

IO. CHRIST. POLYC. ERXLEBEN

PHIL. D. ATQVE PROF. P. O. IN ACADEMIA GEORGIA AV-
GVSTA, REG. SOCIET. SCIENT. GOETTING. INSTIT. REG. HISTOR.
GOETTING. SOCIET. BATAV. PHILOSOPH. EXPERIMENT. ROTERO-
DAMI DICATAE, SOCIET. REG. OECON. CELLENSIS SODALIS;
SOCIET. BEROLIN. NATVR. CVRIOS. MEMBR. HONORAR.

S Y S T E M A
REGNI ANIMALIS

PER
CLASSES, ORDINES, GENERA,
SPECIES, VARIETATES

CVM
SYNONYMIA ET HISTORIA ANIMALIVM.

CLASSIS I
MAMMALIA.

Roder,
Gottingae, 1777.



Donum Fel. Auctario.

L I P S I A E
IMPENSIS WEYGANDIANIS
MDCCLXXVII.

SMITHSONIAN
JUN 17 1959
LIBRARY

AL
708
E79
1777
SCHHRB
594
E73
mem.

SERENISSIMO

ATQVE

POTENTISSIMO PRINCIPI

AC DOMINO

GEORGIO III

MAGNAE BRITANNIAE, FRANCIAE,

HIBERNIAE

REGI

DEFENSORI FIDEI

DVCI BRVNSVICENSIVM ET LVNEBVRGENSIVM

S. R. I. ARCHITHESAVRARIO ET

PRINCIPI ELECTORI

DOMINO SVO CLEMENTISSIMO.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

CHICAGO, ILL.

1910

...

...

...

...

...

...

...

In Academia TVA Goettingensi,
REX CLEMENTISSIME eruditus, in-
que eadem postea constitutus publi-
cus professor, TVISque stipendiis, vt
aliis sermonibus et scriptionibus pro-
sim, nutritus, **AVGVSTISSIMO TVO**
NOMINI istum praecipue librum in-
scribendum iudicaui, quem vix con-
scripsissem, nisi bibliotheca Georgiae
TVAE Augustae maxime adiutus. Ea

autem potissimum cura subit animum,
vt quae TIBI, REGVM OPTIME, di-
cantur, TE digna sint. Heic tamen
non habeo, quae excusationi mihi ef-
se possint praeter ea, quae olim apud
Vespasianum suum Plinius: et Diis
rusticos multasque gentes supplicare,
et mola tantum falsa litare, qui non
habent thura.

MAIESTATI TVAE

deuotissimus

Io. Christ. Polyc. Erxleben.

PRAEFATIO.

Animus fuit in conscribendo libro, cuius priorem edo particulam, primo catalogum animalium locupletio-rem exhibendi istis, qui in systemate naturae perillustris LINNEI, aliisque libris offenduntur, dein synonyma plura ex auctoribus collecta tradendi suisque quaelibet speciebus tribuendi, quam quae LINNEVS habet, iique qui huius viri immortalis vestigia pressere.

Disposui itaque, quae mihi innotuerunt ex Mammalium classe animalia, hanc enim solam hodie absolutam edo, tam propriis obseruationibus, quam auctorum lectione. Genera stabiliui, quae mihi maxime naturalia visa, nullius iurans in verba magistri; specierum characteres erui, varietates praecipuas notavi, in has minus tamen curiosus quam in ipsas species.

Synonyma, cum vix ac ne vix quidem vquam omnia ex auctoribus colligere me posse mox intelligerem, maiorem tamen eorundem copiam attuli quam quae apud vllum alium occurrit auctorem, cum octo circiter millia ex quadringentis fere voluminibus hausta synonyma ad Mammalia animalia spectantia collegerim, inque hoc libro iam sistam. Inter haec autem

ne vnicum quidem esse, quod non ipse euoluerim atque ex auctore suo descripserim, fidem dare possum, paucissimis iis exceptis, quae signo peculiari (†) notavi, ex auctoribus desumptis, quos mihi ipsi videre nondum licuit. Varietatum synonyma minus curavi.

Neque autem mutavi synonyma auctorum, ne verbo quidem; quod ab aliis haud bene factum credo; neque latino sermone descripsi, quae alia lingua imposita sunt nomina animalibus ab ipsis auctoribus. Omnia chronologico ordine disposui, ut eo melius ex ipsa synonymia pateat artis progressus, quamvis id incommodi habeat is ordo, ut saepius repetenda essent varia nomina, quae alias magis contrahi potuissent.

In figuris animalium citandis semper fere distinxī bonas a mediocribus, utrasque a malis et pessimis, nec non quae ex viuo, ut dicunt, paratae sunt, a descriptis. Cum vero nonnullorum auctorum, EDWARDSII, BUFFONII, aliorumque figurae tantum non omnes bonae, imo optimae, sunt, de his raro aliquid monui, nisi ubi notandus erat aliquis defectus.

Nomina animalium, quibus appellantur hodie apud varias orbis gentes, sedulo conquisiui. Maximi haec mihi adiumenti fuit, quod gratissima profecto mente publice testandum est, singularis

gularis benevolentia, qua collega aestumatissimus, IO. ANDR. DIEZE vir doctiss. nomina animalium hispanica, lusitanica, italica, anglica, saepe etiam gallica, quae compilaueram, accuratius examinare, corrigere vehementerque augere aliis mihi plane ignotis voluit. Hoc scilicet studio pro ea, qua pollet vir doctissimus erga omnes litterarum cultores humanitate, eaque qua me suscepit amicitia, eo magis gratum vtileque lectoribus opus profecto effecit; me vero sibi obstrictissimum reddidit, qui praeter ea cum reliquis, qui bibliothecae academicae Georgiae Augustae praesunt viris doctissimis, libris mihi nondum notis ad scopum meum facientibus indigitandis afferendisque maxime proficuum operi, quod hic sisto, se praebuit.

Libros porro aliquot in bibliotheca academica nondum exstantes rarioresque, pro suo in me favore lubentissime, quod gratissima recolo mente, communicavit CHRIST. GVIL. BÜTTNER vir doctiss.

Iniustum autem foret, si intactum illaudatumque hic dimitterem IVST. CHRIST. LODER virum clariss. historiae naturalis atque medicae artis cultorem apud nos felicissimum, quem praecipue adiutorem, eumque indefessum maxime atque sedulum, habui in colligendis atque ordi-

nandis nominibus ex Rufforum, Tungusorum, Buraetorum etc. linguis desumptis. Nil vere sine isto in his praestitiffem, cum ne legere quidem, quae Rufforum characteribus scripta sunt, ante feiuerim, quam amicitia viri clariffimi frui licuerit.

Absoluto denique opere, typisque fere exscripto, hungarica animalium mammalium nomina bencuole communicauit Generofiffimus IOSEPHVS DE PODMANICZKY, Nobilis Hungarus, notato fimul adiectis in parenthefi litteris fono, quo pronuntianda sunt. Haec eo gratiora fore lectoribus iudicauit, quo rarius apud alios occurrunt auctores, addidique sub fine voluminis.

Atque haec fere sunt, quae monenda heic habui. Simili studio et reliquas regni animalis classes complecti animus est, multaque eo facientia iam collegi; quando vero alteram, Auium, classem abfoluere liceat, multis aliis negotiis obrutus haftenus nescio. Goettingae, mense Nouembri, MDCCCLXXVI.

C A T A L O G V S

Voluminum eorumque editionum quibus vsus sum.

- Act. holmiens.* Der königl. schwed. Academie der Wissenschaften Abhandlungen, aus dem Schwed. überf. durch Abr. Gotth. Kästner, Hamb. et Lipf. 1749 seqq. 8 mai.
- Act. nidros.* Der Drontheimischen Gesellschaft Schriften, aus dem Dänischen überf. Hafn. 1765 seqq. 8.
- Act. vpsal.* Acta societatis regiae scientiarum vpsaliensis, Holm. 1744 seqq. 4.
- Adanf. Seneg.* Histoire naturelle du Senegal, par M. Adanson, à Paris 1757, 4 mai.
- Aelian. anim.* Aeliani de natura animalium Libri XVII cum animaduersionibus Conr. Gesneri et Dan. Wilh. Trilleri, curante Abr. Gronouio, Lond. 1744, 4 mai.
- Agric. an. subtr.* Georgii Agricolae de animantibus subterraneis liber, Witteb. 1614, 8.
- Agric. monogr.* Ioh. Georg. Agricola von des Hirschsens Natur und Eigenschaft, Amberg. 1603, 4 †
- Albin birds* A natural history of birds illustrated with a hundred and four Copper-plates, by Eleaz. Albin, Lond. 1731 - 1738, 4; Vol. I - III.
- Aldrov. bisulc.* Vlyff. Aldrouandi quadrupedum omnium bisulcorum historia, Bonon. 1642, fol.
- Aldrov. digit.* Vlyff. Aldrouandi de quadrupedibus digitatis viuiparis L. III et de quadrupedibus digitatis ouiparis L. II Bonon. 1645, fol.

Aldrov.

- Aldrov. ornith.* Vlyff. Aldrouandi ornithologia, Bonon. 1646, fol. Tom. I-III.
- Aldrov. pisc.* Vlyff. Aldrouandi de piscibus L. V et de Cettis Lib. vnus, Bonon. 1638, fol.
- Aldrov. solid.* Vlyff. Aldrouandi de Quadrupedibus solidipedibus L. Bonon. 1647, fol.
- Aless. quadrup.* Animali quadrupedi tolti dal naturale difsegnati, incisi e miniati co i lor veri colori da Innoc. Alessandri e Pietr. Scataglia, in Venez. 1771-1775, fol. mai. Tom. I-IV.
- Allam. Buff. hist. nat.* Editio barata operis Buffoniani, quam curavit doctiff. Allamand. †
- Alpin. Aeg.* Prosp. Alpini historia Aegypti naturalis, Lugd. bat. 1735, 4.
- Anderf. Isl.* Herrn Ioh. Anderf. Nachrichten von Island, Grönland und der Strasse Davis, Frankf. und Leipz. 1747, 8.
- Anson voy.* A voyage round the world in the years 1740, 1, 2, 3, 4 by George Anson Esq. compiled — by Rich. Walter Lond. 1748, 4 mai.
- Argensf. Molucc.* The discovery and conquest of the Molucco and Philippine Islands, written in Spanish by Bartholomew Leonardo de Argensola, Lond. 1708, 4.
- Arist. hist. anim.* Aristotelis historia de animalibus, Iul. Caes. Scaligero interprete, cum eiusdem commentariis, Tolos. 1619, fol.
- Art. descript.* Petr. Artedi Descriptiones specierum piscium, Lugd. bat. 1738, 8.
- Art. gen.* Petr. Artedi genera piscium, Lugd. bat. 1738, 8.
- Art. synon.* Petr. Artedi synonymia nominum piscium, Lugd. bat. 1738, 8.
- Bancr. Guian.* An essay on the natural history of Guiana in South America, in several letters from a Gent.

a Gentleman of the medical faculty (Edw. Bancroft) Lond. 1769, 8 mai.

- Barbot Guin.* A description of the Coasts of North and South-Guinea and of Etniopia inferior, vulgarly Angola, by John Barbot; in *Churchill's collect. II p. I.*
- Barr. Fr. équ.* Essai sur l'histoire naturelle de la France équinoxiale, par Pierre Barrere, à Paris 1749, 12.
- Barthol. act. hafn.* Thom. Bartholini Acta medica et philosophica hafniensia ann. 1671 et 1672 Hafn. 1673 seqq. 4.
- Baub. monogr.* Casp. Baubini de lapidis Bezaar ortu, natura, differentiis veroque usu Liber, Basil. 1613, 8.
- Bell trav.* Travels from St. Petersburg in Russia to diverse parts of Asia by John Bell, Glasgow 1763, 4; Tom. I et II.
- Bellon. aquat.* Petr. Bellonii de aquatilibus Libri II, Paris. 1553, 8 long.
- Bellon. obs.* Petri Bellonii observationes tribus libris expressae, Antwerp. 1605, fol.
- Bellon. ois.* L'histoire de la nature des oyseaux avec leurs descriptions et naïfs portraits retirez du naturel par Pierre Belon du Mans, à Paris 1555, fol.
- Bellon. poiss.* L'histoire naturelle des estranges poissons marins, par Pierre Belon du Mans, à Paris 1551, 4.
- Bergen orat.* Car. Aug. a Bergen oratio de Rhinocerote, Francof. ad V. 1746, 4. †
- Berl. Samml.* Berlinische Sammlungen zur Beförderung der Arzneywissenschaft, der Naturgeschichte etc. Berolin. 1768 seqq. 8.
- Bernier voy.* Voyages de François Bernier, contenant la description des etats du Grand Mogol etc. à Amsterd. 1699, 12; Tom. I, II.

- Blumenb. gen. hum. var.* Io. Frid. Blumenbachi disputatio de generis humani varietate nativa, Goett. 1775, 8.
- Bom. dictioun.* Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle par M. Valmont de Bomare, à Paris 1768, 4 mai. Tom. I-IV.
- Bont. Ind. or.* Jacobi Bontii historiae naturalis et medicae Indiae orientalis L. VI cum Guil. Pisonis de Indiae utriusque re naturali et medica L. XIV Amstel. 1658, fol.
- Borr. Cochinch.* An Account of Cochinchina by Christopher Borri; in *Churchill's collection II* p. 787.
- Bossm. Guin.* Reise nach Guinea durch Wilh. Bossmann, Hamb. 1708, 8.
- Boullaye voy.* Les voyages et observations du Sieur de la Boullaye-le-Gouz, à Paris, 1657, 4.
- Bradl. nat.* A philosophical account of the works of nature, by Rich. Bradley, Lond. 1721, 4 max.
- Bresl. Samml.* Sammlung von Natur- und Medicin-wie auch hierzu gehörigen Literaturgeschichten, Leipz. 1717-1730, 4.
- Brick. North-Carol. rol.* The natural history of North-Carolina, by John Brickell, Dublin, 1737, 8.
- Briss. regn. an.* Regnum animale in classes IX distributum: Le regne animal divisé en IX classes, par M. Brisson, à Paris 1756, 4 mai.
- Brown. Iam.* The civil and natural history of Iamaica, by Patrick Browne, Lond. 1756 fol.
- Bruin Reiz.* Cornelis de Bruins Reizen over Moskovie, door Perse en Indie, Amsterd. 1711 fol.
- Buff. hist. nat.* Histoire naturelle générale et particulière, avec la description du cabinet du Roi, par MM. de Buffon et D'aubenton, à Paris 1749-1767, 4 mai. Tom. I-XV.
- Caes. Gall.* C. Iul. Caesaris de bello gallico Libri VIII.
- Castelli monogr.* De hyacina odorifera *εξετασις*; Petri Castelli, Francof. 1641, 12.

- Catesb. Carol.* The natural history of Carolina, Florida and the Bahama Islands by Mark Catesby, Lond. 1731, fol. mai. Tom. I, II.
- Cauche Madag.* Relations veritables et curieuses de l'isle de Madagascar et du Bresil, à Paris, 1651, 4.
- Chardin voy.* Voyages du Chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l'Orient, à Amst. 1735, 4; Tom. I-IV.
- Charlet. exerc.* Gualt. Charletoni exercitationes de differentiis et nominibus animalium, Oxon. 1677, fol.
- Charlev. nouv. Fr.* Histoire et description generale de la nouvelle France, par le P. de Charlevoix, à Paris 1744, 4; Tom. I-III.
- Church. collect.* A collection of voyages and travels, Lond. 1704, fol.
- Cieza Peru* The seventeen years travels of Peter de Cieza through the mighty Kingdom of Peru, Lond. 1709, 4.
- Cluf. exot.* Car. Clusii exoticorum L. X Antwerp. 1605, fol.
- Column. aquat.* Aquatilium et terrestrium aliquot animalium aliarumque naturalium rerum observationes Fabio Columna auctore; in Eiusdem minus cognitarum rariorumque stirpium Ecphrasi, Rom. 1616, 4.
- Comm. petrop.* Commentarii academiae scientiarum imperialis petropolitanae, Petrop. 1726-1752, 4 mai. Tom. I-XIV.
- Condam. voy.* Relation abrégée d'un voyage fait dans l'intérieur de l'Amerique méridionale par M. de la Condamine, à Paris, 1745, 8.
- Cranz. Groenl.* Dav. Cranz Historie von Grönland, Barby, 1765, 8.
- Dampier voy.* Nouveau voyage autour du monde par Guill. Dampier, à Rouen 1723, 8; Tom. I-V.

- Dapp. Afr.* Umständliche und eigentliche Beschreibung von Africa, durch O. Dapper, Amsterd. 1670, fol.
- De la Caille voy.* Journal historique du voyage fait au Cap de bonne esperance, par M. de la Caille, à Paris 1763, 12.
- Della Valle voy.* Les fameux voyages de Pietro della Valle à Paris 1662, 4; Tom. I-IV.
- Des March. voy.* Voyage du Chevalier Des Marchais en Guinée, à Amsterd. 1731, 8, Tom. I-IV.
- Dictioun. anim.* Dictionnaire raisonné et universel des animaux par M. D. L. C. D. B. à Paris 1759, 4 mai. Tom. I-IV.
- Dierev. Acad.* Relation du voyage du Port Royal de l'Acadie ou de la nouvelle France, par M. Diereville, à Amsterd. 1710, 8.
- Dobbs Hudf.* An account of the countries adjoining to Hudson's bay by Arthur Dobbs Esq. Lond. 1744, 4.
- Du Halde Chin.* Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'empire de la Chine et de la Tartarie chinoise, par le P. I. B. du Halde, à la Haye 1736, 4; Tom. I-IV.
- Du Pratz Louif.* Histoire de la Louisiane, par M. Le Page du Pratz, à Paris 1758, 8; Tom. I-III.
- Du Tertre Antill.* Histoire generale des Antilles par le R. P. Du Tertre, à Paris 1667, 4; Tom. I-III.
- Edw. birds* A natural history of Birds, by George Edwards, Lond. 1743 - 1751, 4; Tom. I-IV.
- Edw. glean.* Gleanings of natural history, by George Edwards Lond. 1758 - 1764, 4; Tom. I-III.
- Edw. monogr.* Edwards Beschreibung des Sanglins oder kleinern Cagui, Hamb. 1773, 4.
- Egede Groenl.* Description et histoire naturelle du Groenland par M. Egede, à Copenh. 1763, 8.

- Ellis Hudf.* Heinr. Ellis Reise nach Hudfons Meerbusen, Goett. 1750, 8.
- Fermin Surin.* Phil. Fernins historisch physikalische Beschreibung der Kolonie Surinam, aus dem Franz. übers. Berlin 1775, 8; Tom. I, II.
- Fernand. anim.* Historiae animalium et mineralium nouae Hispaniae lib. I Franc. Fernandez authore; in Hernandezii (eiusdem auctoris) *rer. medic. thesauro.*
- Feuill. Journ.* Journal des observations, physiques, mathematiques et botaniques, faites par l'ordre du Roi sur les côtes orientales de l'Amérique meridionale etc. par le R. P. Louis Feuillée, à Paris 1714, 4; Tom. I-III.
- Flacourt Madag.* Histoire de la grande isle Madagascar, composée par le Sieur de Flacourt, à Paris 1658, 4.
- Forsk. fn. orient.* Petr. Forskål faunae orientalis conspectus; in eiusd. descriptionibus animalium quas in itinere orientali obseruauit, Haun. 1775, 4.
- Frezier voy.* Relation du voyage de la mer de Sud aux côtes du Chili, du Perou et du Bresil, par M. Frezier, à Amst. 1717, 8; Tom. I, II.
- Frisch Vögel* Ioh. Leonh. Frisch Vorstellung der Vögel in Teutschland, Berlin, fol.
- Froger voy.* Relation d'un voyage fait en 1695, 1696 et 1697 aux côtes d'Afrique, Detroit de Magellan, etc. par le Sieur Froger, à Paris 1699, 8.
- Garc. arom.* Aromatum et simplicium aliquot medicamentorum apud Indos nascentium historia conscripta a D. Garcia ab Horto; in *Clusii exor.*
- Gesn. aquat.* Conr. Gesneri historiae animalium Lib. IIII qui est de piscium et aquatilium animalium natura, Tiguri 1558, fol.

- Gesn. av.* Conr. Gesneri historiae animalium Lib. III
qui est de avium natura, Tiguri 1555 fol.
- Gesn. Fischb.* Conr. Gesneri vollkommenes Fischbuch,
Frankf. 1670, fol.
- Gesn. quadrup.* Conr. Gesneri historiae animalium Lib. I de
Quadrupedibus viviparis, Tiguri 1551 fol.
- Gesn. Thierb.* Allgemeines Thierbuch, durch Conr. Gesne-
rum in lateinischer Sprache beschrieben,
durch Conr. Forerum ins Teutsche überf.
Frankf. 1669, fol.
- I. G. Gmel. Sibir.* Ioh. Georg Gmelins Reise durch Sibirien,
Goett. 1751, 8; Tom. I-IV.
- S. G. Gmelin Reif.* Sam. Georg. (*erronee pro Gottlieb*) Gmelins
Reise durch Rußland zur Untersuchung der
drey Naturreiche, Petersb. 1770 fqq. 4
mai. Tom. I-III.
- Grab, monogr.* Io. Andr. Grabæ elaphographia s. descriptio
Cerui, Ien. 1667, 8. †
- Grew mus. reg. soc.* Musæum regalis societatis, or a Catalogue
and description of the rarities belonging to
the Royal Society, by Nehem. Grew, Lond.
1686, fol.
- Gronov. zooph. I.* Laur. Theod. Gronouii Zoophylacii Gronouia-
ni fasciculus primus, Lugd. bat. 1763, fol.
- Gum. Orin.* El Orinoco ilustrado y defendido, por el Pa-
dre Joseph Gumilla, en Madrid 1745, 4;
Tom. I, II.
- Hallen vierf.* Die Naturgeschichte der Thiere in sistemati-
scher Ordnung. Die vierfüßigen Thiere,
von Ioh. Sam. Haller (*falso pro Hallen*)
Berl. 1757, 8.
- Hartenfels monogr.* Elephantographia curiosa, seu Elephanti de-
scriptio, authore D. Geo. Chph. Petri ab
Hartenfels, Erford. 1715, 4.
- Hasselqu. Palaest.* Frid. Hasselquitts Reise nach Palaestina, aus
dem Schwed. überf. Rostock 1762, 8 mai.

- Hawkesw. Seereis.* Geschichte der Seereisen und Entdeckungen im Südmeer von Ioh. Hawkesworth, aus dem Engl. überf. von Ioh. Frid. Schiller, Berlin 1774, 4 mai. Tom. I-III.
- Heinsf. monogr.* Vdadr. Heinsii dissertatio de Alce, Ien. 1697, 4.
- Hernand. Mex.* Rerum medicarum nouae Hispaniae thesaurus, seu plantarum, animalium, mineralium mexicanorum historia, ex Franc. Hernandez relationibus a Nardo Ant. Reccho collecta, Rom. 1651, fol.
- Hill anim.* An history of animals, by John Hill, Lond. 1752, fol.
- Hist. de l'acad.* Histoire de l'academie royale des sciences, avec les memoires, à Paris 1699 seqq. 4.
- Höchstr. Lapp.* Petr. Höchströms Beschreibung von dem unter Schwedischier Crone gehörigen Lappland, aus dem Schwed. überf. von Templin, 1748, 8.
- Hourr. nat. hist.* Natuurlyke historie of uitvoerige Beschryving der Dieren, Planten en Mineralien, volgens het Samenstel van den Heer Linnaeus, Amsterd. 1761 seqq. 8 mai.
- Hugh. Barbad.* The natural history of Barbados by the reverend Mr. Griffith Hughes Lond. 1750 fol.
- Hulden monogr.* Phil. Lib. ab Hulden multifariae vtilitatis Rangifer, Ien. 1696, 4.
- Iacob. mus. reg.* Museum regium seu catalogus rerum tam naturalium quam artificialium quae in Basilica bibliothec. augustiss. Daniae Monarchae asseruantur descriptus ab Olig. Iacobaeo, Hafn. 1696, fol.
- Ionst. av.* Io. Ionstoni theatrum vniuersale de auibus Heilbr. 1756, fol.
- Ionst. quadrup.* Io. Ionstoni theatrum vniuersale omnium animalium quadrupedum, Heilbr. 1755, fol.

- Ionst. pisc.* Io. Ionstoni historiae naturalis de piscibus et cetis Libri V, Heilbr. 1767, fol.
- Kaempf. amoen. exot.* Engelb. Kaempferi amoenitatum exoticarum politico - physico - medicarum fasciculi V, Lemgou. 1712, 4.
- Kaempf. Japon.* The history of Iapan, by Engelb. Kaempfer, Lond. 1727, fol.
- Kalm Amer.* Pet. Kalms Beschreibung der Reise nach dem nördlichen America, Goett. 1759, 8; Tom. I-III.
- Klein. miss. pisc.* Iac. Theod. Klein historiae piscium naturalis promouendae missus I-V, Ged. 1040-1749, 4 mai.
- Klein. prodr. av.* Iac. Theod. Klein historiae avium prodromus, Lubec. 1750, 4.
- Klein. quadrup.* Iac. Theod. Klein Quadrupedum dispositio brevisque historia naturalis, Lips. 1751, 4.
- Knorr delic.* Deliciae naturae selectae, oder auserlesenes Naturalien cabinet ehemals herausgegeben von Georg. Wolfg. Knorr, beschrieben von Phil. Lud. Stat. Müller Nürnberg. 1766 fol. mai. Tom. I, II.
- Knox Ceylon.* An historical relation of the Island Ceylon, by Rob. Knox, Lond. 1681, fol.
- Kolbe Vorgeb.* Vollständige Beschreibung des africanischen Vorgebirges der guten Hoffnung von M. Pet. Kolben, Nürnberg. 1709, fol.
- Kram. Austr.* Guil. Henr. Kramer elenchus vegetabilium et animalium per Austriam inferiorem observatorum, Vienn. 1756, 8.
- Laet Amer.* Novus orbis seu descriptionis Indiae occidentalis L. XVIII auth. Io. de Laet, Lugd. bat. 1633, fol.
- Laur. mus. reg.* Museum regium seu catalogus rerum tam naturalium quam artificialium etc. ab Olig. Iacobaeo quondam descriptus, nunc vero illustratus accurante Ioh. Lauerentzen Hafn. fol.

- Lawson Carol.** A new voyage to Carolina, by Iohn Lawson^s Lond. 1709, 4. *Conuenit cum editione hac etiam pagina altera sub titulo: the History of Carolina by Iohn Lawson, Lond. 1718, 4; cui icones additae sunt, quas non reperio in priore.*
- Laxm. Sibir. br.** M. Erich Laxmann's Sibirische Briefe herausgegeben von Aug. Ludw. Schlözer, Goett. 1769, 8.
- Ligon Barbado.** A true and exact history of the Island of Barbados, by Rich. Ligon, Lond. 1657 fol.
- Linn. amoen. acad.** Car. Linnaei amoenitates academicae, Holm. 1749-1769, 8 mai. Tom. I-VII. *Tomi prioris editione lugdunens.* 1749 *vsus sum.*
- Linn. fn. suec. 1.** Car. Linnaei Fauna suecica, Lugd. bat. 1746, 8.
- Linn. fn. suec. 2.** Car. Linnaei Fauna suecica, ed. altera auctior, Stockh. 1761, 8.
- Linn. Gothland.** } Carls von Linné Reisen durch Oeland und
Linn. Oeland. } Gothland, aus dem Schwed. überf. Halle
1764, 8.
- Linn. mant. II.** Car. a Linné mantiffa plantarum altera, Holm. 1771, 8. mai.
- Linn. mus. Ad. Frid. I.** Car. Linnaei Museum Adolphi Friderici Regis, Stockh. 1754, fol. mai.
- Linn. mus. Ad. Frid. II.** Car. a Linné Museum Adolphi Friderici Regis, Tomi II prodromus, Holm. 1764, 8. mai. cum museo Lud. Vlr. reginae.
- Linn. Schon.** Carl Linnaei Versuche einer Natur-Kunst- und Oeconomie historie ven einigen schwedischen Provinzen, Leipz. 1756, 8.
- Linn. syst. nat. 2.** Car. Linnaei systema naturae, Holm. 1740, 8. *Vsus sum quinta editione, Hall. 1747 quae conuenit cum secunda.*
- Linn. syst. nat. 6.** Car. Linnaei systema naturae, Holm. 1748, 8. *Vsus sum editione seprima, Lipsf. 1748, quae conuenit cum sexta.*
- Linn. syst. nat. 10.** Car. Linnaei systema naturae, ed. 10 reformata, Holm. 1758, 8 mai.

- Linn. syst. nat.* 12. Caroli a Linné Systema naturae, ed. 12 reformata, Holm. 1766, 8. mai.
- Linn. Westgoth.* Carls von Linné Reisen durch Westgothland, aus dem Schwed. übers. Halle 1765, 8.
- Lobo Abiss.* Voyage historique d'Abissinie du R. P. Ierome Lobo, de la comp. de I. trad. du Portugais par M. le Grand, Amsterd. 1728, 8; Tom. I, II.
- Ludolf. Aeth.* Iobi Ludolfi historia aethiopica, Francof. 1681, fol.
- Ludolf. comment.* Iobi Ludolfi ad suam historiam aethiopicam commentarius, Francof. 1691, fol.
- Maillet Aeg.* Description de l'Egypte composée sur les mémoires de M. de Maillet par M. l'abbé le Mascrier, à Paris 1735, 4.
- Mandelsl. Reif.* Ioh. Albr. von Mandelslo morgenländische Reisebeschreibung, Schlesw. 1658, fol.
- Marcgr. Brasil.* Georg. Marcgrauii de Liebstad historiae rerum naturalium Brasiliae Libri VIII, cum Guil. Pisonis de medicina brasiliensi L. IV Lugd. bat. 1648, fol.
- Marii monogr.* Io. Marii Castorologia explicans Castoris animalis naturam et usum, Aug. Vind. 1685, 8.
- Marmol Afr.* L'Afrique de Marmol, à Paris 1667, 4 Tom. I, II.
- Mart. Buff. vierf.* Herrn von Buffons Naturgeschichte der vierfüßigen Thiere, mit Vermehrungen aus dem Franz. übers. Berl. 1772 seqq. 8.
- Mart. Naturlex.* Friedr. Heinr. Wilh. Martini allgemeine Geschichte der Natur in alphabetischer Ordnung, Berl. 1774 seqq. 8 mai.
- Mart. Spitzb.* Frid. Martens Spitzbergische oder Grönländische Reisebeschreibung, Hamb. 1675, 4.
- Maupert. oeuvr.* Oeuvres de Maupertuis. Lyon, 1768, 8; Tom. I - IV.
- Mem. de l'acad.* vid. *Hist. de l'acad.*
- Merian. Surin.* Mar. Syb. Meriaen over de Voortteeling en wonderbaerlyke Veranderingen der Surinamsche Insecten, t' Amsterd, 1719, fol.

- Meroll. Cong.* A voyage to Congo and several other Countries in the southern Africk by Ierom Merolla da forrento; *in Church. collect. Ip. 65 I.*
- Meyer Thiere* Ioh. Dan. Meyers Vorstellung allerhand Thiere und ihrer Scelete, Nürnberg. 1748 seqq. fol. Tom. I-III.
- Moncon. voy.* Journal des voyages de Monsieur de Moneonys, à Lyon, 1665, 4; Tom. I, II.
- Moor. trav.* Travels into the inland part of Africa by Francis Moore, Lond. absque anno, 8.
- Mort. Northampt.* The natural history of Northampton-shire, by John Morton, 1712; fol.
- Müll. Dan. prodr.* Zoologiae danicae prodromus, auct. Oth. Frid. Müller, Haun. 1776, 8.
- Müll. Naturf.* Des Ritters Carl von Linné vollständiges Natursystem, ausgefertiget von Phil. Ludw. Stat. Müller, Nürnberg. 1773-1776, 8; Tom. I-VI et Suppl.
- Müll. Samml.* Sammlung russischer Geschichte, Petrop. 1732 seqq. 8.
- Mus. Besler.* Rariora Musei Besleriani, quae olim Basil. et Mich. Rup. Besleri collegerunt, commentariolo illustrata a Io. Henr. Lochnero, 1716, fol.
- Mus. Worm.* Museum Wormianum, seu historia rerum rariorum etc. Lugd. bat. 1655, fol.
- Naturf.* Der Naturforscher, Halle 1774 seqq. 8 mai.
- Neub. Gesandtsch.* Die Gesandtschaft der Ostindischen Gesellschaft an den Tartarischen Cham durch Ioh. Neuhof, Amsterd. 1666, 4 mai.
- Nieremb. hist. nat.* Io. Euseb. Nierembergii historia naturae maxime peregrinae, Antwerp. 1635, fol.
- Nieub. Brasil.* } Voyages and Travels into Brasil and the East-
Nieub. East. Ind. } Indies, by Mr. John Nieuhoff; *in Church. Collect. II p. I.*
- Nov. comment. petr.* Noui commentarii academiae scientiarum imperialis petropolitanae, Petrop. 1750 seqq. 4.

- Ol. Magn. sept.* Historia de gentibus septentrionalibus, autore Olao Magno, Rom. 1555, fol. min.
- Olear. Gott. Kunstk.* Gottleifische Kunstkammer, durch Adamum Olearium, Schlesw. 1674, 4.
- Olear. Reif.* Vermehrte neue Beschreibung der Muscowitischen und Persischen Reyse durch Adam Olearius Ascanius, Schlesw. 1656, fol.
- Oppian. cyneg.* Oppiani de venatione Lib. IV de piscatu LV studio et opera Conr. Rittershusii, Lugd. bat. 1597, 8.
- Osbeck Ostind.* Pet. Osbeck Reise nach Ostindien und China, aus dem Schwed. überf. Rostock 1765, 8.
- Ovalle Chile* Alonso de Ovalle historical relation of the Kingdom of Chile; in *Church. collect.* III p. I.
- Pallas miscell.* P. S. Pallas miscellanea zoologica, quibus nouae imprimis atque obscurae animalium species describuntur, Hag. Com. 1766, 4.
- Pallas Reif.* P. S. Pallas Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs, St. Petersburg. 1771 seqq. 4 mai.
- Pallas spicil.* Petri S. Pallas spicilegia zoologica, Berol. 1767 seqq. 4 mai.
- Parsons monogr.* Die natürliche Historie des Nashorns von D. Parsons aus dem Engl. von Georg Leonh. Huth, Nürnberg. 1747, 4.
- Paullini monogr.* { Christ. Franc. Paullini Talpa, Francof. 1689, 8.
Christ. Franc. Paullini Lagographia curiosa s. leporis descriptio, Aug. vind. 1691, 8. f
- Penn. brit. zool.* British Zoology, Lond. 1763 seqq. fol. mai.
- Penn. ind. zool.* Indian Zoology, by Thom. Pennant, Lond. 1769, fol.
- Penn. syn. quadr.* Synopsis of Quadrupeds, Chester, 1771. 8.
- Pernetty voy.* Histoire d'un voyage aux isles Malouines fait en 1763, et 1764 par Dom Pernetty, à Paris 1770, 8; Tom. I, II.
- Perr. anim.* Memoires pour servir à l'histoire naturelle des animaux, par M. Perrault; in *Memoires de*

de l'acad. roy. des sciences depuis 1666
jusqu' à 1699 Tom. III Parr. I - III, 4.

- Petiv. gazoph.* Iac. Petiveri Gazophylaciam naturæ et artis,
Lond. 1702 seqq. fol.
- Philos. transact.* Philosophical Transactions ; notissimum opus
prodiens ab anno inde 1665, Lond. 4.
- Pis. Ind.* Guil. Pisonis de Indiae vtriusque re naturali
et medica L. XIV, Amstel. 1658, fol.
- Plin. hist. nat.* C. Plinii Secundi naturalis historiae Libri
XXXVII. Citavi capita editionum vulgari-
um, et Harduini.
- Pocock. orient.* A description of the East and some other
Countries by Rich. Pococke, Lond. 1743,
fol. Tom. I, II.
- Pontopp. Dan.* Den Danske Atlas, eller Konge-Riger Dan-
nemark med dets naturlige Egenskaber,
etc. forestillet — ved Erich Pontoppidan,
Kiøbenh. 1763-1769, 4; Tom. I - V.
- Purch. Pilgr.* Purchas his Pilgrimes, Lond. 1625 fol. Tom. I-V.
- Rai. syn. pisc.* Io. Raii synopsis methodica piscium, Lond.
1713, 8.
- Rai. syn. quadr.* Synopsis methodica animalium quadrupedum
et serpentini generis, auct. Io. Raio, Lond.
1693, 8.
- Rauwolf. Reif.* Beschreibung der Reyff Leonhardi Rauwolf-
fen, so er vor dieser Zeit gegen Aufgang in
die Morgenländer selbst vollbracht, Frankf.
1582, 4; Tom. I-III.
- Red. opusc.* Franc. Redi Opuscula varia physiologica, Lugd.
bat. 1729, 2; Tom. I-III.
- Riding. jagdb. Th.* Abbildung der jagdbaren Thiere mit dersel-
ben angefügten Fährten und Spuren von
Ioh. El. Ridinger, Augsb. 1740, fol. mai.
- Rochef. Antill.* Histoire naturelle et morale des Iles Antilles
de l'Amérique (par Rochefort) à Rotterd.
1665, 4.

- Rondel. aquat.* Guil. Rondeletii vniuersae aquatiliū historiae pars altera, Lugd. 1555, fol.
- Rondel. pisc.* Guil. Rondeletii libri de piscibus marinis, Lugd. 1554, fol.
- Rumph. herb. amb. auct.* Geo. Everh. Rumphii herbarii amboinensis auctarium, cura et studio Ioh. Burmanni, Amst. 1755, fol.
- Ruff. Alepp.* The natural history of Aleppo and parts adjacent, by Alex. Ruffel M.D. Lond. 1756, 4 mai.
- Rytzschk. Orenb.* Orenburgische Topographie verfaſſet von Peter Rytzschkov, Riga 1772, 8; Tom. I, II.
- Rzacz. Polon.* Historia naturalis curioſa regni Poloniae, magni ducatus Lituaniae annexarumque prouinciarum, opera P. Gabriel. Rzaczynski S. I. Sandomir. 1721, 4.
- Rzacz. Polon. auct.* Auctarium historiae naturalis - curioſae regni Poloniae etc. studio P. Gabr. Rzaczynski S. I. Ged. 1736, 4.
- Scheff. Lapon.* Io. Schefferi Lapponia, Francof. 1673, 4.
- Scheuchz. it. alp.* Itinera per Heluetiae alpinas regiones facta a Io. Iac. Scheuchzero, Lugd. bat. 1723, 4; Tom. I - IV.
- Schonev. ichth.* Ichthyologia et nomenclaturae animalium marinarum, fluuiatilium, lacustrium, quae in ducatibus Slesuici et Holsatiae et emporio Hamburgo occurrunt triuiales, auctore Steph. a Schonevelde, Hanib. 1624, 4.
- Schreb. Säugth.* Die Säugthiere in Abbildungen nach der Natur, mit Beschreibungen, Erlang, 1775 seqq. 4 mai.
- Schroeck. monogr.* Luc. Schroeckii exercitatio academica de moscho, Ien. 1667, 4.
- Schultz. bil.* De bile medicina diff. Io. Domin. Schultze, Goett. 1775, 4.
- Schwenckf. theriour.* Casp. Schwenckfeld therionophium Silesiae, Lignic. 1603, 4.

- Seb. rhes.* Alb. Sebae locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio, Amstel. 1734 — 1765, fol. max. Tom. I-IV.
- Shaw trav.* Travels, or observations relating to several Parts of Barbary and the Levant, by Thoni. Shaw, Oxford 1738, fol. mai.
- Sibb. Scor. an.* Scotia illustrata, siue prodromus historiae naturalis etc. auctore Rob. Sibbald, Edinb. 1684, fol. Pars secunda specialis: tomus II de animalibus Scotiae.
- Sloane Jam.* A voyage to the Islands Madera, Barbados, Nieves, S. Christophers and Iamaica, by Hans Sloane, Lond. 1702-1725 fol. Tom. I, II.
- Stell. Kamtsch.* Georg Wilh. Stellers Beschreibung von dem Lande Kamtschatka, Frankf. und Leipz. 1774, 8 mai.
- Strahlenb. As.* Das nord- und ostliche Theil von Europa und Asia, ausgefertigt von Phil. Joh. von Strahlenberg, 1730, 4.
- Sulz. monogr.* Versuch einer Naturgeschichte des Hamsters, von F. G. Sulzer, Goett. 1774, 8.
- Tavernier voy.* Les six voyages de Jean-Bapt. Tavernier, à Paris 1682, 4; Tom. I-III.
- Thevenot voy.* Relation d'un voyage fait au Levant par M. de Thevenot, à Paris 1665, 4; Tom. I, II.
- Thevet cosmogr.* La Cosmographie universelle d'André Thevet, à Paris 1575 fol. Tom. I, II.
- Toreen Surat.* Eine ostindische Reise nach Suratte, China, etc. verrichtet von Olof Toreen; cum Osbeckii supra citato itinere.
- Fournes voy.* Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roi par M. Pitton de Tournefort, à Amsterd. 1718, 4; Tom. I, II.
- Tulp. obs.* Nic. Tulpik observationes medicae, Amstel. 1672, 8.
- Tyson monogr.* Orang Outang siue homo siluestris: or the anatomy of a pygmie, by Edw. Tyson, Lond. 1699, 4 mai. Valent.

- Valent. Amboin.* Omftandig Verhaal van de Gefchiedeniffen en Zaaken — in Amboina, door François Valentyn, Dordr. 1726, fol. Operis V voluminum pars III.
- Ulloa voy.* Voyage historique de l'Amerique meridionale fait par ordre du Roi d'Espagne par Don George Iuan et par Don Antoine de Ulloa, à Amft. 1752, 4; Tom. I, II.
- Wafer voy.* Voyage de Mr. Wafer; in tomo IV itin. Dampierii.
- Wagn. Heluet.* Historia naturalis Heluetiae curiofa auct. Io. Iac. Wagnero, Tiguri 1680, 12.
- Wagn. mus. baruth.* P. C. Wagners Beschreibung des Bareuther Naturalienkabinetts. Inceptum opus, non absolutum, absque titulo, editum ab anno inde 1763 fol. mai. Vidi tab. I ad 16 et commentarium a pag. 1 ad pag. 28.
- Waldung. monogr.* Wolffg. Waldungi Lagographia s. liber de natura et vtilitate leporum, Amberg. 1619, 4. †
- Willughbb. pisc.* Franc. Willughbeii de historia piscium libri IV. Totum opus recognouit, coaptauit, suppleuit Ioh. Raius, Oxon. 1686, fol.
- Worm. monogr.* Ol. Wormii historia animalis quod in Norwegia quandoque e nubibus decidit, Hafn. 1653, 4. †
- Ysbr. Reis.* Drie-jarige Reizen naar China door E. Ysbrants Ides, Amsterd. 1704, 4.
- Zerenghi monogr.* La vera descrizione dell' Hippopotamo, autore Federico Zerenghi da Narni, Napoli, 1603, 4. †

REGNI ANIMALIS
CLASSIS I.

M A M M A L I A.

MAXILLAE *incumbentes, tectae*: DENTIBVS *intrusis plerisque.*

MAMMAE *lactiferae.*

* * *

Ordines Classis primariae difficulter determinandi, si vere naturales quaeris; neque pedibus, neque dentibus distinguendi.

Synoptica methodo disposuerunt praecipue e pedum structura Quadrupeda Raius et huic multo inferior Kleinius, postea prudentior Pennantus.

Systematica methodo e solis dentibus desumpta usus est in decima Systematis Naturae editione immortalis Linneus; adhibitis simul pedibus in duodecima: Brissonius autem nimis inhaerens minutiis solos dentes adhibuit ad distinguendos ordines.

Mihi haec generum series arridet, missis omnibus in ordines diuisionibus.

I. HOMO.

Dentes Primores incisores, supra et infra IV:

Laniarii conici, longitudine aequales, approxinati.

Manus

Manus in palmis, non in plantis.

Mammae pectorales II.

Cauda nulla.

2. SIMIA.

Dentes Primores incisores, supra et infra IV.

Laniarii solitarii, reliquis longiores, supra a primoribus, infra a molaribus remoti.

Molares obtusi V - VI vtrinque.

Manus in palmis plantisque.

Mammae pectorales II.

Cauda nulla.

3. PAPIO.

Dentes Primores incisores, supra et infra IV.

Laniarii reliquis longiores, supra a primoribus, infra a molaribus remoti.

Manus in palmis plantisque.

Mammae pectorales II.

Cauda abbreviata.

Sacci in buccis pro macerando cibo.

4. CERCOPITHECVS.

Dentes Primores incisores, supra et infra IV.

Laniarii reliquis longiores, supra a primoribus, infra a molaribus remoti.

Manus in palmis plantisque.

Mammae pectorales II.

Cauda elongata, non prehensilis.

Nates callosae.

Sacci in buccis pro macerando cibo.

5. CEBVS.

5. CEBVS.

Dentes Primores incisores, supra et infra IV.

Laniarius vtrinque I.

Manus in palmis plantisque.

Mammae pectorales II.

Cauda prehensilis.

Nates pilosae.

6. CALLITHRIX.

Dentes Primores incisores supra et infra IV.

Laniarii solitarii.

Manus in palmis plantisque.

Mammae pectorales II.

Cauda elongata non prehensilis.

Nates tectae.

Sacci in buccis nulli.

7. LEMVR.

Dentes Primores superiores IV: intermediis remotis.

inferiores VI longiores, porrecti,
compressi, paralleli, approxi-
mati.

Laniarii solitarii, approximati.

Molares plures, sublobati: antichi longiores
acutiores.

Manus in palmis plantisque (plerisque).

8. DIDELPHIS.

Dentes Primores superiores X.

inferiores VIII: intermediis duobus
breuissimis.

Laniarii longi, plures.

Mola-

Molares denticulati.

Lingua subciliata.

Plantae manus, pollice mutico.

Cauda longa, gracilis, subnuda.

9. BRADYPVS.

Dentes Primores nulli vtrinque.

Laniarii? obtusi, solitarii, molaribus longiores occurrentes.

Molares vtrinque V cylindrici, obtusi.

Corpus pilis tectum.

Crura antica multo longiora posticis.

Vngues longissimi.

10. MYRMECOPHAGA.

Dentes nulli.

Lingua teres, extensilis.

Os angustatum in rostrum.

Corpus pilis tectum.

Vngues longi arcuati.

11. MANIS.

Dentes nulli.

Lingua teres, extensilis.

Os angustatum in rostrum.

Corpus squamis tectum.

Manimae pectorales II.

12. DASYPVS.

Dentes molares plures, VII - VIII vtrinque, absque primoribus, absque laniariis.

Corpus cataphractum testa ossæa, zonis intersecta.

Vngues acuti.

13. TAL-

13. TALPA.

Dentes Primores superiores VI.
inferiores VIII.

Laniarii maior I; inferiores IV.

Nasus elongatus.

Palmae fossoriae.

14. SOREX.

Dentes Primores superiores II bifidi.
inferiores IV: intermediis brevioribus (interdum II).

Laniarii vtrinque plures.

Nasus elongatus gracilis.

Pedes digitati.

15. PTEROPVS.

Dentes Primores IV vtrinque.

Palmae corpore longiores, pollicibus brevissimis, membrana inter digitos expansa et ad crura postica extensa, pro volatu.

Mammae duae pectorales.

16. VESPERTILIO.

Dentes Primores supra et infra numero inaequales, variantes.

Palmae corpore longiores, pollicibus brevissimis, membrana inter digitos expansa et ad crura postica extensa, pro volatu.

Mammae duae pectorales.

17. VRSVS.

Dentes Primores superiores VI, intus excauati, alterni.

inferiores VI: laterales II longiores lobati; secundarii basi interiores.

Laniarii solitarii, conici.

Molares V s. VI: primo laniariis approximato.

Lingua laeuis.

Membrana nictitans.

Nasus prominens.

Penis scatens osse incuruo.

18. ERINACEVS.

Dentes Primores superiores II distantes.

inferiores II minus distantes.

Laniarii vtrisque II recumbentes.

Corpus spinis tectum.

19. SVS.

Dentes Primores superiores IV conuergentes.

inferiores VI prominentes (*variante paullulum numero in variis*).

Laniarii superiores II breuiores.

inferiores II exterti.

Rostrum truncatum, prominens, mobile.

Pedes bifulci.

20. HYDROCHAERVS.

Dentes Primores II - X.

Laniarii nulli.

Palmæ

Palmae vngulis quatuor.

Plantae vngulis tribus.

21. HIPPOPOTAMVS.

Dentes Primores Superiores IV per paria remoti.

Inferiores IV prominentes: intermediis longioribus.

Laniarii solitarii, inferiores maiores, recurvati, oblique truncati.

Pedes margine vnguiculati.

22. RHINOCEROS.

Dentes Primores vtrunque II, remotissimi, obtusi; nisi forte *laniarii* sint absque primoribus.

Cornu solidum, conicum, naso insidens.

Pedes vngulati.

23. ELEPHAS.

Dentes Primores nulli vtrunque.

Laniarii superiores elongati.

Proboscis longissima, prehensilis.

Corpus nudiusculum.

24. EQVVS.

Dentes Primores Superiores VI, obtuse truncati.

Inferiores VI, prominentiores.

Laniarii solitarii, vtrunque remoti.

Pedes vngula indiuisa.

Mammae II inguinales.

25. CAMELVS.

Dentes Primores Superiores nulli.

Inferiores VI spathiformes.

Laniarii distantes: superiores III; inferiores II.

Cornua nulla.

Labium superius fissum.

Pedes subdidactyli.

26. BOS.

Dentes Primores Superiores nulli.

Inferiores VIII.

Laniarii nulli.

Cornua concava, antrorsum versa, lunata, laevia.

Pedes vngulati.

Mammae inguinales.

27. OVIS.

Dentes Primores Superiores nulli.

Inferiores VIII.

Laniarii nulli.

Cornua concava, retrorsum versa, intorta, rugosa.

Pedes vngulati.

Mammae inguinales.

28. CAPRA.

Dentes Primores Superiores nulli.

Inferiores VIII.

Laniarii nulli.

Cornua concava, sursum versa, erecta, compressa, scabra.

Mentum barbatum.

Pedes vngulati.

Mammae inguinales.

29. ANTILOPE.

Dentes Primores Superiores nulli.
Inferiores VIII.

Laniarii nulli.

Cornua concaua, fursum versa, teretia, annulata
 vel spiralia.

Mentum imberbe.

Pedes vngulati.

Mammae inguinales.

30. CERVVS.

Dentes Primores Superiores nulli.
Inferiores VIII.

Laniarii nulli (interdum solitarii superius).

Cornua solida, annua, tenera corio hirto tecta
 apiceque crescentia, denudata.

Pedes vngulati.

Mammae inguinales.

31. MOSCHVS.

Dentes Primores Superiores nulli.
Inferiores VIII.

Laniarii superiores solitarii exserti.

Cornua nulla.

Pedes vngulati.

Mammae inguinales.

32. LEPVS.

Dentes Primores vtrinque II: *superiores* duplicati:
interioribus s. palatinis minoribus.

Laniarii nulli.

Pedes digitati: digitis 5 - 4.

33. HYSTRIX.

Dentes Primores vtrunque II oblique scissi.

Laniarii nulli.

Molares IV vtrunque supra et infra.

Corpus spinis tectum.

34. CAVIA.

Dentes Primores supra et infra II.

Laniarii nulli.

Pedes digitati: digitis 4-3. (At Pacae 5-5.)

Cauda nulla, sicut brevis.

35. GLIS.

Dentes Primores vtrunque II.

Laniarii nulli.

Auriculae abbreviatae.

Pedes digitati: digitis 4-5.

Cauda brevis vel mediocris, pilosa.

36. SPALAX.

Dentes Primores vtrunque II, cuneiformes, plani.

Laniarii nulli.

Oculi minuti.

Auriculae nullae.

Pedes pentadactyli.

Cauda nulla s. breuissima.

37. MVS.

Dentes Primores vtrunque II; *inferiores* subulati.

Laniarii nulli.

Pedes digitati: digitis 4-5.

Cauda gracilis, subnuda.

38. IACVLVS.

Dentes Primores vtrinque II. MON

Laniarii nulli.

Pedes antichi breuissimi; postici elongati.

Cauda elongata, apice floccosa. simi2

39. SCIVRVS.

Dentes Primores vtrinque II: *superiores* cuneati;
inferiores compressi. signi

Laniarii nulli.

Pedes digitati: digitis 4-5: palmis saepe vngui-
culus pollicaris.

Cauda longa, pilis longioribus.

40. CASTOR.

Dentes Primores vtrinque II: *Superiores* truncati,
angulo transuerso excauati; *inferiores*
apice transuersi.

Laniarii nulli.

Pedes digitati: digitis 5-5.

Cauda plana, nec teres, squamosa.

41. LVTRA.

Dentes Primores Superiores VI, erecti, acutiores, di-
stincti.

Inferiores VI, obtusiores, conferti:
duo interiores.

Pedes pentadactyli palmati. cous. 2

42. MVSTELA.

Dentes Primores Superiores VI, erecti, acutiores,
distincti. 159 32

Inferiores VI, obtusiores, conferti:
duo interiores.

1. *Lingua* laevis.

2. *Pedes* fissi, pentadactyli.

43. VIVERRA.

Dentes Primores vtrinque VI: intermediis breuio-
ribus.

Molares plures quam tres.

Lingua retrorsum saepe aculeata.

Vngues exserti.

44. FELIS.

Dentes Primores VI acutiusculi: exterioribus ma-
ioribus.

Laniarii solitarii, supra a primoribus, infra
a molaribus remoti.

Molares terni.

Lingua retrorsum aculeata.

Pedes digitati: digitis 5-4: vnguibus retractilibus.

45. CANIS.

Dentes Primores Superiores VI: laterales longiores
distantes: intermedii lobati.

Inferiores VI: laterales lobati.

Laniarii solitarii, incuruati.

Molares VI s. VII (pluresue quam in re-
liquis).

46. PHOCA.

Dentes Primores Superiores VI paralleli: exteriores
maiores.

Inferio-

Inferiores IV paralleli, distincti,
aequales, obtusiusculi.

Laniarii solitarii: superiores a primoribus,
inferiores a molaribus remoti, primori-
bus longiores.

Molares V s. VI, tricuspидati.

Auriculae nullae (plurimis).

Corpus postice gracilescens.

Pedes pentadactyli: postici coaliti.

47. TRICHECHVS.

Dentes Primores nulli vtrinque.

Laniarii superiores solitarii.

Molares ex osse rugoso vtrinque; inferius
duo. (vtrinque quatuor secundum Pen-
nantium).

Labia geminata, fissa.

Auriculae nullae.

Pedes digitati pentadactyli palmati: posteriores
compedes coadunati in pinnam.

48. BALAENA.

Pedes nulli: anticorum loco *pinnae* pectorales;
posticorum loco *pinna caudalis* horizontalis
absque unguibus.

Dentium loco in maxilla superiore *laminae corneae*.

Fistula respiratoria duplex supra caput.

49. PHYSETER.

Pedes nulli: anticorum loco *pinnae* pectorales;
posticorum loco *pinna caudalis* horizontalis,
absque unguibus.

Dentes in maxilla inferiore; non in superiore.
Fistula respiratoria in capite s. fronte.

50. DELPHINVS.

Pedes nulli: anticorum loco *pinnae* pectorales;
 posticorum loco *pinna caudalis* horizontalis,
 absque unguibus.

Dentes in maxilla vtraque.
Fistula respiratoria in capite.

51. MONODON.

Pedes nulli: anticorum loco *pinnae* pectorales;
 posticorum loco *pinna caudalis* horizon-
 talis, absque unguibus.

Dentes duo in maxilla superiore exserti, prae-
 longi, recti, spirales.
Fistula respiratoria in vertice.

Naturales hic subesse *ordines* generum 1-7; 9-11;
 12-20; 21-24; 25-31; 32-40; 41-46; 47-
 51; apparet; neque male coniungi crediderim 7
 et 8; 11 et 12; 20 et 21; 24 et 25; 31 et 32;
 40 et 41; 46 et 47.

Linnaeanam methodum qui praefert, ita disponat
 genera ante dicta:

Secundum editionem X Systematis naturae:

I. PRIMATES.

*Dentes Primores superiores IV, paralleli.
Mammae pectorales II.*

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. HOMO. | 1. HOMO. |
| 2. SIMIA. | 2. SIMIA. |
| | 3. PAPIO. |
| | 4. CERCOPITHECVS. |
| | 5. CEBVS. |
| | 6. CALLITHRIX. |
| 3. LEMVR. | 7. LEMVR. |
| 4. VESPERTILIO. | 15. PTEROPVS. |
| | 16. VESPERTILIO. |

II. BRVTA.

Dentes Primores nulli vtrinqve.

- | | |
|------------------|-------------------|
| 5. ELEPHAS. | 23. ELEPHAS. |
| 6. TRICHECVS. | 47. TRICHECVS. |
| 7. BRADYPVS. | 9. BRADYPVS. |
| 8. MYRMECOPHAGA. | 10. MYRMECOPHAGA. |
| 9. MANIS. | 11. MANIS. |

III. FERAE.

*Dentes Primores superiores VI, acutiufculi.
Laniarii folitarii.*

- | | |
|------------|------------|
| 10. PHOCA. | 46. PHOCA. |
| 11. CANIS. | 45. CANIS. |
| 12. FELIS. | 44. FELIS. |

- | | |
|--------------|--------------|
| 13. VIVERRA. | 43. VIVERRA. |
| 14. MUSTELA. | 41. LYTRA. |
| 15. VRSVS. | 42. MUSTELA. |
| | 17. VRSVS. |

IV. BESTIAE.

Dentes Primores utrinque: intermediis distantibus.

Laniarii semper uno plures utrinque.

Nasus ultra os prominens.

- | | |
|----------------|----------------|
| 16. SVS. | 19. SVS. |
| 17. DASYPVVS. | 12. DASYPVVS. |
| 18. ERINACEVS. | 18. ERINACEVS. |
| 19. TALPA. | 13. TALPA. |
| 20. SOREX. | 14. SOREX. |
| 21. DIDELPHIS. | 8. DIDELPHIS. |

V. GLIRES.

Dentes Primores bini supra et infra, a molaribus remoti.

Laniarii nulli.

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 22. RHINOCEROS. | 22. RHINOCEROS. |
| 23. HYSTRIX. | 33. HYSTRIX. |
| 24. LEPVS. | 32. LEPVS. |
| 25. CASTOR. | 40. CASTOR. |
| 26. MVS. | 34. CAVIA. |
| | 35. GLIS. |
| | 36. SPALAX. |
| | 37. MVS. |
| | 38. IACVLVS. |
| 27. SCIVRVS. | 39. SCIVRVS. |

VI. PECORA.

Dentes Primores superiores nulli.
inferiores VI aut VIII a mo-
laribus remotissimi.

Pedes vngulati.

Mammae inguinales.

28. CAMELVS.

25. CAMELVS.

29. MOSCHVS.

31. MOSCHVS.

30. CERVVS.

30. CERVVS.

31. CAPRA.

28. CAPRA.

29. ANTILOPE.

32. OVIS.

27. OVIS.

33. BOS.

26. BOS.

VII. BELLVAE.

Dentes Primores obtuse truncati.

Mammae duae inguinales.

34. EQVVS.

24. EQVVS.

35. HIPPOPOTAMVS.

21. HIPPOPOTAMVS.

20. HYDROCHAERVS.

VIII. CETE.

Spiracula supra Caput.

Pinnae pectorales caudalisque horizontalis, abs-
que vnguibus.

36. MONODON.

51. MONODON.

37. BALAENA.

48. BALAENA.

38. PHYSETER.

49. PHYSETER.

39. DELPHINVS.

50. DELPHINVS.

Secundum editionem XII Systematis naturae.

I. PRIMATES.

Dentes Primores incisores: superiores IV paralleli.

Mammae pectorales II.

1. HOMO.

2. SIMIA.

3. LEMVR.

4. VESPERTILIO.

1. HOMO.

2. SIMIA.

3. PAPIO.

4. CERCOPITHECVS.

4. CEBVS.

6. CALLITHRIX.

7. LEMVR.

15. PTEROPVS.

16. VESPERTILIO.

II. BRVTA.

Dentes Primores nulli vtrinque.

5. ELEPHAS.

6. TRICHECVS.

7. BRADYPVS.

8. MYRMECOPHAGA.

9. MANIS.

10. DASYPVS.

23. ELEPHAS.

47. TRICHECVS.

9. BRADYPVS.

10. MYRMECOPHAGA.

11. MANIS.

12. DASYPVS.

III. FERAE.

*Dentes Primores superiores sex, acutiusculi.
Canini solitarii.*

11. PHOCA.

12. CANIS.

13. FELIS.

14. VIVERRA.

46. PHOCA.

45. CANIS.

44. FELIS.

43. VIVERRA.

15. MV.

15. MUSTELA.

41. LUTRA.

16. VRSVS.

42. MUSTELA.

17. DIDELPHIS.

17. VRSVS.

18. TALPA.

8. DIDELPHIS.

19. SOREX.

13. TALPA.

20. ERINACEVS.

14. SOREX.

18. ERINACEVS.

IV. GLIRES.

Dentes Primores bini supra et infra approxima-
ti, a molaribus remoti.

Laniarii nulli.

21. HYSTRIX.

33. HYSTRIX.

22. LEPVS.

32. LEPVS.

23. CASTOR.

40. CASTOR.

* CAVIA.

34. CAVIA.

34. MVS.

35. GLIS.

36. SPALAX.

37. MVS.

38. IACVLVS.

25. SCIVRVS.

39. SCIVRVS.

26. NOCTILIO.

16. VESPERTILIO.

V. PECORA.

Dentes Primores superiores nulli.
inferiores VI aut VIII a mola-
ribus remotissimi.

Pedes vngulati.

Mammae inguinales.

27. CAMELVS.

25. CAMELVS.

28. MOSCHVS.

31. MOSCHVS.

29. CERVVS.

30. CERVVS.

30. CAPRA.

28. CAPRA.

31. OVIS.

27. OVIS.

32. BOS.

26. BOS.

VI. BELA

VI. BELLVAE.

Dentes Primores obtuse truncati.

Pedes vngulati.

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 33. EQVVS. | 24. EQVVS. |
| 34. HIPPOPOTAMVS. | 21. HIPPOPOTAMVS. |
| | 20. HYDROCHAERVS. |
| 35. SVS. | 19. SVS. |
| 36. RHINOCEROS. | 22. RHINOCEROS. |

VII. CETE.

Spiracula supra Caput.

Pinnae Pectorales caudalisque horizontalis absque vnguibus.

- | | |
|----------------|----------------|
| 37. MONODON. | 51. MONODON. |
| 38. BALAENA. | 48. BALAENA. |
| 39. PHYSETER. | 49. PHYSETER. |
| 40. DELPHINVS. | 50. DELPHINVS. |

REGNI ANIMALIS

CLASSIS I

M A M M A L I A.

I. HOMO.

- Dentes Primores* incisores, supra et infra IV.
Laniarii conici, longitudine aequales,
approximati.
Manus in palmis, non in plantis.
Mammae pectorales II.
Cauda nulla.

Sapiens. I. HOMO.

Nosce te ipsum.

Variat cultura, loco, non specie.

- Lappo.* α. Paruus torosus albus macrocephalus, facie plana lata, maxilla inferiore prominula acuminata vix barbata, oculis paruis profundis nigrosulcis, naso paruo obtuso, buccis inflatis, ore magno, labiis crassis, auriculis magnis, pilis rectis nigris crassis, brachiis longioribus, manibus plantisque minoribus.

In borealibus Europae, Asiae, Americae.

- Tatarus.* β. Mediocris oliuaceus, facie plana lataque, fronte rugosa, oculis paruis profundis nigris, superciliis largis, naso breui crasso, buccis tumidis, mento prominente acuminato, barba rariore, dentibus

longioribus interstitiis maioribus, pilis nigris crassioribus, femoribus crassis, cruribus brevioribus.

Ab Imao versus circulum arcticum in Asia.

Asiaticus. γ. Mediocris luridus rigidus, pilis nigricantibus, oculis parvis nigris, naso depresso, labiis crassis, dentibus antrosum versis.

Trans Gangem.

Europaeus. δ. Mediocris albus torosus, pilis flavescentibus prolixis, oculis caeruleis vel fuscis, labiis tenuioribus.

Afer. ε. Magnus niger, cute holosericea ex reticulo mucoso Malpighiano crassiore nigroque, pilis atris contortuplicatis, oculis nigris viridibusque, naso simo, labiis tumidis, ventre inflato, mammis lactantibus prolixis.

Praecipue in Africa occidentali.

Americanus. ζ. Mediocris rufus, pilis nigris rectis crassis, facie ephelctica, fronte parva, oculis nigris, naso aquilino, naribus patulis, mento subimberbi (nisi forte foliarti hoc tribuendum).

Causa varietatum frigoris calorisque gradus varii, vitae ratio, ritus moresque, ignota alia.

Varietates artificiosae monstrosaeque: *Europaei* auriculis immobilibus, iunceaеque puellae abdomine attenuato corpore vespiformi. *Sinenses* oculis parvis remotis, capite conico, naso plano depresso, vnguibus manuum longissimis, abdomine tumido, dentibus nigris, feminaeque pedibus minimis. *Hottentotti* monorchides.

Homo ferus LINN. non est varietas.

Paragonici gigantes fabulosi cum veterum *pygmaeis* (nisi forte *Simiae*), *bermaphroditisque* *Floridae*.

DESCRIPTIO: CORPVS ipsa sua conformatione erectum, nudum, Pilis raris remotissimis adspersum, subsexpedale.

CAPVT obouatum: *Pileus* longius pilosus: *Syncipite* obtuso, *Vertice* obtusissimo, *Occipite* gibboso.

Facies nuda: *Frons* planiuscula, quadrata, *Temporibus* compressa, angulis sinu intra *Pileum* adscendens. *Supercilia* prominula pilis extorsum in suturam imbricatis, interstincta *Glabella* planiuscula. *Palpebra superior* mobilis, *inferior* quieta; vtraque *Ciliis* exstantibus subrecuruatis pectinata. *Oculi* rotundi: *Pupilla* orbiculata absque membrana nititante. *Genae* gibbae, molliusculae, coloratae. *Malae* compressiusculae. *Buccae* laxiores. *Nasus* prominens, labio breuior, compressus, apice altior gibbosiorque: *Naribus* ouatis, intus hirtis, margine crassiusculo. *Labium superius* subperpendiculare, *Lacuna* exaratum; *Labium inferius* erectiusculum, magis gibbum. *Mentum* prominens, obtusum, gibbosum. *Os* maribus setis barbatum, imprimis mentum setis fasciculatum. *Dentes* vtrunque *Primores* incisores, erecti, paralleli, approximati. *Laniarii* solitarii, vix longiores, vtrinque reliquis approximati; *Molares* quini, obtusiusculi. *Aures* laterales: *Auriculae* rotundato-lunatae, compressiusculae, nudaе, supra margine fornicatae; infra gibbosae, molles.

TRUNCVS constans Collo, Thorace, Dorso, Abdomine:

Collum teretiusculum, capite breuius; *Cervicis* *Nucha* concaua; *Gula* supra concaua, medio subtus gibba. *Thorax* antice posticeque depressiusculus; *Pectus* planiusculum, *Iugulo* excavato, *Axillis* concauis barbatis, *Scrobiculo* planiore. *Mammae* duae, pectorales, distantes, gibbae, rotundatae: *Papilla* cylindrica, obtusa, rugosa, areola cincta.

Dorsum Tergo planiusculo, *Humeris* exstantibus, *Iuxta* *scapulo* depresso.

Abdomen gibbum, laxum: *Vmbilico* excavato, *Epi-*
gastro planiore, *Hypogastro* gibbosiore, *Hypo-*
chondriis rotundatis, *Inguinibus* planiusculo-con-
cauis. *Pubis* regio barbata. *Genitalia* exserta: *Pene-*
cylindrico, *Scroto* subrotundo, rugoso cute laxa,
sutura longitudinali per *Perinaeum* excurrente; s.
Vulua gibba, compressiuscula, *clitoride*, *nymphis*
hymeneque instructa. *Cauda* exserta nulla.

ARTVS ex *Manibus* loco pedum anteriorum et *Pe-*
dibus posterioribus:

Manuum *Armi* diuaticati, crassiusculi, teretes, lon-
gitudine pedum. *Cubitus* obtuso - prominulus.
Vlna crassitie armorum, teres, introrsum planior.
Palmae rotundatae, dilatatae, planae, extus con-
vexae, *Vola* concava; *Digiti* V: *Pollex* remotus,
breuior, crassior. *Digiti* 2, 3, 4, 5, approximati,
horum 5 minor reliquis, dein 4, 2 sed 3 paullo
longior, medium femoris attingens. *Vngues* omnibus
rotundati, obouati, plano-conuexi, *lunula* pallida.

Pedum *Femora* approximata, *Lumbis* musculosis, *Na-*
tibus gibbis, carnosis, *Genubus* antroisum versis,
obtusissimis, *poplitibus* subtus concavis. *Crura*
longitudine femorum, postice musculoso-ventrico-
sa, inferne angustiora, antice macra. *Calcanei*
Talis insistentes, prominuli, gibbi: *Malleolis* la-
teralibus, oppositis, hemisphaericis, duriusculis.
Plantae oblongae, supra conuexiusculae, subtus
planae, transuerse concavae. *Digiti* V: omnes
incurui, subtus gibbi, approximati. *Pollex* cras-
sior, breuior; 2, 3 subaequales, 4, 5 decrescen-
tes; ultimo minimo. *Vngues* vt in *Manibus* omnes.

Differt itaque a reliquis Corpore erecto nudo, at
pilofo Capite, *Superciliis* *Ciliisque*, maturis *Pube*,
Axillis. *Caput* *Cerebro* omnium maximo; *Vuula*;
Facies

Facies abdomini parallela, nuda: Naso prominente, compresso, breuiore; Mento prominente. Cauda nulla. Pedes Talis insistentes. Mares mento barbato; Feminae imberbi.

NASCITVR ceteris Animalibus imperaturus fragillimus, nudus, suapte natura inermis, ad vagitus statim et ploratum, ad omnem fortunae contumeliam proiectus, tardae sapientiae alienae opis indigens, post dies grauiditatis 274, longitudine 15-20 pollicum, ponderis 6-7 librarum, capite ingenti. Sed miseret atque etiam pudet aestimantem, quam sit frivola animalium superbissimi origo.

Infans laborat post partum ictero neophytorum tri-duo; dormit multum, non diu. Ridet animal risibile et lacrymat post dies 40. Dentes excrescunt primores inferiores, tumque superiores, mense 6-12, anno 6-12 aliis permutandi; lanariii mense nono decimoque, molares anteriores anno secundo.

Puber vario tempore, pro climate, sexu, victu, anno 12-16. Masculis testes scrotum intrant versus pubertatem. Menstruo laborat matura viro.

Adolescit anno 20-22. Monogamia naturali viuit, luxurie defluens polygamus passim. Parit 1-2, rarius 3-4. Praeter mulierem pauca animalia coitum nouere grauida.

Senescit temporibus capillisque canis, corpore are-scente curuato. Aetas 70-80 annorum. Viui-mus vt immortales, et morimur vt mortales.

Habitat intra tropicos *Palmis lotophagus.*

Hospitatur extra tropicos *sub nouercante Cerere carni-vorus. Raro miserrimus abiectissimusque saeuit in propriam speciem anthropophagus.*

HOMO TROGLODYTES nocturnus, non confundendus cum *Simia Satyro*, morbidus reperitur passim in

Zona torrida, rariusque extra eam, *Africanis* Dondos, *Lusitanis* Albinos, *Indis* Kackerlack, Kalkalak, Kalkalatt, *vulgo* Leucaethiops: minor conterraneis, colore albissimo, cute holosericea vel squamofa, pilis albis interdumque flavis, impubis saepe imberbisque, iride aurea, rarius pallide caerulea, noctu videt luscitiosus (vix membrana nictitante.) Corpus debile. Mors praematura. Ad hunc accedit *Aethiops macularus* itidem morbidus.

* * *

HOMO LUCIFER orbis antarctici caudatus fabulosus.

2. SIMIA.

Dentes Primores incifores, supra et infra IV.

Laniarii solitarii, reliquis longiores, supra a primoribus, infra a molaribus remoti.

Molares obtusi V - VI vtrinque.

Manus in palmis plantisque.

Mammae pectorales II.

Cauda nulla.

Satyrus. I. S. ferruginea, lacertorum pilis reuerfis, natibus testis.

Satyrus *Plin. hist. nat. V c. I (Hard. c. I) c. 8 (Hard. c. 8)?*

Satyrus Aelian. anim. XVI c. 15?

Satyrus *Gesn. quadr. p. 97A.*

The Pongo (and the Engéco) *Purch. Pilgr. II p. 982.*

Bais *Nieremb. hist. nat. p. 179.*

Orang Outang *Indorum Jonst. quadr. p. 139.*

- Trettrétretré, Tratratratra *Flacourr Madag. p. 154?*
(breucaudatum dicit.)
- Ourang-Outang *Bont. Ind. or. p. 84 fig.* pessima,
mulieris potius, non Simiae.
- Satyrus indicus, homo syluestris: Orang-outang *Tulp. obs. p. 270 tab. 14.*
- Fese *Neub. Gesandtsch. p. 373. fig.* fere Tulpii.
- Quojas *Morrou Dapp. Afr. p. 393, 582, fig. p. 583 Tulpii.*
- Satyrus indicus; Orang Outang Indis, the Drill
Cbarlez exerc. p. 16.
- Orang Outang siue homo syluestris *Tyson monogr. figg. bonae.*
- Barris *Barbot Guin. p. 101.*
- The Quojas-Morrou or Worrou *Barbot Guin. p. 115.*
- L'animal appellé Sinfu du Halde *Chin. I. p. 33.*
- Chimpanzee *Scorin tabula peculiari Lond. 1738. †*
- Simia ecaudata subtus glabra *Linn. syst. nat. 6 p. 3 n. 1.*
- Simia Orang Outang *Klein. quadr. p. 86.*
- Simia acauda subtus glabra. The Simia without a tail,
with a smooth belly. The Satyr *Hill. anim. p. 535.*
- L'homme des bois: Simia (Homo syluestris) vnguibus
omnibus planis et rotundatis, caesarie faciem cin-
gente *Briff. regn. an. p. 189 n. 2.*
- Der Waldmensch *Hall. vierf. p. 549.*
- Simia (Satyrus) ecaudata subtus nuda *Linn. syst. nat. 10, 1 p. 25 n. 1.*
- The Man of the wood *Edw. Glean. I tab. 213.*
- Baris ou homme des bois *Dictionn. anim. I p. 250.*
- Homme sauvage *Dictionn. anim. II p. 487.*
- Orang-outang *Dictionn. anim. III p. 279.*
- Pongos *Dictionn. anim. III p. 531.*
- Satyre *Dictionn. anim. III p. 43.*
- De Sater of Boschmensch *Houtr. nat. bist. I p. 330
tab. 5 fig. 2 Edw.*
- Aap zonder Staart, van onderen kaal *Houtr. nat. bist. I p. 354 tab. 6 fig. 1 Tulpii.*

Simia (Pygmaeus) ecaudata ferruginea capite lacertisque pilis reuersis *Linn. amoen. ac. VI p. 68 fig. 4. sub nomine: Pygmaeus Edwardi fig. Edw.*

Simia (Satyrus) ecaudata subtus nuda abdomine gibboso *Linn. amoen. ac. VI p. 69 fig. 3 Scotini.*

Homme sauvage *Bon. dictionn. II p. 534.*

Pongos *Bon. dictionn. III p. 626.*

Quojavaurau *Bon. dictionn. III p. 697.*

Simia (Satyrus) ecaudata ferruginea, lacertorum pilis reuersis, natibus tectis *Linn. syst. nat. I 2, I p. 34 n. I.*

Les Orang-Outangs, ou le Pongo et le Iocko *Buff. hist. nat. XIV p. 43.*

Le Iocko *Buff. hist. nat. XIV tab. I fig. bon.*

Great Ape *Penn. syn. quadr. p. 96 n. 64.*

Iocko *Aless. quadrup. IV tab. 173 fig. Buff.*

Der Satyr *Müll. Naturf. I p. 119 tab. 5 fig. I, 2. Edw. tab. 6 fig. I Tulp.*

Der Buschmensch, Erdmensch *Mart. Naturlex. I p. 551 fig. Buffon.*

Der Orang outang: Simia Satyrus *Schreb. Säugth. I p. 54 n. I tab. 2 fig. Buff. tab. 2, B fig. Allam. in edit. bat. Buffon.*

Orang outang *in India orientali.*

Sinfin *Sinensibus.*

Pongo, Iocko *Congensibus.*

Varietas duplex: maior (le Pongo Buff.) et minor (le Iocko Buff.)

Corpus erecti ad pedes 5 - 6 altum, vndique vestitum, brunneum: pilis antice rarioribus rufo-fuscis, longitudine vix digiti transuersi, postice densioribus. Caput rotundum. Facies plana, humanae similis, nigricans. Frons nuda, breuior quam homini. Cilia nigra: superiora longiora densiora. Superciliorum loco series transuersa pilorum. Nasus depressus vix prominens. Os a naso remotius quam

quam in homine, margine lirto. Saccus in buccis nullus, qui in reliquis Simiis omnibus. Mentum barbatum. Auriculae humanis similes maiores. Capilli reliquis pilis longiores. Brachia longiora, ut genua tangant in erecto animali, pollicibus brevioribus. Manus intus glabrae nigricantes. Ungues rotundati. Plantae forma pedum, pollice brevissimo; reliquis digitis longioribus. Pili in lacertis reuerſi verſus cubitum. Nates testae. Mari frenulum praeputii nullum. Genitalia feminina humanis similia. Costae vtrinque 13. Fortissimum musculosumque animal.

Deesse unguis in palmarum pollicibus ex cel. Camperi obseruatione habet cl. *Blumenbach de gen. hum. var. p. 38.*

Habitat solitaria in desertissimis regionibus interioris Africae, Sumatrae, Borneo, Iauae, Sinae. Dormit in arboribus. Grauis; melancholica, nec malitiosa petulansque, instar reliquarum Simiarum. Iunior mansuescit docillima. Edit fructus et nuces. Celeris agilisque defendit se lapidibus baculoue. Marem aiunt appetere mulieres, feminam parere vnum ad duo. Fabula autem est, nasci e coitu mulierum indarum cum simiis. Veterum Satyrus videtur.

Talpiana figura et descriptio, quod mihi quidem videtur, speciem haud diuersam spectat (aliter sentiente cl. *Blumenb. de gen. hum. var. p. 37* qui propriam speciem putat). Femina fuit, quam descripsit Tulpius: antice tota glabra facie, fronte, auriculis, pectore, abdomine, brachiis, cruribus; abdomine gibboſo s. tumido. Munda fuit, erecta incedens, docilis et sapiens, long. ~~5~~ ^{ad summum 3} ped. *sedua; constat enim "longitudine quaei trioni."*

longima-2. S. brachiis longitudine corporis.

na. Le Grand Gibbon *Buff. hist. nat. XIV p. 92 tab. 2.*

Le petit Gibbon *Buff. hist. nat. XIV tab. 3.*

A singular species of Monkeys without tails: Golocks Bengalenſibus *De Viſme Philoſ. Trans. LIX p. 7 I tab. 3 figg. verofimiliter malae.*

The longarmed Ape *Penn. ſyn. quadr. p. 99 n. 66.*

Homo (Lar) brachiis longitudine corporis *Linn. mant. II p. 521.*

Gibbon grande *Aleſſ. quadrup. IV tab. 174 fig. 1 Buff.*

Gibbon picciolo *Aleſſ. quadrup. IV tab. 174 fig. 2 Buff.*

Der indianiſche langärmige Affe, der Schleuderaffe *Mari. Naturlex. I p. 565 figg. Buff.*

Der langarmige Affe: Simia longimana *Schreb. Säugth. I p. 66 n. 2 tab. 3 figg. Buff.*

Der Langarm *Müll. Naturf. Suppl. p. 4 t. 1 fig. 1 Buff.*

Corpus erectum, humanae altitudinis, pilis nigris durioribus. Caput rotundum. Facies plana, nigrefcens, humanae ſimillima. Oculi profundi, magni. Regio oculorum, naſi, oris, nuda. Circumferentia faciei ſubpilofa cinerea. Auriculae nudaе, nigrae, rotundatae. Nates calloſitate parua. Brachia longiſſima ad plantas vsque extenſa, vt erecta incedat tetrapus. Ungues plani in palmis, ſubacuti in plantis.

Varietas maior et minor, quarum haec coloribus pallidioribus.

Habitat

SIMIAE cum affinibus curioſae, attentae, ſuſpectae, memores, furaces, petulantes, imitatrices, geſticulatrices, laſciae, indociles, minantur; hoſtes adeunt motis dentibus labiisque rident, cibos bucca macerant, pediculos venantur, tactu excellunt. Monogamae natos vlnis gerunt, menſtruant, terrefactae cacant immundae, vrinae meatu ſaepe diſtincto a vulua; vtero etiam gerentes libidinofae. Phytiphagae edunt fructus, femina, olera, radices, oua auium, ranas, infecta, vermes. Prolem mire amant. Defendunt ſe lapidibus, excrementis, arborum ramis in hoſtes proiectis.

Habitat in Coromandel, Bengalaeque filuis, in Malacca Moluccisque, Sinae finitimis. Mitis, segnis, frigoris pluviaeque impatiens. Menstruat.

Varietatem aliam β habet *Penn. syn. quadr. p. 100*, quae fuit apud Lord Clive, in omnibus perquam similem minori, at forma elegantiore pedibusque anticis brevioribus. Facies, auriculae, pileus capitis, palmae et plantae nigra, reliquum corpus et brachia pilis argenteis. Alitudo biennis circiter ped. 3. Mitis erat atque laeta.

Siluanus. 3. S. brachiis corpore brevioribus, natibus caluis, capite subrotundo.

Πιθηκος Arist. hist. anim. II c. 13 n. 83, 84.

Simia Plin. hist. nat. VIII c. 54 (c. 80 Hard.) XI c. 37 (c. 62 Hard.) c. 44 (c. 100, 101. Hard.)

Πιθηκος Aelian. anim. V c. 26.

Simia Gesn. quadrup. p. 957 fig. mediocr.

Simia Alpin. Aeg. I p. 242 tab. 20 fig. 1 mala.

Simia Aldrov. digit. p. 199.

Simia Iouft. quadrup. p. 96, 137.

Simia 1 et 2 Iouft. quadrup. tab. 59 figg. mediocr.

Cercopithecus Iouft. quadrup. tab. 59 fig. inferior ad sinistram mediocr.

Simia, ein Aff Gesn. Thierb. p. 1 fig. mala, melior p. 2.

Simia Ludolf. Aerb. I c. 10 n. 52.

Simia simpliciter dicta cauda carens Rai. syn. quadr. p. 149.

Simia simpliciter dicta cauda carens Sloan. Iam. II p. 328.

Ein Aff Meyer Thiere I tab. 13 fig. mediocr.

Simia

Tecto comis arborum intertexto altissimisque columnis innixo obumbrantur terrae aestuantes inter tropicos Indiae, ne adurantur; hoc rectum inhabitant gentes Simiarum cum affnibus, nec non Psittacis volucribusque aliis.

Simia ecaudata, rufo nigricans *Linn. syst. nat. 6 p. 3 n. 4.*

Simia acauda capite maiore. The great-headed Simia, with no tail *Hill anim. p. 536.*

Simia (vulgaris) ecaudata, clunibus tuberosis *Linn. mus. Ad. Frid. I p. 1.*

Le Singe: Simia (.) vnguibus omnibus planis et rotundatis *Briff. regn. an. p. 188 n. 1.*

Simia (Sylvanus) ecaudata, clunibus tuberoso-callosis *Linn. syst. nat. 10, I. p. 25 n. 2.*

Singes *Dictionn. anim. IV p. 194* cum congener.

Aap zonder Staart, het Gat Eeltagtig uit puilende *Houtt. nat. hist. I p. 356.*

Singe *Bom. dictionn. IV p. 226* cum congener.

Simia (Sylvanus) ecaudata, natibus caluis, capite subrotundo *Linn. syst. nat. 12, I p. 34 n. 2.*

Le Pitheque *Buff. hist. nat. XIV p. 84.*

The Pigmy ape *Penn. syn. quadr. p. 98 n. 65 tab. 12 fig. 1 bon.*

Piteco *Aleff. quadrup. IV tab. 198 fig. mediocr.*

Der Waldteufel *Müll. Naturf. I p. 120.*

Der gemeine Affe: Simia Sylvanus *Schreb. Säugth. I p. 68 n. 3 tab. 4 fig. propria bona.*

Affe der Alten *Mart. Naturlex. I p. 546 fig. Schreb.*

Simia, Mona, *Italis.*

Singe; Guenon (femina) *Gallis.*

Simio, Ximio, Mono (mas); Simia, Ximia, Mona (femina) *Hispanis.*

Bogío, Bugío (mas); Bogía, Bugía (femina) *Lusitanis.*

Affe; Aeffinn (femina) *Germanis.*

Ape

Accedunt ad Hominem forma, incessu saepe erecto, claviculis, vnguibus, facie nudiuscula, auriculis, ciliis, vuula, musculis loquelae inferuentibus non loquentes, vtero. Deesse in Simiis ossicula auditus cl. *Martini Naturlex. I p. 525.*

Ape *Anglis.*

Aap *Belgis.*

Обезьяна (*Obes'jana*) *Ruffis.*

Magnitudo *Felis maioris*. Frons ad superciliarum regionem transverse gibba. Facies in medio nuda rugosa. Auriculae humanae. Ungues plani. Nates calvae. Color oliuaceus, subtus flavescens. Scrotum tamquam intra vuluam reconditum; vel penis intra scroti foramen; autumnno testiculi intumescunt. Sedes feminae rari instar extuberans. Lacertorum pili subtus reuersi, uti et verticis.

Habitat in Africa Indiaque, gregaria. In Iamaica insula dicitur esse ex nauibus naufragium passis superstes. Animal ridendum risibili, agile, imitans, erectum sedet, minatur minis, cachinno blanditur, Caffrorum more salutat. Sorbilia manu haurit. Edit poma, nuces, familiaque, atque insecta, praecipue formicas. Prolem mire amat. Menstruat. Libidinosum animal. Parit prae reliquis in Europa, grauida in mensem decimum. Hostes pellit arenis oculis eorum iniectis. Docilis mitisque.

Inuus.

4. S. capite oblongo, natibus caluis.

Simius *Cynocephalus Alpin.* *Aeg. I p. 241 tab. 15 fig. I mala.*

Simius *Cynocephalus alter Alpin.* *Aeg. I p. 241 tab. 16 fig. mediocr.*

Cynocephalus Ionst. quadrup. p. 144.

Cynocephalus. Hundsköpfl. Mommenet I *Ionst. quadrup. tab. 59 fig. mediocr.*

Simia ecaudata, clunibus tuberosis *Linn. syst. nar. 6 p. 3 n. 3.*

Simia acauda, clunibus tuberosis. The tail-less *Simia*, with large buttocks *Hill. anim. p. 536.*

Le Singe cynocephale: *Simia cynocephala* (. . . .) unguibus omnibus planis et rotundatis *Briss. regn. an. p. 191 n. 1.*

Simia

Simia (Inuus) ecaudata, natibus caluis, capite oblongo *Linna. syst. nat.* 12, I p. 34 n. 3.

Le Magot *Buff. hist. nat.* XIV p. 109 tab. 7, 8 figg. malae, Siluani potius adulti.

The Barbary ape *Penn. syn. quadr.* p. 100 n. 67.

Tartarino *Aless. quadrup.* IV tab. 175 figg. Buff.

Der Buschgott, Pan *Müll. Naturf.* I p. 121.

Der Buschgott *Marz. Naturlex.* I p. 549 fig. Buff.

Der Hundskopf: Simia Inuus *Schreb. Säugth.* I p. 71 n. 4 tab. 5 fig. propria bona (reicienda Buffoniana).

Simillima S. Siluano, sed rostro productiore, colore pallidior. supra sordide virescente, subtus obscure flavescente, cute caeruleo-grisea. Ad 4 pedes altus. Oculi parui. Nasus depressus. Auriculae humanis similes. Facies lanuginosa, albicans: pili frontis nigri, in collo rufescentes. Crura extus rufa. Manus nudaе nigrae. Ungues rotundati. Nates caluae.

Habitat in India Africaque gregaria, raro ad Gibraltar, forsitan casu. Malitiosa, ferox, stupida. Tetrapus ut plurimum incedit. Bene fert nostrum clima. Menstruat.

Vix videtur Cynocephalus veterum, ad proximum, vel ad Cercopithecii genus potius referendus.

3. PAPIO.

Dentes Primores incisores, supra et infra IV.

Laniarii reliquis longiores, supra a primoribus, infra a molaribus remoti.

Manus in plamis plantisque.

Mammae pectorales II.

Cauda abbreviata.

Sacci in buccis pro macerando cibo.

Sphinx. 1. P. facie nigra, vnguibus acuminatis, natibus caluis purpureis.

Sphinx *Plin. hist. nat. VIII c. 21* (c. 30 *Hard.*)?

Sphingion *Plin. hist. nat. VIII c. 29* (c. 34, 35 *Hard.*)

X c. 72 (c. 93 *Hard.*)?

Sphinx *Gesn. quadrup. p. 979*?

Papio *Aldrov. dig. p. 259 fig. p. 260* pessima.

Papio primus *Ioust. quadrup. p. 144 tab. 61 fig.* Aldrov.

Eine Art des Vielfrasses, Babuin *Gesn. Thierb. p. 357.*

fig. p. 358 Aldrov.

Babio: the Baboon *Charlet. exerc. p. 16.*

Papio *Rai. syn. quadr. p. 158.*

Bavian *Kolbe Vorgeb. p. 138 tab. 5 fig. 1* mala.

Simia femicaudata, ore vibrissato, vnguibus acutis *Linn.*

syst. nat. 6 p. 3 n. 5.

Cebus, Papio; Baboon, Hyaena *Gesneri Klein quadr.*

p. 89.

Simia cauda breui, ore vibrissato The whiskered *Si-*

mia, with a very short tail: the Baboon *Hill.*

anim. p. 537.

Lo

PAPIONES facie longiore, rostro latiore, dentibus fortioribus, recedunt a Simiis, libidinosissimi, moribus magis efferati.

Hi cum Simiis et Cercopithecis omnibus Americae plane exules.

Malé nouo orbi varias species tribuit *Fermin.*

- Le Babouin: Papio *Briff. regn. an. p. 192 n. 1.*
 Der Mamonet *Hall. vierf. p. 553.*
 Der Pavian *Hall. vierf. p. 559.*
 Simia (Sphinx) semicaudata, ore vibriffato, vngu-
 bus acuminatis *Linn. syst. nat. 10, I p. 25 n. 3.*
 Babouin ou Babon *Dictioun. anim. I p. 198.*
 Papio *Dictioun. anim. III p. 354.*
 Kortstaartige Aap, met Hairen aan den Bek en spitse
 Nagelen *Houtt. nat. hist. I p. 257.*
 Simia (Sphinx) semicaudata, ore vibriffato, vnguibus
 acuminatis, natibus caluis *Linn. syst. nat. 12 I*
p. 35 n. 6.
 Le Papion ou Babouin proprement dit *Buff. hist. nat.*
XIV p. 133.
 Grand Papion *Buff. hist. nat. XIV tab. 13 fig. bon.*
 Petit Papion *Buff. hist. nat. XIV tab. 14 fig. bon.*
 Babbuino grande *Aless. quadrup. IV tab. 176 fig. 1*
Buff.
 Babbuino picciolo *Aless. quadrup. IV tab. 176 fig. 2*
Buff.
 Der Bavian *Müll. Naturf. I p. 122.*
 Der braune Pavian: Simia Sphinx *Schreb. Säugrb. I*
p. 80 n. 8 tab. 6 fig. Buff.
 Babuino *Italis.*
 Babouin *Gallis.*
 Monazo (mas); Monaza (femina) *Hispanis.*
 Bugío rabudo *Lusitanis.*
 Pavian *Germanis.*
 Baviaan *Belgis.*
 Baboon *Anglis.*
 Babian *Suecis.*
 Choakauma *Hortentortis.*

Longi-

In genera quinque diuidendae SIMIAE LINNAEI aliorumque aucto-
 rum mihi videntur e placitis Buffonii, cum vere inter se dif-
 ferant species numerosissimae.

Longitudo corporis 3-4 pedum, caudae pollicum 7-8 et forsan maior. Caput oblongum Canis, sed obtusius, crassiusque rostrum. Oculi parui approximati. Nasus caninus. Facies nigra nuda. Palpebrae albae. Auriculae rotundatae nudaе. Collum crassum breue. Corpus quadratum, torosum, robustum. Pili rufi fusci; ventre et cruribus intus subdenudatis, cute alba. Crura breuia. Manus glabrae, nigrae. Ungues in pollicibus plani ac rotundati, in reliquis digitis acuminati. Cauda recuruata. Nates sanguinolentae.

Habitat in calidissimis Africae Indiaeque. Aspectu malignus et ferox. Animal libidinosum mulieribus facile vim inferens, neque domandum. Tetrapus incedit. Edit fructus arborum aliaque vegetabilia. Menstruat. Parit 1-2, sterilis in nostris terris.

Os non vibrissatum secundum Buffonium, vti Linneo.

Maimon. 2. P. facie violacea, unguibus acuminatis, natibus caluis purpureis.

Le Magot ou Tartarin: Cercopithecus cynocephalus parte corporis anteriore longis pilis obsita, naso violaceo nudo *Briff. reg. an. p. 214 n. 3.*

Magot ou Tartarin. *Dictionn. anim. III p. 6.*

Simia (Maimon) caudata subbarbata, genis caeruleis striatis, natibus caluis *Linn. syst. nat. 12, I p. 35 n. 7.* (Descriptio autem ad sequentem pertinet.)

Le Mandrill *Buff. hist. nat. XIV p. 154 tab. 16 mas; tab. 17 femina.*

The ribbed-nose Baboon *Penn. syn. quadr. p. 103 n. 69.*

Mandrill maschio *Aless. quadrup. IV. tab. 177 fig. 1*
Mandrill femmina *fig. 2. figg. Buff.*

Der Teufel *Müll. Naturf. I p. 123.*

Der Maimon: Simia Maimon *Schreb. Säugth. I p. 74 n. 5 tab. 7 fig. Buff.*

Magnitudo praecedentis facileque maior fortiorque, at mitior est. Caput oblongum, caninum. Nasus longus, depressus, nudus, violaceus. Facies violacea, striis longitudinalibus profundis. Os parvum, labiis tenuioribus. Auriculae subacuminatae, nudaе. Pili corporis rufo fulci, in pectore et ventre grisei. Nates nudaе, sanguineae. Cauda poll. 2 - 3 longa, valde pilosa, erecta. Manus nudaе. Penis quasi circumcisus. Vulva prominens. Menstruat.

Habitat in Africa, forteque in Asia. Edit fructus, pisces, carnes. Sedet erectus, tetrapus incedit, interdumque erectus. Vox infantis. Dentibus stridet. Mucum e naribus perpetuo defluentem lingua lambit. Dicitur mulieres per vim stuprare.

The Smitten *Barbot Guin.* p. 212 *Boffm. Guin.* p. 301 aut idem animal est, aut affine: certe non *Simia Satyrus*, uti Buffonio videtur.

Mormon. 3. P. facie cyanea, pilis verticis fastigiatis, natibus caluis purpureis.

Anatome Cercopithecii Mamonet dicti *Barthol. act. hafn.* I p. 67, 313 fig. mala; videtur tamen hic fuisse, quem secuit.

The Man-Tiger from Africa *Bradl. nat.* p. 117 tab. 15 fig. I mala.

Das sogenante wilde Thier Choras *Bresl. Samml.* XV p. 177 fig. mediocr.

Simia semicaudata, maxilla inferiore barbata, vertice fetis erectis mitram referentibus obliquo, vnguibus acutis, Austr. Choras *Kram. Austr.* p. 310.

Mamonet *Dictionn. anim.* III p. 14?

Simia (Mormon) *semicaudata* subbarbata nigro fusca, malis tumidis nudis cyaneis oblique striatis, natibus caluis sanguineis *Alstroemer: Act. holmiens.* 1766 p. 144 tab. 3 fig. propria bona.

the Mantegar. Edw. Tyson, in philos. Transact. vol. 29. 1702. p. 1571 sq. *Simia*

Simia Mormon Berlin. Samml. I p. 387 fig. Alstroem.
 The tufted Apè *Penn. syn. quadr. p. 102 n. 68*
tab. 12 fig. 2 mala deformisque, cauda mutilata,
vt Simia videatur.

Der Choras: Simia Mormon Schreb. Säugth. I p. 75
n. 6 tab. 8 fig. Alstroem.

Der Choras Müll. Naturf. Suppl. p. 6 t. 1 fig. 2
Alstroem.

Longitudo 2 pedum (forsan nondum adulti). Facies longiuscula plana, fronte conuexa. Circumferentia faciei pilis lanuginosis obscure griseis, in fronte erectis densisque fastigiatis. Oculi parvi, profundi, iride fusca. Nasus sanguineus. Buccae nudaе, tumidae, caeruleae, sulcis 4-5 obliquis. Os truncatum, marginatum, porcinum. Mystaces plures, absque ordine, breues, molliores. Sacci buccarum amplissimi. Auriculae breues, acuminatae, rigidae. Ab auribus ad nucham stria subnuda, cute perfecte alba. Mentum barba alba, versus gulam breuiore, ibidemque subflauescente. Collum breue et crassum, supra obscure canum, subtus flauescenti-album. Corpus postice gracilescens. Dorsum pilis densis longisque, obscure canis. Pectus flauescenti album. Venter albus. Lumbi pilis rarioribus, cute violacea transparente. Nates eleuatae cordiformes, nudaе, sanguineae. Sutura abdominis longitudinalis, nuda sanguinea. Cauda violacea, 2 poll. longa, recuruata. Scrotum cum pene album vel violaceum. Crura antica et postica dorso concoloria. Digniti nudi, nigricantes, cute molli. Ungues subacuti, pollicum rotundati.

Habitat in Zeylona, aliisque Indiae regionibus. Senior reliquis affinis, minus ludibundus, magisque mundus. Lasciuus valde, fortis, docilis, mansuescit. Vox porci. Incedit tetrapus.

Nemestrina. 4. *P. subbarbatus* griseus, iridibus brunneis, natibus caluis, cauda nuda contortuplicata.

Monkeys of a docile kind *Kaempf. Jap. I p. 126?*

The pig-tailed Monkey *Edw. glean. I p. 8 tab. 214.*

Simia (Nemestrina) semicaudata subbarbata grisea, iridibus brunneis, natibus caluis *Linn. syst. nat. 12,*

I p. 35 n. 4.

Le Maimon *Buff. hist. nat. XIV p. 176 tab. 19.*

The pig-tail Baboon *Penn. syn. quadr. p. 105 n. 71.*

Mammone *Aless. quadrup. IV tab. 179 fig. Buff.*

Der Waldgott *Müll. Naturf. I p. 121.*

Der Schweinschwanzaffe: *Simia Nemestruina Schreb. Säugth. I p. 79 n. 7 tab. 9 fig. Edw.*

Similis Cercopitheco Cynomolgo. Longitudo corporis ped. 2 - 2½, caudae poll. 5 - 6. Facies nuda, e nigro rubra. Oculi castanei. Palpebrae nigrae. Nasus depressus. Supra et infra os pili rari nigri. Labia tenuia. Auriculae humanis similes, nuda, mediocres, subacuminatae. Pileus capitis coloris obscurioris. Corpus supra pilis nigro-olivaceis, subtus pallidioribus. Manus nuda, nigrae. Ungues longi, plani. Pollices plantarum longiores, membrana connexi cum indice. Cauda nudata, gracilis, tota ut in Porco. Genitalia masculina extus haud propendentia.

Habitat in Sumatra, Iaponia, mitis docilisque, minusque lascivus. Frigoris impatiens. Dormit sedens, incedit bipes quadrupesque. Rarius visus in Europa.

Apedia. 5. *P. palmarum* pollice approximato, unguibus oblongis: pollicum rotundatis; natibus tectis. *Simia* cauda abrupta, unguibus compressis: pollice palmarum digitis adhaerente *Linn. amoen. acad. I p. 558.*

Simia

Simia (*Apedia*) *semicaudata*, palmarum pollice approximato, vnguibus oblongis: pollicum omnium rotundatis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 25 *n.* 4.

Kortstaartige Aap, met de Duimen digt tegen de Vingers aangevoegd, de Nagelen langwerpig, die der Duimen altemaal gerond *Houtr. nat. hist.* *I p.* 358.

Simia (*Apedia*) *semicaudata*, palmarum pollice approximato, vnguibus oblongis: pollicum rotundatis; natibus tectis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 35 *n.* 5.

The little Baboon *Penn. syn. quadr. p.* 105 *n.* 70.

Der Kurzschwanz *Müll. Naturf.* *I p.* 122.

Magnitudo felis. Caput subrotundum. Os prominens, paruum, retusum, fuscum, pilis patulis. Facies fusca, subnuda. Auriculae subrotundae, nudaе. Corpus pilis subflavescentibus, apice nigricantibus. Nates tectae. Cauda vix duo digitos transversos longa, obtusa, pilosa. Palmarum digiti oblongi, pollice reliquis adhaerente, vt in plantis humanis. Plantarum digiti longiores, pollice magis remoto, vt in palmis humanis. Ungues longi, curui, conuexi, compressi, lineares, obtusi, pollicum rotundati.

Cercopithecum sciureum cauda mutilata putat doctiss. Schreberus: at nostro auriculae magis nudaе, singularisque palmarum structura, vt differre potius credam.

Species obscura.

* A new Baboon *Penn. syn. quadr. addit. tab.* 13 *fig.* 2.

Maior, informis, fusco rufus, artubus longioribus, quadrupes, cauda porcina erecta. Patria ignota. Nisi forte sit *Papio Sphinx*; ad quem refert doctiss. Schreberus.

4. CERCOPITHECVS.

Dentes Primores incisores, supra et infra IV.
Laniarii reliquis longiores, supra a
 primoribus, infra a molaribus re-
 moti.

Manus in palmis plantisque.

Mammae pectorales II.

Cauda elongata, non prehensilis.

Nates callosae.

Sacci in buccis pro macerando cibo.

Hama- I. C. cinereus, auribus comosis, vnguibus acu-
 dryas. tiusculis, natibus caluis.

Κυνοκεφαλος *Arist. hist. anim. II c. 13 n. 83.*

Cynocephalus *Plin. hist. nat. VIII c. 54 (c. 80 Hard.)*

Κυνοκεφαλος *Aelian. anim. II c. 46. IV c. 46. VI c. 10*

VII c. 19. X c. 30.

Cynocephalus *Gesn. quadrup. p. 971.*

Simia supra aures comata *Alpin. Aeg. I p. 242 tab.*
 17 fig. mediocr.

Simia Cynocephalus ad vtramque aurem magna coma
 dependente *Alpin. Aeg. I p. 242 tab. 18, 19 figg.*
 mediocr.

Απ Κυνοκεφαλος? *Clus. exot. p. 370 fig. pessima.*

Cynocephalus 2 *Pertrand Ionst. quadrup. tab. 59 fig.*
 mala.

Der Hundskopf *Gesn. Thierb. p. 13 fig. eadem.*

Simia caudata imberbis, auribus comosis *Linn. syst.*

nat. 6 p. 3 n. 7.

Le Tartarin Geoffroy & Cuvier. 3^e me Livre Simia

Simiac maxime affinis:

Si mihi cauda foret, cercopithecus eram.

MARTIAL.

Simia caudata imberbis, auribus comosis. The tailed *Simia* with hairy ears *Hill. anim. p. 537 tab. 26 fig. mediocr.*

Simia (aegyptiaca) cauda elongata, clunibus tuberosis nudis *Hasselqu. Palaest. p. 269.*

Simia (Hamadryas) caudata imberbis, auribus comosis *Linn. syst. nat. 10, I p. 27 n. 11.*

Geftaarte Aap zonder Baard, de Ooren met dikke Hairdodden *Houtt. nat. hist. I p. 363.*

Simia (Hamadryas) caudata cinerea, auribus comosis, vnguibus acutiufculis, natibus caluis *Linn. syst. nat. 12, I p. 36 n. 8.*

The dogfaced Monkey *Penn. syn. quadr. p. 107 n. 72 tab. 14 fig. 1 Edwardsii inedita.*

Die Waldnympe *Müll. Naturf. I p. 124.*

Der graue Pavian: *Simia Hamadryas Schreb. Säugth. I p. 82 n. 9 tab. 10 fig. Edw.*

Proxime accedit ad praecedens genus, vt Papionem diceres, nisi esset cauda fere longitudine corporis. Ultra 5 pedes altus. Caput subrotundum pilosissimum, imprimis pone auriculas. Rostrum teres, oblongum, basi crassiusculum, apice magis attenuatum. Facies nuda, ex rubro nigrescens. Oculi parui. Auriculae acutae, capillis occultatae. Corpus crassum, breue, parum versus inguina contractum, pilosissimum, imprimis antice; griseo oliuaceum. Artus fortes et crassi, pilosissimi. Digni aequales, excepto pollice brevior. Vngues rotundati, in plantis acutiufculi. Nates denudatae, fanguineae. Cauda parum attenuata, pilosa, erecta.

B 4

Habitat

CERCOPITHECI difficile genus, specierum numerosissimarum, accuratius adhuc determinandarum.

Habitat gregarius in calidissimis Asiae et Africae. Valde ferox, impudens atque lascivus, difficulter domandus.

Hunc puto veterum Cynocephalum, cum doctiss. Pennanto, qui et huc refert *le Babouin Buff.* mihi potius ad Papionem Sphingem referendum.

Veter.

2. *C. barbatus albus*, barba nigra.

Simia alba seu incanis pilis, barba nigra promissa
Rai. syn. quadr. p. 158.

Cebus Elaurandus Zeylanensium Klein. quadr. p. 89.

Le Singe blanc à barbe noire: *Cercopithecus barbatus albus*, barba nigra *Briss. regn. an. p. 207. n. 21.*

Simia (Veter) caudata barbata alba, barba nigra
Linn. syst. nat. 12, I p. 36 n. 9.

Le Lowando *Buff. hist. nat. XIV p. 169.*

Der Altvater *Müll. Naturf. I p. 124.*

Der weisse Bartaffe; weis mit schwarzem Barte
Schreb. Säugth. I p. 86 n. 10 B)

Elawandum Zeylanensibus.

Habitat in Zeylona; Asia.

Forfan vnicam modo speciem efficit cum insequentibus 3, 4, 5, sic putantibus Pennanto, Schrebero, Buffonio. Forfan et *C. Faunus* coit cum his omnibus. Separatim proponam singulos, donec certiora elucescant.

Senex.

3. *C. barbatus totus albus.*

Simiae candentes toto corpore Plin. hist. nat. VIII. c. 21 (c. 31 Hard.)?

Πιθηκος εν Πρασιαις τοις ινδικοις Aelian. anim. XVI c. 10?

Another sort of monkeys, Wanderows *Knox Ceylon. p. 25.*

The

The lion-tailed Monkey *Penn. syn. quadr. p. 109*
n. 73 γ)

Der weisse Bartaffe; ganz weifs *Schreb. Säugth. I*
p. 86 n. 10 A)

Habitat in Zeylona; Asia.

Vetulus. 4. *C. barbatus niger, barba alba.*

Πιθηκος εν Ινδοις Aelian. anim. XVII c. 39?

Monkeys *Knox Ceylon. p. 25 fig.*

Cercopithecus niger barba incana promissa Rai. syn.
quadr. p. 158.

The little bearded Man *Barbot Guin. p. 212.*

Bartmännerchen *Bosfin. Guin. p. 302.*

Cercopithecus niger, barba incana promissa Klein.
quadrup. p. 89.

Le Singe noir à barba blanche: *Cercopithecus bar-*
batus niger, barba incana Briff. regn. an. p. 207,
n. 22.

Simia (Silenus) caudata barbata nigra, barba niuea
prolixa Linn. syst. nat. 10, I p. 26 n. 5.

Ouanderons *Dictionn. anim. III p. 296.*

Gestaarte Aap met een Baard, zwaait over 't Lyf,
 hebbende een grooten sneeuwvitten Baard *Houtt.*
nat. hist. I p. 358.

Ouanderons *Bom. dictionn. III. p. 311.*

L'Ouanderou *Buff. hist. nat. XIV p. 169 tab. 18 fig.*
male cauda truncata.

The lion-tailed Monkey *Penn. syn. quadr. p. 109*
n. 73 δ) tab. 13 A fig. 1.

Simia di Ceylan Aless. quadr. IV tab. 178 fig. Buff.

Der Weisbart *Müll. Naturf. I. 124.*

Der schwarze Bartaffe; schwarz mit weissem Barte:
Simia Silenus Schreb. Säugth. I p. 87 n. 11 tab.
11. fig. Buff.

Wanduru *Zeylanensibus*.

Slinger - aap *Belgis*.

Habitat in Zeylona, Asia, Africa.

Silenus. 5. *C. barbatus totus niger*.

Simia callitriches leonino corpore Alpin. Aeg. I p.
243 tab. 20 fig. 2 mediocr.

Simia callitrix magnitudine Cynocephalorum Alpin.
Aeg. I p. 244 tab. 21 fig. melior.

Simia caudata caesarie proluxa faciem cingente Linn.
syst. nat. 6 p. 3 n. 13.

Simia capite comoso. The hairy-headed Simia Hill.
anim. p. 539 tab. 26 fig. mediocr.

Le Singe noir d'Egypte: *Cercopithecus barbatus ni-*
ger, caesarie proluxa nigra faciem cingente Briff.
regn. an. p. 209 n. 26.

Simia (Silenus) caudata barbata nigra, barba nigra
proluxa Linn. syst. nat. 12, I p. 36 n. 10.

The lion-tailed Monkey *Penn. syn. quadr. p. 109*
n. 73.

Habitat in India orientali Africaeque calidioribus.

Rostrum elongatum. Facies nuda. Corpus postico
gracilescens. Nates callosae. Long. 3 - 3½ ped.
Ferox. Tetrapus ut plurimum incedit.

Faunus, 6. *C. barbatus, cauda apice floccosa.*

Cercopithecus barbatus I Clus. exot. p. 37 I cum fig.

Cercobithecus barbatus Clusii Nieremb. hist. nat. p.
177 cum fig. Clus.

Cercopithecus barbatus Clusii Ionst. quadrup. tab. 74
fig. Clus.

Cercopithecus barbatus I Clusii Rai. syn. quadr. p. 159.

Cebus barbatus primus Clusii Klein. quadrup. p. 89.

Simia

Simia caudata barbata, cauda floccosa Linn. syst. nat. 6 p. 3 n. 15.

Simia caudata barbata, cauda floccosa. The bearded Simia, with a woolly tail Hill anim. p. 540.

Le Singe barbu à queue de Lion: *Cercopithecus barbatus, supra ex nigro et fulco mixtus, infra albus, barba incana mucronata, cauda in floccum desinente Briss. regn. an p. 209 n. 25.*

Der große brandfarbige Affe aus Guinea *Hall. vierf. p. 554.*

Simia (Faunus) caudata barbata, cauda apice floccosa Linn. syst. nat. 10, I p. 26 n. 6.

Gestaarte Aap met een Bâard, de Staart aan't end een kwast hebbende *Houtt. nat. hist. I p. 359.*

Simia (Faunus) caudata barbata, cauda apice floccosa Linn. syst. nat. 12, I p. 36 n. 11.

Der Löwenschwanz, Waldgeist *Müll. Naturf. I p. 125.*

Species obscura, adeoque dubia. Corpus nigricans: pectus et anteriora abdominis alba. Auriculae mediocres. Nasus simus. Barba incana mucronata. Ungues humani. Cauda longa, sat crassa, in floccum desinens.

Habitat - - - - -

Pertinere huc quoque videtur:

Le Malbrouck *Buff. hist. nat. XIV p. 224 tab. 29.*

Simia di Bengala Aless. quadrup. IV tab. 182 fig. Buff.

Der Malbruk: *Simia Faunus Schreb. Säugth. I p. 90 n. 12 tab. 12 fig. Buff.*

Longitudo corporis ped. 1½, cauda fere longitudine corporis. Facies cinerea. Oculi magni. Palpebrae coloris carnei. Rostrum prominens. Nasus

fus depressus. Auriculae magnae, ténues, colore carneo. Supra flauofuscus, subtus flauogriseus. Fascia grisea ab oculis ad aures. Quadrupes.

Habitat in Bengala.

Varietatem *C. Cynomolgi*, posteaque *Aygulae* putat Pennant.

Affinis quoque, nisi propria species obscura:

Cercopithecus non barbatus I *Clus. exot. p. 371.*

Cercopithecus non barbatus I *Clusii Rai. syn. quadr. p. 160.*

Simia caudata imberbis fuscoflava, pectore gulaque albis, cauda floccosa *Linn. syst. nar. 6 p. 3 n. 9.*

Cebus imberbis I *Clusii Klein. quadrup. p. 89.*

Simia subflauescens pectore albescente, cauda floccosa. The yellowish *Simia*, with a whitish breast, and a woolly tail *Hill anim. p. 538.*

Le Singe à queue de Lion: *Cercopithecus ex flauo fuscus*, cauda in floccum desinente *Briss. regn. an. p. 203 n. 15.*

Der Affe mit ausgerauftem büschligem Schwanze und gelber Kehle *Hall. vierf. p. 557.*

Totus ex flauo fuscus, excepto pectore et gutture albicantibus. Cauda subnuda, apice floccosa.

Cynomol-7.C. imberbis, naribus bifidis elatis, cauda arcuata, natibus caluis.

Cercopithecus *Gesn. quadrup. p. 967 cum fig. me. diocr.*

Cercopithecus angolensis maior *Marcgr. Bras. p. 227.*

Macaquo Congensium *Ionst. quadrup. p. 143.*

Le premier de nos Singes *Perr. anim, II p. 55 tab. 43 fig. superior mediocr.*

Cercopithecus angolensis maior *Rai. quadrup. p. 155.*

Simia

- Simia caudata imberbis, naribus elatis bifidis* Linn.
syst. nat. 6 p. 3 n. 10.
- Cercopithecus angolensis maior* Barr. *Fr. equ. p. 149.*
- Cebus angolensis maior* Macaquo Maregr. *Klein quadrup. p. 89.*
- Simia caudata naribus bifidis.* The long-tailed *Simia* with bifid nostrils *Hill anim. p. 533.*
- Le Makaque: *Cercopithecus cynocephalus naribus bifidis, elatis, naribus caluis* *Briss. reg. an. p. 213 n. 2*
- Der grössere angolische Affe *Hall. vierf. p. 556.*
- Simia (Cynamolgus) caudata imberbis, naribus bifidis elatis, clunibus tuberosis* Linn. *syst. nat. 10, I p. 28 n. 16.*
- Macaque *Dictionn. an. III p. 10.*
- Gestaarte Aap zonder Baard, met een gespleeten opgewipte Neus, de billen bultig *Houtt. nat. hist. I p. 367.*
- Simia (Cynomolgus) caudata imberbis, naribus bifidis elatis, cauda arcuata, naribus caluis* Linn. *syst. nat. 12, I p. 38 n. 15.*
- Le Macaque *Buff. hist. nat. XIV p. 190 tab. 20.*
- The hare-lipped Monkey *Penn. syn. quadr. p. 111 n. 74.*
- Macacco *Aless. quadrup. IV tab. 180 fig. 1.* Buff.
- Der Hundsbeißer, angolische Affe *Müll. Naturf. I p. 127.*
- Die Meerkatze: *Simia Cynamolgus* *Schreb. Säugtb. I p. 91 n. 13 tab. 13 fig.* Buff.
- Macaquo *Congenfibus.*
- Longitudo corporis 2 ped. et ultra. Caput magnum. Rostrum prominens. Facies nuda liuida rugosa. Crista pilosa parua in vertice. Oculi parui. Nasus crassius depressus: nares bifidæ elatae. Auriculæ pilosæ. Corpus crassum, breue, subtus flauescenti-supra oliuaceo-griseum. Nates callo.

fae. Cauda longitudine corporis vel paullo brevior, arcuata. Pedes breviores. Ungues pollicum rotundati, reliquorum digitorum acuti, imprimis in plantis.

Habitat in Guinea, Congo, Angola, Africa australi. Moschum paullulum spirat, gregarius, mitis facileque mansuescens. Clamat Hah Hah, mire gesticulatur. Quadrupes incedit, rariusque bipes. Menstruat.

Cynocephalus. 8. *C. imberbis* flavescens, ore producto, cauda recta, natibus calvis.

Guineensis alius *Marcgr. Brasf. p. 228.*

Cercopithecus *Iouft. quadrup. tab. 59 fig. inferior ad dextram.*

Cercopithecus guineensis tertius *Marcgrauii Rai. syn. quadr. p. 157.*

Cebus tertius guineensis Klein. quadrup. p. 89.

Le Singe de Guinée: *Cercopithecus pilis ex umbra, griseo, fusco et flavo variegatis vestitus Briff. regn. an. p. 196 n. 6.*

Le Cercopithéque cynocéphale: *Cercopithecus cynocephalus ex viridescentibus et flavicantibus pilis variegatus Briff. regn. an. p. 213 n. 1.*

Der Hundskopf *Müll. Naturf. I p. 128.*

Simia (Cynocephalus) caudata imberbis flavescens, ore producto, cauda recta, natibus calvis Linn. syst. nat. 12, I p. 38 n. 16.

Simiae Inuo simillimus, sed caudatus; forsan non vere differt a Cynomolgo, sic putante doctiff. Schrebero.

Habitat in Africa.

Diana. 9. *C. barbatus*, fronte barbaque fastigiata.

Cercopithecus barbatus II Clusf. exor. p. 371.

Beard-

Regnier in Journal d'hist. naturelle Paris.
 1792. Mém. T. 1. pag. 402. Syn. tab. 21 fig. 1.

Beard-men *Purch. Pilgr. II. p. 955.*

Cercopithecus barbatus Guineensis Marcgr. Brasf. p. 227 fig. p. 228 mala.

Cercopithecus barbatus Guineensis Iouft. quadrup. tab. 60 fig. Marcgr.

Cercopithecus barbatus guineensis, Congensibus Exquima Rai. syn. quadr. p. 156.

Cercopithecus barbatus 2 Clusii Rai. syn. quadr. p. 159.

Simia caudata barbata: barba cana, cauda simplici Linn. syst. nat. 6 p. 3 n. 16.

Cebus barbatus. Exquima Guineensis Klein, quadrup. p. 89.

Cebus barbatus 2 Clusii Klein. quadrup. p. 89.

Simia barbata cana, cauda simplici. The Simia with a hoary beard, and naked tail Hill anim. p. 540.

Die Meerkatze Diana Linné: Act. holmiensf. 1754 p. 213 tab. 6. fig. propria.

Le Singe de Guinée à barbe blanche: Cercopithecus barbatus fuscus, punctis albis inspersus, barba alba Briff. regn. an. p. 207. n. 23.

Le Singe barbu: Cercopithecus barbatus, ex nigro et fusco mixtus, pectore et anteriore ventris parte albis, barba incana mucronata Briff. regn. an. p. 208 n. 24.

Der glatthärige Affe Hall. vierf. p. 555.

Bärtige Meerkatze. Diane Hall. vierf. p. 600.

Simia (Diana) caudata barbata, fronte barbaque fastigiata Linn. syst. nat. 10, I p. 26 n. 8.

Gestaarte Baard- Aap, met een gekuisden Baard en een Toupet op 't Voorhoofd Hourr. nar. hist. I p. 360 tab. 6 fig. 2 Linn.

Simia (Diana) caudata barbata, fronte barbaque fastigiata Linn. syst. nat. 12, I p. 38 n. 17.

L'Exquima Buff. hist. nat. XV p. 16.

The spotted Monkey Penn. syn. quadr. p. 112 n. 75.

Diane Müll. Naturf. I p. 128 tab. 6 fig. 2 Linn.

Die

Die Diane: Simia Diana *Schreb. Säugth. I p. 94 n.*

I 4 tab, I 4 fig. Linn.

Exquima *Congenfibus.*

Magnitudo felis maioris. Facies nuda, nigra circa oculos et nasum. Nasus depressus. Oculi flavofusci. Auriculae parvae, rotundatae, nigrae, fere nudae. Frons pilis erectis, albis, fastigiatis, linea transversa in formam lunae crescentis. Barba fastigiata nigra, subtus alba pilis longioribus, infidens tuberi adiposo. Caput corpusque nigrum, punctis albidis adpersum. Gula, pectus et brachia intus alba. Dorsum postice et supra ferrugineum. Femora subtus heluola. Linea alba ab ano ad genua in exteriori latere femorum ducta. Abdomen pedesque nigri. Manus nigrae, subtus nudae. Ungues longiusculi. Cauda recta nigra, corpore longior, non prehensilis uti Marcgrauius et Buffonius.

Habitat in Guinea, Congo. Iunior ludibundus deiicit omnia, peregrinos nescitando salutatur, iratus maxillas hiantes ore exagitat. Adultior dentibus laniariis elongatis mordax et malignus euadit. Cubile purum seruat. Vocatus respondet Greck. Plus potat congeneribus. Amat calorem, at meridie umbram quaerit. Noctibus frigidioribus clamat. Dormit per noctem et in tenebris, interdum perpetuo in motu. Menstruat e caudae apice.

Mona. 10. C. barbatus supra rufofuscus, cauda grisea, natibus macula vtrinque alba, pedibus nigris.

Monichus Alpin. Aeg. I p. 242 tab. 20 fig. 3?

Le Singe varié: Cercopithecus pilis ex nigro et fusco variegatis vestitus, pedibus nigris, cauda cinerea
Briff. reg. an. p. 198 n. 9.

La Mone *Buff. hist. nat. XIV p. 258 tab. 36.*

The varied Monkey *Penn. syn. quadr. p. 118 n. 84.*

Monna

Monna *Aless. quadrup. IV tab. 184 fig.* Buff.

Die Mone: *Simia Mona Schreb. Säugth. I p. 97 n. 15 tab. 15 fig.* Buff.

Die Mone *Müll. Naturf. Suppl. p. 7 tab. 1 fig. 3.* Buff.

Longitudo corporis $1\frac{1}{2}$ ped. caudae 2. ped. Caput paruum, rotundatum. Rostrum crassum, breue. Facies plana, fusca. Frons lunula grisea: fascia nigra ab oculis ad aures, et inde ad humeros et brachia. Auriculae rotundatae. Barba e pilis albis, flauis nigrisque mixta. Corpus supra rufofuscum, venter et crura intus albicant. Crura extus et pedes nigra. Ungues subacuti, pollicum vero rotundati. Cauda obscure grisea, ad eiusdem ortum vtrinque macula parua alba. Nates callosae. Quadrupes incedit.

Habitat in Asia, Africa, vulgaris. Mitis et docilis.

Sabaea. II. C. imberbis flauicans, facie atra, cauda cinerea, natibus caluis.

Le Singe verd: *Cercopithecus ex cinereo flauescens, genis longis pilis albis obfistis Briss. regn. an. p. 204 n. 17.*

Singes verds *Adanf. Seneg. p. 76, 177.*

The St. Iago Monkey *Edw. Glean. I p. 10 tab. 215.*

Simia (Sabaea) caudata imberbis flauicans, facie atra, cauda cinerea, natibus caluis Linn. syst. nat. 12, I p. 38 n. 18.

Le Callitriche *Buff. hist. nat. XIV p. 272 tab. 37.*

The green Monkey *Penn. syn. quadr. p. 113 n. 76.*

Callitriche *Aless. quadrup. IV tab. 185 fig. 1 fig.* Buff.

Der Mohr *Müll. Naturf. I p. 129.*

Der grüne Affe: *Simia Sabaea Schreb. Säugth. I p. 100 n. 17 tab. 18 fig.* Edw.

Magnitudo Cati. Corpus supra e cinereo viridique
 flavescentia; subtus gula, pectore, abdomine, fe-
 moribus album. Caput paruum rotundatum. Ro-
 strum elongatum. Facies nuda atra. Auriculæ par-
 vae, rotundatae, nigrae. Tempora ex albido
 flavescentia, pilis longioribus reuerfis. Supercilia
 nigra setosa. Cauda recta, gracilis, longitudine cor-
 poris, cana. Pedes cinerei. Ungues rotundati,
 sed in anticis ouati. Nates callositate parua.

Habitat in Africa, gregarius; vulgaris in insulis ca-
 pitis viridis. Quadrupes. Mutus.

Patas. 12. *C. barbatus* supra ruber, subtus canus.

κηπος *Aelian. anim. XVII c. 8.*

Simius Callitrichus Alpin. Aeg. Ip. 244 tab. 20 fig. 4.
 mala.

Peasants *Barbor Guin. p. 212?*

Le Singe roux d'Egypte: *Cercopithecus barbatus,*
 rufus, facie nigra, caesarie alba cincta *Briff. regn.*
an. p. 210 n. 27.

Patas Dictionn. anim. III p. 359.

Patas Bom. dictionn. III p. 385.

Le Patas à bandeau noir *Buff. hist. nat. XIV p. 208*
tab. 25.

Le Patas à bandeau blanc *Buff. hist. nat. XIV tab. 26.*

The red Monkey *Penn. syn. quadr. p. 116 n. 82.*

Scimie rosse del Senegal *Aless. quadrup. IV tab. 181*
fig. Buff.

Der rothe Affe: *Simia Patas Schreb. Säugth. I p. 98*
n. 16 tab. 16 fig. Buff.

Der rothe Affe *Müll. Naturf. Suppl. p. 7 tab. 1 fig. 4*
Buff.

Longitudo corporis ad 2 ped. forsan et maior. Cor-
 pus gracile, supra pulchre rubrum, splendens,
 subtus canum. Oculi profundi. Rostrum longum.
 Linea

Linea transuersa nigra supra oculos inter aures. Auriculae tenues, pilis longioribus. Mentum barba flaua. Cauda corpore breuior. Nates callosae.

Variat fascia alba faciei; barba alba.

Habitat in Senegal. Quadrupes plerumque incedit. Minus agilis reliquis, curiosus valde. Defendit se lapidibus atque excrementis in hostes proiectis.

nictitans. 13. C. imberbis niger punctis pallidis adspersus, naso albo, pollice palmarum breuissimo, natibus tectis.

White noses *Purch. Pilgr. II p. 955.*

Angolensis alius *Marcgr. Bras. p. 227.*

Simia (nictitans) caudata imberbis nigra punctis pallidis adspersa, naso albo, pollice palmarum breuissimo, natibus tectis *Linn. syst. nat. 12, I p. 40 n. 23.*

The winking Monkey *Penn. syn. quadr. p. 120 n. 87.*

Der nickende Affe *Müll. Naturf. I p. 132.*

Der weismäulige Affe *Schreb. Säugth. I p. 103 n. 20.*

Magnitudo fere Simiae Siluani. Facies breuis pilosa. Orbitae nudaе. Iides luteae. Nasus albus. Labia et mentum albida. Pili corporis nigri annulis aliquot pallidioribus. Nates tectae. Cauda recta, cylindrica, corpore longior. Pedes et cauda nigra. Pollex palmarum non longior primo articulo indicis.

Habitat in Guinea, ludibundus, capite continuo nictitans.

Petaurista, 14. C. barbatus facie nigra, labiis macula triangulari alba, buccis auriculisque nudis.

Blanc-nez *Allam. Buff. hist. nat. XIV p. 141 tab. 39 f*
 Der weifsnafige Affe: *Simia Petaurista Schreb. Säugth.*

I p. 103 n. 21 tab 19 B fig. Allam.

Die Weifsnafe *Müll. Naturf. Suppl. p. 8 tab. 2 fig. 1*
 Allam.

Longitudo corporis 13 pollicum, caudae 20 poll.
 Facies plana, nigra. Oculi magni, profundi.
 Frons flava. Orbitae atque buccae nudaе. Macu-
 la triangularis niuea sub naribus, apice deorsum
 verso. Mentum barba alba breui. Auriculae oua-
 tae, nudaе. Fascia nigra trans caput ab aure ad
 aurem, pilis longioribus. Dorsum et cauda supra
 et pedes latere exteriori nigro-oliuacea. Manus
 nigrae. Pedes intus pallide grisei. Pectus et ven-
 ter alba. Nates caluae. Ungues rotundati.

Habitat in Guinea. Tetrapus. Mitissimus, agilis. Ne
 barba madescat, dum potat, bene curat.

Tala- 15. C. buccis barbatis, pedibus nigris, cauda
 poin. supra oliuacea, subtus cinerea.

Le Talapoin *Buff. hist. nat. XIV p. 287 tab. 40.*

The Talapoin Monkey *Penn. syn. quadr. p. 115 n. 79.*

Talapoino *Aless. quadrup. IV tab. 186 fig. 1 Buff.*

Der schwarznafige Affe: *Simia Talapoin Schreb.*

Säugth. I p. 101 n. 18 tab. 17. fig. Buff.

Der schwarznafige Affe *Müll. Naturf. Suppl. p. 8*
tab. 1 fig. 5 Buff.

Caput rotundum. Rostrum subelongatum. Nasus acu-
 tus. Facies plana, coloris carnei. Auriculae ma-
 gnae, rotundatae, nudaе, nigrae. Pili in buccis
 longissimi versus aures reflexi. Mentum barba
 parua. Corpus supra et artus latere exteriori ob-
 scure flavescenti-virides, subtus flauo-albidi.
 Pedes nigri. Ungues digitorum acuminati, pol-
 licum rotundati. Cauda longa, gracilis, supra
 obscure oliuacea, subtus cinerea. Nates callosae.

Lon-

Longitudo corporis pedis vnus, caudae 19 pollicum.

Habitat in India.

Num eadem cum sequente?

Cephus. 16. C. buccis barbatis, vertice flavescente, pedibus nigris, cauda apice ferruginea.

Alius Guineensis *Marcgr. Brasf. p. 228.*

Alius Guineensis *Rai. syn. quadr. p. 156.*

Simia caudata, genubus auribusque barbatis *Linn. syst. nat. 6 p. 3 n. 12.*

Cebus barbatus alius Guineensis *Klein. quadrup. p. 89.*

Simia caudata, auribus genubusque barbatis. The tailed Simia, with tufts of hair at the ears and knees *Hill anim. p. 539.*

Le Singe de Guinée à barbe jauneâtre: Cercopithecus nigricans, genis et auriculis longis pilis ex albo flauicantibus obsitis, ore coerulescente *Briff. regn. an p. 206 n. 19.*

Simia (Cephus) caudata, buccis barbatis, vertice flavescente, pedibus nigris, cauda apice ferruginea *Linn. syst. nat. 10, I p. 27 n. 9.*

Gestaarte Baard-Aap, met gebaarde Wangen, de top geelagtig, de Pooten zwart, de Staart aan 't end vaal *Houtt. nat. hist. I p. 362.*

Simia (Cephus) caudata, buccis barbatis, vertice flavescente, pedibus nigris, cauda apice ferruginea *Linn. syst. nat. 12, I p. 39 n. 19.*

Le Moustac *Buff. hist. nat. XIV p. 283 tab. 39.*

The Moustache Monkey *Penn. syn. quadr. p. 114 n. 78.*

Mustacchio *Aless. quadrup. IV tab. 185 fig. 2 Buff.*

Das Blaumaul *Müll. Naturf. I p. 130.*

Der blaumäulige Affe: Simia Cephus *Schreb. Säugeth. I p. 102 n. 19 tab. 19. fig. Buff.*

Longitudo corporis ped. I caudae 18 poll. Facies nuda caerulefca. Vertex flauus pilis longis erectis. Nasus breuis. Lunula superciliarum transuerfa alba. Circa os pili aliquot nigri. Labia infra nasum niuea. Ante auriculas fasciculi duo magni pilorum flauorum. Corpus supra e rubro vel virefcente gifeum, fubtus pallidius. Cauda dorfo concolor, excepto apice ferrugineo. Nates callofae. Pedes nigri. Ungues plani.

Habitat in Guinea. Tetrapus incedit. Ludit et clamat.

Aethiops. 17. C. imberbis vertice pilis arrectis lunulaque frontis albis.

Simia Aethiops Haffelqu. Palaest. p. 270.

Simia (Aethiops) caudata imberbis, vertice pilis arrectis lunulaque frontis albis Linn. Syst. nat. 10, I p. 28 n. 14.

Gestaarte Aap zonder Baard, met overendstaande witte Hairen op den Kop en een wit Maantje aan 't Voorhoofd Houtt. nat. hist. I p. 366.

Simia (Aethiops) caudata imberbis, vertice pilis arrectis lunulaque frontis albis Linn. mus. Ad. Fr. II pag. 4.

Simia (Cephus) β Linn. Syst. nat. 12, I p. 39.

Le Mangabey Buff. hist. nat. XIV p. 244 tab. 32.

Le Mangabey à collier blanc Buff. hist. nat. XIV tab. 33.

The white-eye-lid Monkey Penn. syn. quadr. p. 144 n. 77.

Mangabey Aleff. quadr. IV tab. 183 fig. Buff.

Der weifsängige Affe : Simia Aethiops Schreb. Säugth. I p. 105 n. 22 tab. 20, 21 figg. Buff.

Caput subrotundum. Rostrum obtusiusculum, breue. Facies nigra, lanuginosa. Mystaces breuiusculae, subri-

subrigidae, sparsae sine ordine. Nasus oblongus, aequalis, parum eleuatus. Nares oblongae, basi remotiores. Supercilia pilosa: pilis longis mollivsculis. Palpebrae superiores albissimae, sine linea candida tenuis proxime super supercilia transuersaliter per frontem extensa. Auriculae subrotundae, nigrae, margine inaequales. Coma subrigida, candida, erecta, copiosa, parum longa ad tempora infra auriculas (in Buffonii varietate). Corpus teres, aequale, versus inguina parum angustatum. Cauda corpore paullo longior, teres, basi crassior, apice aequalis, subtus ad basin valde pilosa. Lumbi latiores. Nates caluae. Crura angustiora. Manus nigrae. Digni plantarum longiores. Ungues pollicum et palmarum plani, rotundati; plantarum subacuti. Color capitis, dorsii, laterum, caudae et crurum supra ex cano et viridescente mixtus, in aliis obscurior. Abdomen, gula et crura subtus candida. Crura anterius cana. Cauda subtus ferruginea. Magnitudo felis domesticae.

Hunc lubenter contraherem cum Cepho, praeeunte summo Linneo, nisi propriam speciem dicerent Buffonius, Pennantus, Schreberus, olimque ipse Linneus.

Habitat in Aethiopia, Madagascar. Mitis atque docilis. Quadrupes incedit. Menstruat.

Aygula. 18. C. subimberbis griseus, eminentia pilosa verticis reuerfa longitudinali.

Simia (Aygula) caudata subbarbata, eminentia pilosa verticis longitudinali *Osborn. Ostind. p. 130.*

Simia (Aygula) caudata subbarbata grisea, eminentia pilosa verticis longitudinali *Linn. Syst. nat. 10, 1 p. 27. n. 10.*

Gestaarte Baard-Aap, die grys is van Kolor, met een Kuif van Hair langs heen boven op den Kop
Houtt. nat. hist. I. p. 363.

The middle sized black Monkey *Edw. glean. III p. 221 tab. 311.*

Simia (Aygula) caudata subimberbis grisea, eminentia pilosa verticis reuerfa longitudinali Linn. syst. nat. 12, I p. 39 n. 21.

L'Aigrette *Buff. hist. nat. XIV p. 190 tab. 21.*

The Egret Monkey *Penn. syn. quadr. p. 116 n. 81.*

Aigrette *Alciff. quadrup. IV tab. 180 fig. 2. Buff.*

Der Eulaffe *Müll. Naturf I p. 131.*

Der Tjäkko: *Simia Aygula Scrb. Säugth. I p. 106 n. 23 tab. 22 fig. Buff.*

Magnitudo Felis minoris. Corpus griseum, coloris Lupi, subtus gula, pectore abdomineque albicans. Cauda corpore longior, cinerea, attenuata. Caput antice nigrum, eminentia pilosa verticis grisea. Facies planiuscula, albida, nuda. Nasus depressus, breuissimus, ab ore remotus lacuna labii superioris gemina. Bucca subbarbata, pilis sursum versis. Supercilia frontis gibba, setosa, prominentia. Auriculae acutiusculae. Pedes nigri semipalmati: unguibus pollicum rotundatis, reliquis oblongis. Sutura arcuata ab aure versus oculos deorsum ad basin maxillae inferioris. Sutura alia cubiti longitudinalis.

Habitat in India orientali. Ludibundus, alligatus saltat continuo. Blanditur homini aliisque Aygulis: aliis Simiis visis gesticulatur. Ludit cum canibus. Dormiunt plures capitibus sibi inuicem appositis. Noctu perpetuo clamat.

Buffonio videtur varietas Cynomolgi, quod quidem maxime miror.

Pennanto le Malbrouck Buffonii, quem vide in C. Fauno, huc pertinere videtur: neque equidem hoc intelligo.

Maura. 19. C. totus niger.

Simiolus ceylonicus *Seb. thes. I p. 77 tab. 48 fig. 3?*

Cebus Simiolus ceylonicus *Klein. quadrup. p. 88?*

The Negro Monkey *Penn. syn. quadr. p. 115 n. 80.*

Der Mohraffe: *Simia Maura Schreb. Säugth. I p. 107 n. 24 tab. 22 B fig. propria.*

Der Mohraffe *Müll. Naturf. Suppl. p. 9 tab. 2 fig. 2 Schreb.*

Caput rotundum. Nasus subacutus. Facies coloris fusco carnei, pilis paucis nigris. Irides rubro fuscae. Pili supra oculos longi cum supercilis connexi. Auriculæ pilis temporum suboccultatae. Pili corporis, artuum et caudæ nigri, sat longi, pectus et venter e nigro carnea subnuda. Manus cute nigra molli. Magnitudo felis maioris.

Habitat in Guinea, agilis mitisque.

Num varietas C. Aygulæ?

finicus. 20 C. imberbis, capillitio horizontali plano.

A Rillow *Knox Ceylon p. 26 cum fig. mal.*

Le bonnet-chinois *Buff. hist. nat. XIV p. 224 tab. 30*

The Chinese Monkey *Penn. syn. quadr. p. 117. n. 87.*

Simia (finica) caudata imberbis, capillitio vndique horizontaliter caput obumbrante Linn. mant. II p. 521.

Simia di Bengala Aleff. quadrup. IV tab. 182 fig. Buff.

Der Hutaffe: *Simia finica Schreb. Säugth. I p. 108 n. 25 tab. 23 fig. Buff.*

Der Hutaffe *Müll. Naturf. Suppl. p. 9 tab. 2 fig. 3 Buff.*

Pallide cinereo fuscus. Facies plana, rugosa, incarnata, lanugine alba. Nasus longus, laevis, albicans. Capillitium horizontale orbiculi instar ca-

put obumbrat. Auriculæ magnæ, rotundatæ. Labium superius crassum. Vertex et dorsum medio castanea, crura pallide fusca, manus flavescentes. Corpus subtus pallide fuscum. Cauda corpore longior, supra colore dorsi, subtus ventris.

Habitat in India orientali gregarius. Spoliat hortos et agros, ut vix retineatur.

Hunc Buffonius refert ad suum Malbrouck, quem vide in C. Fauno.

Roloway. 21. C. nigro fuscus, barba alba bifida.

Palatine, ou Roloway *Allam. Buff. hist. nat. XV p. 77 tab. 13 f*

Der Palatinasse: Simia Roloway *Schreb. Säugth. 1 p. 109 n. 26 tab. 25 fig. Allam.*

Der Palatinasse *Müll. Naturf. Suppl. p. 10 tab. 2 fig. 5 Allam.*

Longitudo corporis $1\frac{1}{2}$ ped. Cauda longitudine corporis. Facies triangularis, plana, nigra, circumferentia alba, ex qua oritur barba alba bifida in pectus propendens. Corpus supra nigro fuscum, pilis in capite, lateribus cruribusque apice albis. Pectus, venter, circumferentia natium callosarum, et crura latere interiore alba (in patria animalis dicuntur esse aurantii coloris).

Habitat in Guinea. Mitis, ludibundus.

Nemae- 22. C. mento buccisque barbatis, natibus pilosus. us. fis, cauda alba.

Sifac *Flacourt Madag. p. 153?* (vix est.)

Le grand Singe de la Cochinchine: Cercopithecus cinereus, genis longis pilis ex albo flauicantibus obsitis, torque ex castaneo purpurascente *Briff. regn. an. p. 205 n. 18.*

Le Douc *Buff. hist. nat. XIV p. 298 tab. 41.*

The Cochinchina Monkey *Penn. syn. quadr. p. 119 n. 85.*

Simia

Simia (Nemaus) caudata imberbis, buccis barbatis, cauda alba *Linn. mant. II p. 521.*

Sifach Aless. quadrup. IV tab. 186 fig. 2 Buff.

Der Duk: *Simia Nemaus Schreb. Säugth. I p. 110 n. 27 tab. 24 fig. Buff.*

Der Duk *Müll. Naturf. Suppl. p. 10 tab. 2 fig. 4 Buff.*

Longitudo corporis $3\frac{1}{2}$ - 4 ped. Facies brevis, planiuscula, rubra. Labia et orbitae oculorum brunneae. Auriculae minutae, nudaе, rubrae. Frons barbaque alba. Tempora pilis longioribus exalbido cinereis. Collare purpurascens. Caput supra et corpus griseum, pectus et venter flava. Pedes supra nigri, infra albi. Pollex palmarum brevis. Ungues subacuti, excepto pollice plantarum. Ad basin caudae macula magna alba. Nates testae pilosae, quod soli huic Cercopitheco proprium. Cauda alba, mediocris, vix longitudine corporis.

Habitat in Cochinchina. In Madagascar? Erectus saepe incedit.

Species obscurae.

- * The tawny Monkey *Penn. syn. quadr. p. 120 n. 86*
Magnitudo Catī. Rostrum paullulum productum, coloris carnei. Nasus planus. Aures coloris carnei. Supra pallide fuscus, pilorum basibus cinereis. Dorsum postice aurantium. Pedes cinerei. Venter albus. Cauda corpore breuior.

Habitat in India. Malignus.

Varietas facie nigra, buccis pilis longis albis, corpore pallide griseo virefcens. Artus grisei. Cauda fusca. *Penn. syn. quadr. addit. tab. 13 A fig. 2.*

- ** The Goat Monkey *Penn. syn. quadr. p. 120 n. 88.*
Facies nuda, caerulea, oblique striata. Barba longa caprina. Corpus et artus profunde fusca. Cauda longa. *Mus. brit.*

*** The

*** The annulated Monkey *Penn. syn. quadr. p. 121 n. 89.*

Facies plana. Pili longiores in fronte et buccis.
Corpus et artus supra fusca, venter cinereus.
Cauda corpore brevior, annulata colore profundius et pallidius fusco. *Mus. brit.*

5. CEBVS.

Dentes Primores incisores, supra et infra IV.
Laniarius vtrinque I.

Manus in palmis plantisque.

Mammae pectorales II.

Cauda prehensilis.

Nates pilosae.

Belzebul. 1. C. barbatus niger, caudae extremo pedibusque brunneis.

Aquiqui *Lac. Amer. p. 553.*

Guariba Brasiliensibus *Marcgr. Bras. p. 226 fig. bona.*

Cercopithecus Guariba apud Brasilienses dictus *Ionst. quadrup. p. 142.*

Cercopithecus Meerkatz *Ionst. quadrup. tab. 61.*

Guariba Brasiliensibus *Marcgrauii Rai. syn. quadrup. p. 153.*

Singes *Dampier voy. III p. 302.*

Simia caudata barbata, cauda prehensili *Linn. syst. nat. 6 p. 3 n. 14.*

Cebus Guariba *Marcgrauii Klein. quadrup. p. 88.*

Simia caudata barbata, cauda feminuda. The bearded Simia, with the tail half naked *Hill. anim. p. 539.*

Le Sapajou noir: Cercopithecus niger, pedibus fuscis *Briff. regn. an. p. 194 n. 2.*

Die schwarze glatte Meerkatze *Hall. vierf. p. 555.*

Aquiqui *Dictioun. anim. I p. 148.*

Aquiqui *Bom. dictionn. I p. 136.*

Simia (Belzebul) caudata barbata nigra, cauda prehensili extremo pedibusque brunneis *Linn. syst. nat. 12, I p. 37. n. 12.*

L'Onarine *Buff. hist. nat. XV p. 5.*

The howling Baboon *Bancr. Guian. p. 133.*

The Preacher Monkey *Penn. syn. quadr. p. 122 n. 91.*

Der Fliegenfänger *Müll. Naturf. I p. 125.*

Der schwarze Brüllaffe : Simia Belzebul *Schreb. Säugth. I p. 112 n. 28.*

Guariba, Guereba *Brasiliensibus.*

E maximis huius generis, magnitudine vulpis. Niger, pilis longis laeuissimis nitidus. Barba rotunda, nigra. Facies elata. Oculi nigri, splendentes. Auriculæ breues, subrotundæ. Pedes et caudæ extremum fusca; cauda apice nuda. Mas paullo maior femina. Tetrapus.

Habitat in Brasilia et propinquis terris gregarius.

Minor aliquis ante et post meridiem in medio et altiori loco residet, reliqui paullo inferius circumfident: ille præcinit alta voce et signo manu dato, reliqui omnes accinunt, donec superior iterum manu signum det; tunc omnes vno momento silent, et superior grandi voce cantionem finit; nisi forte hac in fabula elephantem ex musca fecerit Margrauius. Mordax animal, nec domandum. Catulos in dorso gerit.

Os singulare cauum et durum in gula, vnde vox fortis; quod vide apud *Grew mus. reg. soc. p. 11 tab. 2* sub nomine: a throttle bone of a male Aquiqui.

Seni-

CEBI cum Callitrichibus soli nouo orbi proprii, nisi forte Iacchus in Aethiopia reperiatur.

CEBOS dico, non quod veterum Cebos putem animalia veteribus certe ignota, sed quod nomine generico indigeo.

- Seniculus. 2. *C. barbatus rufus*.
 Rex simiorum *Laet Amer. p. 553*.
Arabata Gum. Orin. I p. 295.
Cercopithecus barbatus maximus, ferrugineus, ster-
torofus Barr. Fr. équ. p. 150.
 Le Singe rouge de Cayenne: *Cercopithecus barba-*
tus saturate spadiceus Briss. regn. an. p. 206 n. 20
Simia (Seniculus) caudata barbata rufa, cauda pre-
hensili Linn. syst. nat. 12, I p. 37 n. 13.
 L'Alouate *Buff. hist. nat. XV p. 5*.
 Another Monkey *Bancr. Guian. p. 135*.
 The royal Monkey *Penn. syn. quadr. p. 123 n. 91 a*)
 Der Greifs *Müll. Naturf. I p. 126*.
 Der rothe Brüllaffe: *Simia Seniculus Schreb. Säugth. I*
p. 113 n. 29.
 Mono colorado *Carthageniensibus*.
 Alawata, Singe rouge *Guianensibus*.

Magnitudo circiter praecedentis, vel paullo maior.
 Color totius ruber. Barba minor. Ungues acuti,
 pollicum plantarum rotundiore. Auriculae magnae.

Habitat in Guiania in silvis ad fluvium. Transeun-
 tes ex arboribus voce ingrata, rauca admodum
 simul clamosa eminusque audienda salutat; vix
 adspici se finit, quin illico clamat. Nocturnus.
 Vicitat Musae fructibus. Caro editur sapida. Vox
 ingrator adhuc quam praecedentis.

Varietatem *C. Belzebul* putant Buffonius atque Pen-
 nantus, quod vix credibile videtur.

Paniscus. 3. *C. imberbis ater, palmis tetradactylis*.

Cercopithecus maior, niger, faciem humanam refe-
rens: Quouata Barr. Fr. équ. p. 150.

Le Belzébut: *Cercopithecus* in pedibus anterioribus
 pollice carens, cauda inferius versus apicem pilis
 destituta *Briss. regn. an. p. 211 n. 29*.

The four-fingered Monkey: *Simia fulca maior*, palmis tetradactylis, cauda prehensili ad apicem subtus nuda *Brown. Iam. p. 489.*

Simia (*Paniscus*) caudata barbata, cauda prehensili, palmis subtetradactylis. *Linn. syst. nat. 10, I p. 26 n. 7.*

Belzebut *Dictionn. anim. I p. 272.*

Gestaarte Baard-Aap, met een aanvattende Staart, de Voorpooten omtrent viervingerig *Hourt. hist. I p. 359.*

A Spider Monkey *Edw. Glean. III p. 222* (absque figura).

Simia (*Paniscus*) caudata imberbis atra, cauda prehensili, palmis tetradactylis *Linn. syst. nat. 12, I p. 37 n. 14.*

Le Coaita *Buff. hist. nat. XV p. 16 tab. I.*

The ape here called a Quato *Bancr. Guian. p. 131* (ecaudatam dicit).

Quata *Fermin Surin. II p. 115.*

The fourfingered Monkey *Penn. syn. quadr. p. 124 n. 92.*

Coaita *Aless. quadrup. IV. tab. 187 fig. Buff.*

Der kleine Pan oder Waldgott *Müll. Naturf. I p. 126*

Der vierfingerige Affe: *Simia Paniscus Schreb. Säugth. I p. 115 n. 30. tab. 26 fig. Buff.*

Magnitudo Molossi. Corpus gracile, atrum, pilis longis, rudibus, villosum. Caput paruum, oblongum, rostro crasso. Oculi magni, profundi. Auriculae breues, humanae, nudaе. Facies nuda, ex nigro rubra. Nasus depresso. Pedes longi, graciles, cum cauda extrema dimidia brunnea, subtus nuda. Ne quidem rudimentum pollicis in palmis. Ungues palmarum rotundati, plantarum oblongiusculi. Cauda corpore longior.

Habitat

Habitat in Guiana, Brasilia; Peru. In magnis gregibus arbores inhabitat, raro in terra videtur. Saliit ex arbore in arborem ex cauda dependens, etiam pluribus inter se cauda concatenatis. Gesticulatur, ramos, urinam; excrementa iniicit in peregrinantes. Agillimus, sat mitis ac docilis. Vix fert nostrum clima. Cauda omnia arripit, cibumque eadem ori admouet, diciturque cauda piscari. Parit 1-2. Menstruat.

Capucinus 4. *C. imberbis fuscus, cauda hirsuta, pileo artubusque nigris.*

Cercopithecus brasilianus II. *Cay Clus. exor. p. 372*

Cay Lact Amer. p. 553.

Caa apud Touvoupinamboutios *Ionst. quadrup. p. 144.*

Cay Brasilianis Touvoupinamboutiis dictus Rai. syn. quadr. p. 155.

Macaq Froger voy. p. 145.

Simia (Capucina) caudata imberbis; cauda longa hirsuta, facie flavescente Linn. mus. Ad. Frid. 1 p. 2 tab. 2.

Le Sapajou brun: *Cercopithecus fuscus, capitis vertice nigro Briss. regn. an. p. 193 n. 1.*

Le petit Singe negre: *Cercopithecus totus niger Briss. regn. an. p. 196 n. 5.*

Der ledergelbe Muskusaffe *Hall. vierf. p. 557?*

Simia (Capucina) caudata imberbis, cauda longa hirsuta, facie flavescente Linn. syst. nat. 10, I p. 29 n. 19.

Gestaarte Aap zonder Baard, met een lange ruige Staart, het Aangezigt geelagtig *Houtt. nat. hist. I p. 369.*

Simia (Capucina) caudata imberbis fusca, cauda prehensili hirsuta, pileo artubusque nigris, natibus tectis Linn. syst. nat. 12, I p. 42, n. 30.

Le Sajou *Buff. hist. nat. XV p. 37.* Le Sajou brun *tab. 4.* Le Sajou gris *tab. 5.* (Hoc quidem synonymon

mon doctiff. Schreberus refert ad Apellam, Pen-
nantus ad trepidum, mihi huc potius pertinere
videtur.)

Le Saï *Buff. hist. nat. XV p. 51 tab. 8.*

Le Saï à gorge blanche *Buff. hist. nat. XV tab. 9.*

Der braune Sapajou *Fermin Surin II p. 115.*

The weeper Monkey *Penn. syn. quadr. p. 127 n. 94.*

Saj *Aless. quadrup. IV tab. 189 fig. Buff.*

Saiu bruno *Aless. quadr. IV tab. 188 fig. 1. Grigio
fig. 2 figg. Buff.*

Der Capuziner *Müll. Naturf. I. p. 136.*

Der Winfelaffe: *Simia Capucina Schreb. Säugth. I
p. 120 n. 34 tab. 29 fig. Linn. 2. 7.*

Longitudo corporis 12-14 pollicum. Variat colore
fusco, nigro, griseo, in dorso saturatiore; at capitis ver-
tex, pedes caudaque nigra. Pectus ferrugineum,
interdum album. Caput rotundum. Rostrum breue
et crassum. Facies incarnata, plerisque nigricans,
fronte magis incarnata. Ruga varicosa nigra re-
tractilis supra frontem ante pileum. Nasus crassus,
versus oculos carinatus. Oculi castanei, approxi-
mati. Auriculæ rotundatæ, pilosæ, incarnatæ.
Dentes lanarii non distantes a proximis. Cauda
corpore paullo longior, semper curuata, circum-
que collum sæpius coniecta, pilis longioribus vil-
losa. Ungues digitorum acuti, pollicum planta-
rum rotundati. Pedes situ transuerso ponit, vt
postici semper inter anticos collocentur.

Habitat in Brasilia et Surinamo, gregarius.

Tarsis incedit tetrapus, non salit, tardus, nec fa-
cile scandit. Miser et eiulans semper, clamore
horrendo hostes pellit, stridet sæpius vti Cicada;
iatus latrat more canis. Agilis ludibundus.
Melius reliquis omnibus fert nostrum clima, vt
adeo in Gallia pariat. Non menstruat. Parit 1-2.
Moschum redolet. Mitis, docilis, timidus.

Apella. 5. C. imberbis, corpore fusco, pedibus nigris.
 Simia (Apella) imberbis, cauda prehensili, pedibus
 nigris, corpore fusco *Linn. mus. Ad. Frid. I p. I*
tab. I.

Simia (Apella) caudata imberbis, cauda subprehen-
 sili, corpore fusco, pedibus nigris *Linn. syst. nat.*
10, I p. 28 n. 17.

Gestaarte Aap zonder Baard, met een Staart die byna
 kan grypen, een bruin Lighaam en zwarte Poten
Houtr. nat. hist. I p. 367.

Simia (Apella) caudata imberbis, cauda subprehen-
 sili, corpore fusco, pedibus nigris, natibus tectis
Linn. syst. nat. 12, I p. 42 n. 29.

Der Kahlbart *Müll. Naturf. I p. 136.*

Der Saju: Simia Apella *Schreb. Säugth. I p. 119 n*
33 tab. 28 fig. Linn.

Hic quibus differat a Capucino, non satis intelligo.
 Coniungit vtrumque cum trepido doctiss. Pennantus.

Habitat in America australi.

trepidus. 6. C. imberbis, capillitio arrecto, manibus pe-
 dibusque caeruleis, cauda villosa.

The bush-tailed Monkey *Edw. glean. III p. 222*
tab. 312.

Simia (trepida) caudata imberbis, capillitio arrecto,
 manibus pedibusque caeruleis, cauda prehensili
 villosa *Linn. syst. nat. 12, I p. 39 n. 20.*

The Capucin Monkey *Penn. syn. quadr. p. 126. n. 93.*

Der Zitteraffe *Müll. Naturf. I p. 130.*

Der Buschschwanzaffe: Simia trepida *Schreb. Säugth. I*
p. 118 n. 31 tab. 27 fig. Edw.

Differt a praecedentibus capillitio arrecto hemisphae-
 rico. Forte eadem species, vti videtur Pennanto.

Habitat in America australi.

Fatuel- 7. *C. imberbis*, capitis fasciculis pilorum duobus erectis.

The Tittee: *Simia minor subfusco-miscella*, ventre albido, cauda ad apicem nuda *Brown. Iam. p. 489?*

Le Sapajou cornu: *Cercopithecus ex nigro et fusco variegatus*, fasciculis duobus pilorum capitis corniculorum aemulis *Briff. regn. an. p. 165 n. 3.*

Simia (Fatuellus) caudata imberbis, cauda prehensili, capitis fasciculis pilorum duobus corniculorum aemulis *Linn. syst. nat. 12, I p. 42 n. 28.*

The horned Monkey *Penn. syn. quadr. p. 129 n. 96.*

Der Feldgott *Müll. Naturf. I p. 135.*

Der Hornassé: *Simia Fatuellus Schreb. Säugth. I p. 118 n. 32.*

A Capucino differt fasciculis pilorum duobus in vertice corniculorum aemulis; forte varietas mera eiusdem, ut Buffonio videtur.

Habitat in America australi.

Sciureus. 8. *imberbis flauo fuscus*, ore caerulefcente, pedibus ferrugineis.

Sagouin Froger. voy. p. 144.

Cercopithecus minor luteus: Sapajou jaune *Barr. Fr. équ. p. 151.*

Simia (sciurina) imberbis, cauda longa, occipite gibbo, unguibus plantarum quatuor oblongis *Linn. mus. Ad. Frid. I p. 3.*

Le Sapajou jaune: *Cercopithecus pilis ex fusco, flavescente et candicante variegatis vestitus*, pedibus ex flauo rufescentibus *Briff. regn. an. p. 197 n. 8.*

Simia (sciurea) caudata imberbis, occipite prominulo, unguibus quatuor plantarum oblongis *Linn. syst. nat. 10, I p. 29 n. 20.*

Gestaante Aap zonder Baard, het Agterhoofd uitstekende, vier Nagelen der Agterpooten langwerpig
Houtt. nat. hist. I p. 369.

Der sehr kleine americanische Affe; mit kurzem Bart, langem Schwanz, schwarzblauem Mund und langen Nägeln; Todtenköpfelein genannt *Mus. baruth. p. I tab. I fig. bona.*

Simia (sciurea) caudata imberbis; occipite prominulo, vnguibus quatuor plantarum subulatis, natibus tetis *Linn. syst. nat. 12, I p. 43 n. 31.*

Le Saimiri *Buff. hist. nat. XV p. 67 tab. 10.*

Der gelbe Sapajou *Fermin Surin. II p. 116.*

The orange Monkey *Penn. syn. quadr. p. 128 n. 95.*

Sajmiri *Aless. quadrup. IV tab. 190 fig. Buff.*

Der Eichhornaffe *Müll. Naturf. I p. 136.*

Das Todtenköpfchen: *Simia sciurea Schreb. Säugth. I p. 121 n. 35 tab. 30 fig. mus. Baruth.*

Singe de nuit *Cayennensibus.*

Sapajou aurore, Sapajou orangé, Sapajou jaune *Gal- lis vulgo.*

Longitudo corporis 10-12 poll. Caput rotundum, occipite gibbo prominulo. Facies plana, nuda.

Nasus depressus, parumper acutus, apice nigrescens. Supercilia setacea. Oculi magni. Orbitae

incarnatae. Os fusco caerulefcens, paruum. Auriculae rotundatae, pilis longioribus sordide albis.

Corpus pilis mollissimis flavo fuscis, subtus pallidum.

Vlnae et tibiae ferrugineae siue aurantiae. Un-

gues palmarum rotundati, plantarum subulati, excepto pollicum. Cauda longitudine dupla corporis villosa, apice nigra.

Habitat in Brasilia et Guania.

Tenerum animal, vix ferens nostrum clima. Prouocatum clamat misere. Moschum redolet.

Huius

Huius omnino foetus videtur:

Cercopithecus americanus minor, Monkje dicitur
Seb. thes. I p. 52. tab. 33. fig. 1.

Cebus Caput mortuum vulgo *Klein. quadrup. p. 88.*

Le Singe à queue de rat: Cercopithecus in dorso
spadiceus, in ventre glaber, cauda murina *Briff.
regn. an. p. 201 n. 13.*

Der Todtenkopf *Hall. vierf. p. 558.*

Simia (Morta) caudata imberbis, ore fusco, corpore
spadiceo, cauda nuda subsquamosa *Linn. syst. nat.
10, I p. 29 n. 18.*

Tête de Mort *Dictionn. anim. IV p. 324.*

Gestaarte Aap zonder Baard, met een bruinen Bek,
het Lyf scharlaken rood, de Staart kaal en eeni-
ger maate geschubd *Houtt. nat. bist. I p. 368. tab.
6 fig. 5.*

Cercopithecus caudatus, imberbis; ore fusco: cauda
nuda subsquamosa *Gronov. zooph. I p. 5. n. 21.*

Tête de Mort *Bom. dictioun. IV p. 366.*

Simia (Morta) caudata imberbis spadicea, ore fusco,
cauda nuda squamosa *Linn. syst. nat. 12, I p. 43
n. 32.*

Die Meerkatze mit dem Todtenkopf *Fermin. Surin. II
p. 116.*

Der Todtenkopf, Mönch, *Müll. Naturf. I p. 137
tab. 6 fig. 5.*

lugubris. 9. C. imberbis niger, facie ferruginea.

Magnitudo Capucini. Totus niger. Facies ferrugi-
nea, cum circumferentia vsque in pedes anticos.

Est in viuario Sereniss. Principis Hassiae, Cassel-
lis. Mitis. A nemine hactenus descriptus, quan-
tum video.

Species obscurae.

* Cercopithecus Luzonis minimus D. Camel. Magu
vel Boot Indorum *Petiv. gazoph. tab. 13 fig. 11*

Simia caudata, ore ciliisque vibrizatis *Linn. syst. nat.* 6 p. 3 n. 6.

Simia (*Syrichta*) *caudata imberbis*, ore ciliisque vibriffatis *Linn. syst. nat.* 10, I p. 29 n. 21.

Gestaarte Aap zonder Baard, de Bek en Oogleden met lange Hairen *Houtt. nat. hist.* I p. 369

Simia (*Syrichta*) *caudata imberbis*, ore ciliisque vibriffatis *Linn. syst. nat.* 12, I p. 44 n. 33.

The Philippine Monkey *Penn. syn. quadr.* p. 121 n. 90.

Der Zwerg *Müll. Naturf.* I p. 137.

Der Magu: *Simia Syrichta* *Schreb. Säugth.* I p. 124 n. 36 tab. 31 fig. Petiv.

Habitat in Philippinis insulis.

Nocturnam dicit Petiuerius, qui solus eam habuit, arborisque ramo circumligare pullum ad suum corpus.

** The Antigua Monkey *Penn. syn. quadr.* p. 129 n. 97.

Longitudo corporis 18 pollicum, caudae 20 poll. Facies nigra. Nafus brevis. Tempora barbata. Dorsum et latera colore ex aurantio et nigro intime mixto. Venter albus. Crura extus nigra, intus cinerea. Cauda profundius cinerea. Rich. Morris Esq. habuit ex Antigua, loco tamen natali incerto. Mitis, agilis, ludibundus.

6. CALLITHRIX.

Dentes Primores incisores supra et infra IV.

Laniarii solitarii.

Manus in palmis plantisque.

Mammae pectorales II.

Cauda elongata non prehensilis.

Nates tectae.

Sacci in buccis nulli.

Pithecia. I. C. subimberbis, vellere nigro apice albo, cauda nigra villosissima.

Cagui Brasiliensibus *Marcgr. Bras. p. 227 fig. mediocr.*

Cagui Brasiliensibus *Ionst. quadrup. p. 143 tab. 60 fig. Marcgr.*

Cagui maior Brasiliensibus *Rai. syn. quadr. p. 154.*

Le Sapajou à queue de renard: *Cercopithecus pilis nigris, apice albido, vestitus, cauda pilis longissimis nigris obsita. Briss. regn. an. p. 195 n. 4.*

The Sakee-winkee: *Simia minima, capite albido, dorso fusco pone rufescenti, cauda crinita Brown. Iam. p. 489.*

Simia (Pithecia) caudata subimberbis, vellere nigro apice albo, cauda nigra villosissima *Linn. syst. nat. 12, I p. 40 n. 22.*

Le Saki *Buff. hist. nat. XV p. 88 tab. 12.*

The Saccawinkee *Bancr. Guian. p. 135.*

Der schwarze Saguin *Fermin Surin. II p. 117?*

The fox tailed Monkey *Penn. syn. quadr. p. 130 n. 98.*

Simia coda di volpe *Aless. quadrup. IV tab. 191 fig. Buff.*

Der Affe mit dem Fuchschwanz, der Saki *Berl. Samml. IV p. 72.*

Der Postenreisser *Müll. Naturf. I p. 132.*

Der Saki: *Simia Pithecia Schreb. Säugth. I p. 125*
n. 37 tab. 32 fig. Buff.

Maxima huius generis, longitudine corporis 17 pol-
 licum. Caput rotundatum, paruum, rostro bre-
 viore. Auriculæ parvae, rotundatae. Facies nigri-
 scans, lanugine breui, alba. Frons et tempora
 (nuda) tecta pilis longioribus albidis. Nasus crassus. Oculi
 magni, prominentes, nigri. Corpus nigrum, pi-
 lis omnibus apice albis. Gula, et abdomen pilis
 fordide albicantibus. Cauda pilis longis nigris,
 interdum rufis, elongata. Manus nigrae. Ungues
 acuti, pollicum rotundati.

*Habitat in Guiania. Facile mansuescit, ludibundus,
 semper tamen paullulum malitiosus.*

Tacchus, 2. *C. auribus villosis patulis, cauda hirsutissima
 cinerea nigro annulata.*

Callithrix Plin. hist. nat. VIII c. 54 (c. 80 Hard.)?

Cercopithecus Brasiliensis I Clus. exot. p. 371.

*Cercopithecus Brasiliensis III Sagouin Clus. p. 372 cum
 fig. mediocr.*

Sagouin Laet Amer. p. 553.

Cercopithecus Sagouin Clusii Nieremb. hist. nat. p.

177 fig. Clusii.

Sagouin Nieremb. hist. nat. p. 177 fig. pessima.

Cagui minor Marcgr. Bras. p. 227 fig. mala.

Caitaia Brasiliensibus Marcgr. Bras. p. 227.

*Cercopithecus Sagouin Clus. Ionst. quadrup. p. 143
 tab. 74 fig. Clusii.*

Caitaia Ionst. quadr. p. 143. tab. 60 fig. mala.

Galeo-

CALLITRICHES voco animalcula antecedentibus proxima, quam-
 vis utique genere differant, quae vere pilis coloribusque pul-
 chris gaudent. Veteribus *Callithrix Simiae* pulchrum genus
 erat.

Galeopithecus Sagoin: Eine Art der Meerkatzen
Gesn. Thierb. p. 22 fig. pessima.

Animalculum e genere eorum; quae Hollandi Sanguinen vocant *Ludolf. Aeth. I c. 10 n. 58 fig. mediocr.*

Cagui minor Brasiliensibus *Rai. syn. quadr. p. 154.*

Caitaia *Rai syn. quadr. p. 155.*

Cercopithecus Sagouin *Clus. Rai. syn. quadr. p. 160.*

Simia caudata imberbis, vnguibus pollicum subrotundis *Linn. syst. nat. 6 p. 3 n. 8.*

Cercopithecus minor, dilute oliuaceus, paruo capite
Barr. Fr. équ. p. 151.

A very small Monkey Parson: *Philos. Transact. Vol. XLVII p. 146 fig. mala.*

Cebus Sagouin dictus *Klein. quadrup. p. 87 tab. 3 fig. mediocris.*

Cebus Moschum redolens *Klein. quadrup. p. 88.*

Simia caudata imberbis, fusca, vnguibus pollicum subrotundis. The long-tailed, brown Simia, with the claws rounded *Hill. anim. p. 537 tab. 26 fig. mala.*

Le Singe musqué: Cercopithecus ex albido flavescens, moschum redolens *Briff. regn. an. p. 197 n. 7.*

Le Sagouin: Cercopithecus taeniis transversis alternatim fuscis et e cinereo albis variegatus, auriculis pilis albis circumdatis *Briff. regn. an. p. 202. n. 14.*

Das kleinste Sangouinchen *Hall. vierf. p. 561.*

Simia (Iacchus) caudata, auribus villosis patulis, cauda hirsutissima longissima, vnguibus subulatis: pollicum rotundatis *Linn. syst. nat. 10, I p. 27 n. 12.*

The Sanglin or Cagui minor *Edw. glean. I p. 15 tab. 218 fig. opt.*

Gestaarte Aap, met wyde ruige Ooren, een zeer lange en zeer ruige Staart, de Nagelen Elswyze doch die der Duimen rond aan 't end *Houtt. nat. bist. I p. 364.*

Simia (Iacchus) caudata, auribus villosis patulis, cauda hirsutissima curuata, vnguibus subulatis: pollicum rotundatis *Linn. syst. nat.* 12, I p. 40 n. 24.

L'Ouistiti *Buff. hist. nat.* XV p. 96 tab. 14 fig. bona.

The striated Monkey *Penn. syn. quadr.* p. 132 n. 200.

Giacco *Aleff. quadrup.* IV tab. 193 fig. Buff.

Der Sagoin Ouistiti genannt *Berl. Samml.* IV p. 78.

Der Bifamaffe *Müll. Naturf.* I p. 132.

Der Sanglin oder kleinere Cagui *Edw. monogr.*

Der Sagoin: Simia Iacchus. *Sbreb. Säugth.* I p. 126 n. 38 tab. 33 fig. Buff.

Akarima *Guianienfibus.*

Fonkes *aethiopice.*

Guereza *ambarice.*

Longitudo corporis poll. 6 - 7, caudae poll. II et ultra. Caput minimum; rotundum. Facies e nigro incarnata. Nasus parvus crassus. Irides rubicundae. Auriculae rotundatae, magnae. Fasciculi pilorum longissimi, albi circa aures. Supra nasum inter oculos macula alba siue flauescens. Labia alba. Corpus pilis mollissimis, cinereo, rufo et fusco transuersim striatum. Cauda admodum villosa, cinereo et nigro annulata, subcuruata. Manus pilis breuioribus. Vngues sublati, pollicum rotundati.

Habitat in Brasilia, videturque etiam esse in Aethiopia, veteribus forsitan nota.

Agilis, irrequieta, scandens more Sciuri, cauda incuruata. Rodit ligna vt Mures, edit insecta, fructus, lactinia, panes triticeos martiosque, Theam, Passeres, Pisces. Indomita, morsitans, Felibus infestissima, quarum ventri se affigit. Sonus stridor sibilans. Odor Moschi. Velocissime salit. Frigoris impatientissima. Parit tamen in Lusitania.

Oedi-

- Oedipus. 3. C. imberbis, capillo dependente, cauda rubra.
 Cercopithecus non barbatus II *Clus. exot.* p. 371.
 Cercopithecus non barbatus 2 *Clusii Rai. syn. quadr.*
 p. 160.
 Simia caudata imberbis, collo pectoreque iubatis
Linn. syst. nat. 6 p. 3 n. 11.
 Cebus imberbis 2 *Clusii Klein. quadrup.* p. 89.
 Cebus Liocephalus, Leoniceps, Löwenmeerkatze
Klein. quadrup. p. 90.
 The little Lion Monkey *Edw. birds IV tab.* 195.
 Simia caudata collo pectoreque iubatis. The tailed
 Simia, with a mane on the neck and the breast
Hill. anim. p. 538.
 Le Tamarind: Cercopithecus pilis cinerascens, nigro
 mixtis, vestitus, cauda rufa *Briff. regn. an.*
 p. 199 n. 10.
 Le Singe-Lion: Cercopithecus collo pectoreque iu-
 batis *Briff. regn. an.* p. 204 n. 16.
 Le petit Singe du Mexique: Cercopithecus pilis ex
 fusco et rufo vestitus, facie ultra auriculas vsque
 nigra et nuda, vertice longis pilis albis obsito
Briff. regn. an. p. 210 n. 28.
 Der Löwenaffe *Hall. vierf.* p. 560.
 Das gröflere Sangouinchen *Hall. vierf.* p. 561.
 Simia (Oedipus) caudata imberbis, capillo depen-
 dente *Linn. syst. nat.* 10, I p. 28 n. 13.
 Gestarte Aap zonder Baard, met neerhangend
 Hoofdhair *Houtt. nat. hist.* I p. 364 tab. 6 fig. 3
 Edw.
 Simia (Oedipus) caudata imberbis, capillo depen-
 dente, cauda rubra, vnguibus subulatis *Linn. syst.*
nat. 12, I p. 41 n. 25; III *append.* p. 227.
 Le Pinche *Buff. hist. nat.* XV p. 114 tab. 17.
 The red-tailed Monkey *Penn. syn. quadr.* p. 133 n.
 102.
 Pinco *Aless. quadrup.* IV tab. 195 fig. Buff.

Der kleine Löwenaffe oder Pinche *Berl. Samml. IV*
p. 86. cum fig. Edw.

Der kleine Löwenaffe *Müll. Naturf. I p. 133 tab.*
6 fg. 3 Edw.

Der Pinche: *Simia Oedipus Schreb. Säugth. Ip. 128*
n. 39 tab. 34 fig. Edw.

Longitudo corporis 9 pollicum. Caput rotundatum.
Facies nigra, pilis raris albis. Oculi nigri: iri-
des ferrugineae. Nasus crassus. Verruca in vtra-
que bucca. Auriculae subrotundae, nigrae, nudaе.
Corpus profunde aurantium, fere rubrum. Cau-
da longitudine, dupla corporis, nigra, a basi ad
medium rubra, parum pilosa. Pectus, venter et
pedes albi. Gula nigra. Manus intus nigrae. Un-
gues subulati, excepto pollice palmarum breui.
Caput capillitio dependente longo albo. Ani regio
rubra. Cutis corporis totius nigra.

Habitat in Mexico, Brasilia, Guiania.

Animal tenerum, agile. Vox Muris siue auiculae:
Odor Moschi.

Rosalia. 4. C. capite piloso, faciei circumferentia pedi-
busque rubris.

Le petit Singe-Lion: *Cercopithecus ex albo flauis-*
cans, faciei circumferentia saturate rufa Briss.
reg. an. p. 200 n. 11.

Simia (Rosalia) caudata imberbis, capite piloso, fa-
ciei circumferentia pedibusque rubris, unguibus
subulatis Linn. syst. nat. 12, Ip. 41 n. 26.

Le Marikina *Buff. hist. nat. XV p. 108 tab. 16.*

The silky Monkey *Penn. syn. quadr. p. 133 n. 101*
tab. 15.

Simiotto Leone *Aless. quadrup. IV tab. 194 fig. Buff.*

Der kleinköpfige Löwenaffe *Berl. Samml. IV p. 83.*

Der Rosenaffe *Müll. Naturf. I p. 134.*

Der

Der Marikina: *Simia Rosalia Schreb. Säugth. I p. 130*
n. 40 tab. 35 fig. Buff.

Le petit Singe-Lion *Gallis vulgo.*

Longitudo corporis 8 - 9 pollicum, caudae 12 - 14
 poll. Caput rotundum. Facies fusca, circumfe-
 rentia longius pilosa, rubra, qua auriculae rotun-
 datae nudae occultantur. Nasus crassus. Oculi rufi.
 Corpus pilis densis, longis, sericeis, splendentibus,
 pallide flavis, fere albis. Manus obscure
 purpureae. Ungues subulati, pollicum rotundati.
 Cauda apice floccosa.

Habitat in Brasilia. Agilis.

argenta- 5. *C. imberbis exalbida, facie rubra, cauda fu-*
 ta. *scescente.*

Singes - - - on les nomme Pinches à Maynas, et à
 Cayenne Tamarins *Condarn. voy. p. 165.*

Micos *Vlloa voy. I p. 50.*

Le petit Singe de Para: *Cercopithecus ex cinereo*
albus argenteus, facie auriculisque rubris splen-
dentibus, cauda castanei coloris Briss. regn. an.
p. 201 n. 12.

Sagouin *Bom. dictionn. IV p. 70.*

Le Mico *Buff. hist. nat. XV p. 121 tab. 18.*

The fair Monkey *Penn. syn. quadr. p. 134 n. 103.*

Simia (argentata) caudata imberbis exalbida, facie
rubra, cauda fuscescente Linn. mant. II p. 521.

Mico *Aless. quadrup. IV tab. 196 fig. Buff.*

Die kleine Meerkatze von Para *Berl. Samml. IV p. 90.*

Der Miko: *Simia argentata Schreb. Säugth. I p. 131*
n. 41 tab. 36 fig. Buff.

Der Mico *Müll. Naturf. Suppl. p. 11 tab. 2 fig. 6 Buff.*

Longitudo corporis 8 pollicum, caudae 12 poll. Ca-
 put paruum rotundatum. Facies cum auriculis san-
 guinea

guinea siue cinnabarina. Rostrum breue. Auriculae magnae, nudaе. Oculi distantes. Corpus pilis longis, splendentibus, argenteis, pulcherrimis. Cauda splendens, tenuis, castanea. Ungues incurui: pollicum plantarum rotundati.

Habitat in Brasilia.

Midas. 6. *C. imberbis*, labio superiore fisso, auribus quadratis nudis, pedibus croceis.

Cercopithecus minimus, niger, leontocephalus, auribus Elephantinis *Barr. Fr. équ. p. 151.*

The little black Monkey *Edw. birds IV tab. 196.*

Die lächerliche Meerkatze aus America *Hall. vierf. p. 560?*

Simia (Midas) caudata imberbis, labia superiore fisso, auribus quadratis nudis *Linn. syst. nat. 10, I p. 28 n. 15.*

Gestaarte Aap zonder Baard, met de bouenlip gespleeten en kaale vierkante Ooren *Houtt. nat. hist. I p. 366 tab. 6 fig. 4 Edw.*

Cercopithecus imberbis, caudatus, niger; labio superiore fisso; auriculis quadratis nudis; pedibus croceis *Gronov. zooph. I p. 5 n. 20.*

Simia (Midas) caudata imberbis, pedibus rufis, vnguibus subulatis *Linn. mus. Ad. Frid. II p. 4.*

Simia (Midas) caudata imberbis, labio superiore fisso, auribus quadratis nudis, vnguibus subulatis, pedibus croceis *Linn. syst. nat. 12, I p. 42 n. 27.*

Le Tamarin *Buff. hist. nat. XV p. 92 tab. 13.*

Der schwarze Saguin mit gelben Füßen *Fermin Surin. II p. 117.*

The great eared Monkey *Penn. syn. quadr. p. 131 n. 99.*

Tamarino *Aless. quadrup. IV tab. 192 fig. Buff.*

Der kleine Mydasasie *Berl. Samml IV p. 75.*

Der Langohr *Müll. Naturf. I p. 135 tab. 6 fig. 4* Edw.
 Der Tamari: *Simia Midas Schreb. Säugth. I p. 132*
n. 42 tab. 37 fig. Fdw.

Longitudo corporis 7 - 8 pollicum. Caput rotundum, incarnato-nigricans. Facies nuda. Pili frontis erectiores. Auriculae quadratae, magnae, nudaе, incarnato-nigricantes. Nasus crassius. Oculi castanei. Labium superius fissum. Corpus pilis mollioribus, atris, postice in dorso paullo flavescentibus. Manus et pedes crocei siue rubri. Ungues arcuati, acuminati, compressi, sed in pollice plantarum parui, rotundati, plani. Cauda corpore duplo longior, cylindrica, pilis brevioribus nigris tecta.

Habitat in calidioribus Americae australis. Agilis. Mansuescit. Non facile fert nostrum clima.

7. LEMVR.

Dentes Primores superiores IV: intermediis remotis.

inferiores VI longiores porrecti, compressi, paralleli, approximati.

Laniarii solitarii, approximati.

Molares plures, sublobati: antici longiores acutiores.

Manus in palmis plantisque (*plerisque*).

tardigradus. I. L. ecaudatus.

Animal elegantissimum Robinsoni *Rai. syn. quadr. p. 161.*

Animal-

LEMVRES praecedentibus proximi, figura, moribus, cibo. Faciem vulpinam habent.

- Animalculum cynocephalum ceilonicum, Tardigradam dictum, Simii species *Seb. thes. I p. 55 tab. 35 fig. 1* mas, *fig. 2* femina: *figg. bonae.*
- Cercopithecus ceilonicus, seu tardigradus dictus, maior, mas *Seb. thes. I p. 75 tab. 47 fig. 1* bon.
- Simia mannis quaternis, capite ad aures crinito *Linn. syst. nat. 2 p. 42.*
- Simia ecaudata, vnguibus indicis subulatis *Linn. syst. nat. 6 p. 3 n. 2.*
- Simia acauda, digitorum indicum vngue subulato *Linn. amoen. acad. I p. 558.*
- Der Faule mit dem Hundskopf, beyderley Geschlechts *Meyer Thiere III tab. 3 fig. Seb. p.*
- Simia ceylonica, superiori labio leporino *Klein. quadrup. p. 86.*
- Simia rostro canino, capite elato *Klein. quadrup. p. 86.*
- Simia acauda, vnguibus indicis subulatis. The tails Simia, with the claws of the fore - toes subulated *Hill. anim. p. 536.*
- Lemur (tardigradus) ecaudatus *Linn. mus. Ad. Frid. I p. 3.*
- Le Singe de Ceylan: Simia (ceylonica) vnguibus indicis pedum posteriorum longis, incurvis et acutis *Briff. regn. an. p. 190 n. 3.*
- Le Singe cynocephale de Ceylan: Simia cynocephala (ceylonica) vnguibus indicis longis, incurvis et acutis *Briff. regn. an. p. 191 n. 2.*
- Der langgestreckte röhliche Affe *Hall. vierf. p. 551.*
- Der Affe von Ceilon *Hall. vierf. p. 552.*
- Lemur (tardigradus) ecaudatus *Linn. syst. nat. 10, I p. 29 n. 1.*
- Makis *Dictionn. anim. III p. 11* (cum congeneribus).
- Spookdier zonder Staart *Houtr. nat. bist. I p. 398 tab. 7 fig. 1* Sebae.
- Der kleine ostindische Affe, ohne Schwanz, mit dem Hundskopf, Menschenhänden und langen spitzi-

gen Nägeln an dem zweyten Zehen des Fusses
Mus. baruth. p. 19 tab. 9 fig. 1 bona.

Der allerkleinste ostindische röthliche Affe ohne
Schwanz, mit dem Hundskopf, Menschenhänden,
und langen spitzigen Nägeln am zweyten Zehen
des Fusses, so man noch nicht beschrieben oder
abgebildet findet. *Mus. baruth. p. 19 tab. 9 fig. 2.*

Loris Bom. dictionn. II p. 716.

Le Loris' *Buff. hist. nat. XIII p. 210 tab. 30.*

Lemür (*tardigradus*) *ecaudatus Linn. syst. nat. 12,*
I p. 44 n. 1.

The tallefs *Maucauco Penn. syn. quadr. p. 135 n.*
104 tab. 16 fig. 1.

Lori *Aless. quadrup. IV tab. 160 fig. Buff.*

Der Langschleicher *Müll. Naturf. I p. 147 tab. 7 fig.*
I Sebae.

Der ceylonische Affe *Mart. Naturlex. I p. 563.*

Der Loris: *Lemur tardigradus Schreb. Säugth. I p.*
134 n. 1 tab. 38 fig. propria.

Statura Sciuri. Caput paruum, rotundatum, rostro
acuminato. Facies tecta. Nasus acuminatus. Orbi-
tae oculorum nigro circumdatae. Oculi magni, ap-
proximati. Linea longitudinalis alba oculis inter-
iecta. Auriculae subnudae, breues, vrceolatae, in-
tus bifoliatae: interius scilicet aures instruuntur la-
mellis duabus membranaceis obtusis, exstantibus,
longitudine auriculae. Corpus longum, gracile, pi-
lis breuibibus, mollibus, sericeis, cinereo ferrugi-
neis, linea dorsali subfusca, in fronte bifurcata,
gula albidiore. Mammae duae pectorales, duae
in abdomine versus pectus. Artus tenuiores. Pe-
dum palmae plantaeque nudae. Ungues rotunda-
ti: indicum plantarum vero sabulati. Cauda fere
nulla.

In femina colores dilutiores in dorso, saturatiores in ventre; in mare vice versa *Briff.* Femina meit e clitoride perforata, quod maxime fingulare *Buff.* *Habitat* in Zeylona.

Tardigradus Linneo ex auctoritate suspecta Sebae, negantibus id Buffonio, Pennanto Schrebero. Tener, olfactu audituque excellens, phytiphagus, monogamus.

Mongoz. 2. L. caudatus griseus, cauda unicolore pilosa.

Simius Zambus *Nieremb. hist. nat. p. 176 cum fig. mala.*

The Macassar Fox *Nieub. East. Ind. p. 361 cum fig.*

Singes bruns de couleur des castors *Cauche Madag.*

p. 127.

Vary *Flacourt Madag. p. 153 fig. pessima.*

The Chitote *Barbor Guin. p. 560 tab. 7 fig. mala.*

Simia-Sciurus lanuginosus fuscus ex Iohannae insula

Periv. gazoph. tab. 17 fig. 5 mediocris.

Le Maki aux pieds fauves: Prosimia fusca, rufo admixto, facie nigra, pedibus fulvis *Briff. regn. an.*

p. 221 n. 3.

Le Maki aux pieds blancs: Prosimia fusca, naso, gutture et pedibus albis *Briff. regn. an. p. 221 n. 2.*

Der Biberaffe *Hall. vierf. p. 559?*

The Mongooz *Edw. glean. I p. 12 tab. 216.*

Maki *Bom. dictionn. III p. 7 cum sequentibus.*

Le Mongous *Buff. hist. nat. XIII p. 174 tab. 26.*

Lemur (Mongoz) caudatus griseus, cauda unicolore

Lin. syst. nat. 12, I p. 44 n. 2.

The woolly Maucauco *Penn. syn. quadr. p. 136 n. 105.*

Mongus *Aless. quadrup. III tab. 149 fig. Buff.*

Das Ringauge *Müll. Naturf. I p. 147.*

Der Mongus: Lemur Mongoz *Schreb. Säugth. I p.*

137 n. 3 tab. 39 A fig. Buff. tab. 39 B fig. Edw.

Der Mongus *Müll. Naturf. Suppl. p. 12.*

Ein Monkos *Walch. Naturf. VIII p. 26 tab. I fig. mala.*

Magnitudo Cati. Corpus griseum subtus album, pilis longis, densis, mollibus, crispis. Cauda concolor, elongata. Fascia ocularis fusca. Nasus albus, apice nigro. Irides aurantiae. Auriculae breues, rotundatae. Pedum palmae plantaeque nudaе, nigricantes. Ungues rotundati, excepto indicis plantarum subulato.

Variat pedibus albis vel fulvis; facieque tota fusca. *Habitat* in Madagascar insulisque adiacentibus usque ad Celebes. Dormit in arboribus, phytiphagus. Caput contra pluuiam cauda obtegit. Salax, ludibundus, mitis, tener. Vox porcelli.

Macaco. 3. *L. caudatus niger, collari barbato, cauda pilosa.*

Les Antauarres Cauche Madag. p. 127.

Cercopithecus indicus Bugee dictus Rai. syn. quadr. p. 158? vix videtur.

Cercopithecus indicus Bugee dictus Sloan. Lam. II p. 329? vix.

Le Maki: Prosimia fusca Briff. regn. an. p. 220 n. 1.

The black Maucauco Edw. glean. I p. 13 tab. 217.

Lemur cauda floccosa, corpore fusco Gronov. zooph. I p. 5 n. 22.

Le Vari Buff. hist. nat. XIII p. 174 tab. 27.

Lemur (Macaco) caudatus niger, collari barbato Linn. syst. nat. 12, I p. 44 n. 3.

The ruffed Maucauco Penn. syn. quadr. p. 138 n. 107.

Vari Aleff. quadrup. III tab. 150 fig. Buff.

Der Bartkragen Müll. Naturf. I p. 147.

Der Vari: Lemur Macaco Schreb. Säugth. I p. 142 n. 4 tab. 40 A fig. Edw. tab. 40 E fig. Buff.

Longitudo corporis 11 pollicum, caudae 16 poll. et ultra. Rostrum elongatum, acutum. Irides aurantiae, fere rubrae. Auriculae breues, pilis longioribus caput circumdantibus fere occultatae. Color totius niger vel fuscus, interdum albus nigro maculatus pedibus nigris, vel etiam totus albus. Pili mollissimi. Ungues indicis plantarum fere subulati.

Habitat in Madagascari. Bene mafuescit. Cubile purum feruat; radiis solis delectatur; dormit in loco tenebricoso. Phytiphagus respuit oua, carnes, pisces. Vox fortissima pro corporis mole parua.

Catta 4. *L. caudatus*, cauda albo nigroque annulata pilosa.

Vary *Flacourt Madag. p. 153.*

The Maucauco *Edw. birds IV tab. 197.*

Cebus capite vulpino, Fuchsel-Männchen *Klein. quadrup. p. 90.*

Le Maki à queue annelée: *Prosimia cinerea*, cauda cincta annulis alternatim albis et nigris *Briff. regn. an. p. 222 n. 4.*

Lemur Catta *Toreen Surat. p. 440.*

Der Fuchsaffe *Hall. vierf. p. 560.*

Lemur (Catta) cauda annulata *Linn. syst. nat. 10, 1p. 30 n. 2.*

Spookdier met een gebandeerde Staart *Houtt. nat. bist. I p. 399 tab. 7 fig. 2 Edw.*

Lemur (Catta) cauda nigro-annulata *Linn. mus. Ad. Frid. II p. 5.*

Le Moccock ou Mococco *Buff. bist. nat. XIII p. 173 tab. 22.*

Lemur

Lemur Catta et *Tarsier* recedunt paullulum dentium structura a congeneribus.

Lemur (*Catta*) caudatus, cauda albo nigroque annulata *Linn. syst. nat. 12, I p. 45 n. 4.*

The ring-tail Maucauco *Penn. syn. quadrup. p. 137 n. 106.*

Mococo *Aless. quadrup. III tab. 148 fig. Buff.*

Der Maūkauko *Berl. Samml. V p. 376 fig. Edw.*

Der Eichhornaffe *Müll. Naturf. I p. 148 tab. 7 fig. 2 Edw.*

Der Mokoko: Lemur *Catta Schreb. Säugth. I p. 143 n. 5 tab. 41 fig. Edw.*

Corpus magnitudine et statura felis, griseum, subtus album totum, vna cum temporibus, auribus, frontisque albedine bifida. Vellus omne densissimum, mollissimum, rectiusculum. Dentes primores superiores sex obtusi: intermediis remotis; inferiores sex paralleli, subulati, prominentes, approximati: anterioribus sensim longioribus. Laniarii supra tres, subulati: primo maiore exserto; infra solitarii absque spatio remouente. Molares vtrinque nonnulli, obtusi. Caput naribus acuminatum, labio superiore prominulo, vt in cane. Vibrissae ad os siue nares, et antice supra oculos. Lingua glabra, mollis. Os nigricans. Area oculorum nuda. Oculi magni. Sutura perpendicularis palpebrae superioris. Irides brunneae. Auriculae erectae. Aurium vellus anticum longius pilosum. Verrucae in medio temporum, et antico superciliarum. Macula nuda in vlna interiore. Pedes Simiae, talis incedentes: pollice omnium spatio remoto; subtus nigri et nudi. Postici longitudine corporis, supra albi. Vngues digitis angustiores; pollicum omnes ouati; reliquorum, magis acuti, subcarinati. Cauda longitudine dupla corporis, erecta, semper mouenda, obtusa, crassiuscula, villosa, picta annulis pluribus albis alternisque nigris, sedenti saepe circa corpus caputque flexa. Vulua propendens.

Recedit itaque dentibus paullulum à congeneribus, neque tamen ideo separandus.

In Linneano exemplo oculus dexter diurnus pupilla lineari perpendiculari; sinister nocturnus pupilla orbiculata magna.

Habitat in Madagafcar et proximis insulis, gregarius. Victitat fructibus, oleribus, radicibus. Cibos tenet manibus; mundus; mitissimus, tardiusculus, placidus et tranquillus murmurat ut Felis. Vidi Caffellis, in viuario Serenissimi Principis.

flauus. 5. L. flauus, cauda prehensili.

Cercopithecus indicus Bugee dictus *Sloan. Iam. II p. 329?*

The yellow Maucauco *Penn. syn. quadr. p. 138 n. 108 tab. 16 fig. 2.*

Der Maki mit dem Wickelschwanze: Lemur flauus *Schreb. Säugth. I p. 145 n. 6 tab. 42 fig. Penn.*

Der Wickelschwanz *Müll. Naturf. Suppl. p. 13 tab. 2 fig. 7 Penn.*

Longitudo corporis 19 pollicum, caudae 17 poll. Caput planum largumque. Oculi parui. Nasus brevis, fuscus. Auriculae breues, largae, pendulae, valde distantes. Buccae tumidae. Lingua longissima. Pedes breues, crassi, digitis 5-5, pollicibus non remotis a reliquis. Ungues subouati, incarnati. Pili corporis breues, molles, splendentes densique, supra ex nigro flauis, in buccis, crurum interiore latere ventreque albi. In medio ventre stria lata fusca vsque ad caudam, aliaque per dorsum a capite ad caudam. Cauda splendens, nigro fusca, teres, prehensilis.

Habitat in montosis Iamaicae.

Mitis, ludibundus, omnia cauda arripit, eaque se suspendit.

spendit. Caput recondit sub femoribus abdomi-
neque.

v Babil.

201

Tarfier. 6. L. cauda gracili nuda apice subfloccosa, tibiis
posticis nudis.

Le Tarfier *Buff. hist. nat. XIII p. 87 tab. 9.*

The woolly Ierboa *Penn. syn. quadr. p. 298 n. 225.*

Tarfier *Aless. quadrup. III tab. 145 fig. Buff.*

Soli Buffonio visum animal anomalon, sedis incer-
tae: Pennanto videtur, Iaculo affine, clar. Blumen-
bachius Lemurem potius putat; ego aut Lemurem,
aut Didelphidem credo.

Maior Musculo. Corpus pilis longis, mollioribus, fu-
fcis, capite cinereo. Nasus acuminatus. Auricu-
lae longae, erectae, nudaе, pellucidae. Oculi ma-
gni. Dentes primores duo supra et infra, acumina-
ti; laniarii solitarii supra et infra: inferioribus lon-
gioribus; molares vtrinque sex. Pedes postici lon-
giores anticis (quod et in Lemure Mongoz, Ma-
caco et Catta). Tibiae graciles nudaе. Pedes ma-
nus sunt, digitis longis 5 - 5 Simiac. Ungues pol-
licum rotundati, digitorum reliquorum acuminati.
Cauda elongata, gracilis, nuda, apice pilis longio-
ribus.

Habitat - - - -

volans. 7. L. caudatus, membrana ambiente volitans.

Vespertilio admirabilis *Bont. Ind. or. p. 68 fig. p. 69*
mala.

Cato Simius volans Cameli *Petiv. gazoph. tab. 9 fig.*
8 pessima.

Cato-Simius volans Cameli *Philos. Transact. n. 277*
p. 1065.

Felis volans Ternatana *Seb. thes. I p. 93 tab. 58 fig. 2* femina, *fig. 3* mas.

Die fliegende Katze von Ternate, das Weiblein *Mejer Thiere III tab. 37* das Männlein *tab. 38 figg.* *Sebae.*

Die fliegende Katze *Hall. vierf. p. 453.*

Lemur (volans) caudatus, membrana ambiente volitans *Linn. syst. nat. 10, I p. 30 n. 3.*

Vliëgend Spookdier met een Staart *Houtt. nat. hist. I, p. 401 tab. 7 fig. 3* *Sebae.*

Lemur (volans) caudatus, membrana ambiente volitans *Linn. syst. nat. 12, I p. 45 n. 5.*

The flying Maucauco *Penn. syn. quadr. p. 139 n. 109.*

Die fliegende Katze *Müll. Naturf. I p. 149 tab. 7 fig. 3* *Sebae.*

Der fliegende Maki: Lemur volans *Schreb. Säugth. I p. 146 n. 7 tab. 43 fig.* *Sebae.*

Longitudo 3 ped. latitudo volantis eadem. Caput oblongum. Os paruum, dentibus minutis. Oculi magni. Auriculae parvae, rotundatae, membranaceae. Membrana a capite ad palmas, a palmis per latera ad plantas, a plantis ad apicem caudae expansa. Corpus et membrana supra pilis mollibus griseis, subtus membrana nuda, venulosa. Crura velvete molli, flavo. Digni 5-5. Ungues graciles, acuti, curvi, quibus adhaeret. Cauda gracilis, spithamea. Mammae duae pectorales.

Habitat circa Guzurat, in Moluccis, Philippinisque insulis. Vicitat fructibus arborum. Videtur esse huius generis, certe affinis. Dentes autoptis accuratius examinandi.

8. DIDELPHIS.

Dentes Primores superiores X.
inferiores VIII: intermediis
 duobus brevissimis.

Laniarii longi, plures.

Molares denticulati.

Lingua subciliata.

Plantae manus, pollice mutico.

Cauda longa, gracilis, subnuda.

marfupia- I. D. mammis intra folliculum abdominalem.

lis. Tlaquatzin *Hernand. Mex. p. 330.*

Simiuulpa *Gesn. quadrup. p. 981 fig. pessima.*

Carigue *Laet Amer. p. 551.*

Tlaquatzin *Nieremb. hist. nat. p. 156 fig. ⁿ nimis pilosa.*

Vulpifimia vel Simiuulpa *Aldrov. digit. p. 223 fig. pessima.*

Carigueya Brasiliensibus, aliquibus Iupatiima *Marcgr. Bras. p. 222 cum fig. mediocri. (Femina.)*

Tai-ibi Brasiliensibus, Lusitanis Cachorro do mato, Belgis een Boschratte *Marcgr. Bras. p. 223. (Mas.)*

Carygueia et Taibi *Ionst. quadrup. p. 135 tab. 63 fig. Marcgr.*

Semiulpa *Ionst. quadrup. tab. 58 fig. Gesn.*

Tlaquatzin *Ionst. quadrup. tab. 73 fig. Nieremb.*

Carigueyá *Pis. Ind. p. 323 cum fig. mediocri.*

L'Opallum *Rocheff. Antill. p. 137 cum fig. mediocri.*

Le Manitoü de la Grenade *Du Terre Antill. II p. 301.*

DIDELPHIDES calcaneis incedunt. Edunt vegetabilia, auiculas, oua. Species nondum satis bene determinatae.

Simiulpa, Fuchsaff *Gesn. Thierb. p. 21 cum fig. pessima.*

Maritacáca Pifon. *Rai. syn. quadr. p. 182.*

Tai-ibi Brasiliensibus *Rai. syn. quadr. p. 185.*

Carigueya seu Marsupiale americanum, or the anatomy of an Opossum, *Tyson: Philos. Transact. n. 239 p. 105.*

Carigueya seu Marsupiale americanum masculum *Cowper: Philos. Transact. n. 290 p. 1565.*

The Possum *Lawson Carolin. p. 120 cum fig. mediocri.*

(*Filander Bruin Reiz. p. 374 tab. 213 fig. bona exceptis pedibus.*)

Le Manicou *Feuill. Journ. III p. 206.*

(*De Filander Valent. Amboin. III p. 275.*)

Marsupiale americanum. The Opossum *Catesb. Carol. append. p. XXIX.*

Philander, Opassum siue Carigueja brasiliensis masculina *Seb. thes. I p. 56 tab. 36 fig. 1.*

Philander americanus seu Carigueja, cum catulis lacum ventris intransibus femina *Seb. thes. I p. 57 tab. 36 fig. 2.*

Carigueja iunior, seu Opassum, cum sacco aperto *Seb. thes. I p. 57 tab. 36 fig. 3.*

Philander orientalis cum catulis suis in sacco ventris haerentibus, femina *Seb. thes. I p. 61 tab. 38 fig. 1.*

Philander maximus orientalis femina *Seb. thes. I p. 64 tab. 39 fig. 1.*

The Possum *Brick. North-Car. p. 125.*

Didelphis *Linn. syst. nat. 2 p. 44.*

Le Rat de Bois *Charlev. nouv. Fr. III p. 134.*

Fara ò Ravaie *Gum. Orin. II p. 311.*

Die Beutelratze das Männlein *Meyer Thiere III tab. 4. Das Weiblein tab. 5 figg. Sebae.*

Die orientalische Beutelratze *Meyer Thiere III tab. 7 fig. Sebae.*

Die größte orientalische Beutelratze *Meyer Thiere III*
tab. 8 fig. Sebae.

Didelphis mammis intra abdomen *Linn. syst. nat. 6*
p. 10 n. 1.

Didelphis mammis intra abdomen *Linn. amoen. acad. I*
p. 559.

Vulpes maior, putoria, cauda tereti et glabra, Aoua-
re', Puant *Barr. Fr. équ. p. 166.*

Mus marsupialis; sylvestris, Brasileensis *Klein. quadrup.*
p. 59.

Mus marsupialis. Philander Orientalis *Klein. quadrup.*
p. 59.

Mus marsupialis maximus *Klein. quadrup. p. 59.*

Didelphis mammis intra abdomen. The Didelphis
with the paps within the abdomen: The Opossum
Hill. anim. p. 530 tab. 25 fig. mediocr.

Didelphis (Opossum) mammis intra abdomen *Linn.*
mus. Ad. Frid. I p. 10.

Le Philandre: Philander (.) saturate spa-
diceus in dorso, in ventre flauus, maculis supra
oculos flauis *Briff. regn. an. p. 286 n. 1.*

Le Philandre oriental: Philander (orientalis) saturate
fuscus in dorso, in ventre flauus, maculis supra
oculos flauis *Briff. regn. an. p. 288 n. 2.*

Le Philandre d'Amboine: Philander (Amboinensis)
atropadiceus in dorso, in ventre ex albido cinereo
flauicans, maculis supra oculos obscure fuscis *Briff.*
regn. an. p. 289 n. 3.

The Opossum: Didelphis mammis bulga ventrali te-
tis, capite vulpino simile *Brown. Jam. p. 486.*

Die amerikanische Beutelratte *Hall. vierf. p. 436*
tab. 25.

Die brasilische Beutelratte *Hall. vierf. p. 441.*

Der morgenländische Philander *Hall. vierf. p. 441.*

Der größte Philander *Hall. vierf. p. 441.*

Didelphis (marsupialis) mammis 8 intra abdomen
Linn. syst. nat. 10, l. p. 54 n. 1.

Didelphis (Opoffum) cauda semipilosa, superciliorum regione pallidiore, mammis binis *Linn. syst. nat.* 10, I p. 55 n. 3.

Le Rat de Bois *Du Pratz Louif. II p. 94 cum fig. mediocri.*

Carygueya *Dictionn. anim. I p. 439.*

Didelphé *Dictionn. anim. II p. 28 cum congeneribus.*

Buidel-Rot: Philander met agt Prammen in een Zak aan den Buik *Houtr. nat. hist. II p. 317.*

Philander met de halve Staart hairig, de plaats der Wenkbrauwen bleeker, twee Prammen in een Zak aan den Buik *Houtr. nat. hist. II p. 322 tab. 18 fig. 2 Sebae.*

Le Sarigue ou l'Opoffum *Buff. bist. nat. X p. 279 tab. 45 mas, tab. 46 femina.*

Didelphé *Bom. dictionn. II p. 38 cum congener.*

Didelphis (marsupialis) mammis 8 intra abdomen *Linn. syst. nat. 12, I p. 71 n. 1.*

Didelphis (Opoffum) cauda semipilosa, superciliorum regione pallidiore, mammis binis *Linn. syst. nat.* 12, I p. 72 n. 3.

Didelphidis Opoffum varietas orientalis *Pallas miscell. p. 62.*

Der Philander *Fermin Surin. II p. 100.*

The virginian Opoffum *Penn. syn. quadr. p. 204 n. 144 tab. 21 fig. 1.*

Carigueya machio e femmina *Aleff. quadrup. III tab. 127 figg. Buff.*

Die Beutelratze *Müll. Naturf. I p. 288.*

Die Waldratze *Müll. Naturf. I p. 292 tab. 18. fig. 2 Sebae.*

Cuffu-Aru *Amboinensibus.*

Pelandoc-Aru *Maleitis.*

Aijir *in insula Aru.*

Awari *Surinamensibus.*

Carigueya' *Brasilienfibus littoralibus.*

*Zorua mochillera (vulpes marsupialis) Hispanis novae Grae-
chucha it. Mucá - mucá Peruanis [Ulloa] Iupa-*

Iupatiima Brasiliensibus mediterraneis.

Rapoza Lusitanis.

Magnitudo Felis maioris. Caput acuminatum, rostro conico longo, Suis instar carinato, rictu longissimo Vulpis. Facies fusca. Nares perpendiculares lunares. Oculi minuti, nigri, splendentes. Supra oculum utrumque macula alba. Genae albicantes. Auriculae magnae, rotundatae, nudae, tenuissimae, erectae, atrae, apicibus albis. Vibrissae quinque ordinum, longae, setae pone oris rictum octo, sub gula quinque. Lingua apice papillis ciliata. Collum ad latera fordide flauum, supra postice et dorsum pilis longioribus, mollibus, erectis, basi flauo-albis, medio nigris, apice albicantibus. Corpus superne saluum, subtus exalbidum. Tibiae nigrae, laeues, pilis breuibus. Digni 5-5, teretes, nudi, aequales, in plantis pollice remoto. Ungues compressi, arcuati. Plantarum pollex muticus. Cauda vix longitudine corporis, basi pilosa, quasi segmentis ex rugis prehensilis, dimidio nigro, altero dimidio versus apicem albo.

Feminae sacculus abdominalis ossibus propriis ex ossibus pubis oriundis fultus, in quo mammae 4-8.

Didelphidem marsupialem et Opossum *Linnei* eandem speciem utique puto. Distinguit tamen doctiss. *Pallas miscell. p. 63.*

Abundat in Virginia, Louisiana, Mexico, Brasilia, Peru; nec non in India orientali, male id negante Buffonio.

Orientalem varietatem esse colore dilutiore, quasi griseo ferrugineo, subtus albidam, nigredine nulla circa oculos Pallas.

Vicitat Sacchari culmis, radicibus, fructibus, ouis, Gallinarum sanguine. Sat mitis. Arborea scandit.

In-

Incessus lentus. Mortem simulat capta. Vita tenax. Cauda se appendet arboribus, corpusque vibrando in aliam arborem se transiicit. Nidum parat e gramine sicco inter frutices. Parit pullos minutissimos 4-6 coecos nudosque, quasi semifoetus, mox sacco abdominali intrantes, in quo lacte matris nutriendi excrescunt, donec maturi fiant, sacco interim perpetuo contracto. Post alterum partum ex isto sacco pulli denuo eum intrant quoties terra facti. Foetet animal, canibus non esculentum, ob pellem; caro tamen laudatur a nonnullis porcellique carnis similis dicitur.

- Philander. 2. D. auriculis pendulis, mammis quaternis. Tlaquatzin seu Tai-ibi Brasiliensibus dicta, femina *Seb. thes. I p. 57 tab. 36 fig. 4.*
 Die Boschratte *Meyer Thiere III tab. 6 fig. Sebae.*
 Mus Tlaquatzin *Klein. quadrup. p. 59.*
 Le Philandre du Bresil: Philander (Brasiliensis) pilis in exortu aibis, in extremitate nigricantibus vestitus *Briff. regn. an. p. 290 n. 4.*
 Didelphis (Philander) cauda basi pilosa, auriculis pendulis, mammis quaternis *Linn. syst. nat. 10, I p. 54 n. 2.*
 Philander met de Staart by den wortel hairig, hangende Ooren en vier Prammen *Houtt. nat. bist. II p. 321 tab. 18 fig. 1 Sebae.*
 Didelphis (Philander) cauda basi pilosa, auriculis pendulis, mammis quaternis *Linn. syst. nat. 12, I p. 72 n. 2.*
 Der Philander *Müll. Naturf. I p. 291 tab. 18 fig. 1 Sebae.*

Longitudo corporis 14 poll. Cauda longissima, basi pilosa. Saccus abdominalis nullus. Vbera duo, mammis in singulis duabus. Parit quatuor.

Habitat in Brasilia. Species obscura.

orientalis.

3. *D. digitis duobus intermediis plantarum coadunatis.**De Coescoes Valent. Amboin. III p. 272 fig. in pedibus vitiosa.**Mus seu forex americanus maior, agrestis, capite grandi pullus Seb. tbes. I p. 50 tab. 31 fig. 8.**Mus americanus maior, agrestis, capite grandi Klein. quadr. p. 58.**Le Philandre à grosse tête: Philander (capite crasso) ex rufo luteus in dorso, in ventre ex albo flauicans, capite crasso Briss. regn. an. p. 293 n. 8.**Die grosse amerikanische dickköpfige Waldmaus Hall. vierf. p. 434.**Phalanger Bom. dictionn. III p. 442.**Le Phalanger Buff. hist. nat. XIII. p. 92 femelle tab. 10 mâle tab. 11.**Didelphis orientalis Pallas miscell. p. 59.**The Surinam Opossum Penn. syn. quadr. p. 209 n. 148.**Falanger Aless. quadrup. III tab. 146 fig. Buff.**Der Amboinefer: Didelphis indica Müll. Naturf. Suppl. p. 35.**Cusu Maleisis.**w. Piso p. 323 -
Cusu curae posteriores p. 126. Cousta. in Banda inf*

Longitudo corporis fere 9 poll. caudae 10 poll. Corpus supra rufum, subtus fordide flauescenti album. Caput crassum (secundum Sebam, qui tamen pullum modo habuit oculis adhucdum clausis), postice linea nigra ab occipite per dorli medium porrecta. Auriculae breues, pilosae. Dentes primores supra octo, intermediis et exterioribus acutis et longioribus, secundi paris breuibus et latis, tertiis minimis. Primores infra duo. Pollex plantarum remotus, muticus, digitis secundo et tertio coadunatis, phalange extrema separata, ut sint ungues quatuor. Plica transversalis cutis in ventre. Cauda basi pilosa, pre-

Cook voyage to the northern hemisphere. Pacific Ocean. Lond. 1785. vol. 1. p. 108. tab. 8

prehensilis vt videtur. Saccum abdominalem et huic tribuit Valentyn.

Habitat in Moluccis. Mansuescit. Editur in Amboina, quamuis foeteat.

In Surinamo reperiri dubium maxime.

breuicau- 4. D. cauda abbreviata crassa.

data. Muris siluestris americani femina *Seb. thes. I p. 50 tab. 31 fig. 6.*

Le Philandre à courte queue: Philander (cauda breui) obscure rufus in dorso, in ventre heluus, cauda breui et crassa *Briff. regn. an. p. 294 n. 9.*

Die amerikanische Waldmaus *Hall. vierf. p. 435.*

Philander mammis extra abdomen; cauda breui, crassa, pilosa *Gronov. zooph. I p. 9 n. 35.*

The Rat of Guiana *Bancr. Guian. p. 143?*

The short tailed Opossum *Penn. syn. quadr. p. 208 n. 147.*

Auriculae nudaë. Dorsum rufo fuscum, venter pallidior. Cauda vix longitudine dimidia corporis, basi crassa, apice attenuato.

Habitat in Americae australis siluis. Parit 9-12. Neophyti statim a partu perpetuo adhaerent mammis, vsque dum maturescant. Saccus matris abdominalis nullus.

murina: 5. D. rostro acutiusculo, vngue pollicum palmarum acuto, cauda semipilosa.

Mus siluestris americanus mas, Scalopes dictus *Seb. thes. I p. 48 tab. 31 fig. 1.*

Muris siluestris americani femina *Seb. thes. I p. 49 tab. 31 fig. 2.*

Mus Scalopes *Klein. quadrup. p. 58.*

Le Philandre d'Amérique: Philander (americanus) saturate spadiceus in dorso, in ventre dilute flavus, pedibus albicantibus *Briff. regn. an. p. 291 n. 5.*

Die langfüßige amerikanische Waldmaus *Hall. vierf. p. 432 tab. 24, B.*

Didelphis (murina) cauda semipilosa, mammis fenis *Linn. syst. nat. 10, I p. 55 n. 4.*

Philander met de halve Staart hairig en zes Tepels *Houtt. nat. hist. II p. 324 tab. 18 fig. 3 Seb.*

Philander mammis extra abdomen; cauda longissima tereti, nuda, corpore longiore *Gronov. zooph. I p. 9 n. 33.*

La Marmose *Buff. hist. nat. X p. 335 mâle tab. 52, femelle tab. 53.*

Didelphis (murina) cauda semipilosa, mammis fenis *Linn. mus. Ad. Frid. II p. 8.*

Manicou *Bom. dictionn. III p. 18.*

Marmose ou Rat Manicou *Bom. dictionn. III p. 32.*

Scalopes *Bom. dictionn. IV p. 141.*

Didelphis (murina) cauda semipilosa, mammis fenis *Linn. syst. nat. 12, I p. 72 n. 4.*

Noch eine andere wilde Ratze *Fermin Surin. II p. 99.*

The murine Opossum *Penn. syn. quadr. p. 207 n. 145.*

Marmosa machio e femmina *Aless. quadrup. III tab. 128 figg. Buff.*

Die Buschratze *Müll. Naturf. I p. 293 tab. 18 fig. 3 Sebae.*

Magnitudo Ratti. Auriculae longae lataeque, tenues, nudaе, acutiores quam in didelphide marsupiali. Oculorum orbitae nigrae. Corpus supra canum, subtus flavescenti-album. Rostrum fulco bilobo, nec ut in marsupiali stria laevi vix totum peraratum. Folliculus abdominalis nullus, at plica in utroque latere longitudinalis, inter quas mammae sex interdumque plures. Tibiae pilis brevibus albicantibus tectae. Unguis pollicum palmarum

rum acutus, nec ut in reliquis obtusus. Unguis pollicum plantarum nullus, extimo articulo rotundato. Cauda longitudine corporis, gracilis, ad basin usque squamis parvis tecta, prehensilis.

Habitat in calidioribus Americae australis.

Cum reliquis conuenit cibo et moribus. Parit ad 10-14. Pulli statim post partum mammis fortissime adhaerent, donec maturefcant.

Cum hac perperam a nonnullis confundi dicit Gronouius aliam; quam vocat:

Philander mammis extra abdomen; cauda longissima, tereti, hispida, corporis longitudine *Grono. zooph. I p. 9 n. 34.*

Maior superiore, forma conuenit. Cauda pilis raris, breuibus. Manus et pedes validiores, pentadactyli.

Habitat cum antecedente.

Affinis, nisi propria forte species:

Coyopollin *Fernaud. anim. p. 10.*

Animal caudimanum seu coyopollin *Nieremb. hist. nat. p. 158.*

Coyopollin *Ioust. quadrup. p. 170.*

Mus indicus *Ioust. quadrup. tab. 67 fig. mala.*

Mus indicus, dictus Coyopollin *Charlet. exerc. p. 25.*

Mus africanus Kayopolin dictus mas *Seb. thes. I p. 49 tab. 31 fig. 3.*

Didelphis mammis extra abdomen *Linn. syst. nat. 6 p. 10 n. 2.*

Mus africanus Kajopolin *Klein. quadrup. p. 58.*

Didelphis mammis extra abdomen. The Didelphis with the teats without the abdomen: the african *Rat Hill anim. p. 530.*

Le Philandre d'Afrique: Philander (africanus) saturate spadiceus in dorso, in ventre ex albedo flavicans, cauda ex saturate spadiceo maculata *Briff. regn. an. p. 292 n. 6.*

Die afrikanische Maus Kayopolin *Hall. vierf. p. 433.*

Le Cayopollin *Buff. hist. nat. X p. 350 tab. 55.*

The mexican Opossum *Penn. Syn. quadr. 208 n. 146.*

Kayopollino *Aless. quadrup. III tab. 129 fig. Buff.*

Der Cajopolin *Müll. Naturf. Suppl. p. 35.*

Capite grandiore, naso crassiore, auribus angulatis.
Cauda fusco et flavo variegata, basi pilosa.

Habitat in montosis Mexici, patiens in arboribus.
Erronee Seba africanum animal fecit, et ex hoc postea alii auctores.

dorsifigera. 6. D. cauda basi pilosa corpore longiore, digitis manuum muticis.

Een Soort van een Bos-rot *Merian. Surin. tab. 66 fig. bon.*

Mus seu Sorex siluestris americanus mas *Seb. thes. I p. 49 tab. 31 fig. 4 bon.*

Muris siluestris americani femina *Seb. thes. I p. 49 tab. 31 fig. 5 bon.*

Glis siluestris americanus cum catulis suis *Seb. thes. II p. 90 tab. 84 fig. 4. bon.*

Mus siluestris americanus, femina; catulos suos supra dorsum ferens *Klein. quadrup. p. 58.*

Le Philandre de Surinam: Philander (Surinamensis) ex rufo helvus in dorso, in ventre ex flavo albicans *Briff. regn. an. p. 292 n. 7.*

Der surinamische Aeneas *Hall. vierf. p. 433 tab. 24 A.*

Didelphis (dorsifigera) cauda basi pilosa corpore longiore, digitis manuum muticis *Linn. syst. nat. 10, I p. 55 n. 5.*

Rat de bois *Dictionn. anim. III p. 666.*

Philander met de Staart aan den wortel hairig en langer dan 't Lyf, de Vingeren der Voorpooten stomp genageld *Houtr. nat. hist. II p. 325 tab. 18 fig. 4* Sebae.

Didelphis (dorfigera) cauda basi pilosa corpore longiore, digitis manuum muticis *Linn. syst. nat. 12, I p. 72 n. 5.*

Le Philandre de Surinam *Buff. hist. nat. XV p. 157.*

Die Waldmaus *Fermin Surin. II p. 101.*

The Merian Opossum *Penn. syn. quadr. p. 210 n. 149.*

Die Schwanzratze *Müll. Naturf. I p. 293 tab. 18 fig. 4* Sebae.

Magnitudo Ratti. Auriculae longae, acutae, nudaе. Caput et corpus supra e flavo fuscum. Venter e flavo albidus. Digi 5 - 5, pollice plantarum remoto. Ungues plani. Cauda elongata, gracilis, tota nuda, praeter basin pilosam, mari maculata.

Habitat in Surinamo intra terram.

Parit 5 - 6. Pulli parentem sequuntur, terrefacti eius dorso insitiunt caudisque matris caudam comprehendunt pullos in caueam sic deportantis.

9. BRADYPVS.

Dentes Primores nulli vtrinque.

Laniarii? obtusi, solitarii, molaribus longiores, occurfantes.

Molares vtrinque V cylindrici, obtusi.

Corpus pilis tectum.

Crura antica multo longiora posticis.

Ungues longissimi.

tridactylus. I. B. pedibus tridactylis, cauda breui.

Ignauus, siue per *αντιφρασιον* Agilis *Clus. exot. p. 110 fig. p. 111. mala.*

Ignauus *Clus. exot. p. 372 fig. p. 373* paullulum melior.

Hay *Laet Amer. p. 554 fig. pessima.*

Vnau *Laet Amer. p. 618 fig. Clusii altera.*

Animal Pigritia siue Haut *Nieremb. hist. nat. p. 164*
figg. Clusii. Figura Laetii *p. 163.*

Ai *Nieub. Brasil. p. 18.*

Ignauus Clusii *Aldrov. digit. p. 262.*

Ai siue Ignauus *Marcgr. Bras. p. 221 fig. mediocris.*

Ignauus *Ionst. quadrup. p. 145 tab. 62, 74* figg. Clusii.

Papio 2 *Ionst. quadrup. tab. 61* fig. Laetii.

Ai repens minor *Pis. Ind. p. 321 fig. mala.*

Ai erectus maior *Pis. Ind. p. 322 cum fig. Marcgr.*

Haut, eine besondere Art Affen, *Arctopithecus Gesn.*

Thierb. p. 178.

Ignauus *Olear. Gott. Kunstk. p. 6 tab. 7 fig. 2* mediocr.
Clus.

Ai siue Ignauus, the Sluggard *Charlet. exercit. p. 17.*

The Sloath Ignauus siue Pigritia *Grew. mus. reg. soc.*
p. 11.

Ai siue Ignauus *Maregr. Rai. syn. quadr. p. 245.*

Ignauus seu Pigritia *Iacob. mus. reg. p. 10 Laur. mus.*
reg. quadrup. n. 91.

Le Sloth ou le Pareffeux *Dampier voy. III p. 305.*

Pericos ligeros *Cieza Peru p. 20.*

Ai ou Pareffeux *Des March. voy. III p. 285.*

Ai seu Tardigradus gracilis americanus *Seb. thes. I*
p. 53 tab. 33 fig. 2 bon.

Bradypus manibus tridactylis, cauda breui *Linn. syst.*
nat. 2 p. 42.

Pericoligeros *Gum. Orin. I p. 298.*

Der amerikanische Faule *Meyer Thiere III tab. 1 fig.*
Sebae.

Bradypus manibus tridactylis, cauda breui *Linn. syst.*
nat. 6 p. 3 n. 1.

Bradypus manibus tridactylis, cauda breui *Linn.*
amoen. acad. I p. 495.

Ignauus *Marcgr. Ouai karé. Pareffeux Barr. Fr. équ. p. 154.*

Ignauus Americanus risum fletu miscens *Klein. quadrup.*
p 43.

Ignauus Marcgrauui *Klein. quadrup. p. 43.*

Ignauus Americanus somniculosus *Klein. quadrup. p. 44.*

Bradypus manibus tridactylis, cauda breui. The
Bradypus with three toes on the fore-feet, and
a short tail: the Sloth *Hill anim. p. 534.*

Bradypus (tridactylus) manibus tridactylis, cauda breui
Linn. mus. Ad Frid. I p. 4.

Le Paresseux: Tardigradus (. . . .) pedibus anticis
et posticis tridactylis *Briss. regn. an. p. 34 n. 1.*

The Sloath: Bradypus cinctus, palmis tridactylis,
unguibus arcuatis longissimis *Brown. Iam. p. 489.*

Das schwächte weisgraue amerikanische Faulthier
Hall. vierf. p. 391 tab. 15.

Markgrafs Faulthier *Hall. vierf. p. 392.*

Bradypus (tridactylus) manibus tridactylis, cauda breui
Linn. syst. nat. 10, I p. 34 n. 1.

Ai ou le Paresseux *Dictioun. anim. I p. 59.*

Unau *Dictioun. anim. IV p. 559.*

Luijaard met drievingerige Handen en een korte Staart
Houtt. nat. hist. I p. 480 tab. 9 fig. 1 Sebae.

The Sloth *Edw. glean. II tab. 310.*

Tardigradus pedibus anticis et posticis tridactylis
Gronov. zooph I p. 2 n. 4.

Paresseux *Bom. dictioun. III p. 376.*

L'Ai *Buff. hist. nat. XIII p. 34. Ieunes Ais tab. 5.*

L'Ai adulte *tab. 6.*

Bradypus (tridactylus) pedibus tridactylis, cauda breui
Linn. syst. nat. 12, I p. 50 n. 1.

Amerikanisches Faulthier *Knorr. delic. II. tab. K fig. 1*
caput, fig 2 pedes, fig. 3 pullus.

Das Faulthier *Fermin Surin. II p. 94.*

The three-toed Sloth *Penn. syn. quadr. p. 319 n.*
250 tab. 29 fig. 1.

Ai *Aless. quadrup. III tab. 143 fig. Buff.*

Das dreyfingerige Faulthier Müll. *Natursf. I p. 177*
tab. 9 fig. I Sebae.

Der Ai: Bradypus tridactylus Schreb. *Säugeth. II p. 197*
n. I tab. 64. fig. Edw. et Buff.

Ouaikaré *Guianensibus.*

Ai *Brasiliensibus.*

Perrillo ligero, Perrico ligero *Hispanis.*

Priguiza *Lusitanis.*

Das Faulthier *Germanis.*

Leuy-aert, Luijaard *Belgis.*

The Sloth, *Anglis.*

Magnitudo Vulpis. Corpus pilosissimum, griseo fusum, pilis planis. Caput minimum, subglobosum. Facies subnuda. Nafus obtusus, niger. Oculi parui, nigri, somniculosi. Auriculae nullae. Collum longum. Gula, et facies fordide alba siue flaua. Cauda breuissima, subouata, vndique velere tecta, apice tamen eminente, nudiusculo, acutiusculo. Dentes primores nulli, nisi laniarii, sed occurfantes, anice remotissimi, longiores, truncati. Molares laniariis approximati, breuiores. Pedes anteriores longiores posterioribus, fortissimi, diuaticissimi. Digiti combinati 3 - 3. Ungues compressi, validissimi, falcati, totidem. Pedes postici calcaneis incedentes. Mammae duae pectorales. Figura miserabilis. Costae vtrinque quatuordecim.

Habitat in Americae meridionalis arboribus. Victitat ruminans foliis teneris, imprimis Cecropiae. Non bibit. Imbres metuit. Difficuler scandit, neque mouetur nisi fame coactus: deiicit se ex arbore consumtis foliis eiusdem, ne descendat. Tardissime et aegre incedit; in planitie quinquaginta passus progrediendo, integrum etiam diem infumit. Attonitus quasi caput flectit. Sonus senarius descendens nocturnus. Clamor horrendus, lacrymae miserae.

miseræ. Famen fert diutissime, per mensem adeo.
Parit 1 - 2.

didacty- 2. B. palmis didactylis, cauda nulla.

lus. The Sluggard *Barbot Guin.* p. 212.

Potto *Bossm. Guin.* p. 296.

Tardigradus ceilonicus catulus *Seb. thes. I* p. 54 tab.

33 fig. 4 bon.

Tardigradus ceilonicus femina *Seb. thes. I* p. 54 tab.

34 fig. bon.

Bradypus manibus didactylis, cauda nulla *Linn. syst. nat.* 2 p. 42.

Der asiatische Faule *Meyer Thiere III* tab. 2 fig. Seb.

Bradypus manibus didactylis, cauda nulla *Linn. syst. nat.* 6 p. 3 n. 2.

Silenus. Simia personata, verkleidete Affe *Klein. quadrup.* p. 42.

Ignauus orientalis minimus *Klein. quadrup.* p. 44.

Bradypus manibus didactylis, cauda nulla. The Bradypus with only two toes on the fore-feet, and without any tail: the Ceylon Sloth *Hill anim.* p. 535.

Bradypus (didactylus) manibus didactylis, cauda nulla *Linn. mus. Ad. Frid. I* p. 4.

Le Pareffeux de Ceylan: Tardigradus (ceylonicus) pedibus anticis didactylis, posticis tridactylis *Briff. regn. an.* p. 35 n. 2.

Der verkleidete Faulthieraffe mit dem Hundskopfe *Hall. vierf.* p. 390.

Bradypus (didactylus) manibus didactylis, cauda nulla *Linn. syst. nat.* 10, I p. 35 n. 2.

Le Pareffeux de l'isle de Ceylan *Dictionn. anim.* I p. 59.

Potto ou Stuggard *Dictionn. anim. III* p. 556.

Luijaard met twee - vingerige Handen, zonder Staart *Houert. nat. hist.* I p. 484 tab. 9 fig. 2 Sebae.

Unau *Bom. dictionn. IV.* p. 619.

L'Unau *Buff. hist. nat. XIII p. 34 tab. 1.*

Bradypus (didactylus) manibus didactylis, cauda nulla *Linn. syst. nat. 12, I p. 51 n. 2.*

The two-toed Sloth *Penn. syn. quadr. p. 321 n. 251.*

Unau *Aless. quadr. III tab. 142 fig. Buff.*

Das zweyfingrige Faulthier *Müll. Naturf. I p. 179 tab. 9 fig. 2 Sebae.*

Der Unau: Bradypus didactylus *Schreb. Säugth. II p. 202 n. 2 tab. 65 fig. Buff.*

Potto *Guineensibus.*

Corpus Sciuri magnitudine, vel paullo maius, pilis ferrugineis, undulatis, mollibus, iunior autem magis griseus. Caput rotundatum. Rostrum paullo longius quam in praecedente. Facies hirsuta ad nasum vsque, qui glaber atque depressus, lateribus rugosis. Auriculae magnae, rotundatae, capiti appressae, crinibusque occultatae. Ungues fortes, in palmis duo, in plantis tres. Mammae duae pectorales. Cauda nulla. Costae vtrinque 23.

Habitat in Zeylona, iniuste id negante Buffonio; in Guinea, vix enim dubito, idem animal esse Potto Guineensium. Neque etiam Americae australis exul plane videtur.

Minus lentus praecedente, nocturnus. Misere clamat.

10. MYRMECOPHAGA.

Dentes nulli.

Lingua teres, extensilis.

Os angustatum in rostrum.

Corpus pilis tectum.

Ungues longi, arcuati.

didactyla. 1. M. palmis didactylis, plantis tetradactylis, cauda villosa.

Tamandua seu Coaty americana alba altera *Seb. thes.*
Ip. 60 *tab.* 37 *fig.* 3. bona, nisi quod palmae male monodactylae sint.

Myrmecophaga manibus monodactylis, plantis tetradactylis *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 42.

Der weisse americanische Ameisenfresser *Meyer Thiere III tab.* 10 *fig.* Sebae.

Myrmecophaga manibus didactylis, plantis tetradactylis *Linn. syst. n.* 6 *p.* 8 *n.* 2.

Tamandua minor flavescens: Oouatirioüacu, petit mangeur de fourmis *Barr. Fr. équ. p.* 163.

Tamandua alba altera seu Coati *Klein. quadrup. p.* 46.

Myrmecophaga manibus didactylis, plantis tetradactylis. The Myrmecophaga with only two toes on the fore feet, and four on the hinder feet *Hill anim. p.* 532.

Myrmecophaga (didactyla) manibus didactylis, plantis tetradactylis *Linn. mus. Ad. Frid.* 1 *p.* 8.

Le petit Fourmiller: Myrmecophaga (minima) rostro breui, pedibus anticis didactylis, posticis tetradactylis *Briss. regn. an. p.* 28 *n.* 4.

Der weisse americanische Ameisenfresser *Hall. vierf. p.* 383.

Myrmecophaga (didactyla) palmis didactylis, plantis tetradactylis *Linn. syst. nat.* 10, *Ip.* 35 *n.* 1.

The little Ant-Eater *Edw. glean. I tab. 220.*

Fourmillier-Tamanoir *Dictionn. anim. II p. 217* cum congener.

Tamandua *Dictionn. anim. IV p. 254* cum congener.

Mieren-Eeter met twee Vingers aan de Voorpooten, vier aan de Agterpooten *Houtt. nat. hist. I p. 487 tab. 10 fig. 1* Sebae.

Myrmecophaga rostro breui, pedibus anticis didactylis, posticis tetradactylis *Gronov. zooph. I p. 1 n. 1.*

Le Fourmiller *Buff. hist. nat. X p. 144 tab. 30.*

Fourmilier *Bom. dictionn. II p. 244* cum congener.

Myrmecophaga (didactyla) palmis didactylis, plantis tetradactylis, cauda villosa *Linn. syst. nat. 12; I p. 51 n. 1.*

Die dritte Art vom Ameisenbären *Fermin Surin. II p. 87.*

The lest Ant-eater *Penn. sijn. quadr. p. 333 n. 262 tab. 30.*

Mangia formiche *Aless. quadrup. III tab. 121 fig. Buff.*

Der zweyfingerige oder kleine Ameisenbär *Müll. Naturf. I p. 180 tab. 10 fig. 1* Sebae.

Der kleine Ameisenfresser: Myrmecophaga didactyla *Schreb. Säugth. II p. 206 n. 3 tab. 66 fig. propria bona.*

Der kleine zwozeeige Ameisenfresser *Marr. Naturlex. II p. 274 cum fig. Schreberi.*

Owatiriwau *Guianiensibus.*

Reli-

MYRMECOPHAGAE nocturnae formicas lingua tereti lumbrici formi in oes trahunt vorantque. Diu in ediam ferunt. Incessu lentis omnibusque iniuriis obnoxii vnica salus est in vitae tenacitate, vnguibusque longis, quibus pugnant in dorsum proiectae contra hostes.

Reliquis minor. Longitudo corporis 8 pollicum. Nasus conicus, paullulum deorsum curvatus. Rostrum brevius quam in reliquis: at oris rictus amplior. Auriculae parvae, pilis occultatae. Collum brevissimum. Totum corpus supra flavescenti fuscum, pilis longis, mollibus, sericeis, subtus griseum. Cauda longitudine fere corporis, prehensilis, apice infra denudato, basi crassa. Unguis exterior palmarum altero maior. Ungues plantarum quatuor aequales. Mammae duae pectorales et duae ventrales.

Habitat in America australi. Vicinat formicis. Talis lente incedit.

tridactyla. 2. *M. palmis tridactylis, plantis pentadactylis, cauda villosa.*

Tamandua Myrmecophaga americana *Seb. thes. I p. 60 tab. 37 fig. 2.*

Tamandua Guacu Brasiliensis, seu Vrsa formicaria *Seb. thes. I p. 65 tab. 40 fig. 1.*

Myrmecophaga manibus tridactylis, plantis pentadactylis *Linn. syst. nat. 2 p. 42.*

Der Ameisenfresser Meyer Thiere III tab. 9 fig. Sebae.

Der brasilische Ameisenfresser Meyer Thiere III tab. 12 fig. Sebae.

Myrmecophaga manibus tridactylis, plantis pentadactylis *Linn. syst. nat. 6 p. 8 n. 1.*

Myrmecophaga manibus tridactylis, plantis pentadactylis. The *Myrmecophaga* with three toes on the fore-feet, and five on the hinder feet: the great Ant-bear *Hill anim. p. 531.*

Le Fourmiller aux longues oreilles: Myrmecophaga (minor) rostro longissimo, pedibus anticis tridactylis, posticis pentadactylis, auriculis longis, flaccidis *Brisf. regn. an. p. 27 n. 3.*

Der groſſe Ameiſenbär *Hall. vierf. p. 393 tab. 16.*

Mieren - Eeter met drie Vingers aan de Voorpooten, vyf aan de Agterpooten *Houtt. nat. hiſt. I p. 488 tab. 10 fig. 2.* Sebae.

Myrmecophaga (tridactyla) palmis tridactylis, plantis pentadactylis, cauda villoſa *Linn. ſyſt. nat. 12, I p. 51 n. 2.*

Der dreyfingerige oder groſſe Ameiſenbär *Müll. Naturf. I p. 181 tab. 10 fig. 2* Sebae (Figura ſub iubatae nomine).

Roſtrum longius quam praecedentis. Oris rictus parvus. Auriculae longae flaccidae. Oculi magni. Cauda longa, acuminata, ſupra ſufca. Corpus ſupra pallide caſtaneum, ſubtus magis ruſum. Plaga lateralis nigra nulla, quam male et huic tribuit Linnæus. Mammae pectorales duae, abdominales ſex. Unguis medius palmarum maximus.

Habitat in Braſilia? Africa?

Viſitat formicis, infectis, quorum nidos ungue ſecat. Lente currit. Arbores etiam ſcandit.

Confuſa a plerisque auctoribus cum inſequente.

iubata. 3. M. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda iubata.

Tamandua *Laes Amer. p. 551.*

Myrmecophagus ſive Tamendoa *Nieremb. hiſt. nat. p. 190.*

Tamanduai *Nieub. Braſ. p. 19.*

The Piſmire - eater *Nieub. Braſ. p. 18 fig.* peſſima.

Tamandua Guacu Braſilienſibus *Marcgr. Braſ. p. 225 fig.* ſat bona.

Tamandua Gvacu *Ionſt. quadrup. p. 136 tab. 62 fig.* Marcgr.

Tamanduaá guacú siue maior *Pis. Ind. p. 320 fig.*
 Marcgr.

Tamandua Guacu Brasiliensis *Charlet. exerc. p. 17.*

The great Tamandua *Grew mus. reg. soc. p. 14.*

Tamandua - guacu *Rai. syn. quadr. p. 241.*

L'Ours qui vit de fourmis *Dampier voy. III p. 304.*

Mange-fourmis *Des March. voy. III p. 291.*

Tamandua - Guacu, vulgo Myreneter *Laur. mus. reg.*
tab. 7 fig. 71 mediocris.

Ossò hormiguero *Gum. Orin. II p. 306.*

Tamandua maior, cauda paniculata: Ouariri. Gros
 mangeur de fourmis. *Barr. Fr. équ. p. 162.*

Tamandua - guacu *Klein. quadrup. p. 45 tab. 4 fig. sat*
 bona.

Der größte Ameisenfresser *Meyer Thiere III tab. 13*
 fig. Klein.

Le Fourmiller Tamanoir: Myrmecophaga (Tama-
 noir dicta) rostro longissimo, pedibus anticis te-
 tradactylis, posticis pentadactylis, cauda longissi-
 mis pilis vestita *Briff. regn. an. p. 24 n. 1.*

Der große Ameisenbär *Hall. vierf. p. 395.*

Myrmecophaga (tridactyla) palmis tridactylis, plan-
 tis pentadactylis *Linn. syst. nat. 10, I p. 35 n. 2.*

Le Tamanoir *Buff. hist. nat. X p. 144 tab. 29.*

Myrmecophaga (iubata) palmis tetradactylis, plan-
 tis pentadactylis, cauda iubata *Linn. syst. nat. 12.*

I p. 52 n. 3.

Der große dreyzehigte Ameisenbär *Knorr. delic. II*
tab. K, 9.

Myrmecophaga sciurea *Pallas miscell. p. 65.*

Die erste Art vom Ameisenbären *Fermin. Surin. II p.*
 86.

The great Ant-Eater *Penn. syn. quadr. p. 331 n. 260.*

Tamandua *Aless quadrup. III tab. 120 fig. Buff.*

Der langhaarige Ameisenbär *Müll. Naturf. I p. 182*
 (figura ad antecedentem pertinet).

Dillon's Travels through Spain p. 76. tab. 2. Der
Museum Leverianum tab. 24.

Der große Ameisenfresser: *Myrmecophaga iubata*
Schreb. Säugth. II p. 203 n. 1 tab. 67 fig. Buff.

Der große Ameisenfresser *Mart. Naturlex. II p. 271*
cum fig. Buff.

Wariri *Guianensibus.*

Vmbulu *Congensibus?*

Longitudo corporis ad 4 ped. caudae $2\frac{1}{2}$ ped. Rostrum longum, gracile. Oris rictus minimus. Lingua ad $2\frac{1}{2}$ ped. longa. Oculi parui, nigri. Auriculae breues, rotundatae. Totum corpus griseum pilis nigris mixtis, postice magis nigrescens. Plaga pectoralis lateralis nigra, supra albo cincta. Crura antica albicantia cum macula nigra. Ungues duo medii palmarum reliquis longiores. Cauda pilis longissimis planis, nec teretibus, nigris iubata.

Habitat in Brasilia et Guania. Num etiam in Congo? Lente incedit. Irata caudam agit. Formicarum nidos unguibus effodit. Corpus contra pluuiam cauda obtegit.

tetrada- 4. *M. palmis tetradaetylis, plantis pentadaetylis,*
 etyla: cauda calua.

Tamanduai guacu *Nieub. Bras. p. 19.*

Tamandua - i Brasiliensibus *Marcgr. Bras. p. 225 fig. p. 226* bona.

Tamandua - I *Ionst. quadrup. p. 137 tab. 62 fig. Marcgr.*

Tamanduá minor, Tamanduá Mirí *Pis. Ind. p. 320 fig. p. 321 Marcgr.*

Tamandua - i; the lesser Ant - eater *Charlet. exerc. p. 17.*

Tamandua I Brasiliensibus *Rai. syn. quadr. p. 242.*

Tamandua formicis vescens americana minor *Seb. thes. II p. 48 tab. 47 fig. 2* mediocris.

Der americanifche kleine Ameifenfrefler *Meyer Tbie-
re III tab 11* fig. Seb.

*Myrmecophaga manibus tetradactylis, plantis penta-
dactylis Linn. syst. nat. 6 p. 8 n. 3.*

*Tamandua minor, cinerea: Mangeur de fourmis
Barr. Fr. équ. p. 162.*

Mamandua - I Brafil. Klein. quadrup. p. 46.

*Myrmecophaga manibus tetradactylis, plantis penta-
dactylis. The Myrmecophaga with four toes on
the fore-feet, and five on the hinder. The leffer
Ant-bear Hill anim. p. 532.*

*Le Fourmiller: Myrmecophaga (. . .) rostro
longiffimo, pedibus anticis tetradactylis, posticis
pentadactylis, cauda fere nuda Briff. regn. an. p.
26 n. 2.*

Der mittlere falbe Ameifenbär Hall. vierf. p. 394.

*Myrmecophaga (tetradactyla) palmis tetradactylis,
plantis pentadactylis Linn. syst. nat. 10, I p. 35
n. 3.*

*Mieren - Eeter met vier Vingers aan de Voorpooten,
vyf aan de Agterpooten Houtt. nat. hift. I p. 490.*

*Myrmecophaga rostro longiffimo, pedibus anticis te-
trradactylis, posticis pentadactylis: cauda fere nu-
da Gronov. zooph. I p. 1 n. 2.*

Le Tamandua Buff. hift. nat. X p. 144,

*Myrmecophaga (tetradactyla) palmis tetradactylis, plan-
tis pentadactylis, cauda calua Linn. syst. nat. 12, I
p. 52. n. 4.*

Myrmecophaga myofura Pallas miscell. p. 64.

*Die zwote Art vom Ameifenbären Fermin Surin. II
p. 87.*

*The middle Ant-eater Penn. fyn. quadr. p. 332 n.
261.*

Der vierzähige Ameifenbär Müll. Naturf. I p. 183.

*Der mittlere Ameifenfrefler: Myrmecophaga tetra-
dactyla Schreb. Säugth. II p. 205 n. 2 tab. 68 fig.
Marcgr.*

Der mittlere vierzeeige Ameisenfresser *Mart. Naturlex. II p. 276.*

Longitudo corporis $1\frac{1}{2}$ ped. et ultra. Rostrum longum, gracile, paullulum deorsum curuatum. Os paruum, nigrum. Oculi minuti, nigri. Auriculae breues, erectae. Collum crassiusculum. Corpus pilis splendentibus durioribus, pallide flauis, in medio dorso et cruribus posticis obscurioribus. Plaga pectoralis lateralis nigra. Cauda ferè longitudine corporis, prehensilis, attenuata, pilosa apice nuda. Digni 4 - 5.

Habitat in America meridionali, victu et moribus iurbatae. Cauda se ex arborum ramis suspendit. Nocturna die dormit, capite sub brachiis recondito. Irata baculum prehendit. Stertit posterioribus pedibus infidens. Partem aquae potae per nares eicit, quod et reliquis familiare.

* * *

Fetum Myrmecophagae describit doctiss. *Pallas miscell. p. 64* quam *afra* vocat e promontorio bonae spei. Aut propria species est, aut tridactyla forte. Fetus mole est fere porcelli recens nati, nudus adhuc, praeterquam quod pili rari longiusculi nigri ad os et in pedibus sparsissimi obseruentur, crebriores in palpebris et ad talum pedum anticorum. Corpus crassum. Caput elongatum, magis quam in tetradactyla, rostro, quod pone apicem crassum et obtusissimum, quasi constricto. Nares in apice rostri, approximatae, lunatae. Auriculae maiores quam in congeneribus, oblongae, acutae, planae, pendulae. Pedes humiles, fere vsini, antici tetradactyli, digito medio longiore, extimo minore reliquis. Ungues anticorum longiores, *Erxl. Mammal.* G omnium

omnium triquetro-subulati, rectiusculi. Cauda corpore brevior, attenuata, acuta.

Huc refert vir doctissimus Myrmecophagam Kolbii:

Est Orycteropus ca-
penfis 18 dentibus mo-
laribus instructus. viz
(in uno specimine) 10 superioribus 8 inferioribus -
 Erdſchwein Kolbe *Vorgeb.* p. 165.
 Centenorum adeo pondo esse hic affirmat.

II. MANIS.

Dentes nulli.

Lingua teres, extensilis.

Os angustatum in rostrum.

Corpus squamis tectum.

Mammae pectorales II.

brachyu- I. M. cauda fere longitudine corporis.

ra. Lacertus indicus squamosus *Bont. Ind. or. p. 60 cum*
fig. sat bona.

Le grand Lézard écaillé *Perr. anim. III p. 87 tab.*
17 fig. bon.

Lacerta squamosa ingens *Iacob. mus. reg. p. 9 tab. 9*
fig. 3 Laur. mus. reg. tab. 6 fig. 82 figg. mediocr.

Kquoggelo *Barbot Guin. p. 114.*

Lacertus squamosus minor setulis aspersis *Peruv. ga-*
zoph. tab. 20 fig. 8 mediocr.

De Panggoeling *Valent. Amb. III p. 278.*

Quogelo *Des March. voy. I p. 179.*

Armadillus squamatus maior, seu Diabolus Tajova-
 nicus Siamensium, ex insula Formosa *Seb. thes. I*
p. 87 tab. 53 fig. 5 iunior.

Arma-

MANIS a Myrmecophaga solo vestimento differt.

Armadillus squamatus maior, ceylanicus, seu diabolus Tajovanicus dictus *Seb. thes. Ip. 88 tab. 54 fig. I* adulta.

Manis manibus pentadactylis, palmis pentadactylis *Linn. syst. nat. 6 p. 8 n. 1.*

Manis manibus pentadactylis, plantis pentadactylis *Dahlmann: Act. holmies. 1749 p. 274 tab. fig. 3 bona.*

Tatu mustelinus *Klein. quadrup. p. 47.*

Le Pholidote: Pholidorus (. . . .) pedibus anticis et posticis pentadactylis, squamis subrotundis *Briss. regn. an. p. 29 n. 1.*

Das formosische Teufelchen *Hall. vierf. p. 396, 397 tab. 18.*

Manis (pentadactyla) pedibus pentadactylis *Linn. syst. nat. 10, I p. 36 n. 1.*

Diabie de Tavoyen *Dictioun. anim. II p. 25.*

Lézard ecailleux *Dictioun. anim. II p. 62 I cum congen.*

Quoggelo *Dictioun. anim. III p. 646.*

Tayanan *Dictioun. anim. IV p. 295.*

Schubhaagdis of Mier - Haagdis *Hourr. nat. hist. I p. 494.*

Das mit Schuppen gepanzerte Thier, Manis oder Armodillus genannt *Mus. baruth. p. 4 tab. 2 fig. iunioris.*

Pholidotus pedibus anticis et posticis pentadactylis, squamis subrotundis *Gronov. zooph. I p. 2 n. 3.*

Le Pangolin *Buff. hist. nat. X p. 180 tab. 34.*

Manis (pentadactyla) pedibus pentadactylis *Linn. mus. Ad. Frid. II p. 7.*

Pangolin *Bom. dictioun. III p. 349 cum sequente.*

Quoggelo *Bom. dictioun. III p. 697.*

Manis (pentadactyla) pedibus pentadactylis *Linn. syst. nat. 12, I p. 52 n. 1.*

The short-tailed Manis *Penn. syn. quadr. p. 329 n. 259.*

Pangolino *Aless. quadrup. III tab. 122 fig. Buff.*

lie in the Asiatick researches or Transact. of the Bengal
 city. T. 1. Calcutta 1788. A pag. 376. see mibi in the
 memoirs of Science & Arts N^o 1. 1793. p. 42.

Das fünffingerige Schuppthier, der Iavaische Teufel
Müll. Naturf. I p. 186 tab. 29 fig. 1 fere Sebae.

Das kurzgeschwänzte Schuppenthier: Manis pentadactyla Schreb. Säugth. II p. 210 n. 1 tab. 69 fig.

Buff
malabaris

Alungu in Coromandel. *Nalunga*. *neivou ni*
Pangulling Iauensibus. *oul buriest 61 27. p. 5*

Tchin Chian Kiäpp Sinenfibus.

Quoggelo Guineenfibus.

Kaballaja Zeylon. se animal squamis robustissimis acornat
(ita in catal. mus. Indici Pauli Hermannii 1731. 8.)

Corpus, rectum squamis obtusis, glabris, versus basin striatis, intermixtis pilis crassis, rufis. Subtus abdomen, pectus vsque ad gulam, manus et pedes latere interiore pilosa. Caput oblongum. Squamae verticis minores. Rostrum mediocre. Oris rictus minimus. Narium foramina instar lunae recurvata. Lingua teres, lumbriciformis. Auriculae parvae, rutundatae. Collum distinctum fere nullum. Pedes squamosi. Palmae pentadactylae: vnguibus tribus mediis magnis, duobus lateralibus parvis. Plantae pentadactylae: vnguibus brevioribus, magis curvis. Digi omni pum pedum coadunati, nec fissi. Cauda longitudine fere corporis, supra conuexa, subtus planiuscula, lateribus carinata, imbricata, vtrinque squamosa. Longitudo animalis ad pedes octo. Color fuscus, iunioribus flavescens. Mammae duae pectorales.

Habitat in insulis indicis, Formosa, Iaua, Ceylona; Guinea.

Vicitat insectis, vermibus, lacertis. Naso terram fodit subterranea. Incedens vngues retrahit, ne obtundantur. Vox debilis. Incessus lentus. Irata squamas erigit horrende, territa in globum se contrahit capite caudaque ventrem versus adducit.

Etis,

dis, vt nil conspici queat, nisi squamosus globus.
Valde pinguescit, cauda epulis expetita.

macroura. 2. M. cauda corpore longiore.

Lacertus peregrinus squamosus *Clus. exot. p. 374 fig.*
mediocr.

Lacerta indica Iuannae congener *Aldrov. dig. ouip. p.*
667 *fig. mediocr. absque capite.*

Le Lézard de Clusius *Perr. anim. III p. 89.*

Lacertus peregrinus squamosus *Olear. Gott. Kunstk. p.*
7 *tab. 7 fig. I mediocris.*

The Scaly-Lizard *Grew. mus. reg. soc. p. 46.*

Lacertus peregrinus squamosus *Clui. Rai. syn. quadr.*
p. 274.

Phatagen *Hist. de l' acad. 1703 p. 39.* *In Malaisia hocce nomi-*
ne jam apud Aelianum
Lacertus indicus squamis vndique munitus *et arma-*
venit. 16. 6.
tus Mus. Besler. p. 39 tab. II.

Manis. The scaly Lizard *Hill. anim. p. 533 fig. bon.*

Le Pholidote à longue queue: Pholidotus (longi-
caudatus) pedibus anticis et posticis tetradacty-
lis, squamis mucronatis, cauda longissima *Briss.*
regn. an. p. 31 n. 2.

Viervingërig Schubbier *Houtt. nat. hist. I p. 496.*

Mus. baruth. tab. 14, 15 figg. bon.

Le Phatagin *Buff. hist. nat. X p. 180 tab. 35.*

Manis (tetradactyla) pedibus tetradactylis *Linn. syst.*
nat. 12, I p. 53 n. 2.

The long-tailed Manis *Penn. syn. quadr. p. 328 n.*
258.

Fatagino *Aless. quadrup. III tab. 123 fig. Buff.*

Das vierfingerige Schuppthier *Müll. Naturf. I p. 187.*

Das langgeschwänzte Schuppenthier: Manis tetra-
dactyla *Schreb. Säugth. II p. 211 n. 2 tab. 70 fig.*
Buff.

Minor praecedente, cauda longitudine dupla corporis et ultra. Longitudo corporis $14\frac{1}{2}$ poll. caudae ad 40 poll. Corpus, crura et cauda squamis magnis, acutis, striatis. Caput cum rostro gracili laeue, squamis minoribus. Crura breuia, posteriora paullo longiora, antica pilosa. Ungues 5-5 palmarum pollicis minimo vix apparente (inde tradactyla male dicta auctoribus). Cauda attenuata, apice obtuso. Corpus subtus pilosum.

Habitat in Brasilia? Formosa? Guinea?

Mores praecedentis. Mitis.

12. DASYPVS.

Dentes molares plures, VII-VIII vtrinque, absque primoribus, absque laniariis.

Corpus cataphractum testa ossea, zonis interfecta.

Ungues acuti.

tricinctus. i. D. cingulis tribus, pedibus pentadactylis, cauda breui.

Armadillo siue Tatu genus alterum *Clus. exot. p. 109* fig. mediocr. in pedibus vitiosa.

Armadillo genus alterum Clusii *Nieremb. hist. nat. p. 158* fig. Clusii.

Tatu apara *Marcgr. Bras. p. 232* fig. bon.

Tatus *Ionst. quadrup. p. 174 tab. 80* fig. pessima.

Tatu

Fodiunt DASYPODES subterranei, nocturni, mites. Arbores non ascendunt. Victitant radicibus, inelonibus, baccis, carnibus, piscibus, insectis, lumbricis. Multum potant. Terrefacti corpus conglomerant inuulnerabiles.

- Tatu Apara *Ionst. quadrup. tab. 63 fig.* Marcgr.
- Tatú - apará *Pif. Ind. p. 100 fig.* Marcgr.
- Le Tatou *Rochef. Antill. p. 139 cum fig.* Marcgr.
- Armadillo *Red. opusc. II p. 76 cum fig.* Marcgr.
- Gesn. Thierb. p. 231* figura altera Clusii, altera Marcgr.
- The great shell'd Hedghog *Grew. mus. reg. soc. p. 17.*
- Tatu apara *Rai. syn. quadr. p. 234.*
- Tatu feu Armodillo orientalis, lorica offea toto corpore tectus *Seb. thes. Ip. 62 tab. 38 fig. 2.*
- Tatu feu Armodillo minor conuolutus *Seb. thes. I p. 62 tab. 38 fig. 3.*
- Erinaceus loricatus, cingulis tribus *Linn. syst. nat. 2 p. 45.*
- Cachicâmos ò Armadillos *Gum. Orin. II p. 301.*
- Der orientalische Armadill *Meyer Thiere III tab. 25 fig.* Sebae.
- Dasypus cingulis tribus *Linn. syst. nat. 6 p. 6 n. 2.*
- Tatus *Gesn. Barr. Fr. équ. p. 163.*
- Tatu porcinus *Klein. quadrup. p. 48.*
- Dasypus cingulis tribus. The Dasypus with three belts: the oriental Armadilla *Hill anim. p. 560.*
- L'Armadille oriental: Cataphraëtus (Armadillo orientalis) scutis duobus, cingulis tribus *Briss. regn. an. p. 38 n. 2.*
- Der schönste orientalische Armodillo *Hall. vierf. p. 399 tab. 17.*
- Dasypus (tricinctus) cingulis tribus, pedibus pentadactylis *Linn. syst. nat. 10, I p. 51 n. 2.*
- Cataphraëtus scutis duobus, cingulis tribus *Dictioun. anim. I p. 170.*
- Tatou *Dictioun. anim. IV p. 276 cum congeneribus.*
- Armadil met drie Gordels en vyf-vingerige Pooten *Houtt. nat. hist. II p. 280 tab. 16 fig. 2* Sebae.
- L'Apar ou le Tatou à trois bandes *Buff. hist. nat. X p. 206.*
- Armadille ou Tatou *Bom. dictioun. I p. 185 cum congener.*

Dasypus (trinctus) cingulis tribus, pedibus pentadactylis *Linn. syst. nat.* 12, I p. 53 n. 2.

The three - banded Armadillo *Penn. syn. quadr.* p. 323 n. 252.

Der dreygürtelige Armadill *Müll. Naturf.* I p. 190 tab. 16 fig. 2 Sebae.

Das Gürtelthier mit drey Gürteln: Dasypus trinctus *Schreb. Säugth.* II p. 215 n. I tab. 71 A fig. Sebae.

Armadill mit drey Ringen, Apar, Aparathier *Mart. Naturlex.* III p. 224.

Longitudo corporis cum cauda pedis vnus. Lorica capitis dorisque diuisa in segmenta pentagona et hexagona tuberculata, cingulis tribus in medio dorso, ex squamis parallelogrammis compositis. Rostrum acuminatum. Auriculae breues, nudaе, rotundatae. Oculi parui. Cauda breuissima, squamis hexagonis recta, paullulum depressa. Pedes 5-5, palmarum vnguibus duobus intermediis maioribus, exteriore minimo, duobus interioribus paruis. Plantarum vngues aequales (Secundum Sebam et Kleinium pedes sunt 4-4, digito vnico postico). Penis insignis.

Habitat in America australi. In India orientali vix videtur reperiri.

Valde pinguescit. Iunioris caro delicatula, senioris sapore moschi ingrato. Parit quouis mense pullos quatuor. Mitis.

quadricin-2.D. cingulis quatuor.

etus. *Χελονισκος*, siue *Χελωνεχινος*, Testudinatus Porcellio, vel Testudinatus Echinus, exoticum animal *Column. aquat.* p. XV fig. scuti p. XVI.

Dasypus cingulis quatuor *Linn. syst. nat.* 6. p. 6 n. 3.

Dasypus

Dasypus cingulis quatuor. The Dasypus with four belts: the water Armadillo *Hill anim. p. 561.*

L'Armadille des Indes: Cataphraetus (Armadillo indicus) scutis duobus, cingulis quatuor *Briff. reg. an. p. 39 n. 3.*

Dasypus (quadricinctus) cingulis quatuor *Lin. syst. nat. 10, I p. 51 n. 3.*

Cataphraetus scutis duobus cingulis quatuor *Dictionn. anim. I p. 170.*

Armadil niet vier Gordels om 't Lyf *Houtt. nat. hist. II p. 281.*

Dasypus (quadricinctus) cingulis quatuor *Lin. syst. nat. 12, I p. 54 n. 3.*

Der viergürtelige Armadill *Müll. Naturf. I p. 190.*

Das Gürtelthier mit vier Gürteln *Schreb. Säugth. II p. 217 n. 2.*

Armadill mit vier Ringen, Schildkrötenigel, Seheldkrötenschwein *Mart. Naturlex. III p. 225.*

Species obscura, aut si maus dubia adeo, soli Columnae visa, qui nil nisi loricae habuit conglutinatis fragmentis. Est haec scutis duobus, posteriore maiore, squamis hexagonis, pentagonis, quadratis etc. tuberculatis; inter haec cingula quatuor.

Habitat - - - - -

sexcinctus. 3. D. cingulis senis, pedibus pentadactylis.

Tatou *Bellon obs. p. 204 cum fig. mediocri, cingulis nimiis.*

Armadillo siue Tatou *Clus. exot. p. 330 cum fig. Bellon.*

Tatu: Armadillo *Laet Amer. p. 552 cum fig. Bellon.*

Armadillo Clusii *Nieremb. hist. nat. p. 158 cum fig. Bellon.*

Shield-hogs *Nicub. Bras. p. 19.*

Tatu et Tatu-peba Brasiliensibus *Maregr. Bras. p. 231 cum fig.* Bellon.

Tatu seu Armadillo *Ionst. quadrup. tab. 62 fig.* Bellon.
Gesn. Thierb. p. 230 fig. inferior Bellon.

Tatu *Charlet. exerc. p. 18.*

Tatu siue Armadillo prima *Rai. syn. quadr. p. 233.*

Dasypus cingulis sex *Linn. syst. nat. 6 p. 6 n. 5.*

Dasypus cingulis sex. The Dasypus with six belts *Hill anim. p. 559.*

Dasypus (sexcinctus) cingulis senis, pedibus pentadactylis *Linn. mus. Ad. Frid. I p. 7.*

L'Armadille du Mexique: Cataphractus (Armadillo mexicanus) scutis duobus, cingulis sex *Briff. regn. an. p. 40 n. 4.*

Das hundsköpfige Panzerthier *Hall. vierf. p. 401?*

Dasypus (sexcinctus) cingulis senis, pedibus pentadactylis *Linn. syst. nat. 10, I p. 51 n. 4.*

Cataphractus scutis duobus, cingulis sex *Dictiomm. anim. I p. 170.*

Armadil met zes Gordels en vyf - vingerige Pooten *Houtt. nat. hist. II p. 282.*

L'Encoubert, ou le Tatou à six bandes *Buff. hist. nat. X p. 209 tab. 42* (figura loricae solius).

Dasypus (sexcinctus) cingulis senis, pedibus pentadactylis *Linn. syst. nat. 12, I p. 54 n. 4.*

The sixbanded Armadillo *Penn. syn. quadr. p. 324 n. 253.*

Der sechsgürtelige Armadill *Müll. Naturf. I p. 191.*

Das Gürtelthier mit dem Halschilde: Dasypus sexcinctus *Schreb. Säugth. II p. 218 n. 3 tab. 71 B fig. propria* (quae mihi videtur octodecimcincti figura potius).

Armadill mit sechs Reifen, der Enkubert *Mart. Naturlex. III p. 226. cum fig.* Schreb.

Chirquinchum *Mexicanis.*

Armadillo *Hispanis.*

Encuberto, Encubertado *Lusitanis.*

Schildverken *Belgis.*

Magnitudo Cati. Lorica scutis duobus, cingulisque intermediis sex e squamis triangularibus compositis. Setae inter cingula positae. Squamae scutorum figurae variae. Corpus subtus pilis rarioribus albicantibus. Os acutum. Lingua acuminata angusta. Oculi parvi, profundi. Auriculae nudaе, breues. Digiti 5-5, unguibus subrotundis, in palmis longiores. Cauda longior quam in praecedentibus, corpore tamen breuior, ex basi crassa attenuata. Color ex luteo subrufus.

Habitat in Brasilia et Mexico.

septem- 4. D. cingulis septenis, palmis tetradactylis, plan-
cinctus. tis pentadactylis.

Ayotochtli seu Dasypus cucurbitinus, ab aliis Tatou vel Armadillo dictus *Hernand. Mex. p. 314 cum fig. mediocr.*

Armadillo siue Aiatochtli *Nieremb. hist. nat. p. 158 fig. mediocr.*

Tatus seu echinus brasilianus *Aldrov. digit. p. 478 fig. p. 480 Nieremb. nisi quod cingula sex tantummodo pingat Aldrouandus, Nierembergius vndecim.*

Armadillo siue Aiatochtli *Ionst. quadrup. tab. 74 fig. Nieremb.*

Tatus quadrupes, Eine frembde Gattung Igel *Gesn. Thierb. p. 229 fig. p. 230 superior Nieremb.*

Dasypus cingulis septem *Linn. syst. nat. 6 p 6 n. 6.*

Erinaceus loricatus, cingulis septenis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. amoen. acad. I p. 560.*

Dasypus cingulis septem. The Dasypus with seven belts: the Tatouete *Hill anim. p. 560.*

L'Armadille du Bresil: *Cataphractus* (*Armadillo Brasilianus*) scutis duobus, cingulis octo *Briff. regn. an. p. 41 n. 5.*

Dasypus (*septemcinctus*) cingulis septenis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. syst. nat. 10, I p. 51 n. 5.*

Cataphractus scutis duobus, cingulis octo *Dictionn. anim. I p. 171.*

Armadil met zeven Gordels, de Voorpooten vier- de Agterpooten vyf- vingerig *Houtt. nat. hist. II p. 283.*

Le Tatuéte ou Tatou à huit bandes *Buff. hist. nat. X p. 212.*

Dasypus (*septemcinctus*) cingulis septenis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. syst. nat. 12, I p. 54 n. 5.*

Schildferkel oder Armadill aus America *Knorr. delic. II tab. K, 3. fig. 2.*

The eight-banded Armadillo *Penn. syn. quadr. p. 325 n. 254.*

Der siebengürtelige Armadill *Müll. Naturf. I p. 191.*

Das Gürtelthier mit sechs geflammten Gürteln: *Dasypus septemcinctus* *Schreb. Säugth. II p. 220 n. 4 tab. 72 fig. propria.* Mihi hic omnino sexcinctus videtur.

Das Gürtelthier mit acht Gürteln: *Dasypus octocinctus* *Schreb. Säugth. II p. 222 n. 5 tab. 73 fig. propria.*

Der achtgürtelige Armadill *Müll. Naturf. Suppl. p. 23.*

Armadill mit sechs geflammten, imgleichen mit 7 oder 8 Gürteln, Tatuette *Mart. Naturlex. III p. 228.*

Longitudo corporis 10 pollicum, caudae 9 poll. Caput paruum, ouatum, glabrum, futuris numerosissimis reticulatum. Rostrum productum, acutum. Oculi parui, nigri. Narium foramina lunaria. Aures subouatae, erectae, punctis papillofis tectae. Testa corpus tegens, ossea, cuius prima pars lata, marginata,

ginata, punctis subrotundis; latiusculis, eleuatis, transuersim striata. Cingula septem angusta, ouato-lanceolatis characteribus transuersim striata; postica pars testae magnitudine primae, punctis callofis eleuatis notata. Penis exsertus, subtus carinatus. Cauda cingulis numerosis verticillata, nuda, corpore paullo breuior, acuminata. Pedes anteriores palmis tetradactylis, profunde fissis, digitis retiusculis, interioribus duobus longioribus et fere aequalibus, exterioribus breuibus et inter se fere aequalibus. Ungues magni, erectiusculi, subulati, acutissimi. Pedes posteriores pentadactyli, digitis lateralibus profundius, vt in palmis, separatis et breuioribus, intermediis minus diuisis et longioribus. Ungues obtusiores quam in palmis. Color ferrugineus. Venter pilosus albus.

Habitat in Brasilia. Caro deliciosior quam reliquorum.

An sufficienter a sequente distinctus?

nouem- 5. D. cingulis nouem, palmis tetradactylis, plan-
cinctus. tis pentadactylis.

Tatu-ete Brasiliensibus *Marcgr. Bras. p. 231.*

Armadillo *Mus. Worm. p. 335.*

Armadillo *Olear. Gott. Kunstk. p. 7 tab. 6 fig. 4* fat bona.

The pigheaded Armadillo *Grew mus. reg. soc. p. 18.*

Tatuete Brasiliensibus *Rai. syn. quadr. p. 233.*

Armadillo seu Tatou Brasiliensium *Iacob. mus. reg. p. 8 tab. 9 fig. 4 Laur. mus. reg. tab. 6 fig. 79* mala.

Armadillus siue Tatou *Mus. Besler. p. 40 tab. 11 fig.* fat bona.

Tatu seu Armodillo americanus *Seb. thes. I p. 45 tab. 29 fig. 1* bona.

Tatu iuuenis seu Armadillus minor americanus *Seb. thes. I p. 87 tab. 53 fig. 6* pulli.

Erina-

Erinaceus loricatus, cingulis nouem, manibus tri-
daetylis *Linn. syst. nat. 2 p. 45.*

Der Armadill *Meyer Thiere I tab. 59.*

Der americanische Armadill *Meyer Thiere III tab. 26*
fig. Sebae.

Dasypus cingulis nouem *Linn. syst. nat. 6 p. 6 n. 7.*

Tatus maior moschum redolens: Tatou-Kabassou
Barr. Fr. équ. p. 163.

Tatu porcinus *Klein. quadrup. p. 48.*

Dasypus cingulis nouem. The Dasypus with nine
belts: the three-toed Armadilla *Hill anim. p. 562*
tab. 27.

Dasypus (nouemcinctus) cingulis nouem, palmis te-
tradactylis, plantis pentadactylis *Linn. mus. Ad.*
Frid. I p. 6.

L'Armadille de Cayenne: Cataphraetus (Armadillo
Guianensis) scutis duobus, cingulis nouem *Briss.*
regn. an. p. 42 n. 6.

Das amerikanische Schildferkelchen *Hall. vierf. p. 398.*

Dasypus (nouemcinctus) cingulis nouem, palmis te-
tradactylis, plantis pentadactylis *Linn. syst. nat. 10,*
I p. 51 n. 6.

Cataphraetus scutis duobus, cingulis nouem *Dictionn.*
anim. I p. 171.

Armadil met negen Gordels, de Voorpooten vier-en
de Agterpooten vyf-vingerig *Houtt. nat. bist. II*
p. 284 tab. 16 fig. 3 Sebae.

Ein gepanzertes americanisches Thier, Tatu oder
Tatou genannt, mit einem Schweinskopf und
sechs (*errore typographico pro neun*) Panzerge-
lenken auf dem Rücken *Mus. baruth. p. 23 tab.*
II fig. bon.

Cataphraetus scutis duobus, cingulis nouem *Gronov.*
zooph. I p. 2 n. 5.

Le Cachicame, ou Tatou à neuf bandes *Buff. bist.*
nat. X p. 215 tab. 37.

An american Armadilla *Watzon: Philos. Transact.*
vol. LIV p. 57 tab. 7 fig. bona.

Dasypus (nouemcinctus) cingulis nouem, palmis te-
tradactylis, plantis pentadactylis *Lin. syst. nat.*
12, I p. 54 n. 6.

The Tattu or Armadillo of Guiana *Bancr. Guian.*
p. 145.

The nine-banded Armadillo *Penn. syn. quadr. p. 325*
n. 255.

Armadiglio *Aless. quadrup. III tab. 124 fig. Buff.*

Der neungürtelige Armadill *Müll. Naturf. I p. 192*
tab. 16 fig. 3 Sebae.

Das Gürtelthier mit neun Gürteln: Dasypus nouem-
cinctus *Schreb. Säugth. II p. 223 n. 6 tab. 74 fig.*
propria.

Armadill mit 9 Ringen, der Kachikame *Mart. Na-*
turlex. III p. 230.

Verdadeiro *Lusitanis.*

Longitudo corporis 2 pedum. Rostrum acutum. Au-
riculae longae, paruis squamis testae. Lorica
figuris hexagonis exarata, cingulis 8-9. Pectus
et venter pilis longis. Cauda fere ped. 1 longa,
gracilis, basi crassa, acuminata, cingulis 10-12.
Digiti 4-5; palmarum duobus intermediis maio-
ribus aequalibus, plantarum medio longiore.

Habitat in America australi. Seniorum caro sapore
moschi ingrata.

duode- 6. D. cingulis duodecim, pedibus pentadactylis.
cincin- Tatu seu Armodillo africanus mas *Seb. thes. I p. 47*
ctus. *tab. 30 fig. 3.*

Tatu seu Armodillo africana femina *Seb. thes. I p. 48*
tab. 30 fig. 4.

- Erinaceus loricatus, tegmine tripartito *Linm. syst. nat.* 2 p. 45.
- Der africanische Armadill, das Männlein *Meyer Thiere III tab. 27.* Das Weiblein *tab. 28. figg.* Sebae.
- Dasypus tegmine tripartito *Linm. syst. nat.* 6 n. 4.
- Tatu caninus, capite pedibusque anomalis *Klein. quadrup. p. 49.*
- Dasypus tegmine tripartito. The Dasypus with the covering tripartitely divided: the african Armadilla *Hill anim. p. 56 l.*
- L'Armadille d'Afrique: Cataphractus (Armadillo africanus) scutis duobus, cingulis duodecim *Briff. regn. an. p. 43 n. 7.*
- Cataphractus scutis duobus, cingulis duodecim *Dictionn. anim. I p. 171.*
- Houtt. nat. hist. II tab. 16 fig. 1* Sebae, sub nomine sequentis.
- Le Kabassou, ou Tatou à douze bandes *Buff. bist. nat. X p. 218 tab. 40.*
- Autre Kabassou *Buff. bist. nat. X tab. 41.*
- The twelve-banded Armadillo *Penn. syn. quadr. p. 326 n. 256.*
- Kabassou *Aless. quadrup. III tab. 125 fig. 1* Buff.
- Armadiglio *Aless. quadrup. III tab. 125 fig. 2* Buff. altera.
- Müll. Naturf. I tab. 16 fig. 1.* Sebae, sub nomine sequentis.
- Das Gürtelthier mit zwölf Gürteln: Dasypus duodecimcinctus (vnicinctus) *Schreb. Sängth. II p. 225 n. 7 tab. 75 fig.* Buff.
- Der zwölfgürtelige Armadill *Müll. Naturf. Suppl. p. 23.*
- Armadill mit zwölfg Gürteln, der Kabassu, afrikani-scher Armadill *Mart. Naturlex. III p. 232.*
- Maximus congenerum. Caput crassum. Rostrum obtusum. Auriculae longae, apice rotundato. Lorica

cingulis duodecim composita, bipartita. Squamae cingulorum parallelogrammae, scutorum medio tetragonae, pentagonae, hexagonae. Digni 5-5, vnguibus tribus intermediis palmarum longioribus. Mas cauda nuda, femina squainata; fere longitudine corporis.

Habitat in Africa? (non esse in Africa *Buff.*)

Hunc Linneus coniungit cum sequente, qui maxime differre videtur.

7. D. scuto postico nullo, cingulis octodecim.
 The weefle-headed Armadillo. Tatu mustelinus
 Grew *mus. reg. soc. p. 19 tab. 1.*
 Tatu mustelinus *Rei. syn. quadr. p. 235.*
 Dafypus cingulo simplici *Linn. syst. nat. 6 p. 6 n. 1.*
 Dafypus cingulo simplici. The Dafypus with a single
 belt: the weasel-headed Armadillo *Hill anim.*
p. 559.
 L'Armadille: Cataphractus (Armadillo) scuto unico,
 cingulis octodecim *Briff. regn. av. p. 37 n. 1.*
 Der gepanzerte Ameisenbär *Hall. vierf. p. 396.*
 Dafypus (unicinctus) tegmine tripartito, pedibus pen-
 tadaetylis *Linn. syst. nat. 10, 1 p. 50 n. 1.*
 Cataphractus scuto unico, cingulis octodecim *Dictionn.*
anim. 1 p. 170.
 Armadil met het Schild drieën verdeeld, de Pooten
 vyf-vingerig *Houtt. nat. hist. II p. 279.*
 Le Cirquignon, ou Tatou à dix-huit bandes *Buff. hist.*
nat. X, p. 220.
 Dafypus (unicinctus) tegmine tripartito, pedibus pen-
 tadaetylis *Linn. syst. nat. 12, 1 p. 53 n. 1.*
 The eighteen-banded Armadillo *Penn. syn. quadr.*
p. 327 n. 257.
 Der eingürtelige Armadill *Müll. Naturf. 1 p. 189.*

Das Gürtelthier mit achtzehen Gürteln *Schreb. Säugth.*
II p. 227 n. 8. (Figura tab. 71 B huc pertinere
 mihi videtur.)

Der achtzehngürtelige Armadill *Müll. Naturf. Suppl.*
p. 24.

Armadill mit achtzehn Gürteln, Cirquinçon, Tatu-
 wiesel *Mart. Naturlex. III p. 234 cum fig.* Schre-
 beri.

Longitudo corporis decem pollicum, caudae septem.
 Caput tenue. Frons lata plana. Oculi parvi. Au-
 riculae parvae, erectae, nudaе. Scutum vnicum
 in humeris, reliquum corpus cingulis octodecim;
 scutum posticum nullum. Squamae anteriores ma-
 iores, quadratae, posteriores ex quadratis rotun-
 disque mixtae. Cauda basi annulis sex, acumi-
 nata. Pedes vt in antecedente.

Habitat in America australi.

13. TALPA.

Dentes Primores superiores VI.
inferiores VIII.

Laniarii maior I; minores IV.

Nasus elongatus.

Palmae fossoriae.

europaea. 1. T. cauda breuiore, pedibus pentadactylis.

ασπαλαξ *Arist. hist. anim. I c. 2 n. 15. IV c. 8 n. 240.*

Talpa *Plin. hist. nat. XI c. 37 (c. 52 Hard.) XXX*

c. 3 (c. 7 Hard.) c. 69 (c. 88 Hard.)

ασπαλαξ *Aelian. anim. XVII c. 10.*

ασπαλαξ *Oppian. cyneg. II, 612.*

Talpa *Agric. an. subt. p. 70.*

Talpa *Gesn. quadrup. p. 1055 cum fig. mediocr.*

Talpa

- Talpa *Schwenckf. zberiotr. p. 129.*
 Talpa *Aldrov. digit. p. 449 fig. p. 451 mala.*
 Talpa *Ionst. quadr. p. 170 tab. 66 fig. Gesn.*
 Talpa. Ein Maulwurf, Schär oder Schärmaufs *Gesn. Thierb. p. 257 fig. mala.*
 Talpa *Charlet. exerc. p. 25.*
 Talpa *Sibb. Scor. an. p. 11.*
 Talpa *Paullini monogr.*
 Talpa *Rai. syn. quadr. p. 236.*
 Talpa *Rzacz. Polon. p. 236.*
 Talpa caudata *Linn. syst. nat. 2 p. 45.*
 Talpa caudata *Linn. fn. suec. 1 p. 7 n. 17.*
 Ein Maulwurf *Meyer Thiere I tab. 2 fig. bona.*
 Talpa caudata *Linn. syst. nat. 6 p. 7 n. 1.*
 Talpa nostras *Klein. quadrup. p. 60.*
 Talpa caudata. The tailed Talpa: the Mole *Hill anim. p. 562.*
 La Taupe: Talpa (vulgaris) caudata, nigricans, pedibus anticis et posticis pentadactylis *Briff. regn an. p. 280 n. 1.*
 Talpa caudata *Kram. Austr. p. 314.*
 Der gemeine Maulwurf *Hall. vierf. p. 445 tab. 26 A.*
 Talpa (europaea) caudata, pedibus pentadactylis *Linn. syst. nat. 10, 1 p. 52 n. 1.*
 Taupe vulgaire *Dictionn. anim. IV p. 282.*
 La Taupe *Buff. hist. nat. VIII p. 81 tab. 12.*
 Europäische Mol: Mol met een Staart, de Pooten vyf-vingerig *Houtt. nat. hist. II p. 300.*
 Talpa (europaea) caudata, pedibus pentadactylis *Linn. fn. suec. 2 p. 9 n. 23.*
 Talpa caudata, pedibus pentadactylis *Gronov. zooph. I p. 9 n. 32.*
 The Mole *Penn. brit. zool. p. 52.*
 Muldvarpe *Pontopp. Dan I p. 611.*

Taube *Bom. dictionn. IV* p. 303.

Talpa (europaea) caudata, pedibus pentadactylis *Lin.*
syst. nat. 12, I p. 73 n. 1.

Talpa europaea *Forster: Philos. transact. LVII.* p. 342.

The european Mole *Penn. syn. quadr. p. 311* n. 241.

Talpa *Aless. quadrup. III tab. 105 fig. 1* Buff.

Der europäische Maulwurf *Müll. Naturf. I* p. 295.

Talpa (europaea) caudata pedibus pentadactylis *Müll.*
Dan. prodr. p. 3 n. 18.

Talpa *Italica.*

Topo *Hispanica.*

Toupeira *Lusitana.*

Taube *Gallica.*

Gwadd, Twrch daear *Cambrensis.*

Maulwurf *Germanica.*

Scheer, Scheermaus *Austriaca.*

Mol *Belgica.*

Mole, Moldwarp, Want *Anglica.*

Muldvarp *Danica.*

Vond, Muldvarp *Noruegica.*

Mullvad *Suecica.*

Surck *Smolandica.*

Kret *Polonica.*

Крошѣ (Krot), Земляная сосѣдка *vel* сусѣдка (*Zem-*
lānaja sosēdka vel susēdka) *Russica.*

Каменный медвѣдь (*Kamennyi medwēd'*), Камен-
ная сосѣдка (*Kamennaja sosjedka*) *in Sibiria.*

Longitudo corporis circiter quinque pollicum, cau-
dae vix poll. 1. Caput rostro attenuato, rufescente.
Oculi minuti, pilis occultati. Auriculae nullae. Cor-
pus antice crassum, musculosum, postice vix
gracilius. Pili breues, densi, mollissimi, nigri-
cantes. Cutis tenax. Pedes antici oblique positi,
lati et quasi manus, fossorii, digitis quinque, vn-
guibus fortioribus. Pedes postici minores, digi-
tis quinque. Penis omnium animalium longissi-
mus

mus. Testes maximi, parastatae ampliffimae. Calcaneis incedit cum congeneribus.

Habitat in Europae apricis humosis cultis. In Hibernia nulla.

Subterranea, antro cuniculi clauso. Terram fodit celerrime palmis, plantis terram remouet retrorsum. Praecipue actiua paullo ante pluuiam: tempore sicco magis descendit intra terram. Vitat vermibus, insectis, radicibus. Olfactu fortissimo gaudet. Nidum parat e musco paullulum infra superficiem terrae, in loco eleuato. Parit Maio mense quatuor pullos aut quinque, et forte pluries per annum. Coit fine hiemis.

Varietates:

α. albo-maculata.

Talpa maculata Oostfrisia *Seb. thes. I p. 68 tab.*

41 *fig. 4.*

Talpa maculata, Oost-Frisia *Klein. quadrup. p. 60.*

La Taupe variée: Talpa (variegata) caudata, ex albo et nigro variegata, pedibus anticis et posticis pentadactylis *Briss. regn. an. p. 282 n. 3.*

Der marmorfarbige ostfrisische Maulwurf *Hall. vierf. p. 448.*

Taupe variée *Dictionn. anim. IV p. 288.*

The spotted Mole *Edw. glean. II tab. 268.*

Der fleckichte Maulwurf *Berl. Samml. VI p. 319 cum fig. Edw.*

Der gefleckte Maulwurf: Talpa frisia *Müll. Naturf. Suppl. p. 36.*

β. tota alba.

Talpa alba *Wagn. Heluet. p. 185.*

Talpa alba nostras *Seb. thes. I p. 51 tab. 32 fig. 1.*

Talpa alba *Rzac. auct. p. 329.*

La Taupe blanche: Talpa (alba) caudata, alba, pedibus anticis et posticis pentadactylis *Briff. regn. an. p. 282 n. 2.*

Taupe blanche *Dictionn. anim. IV p. 288.*

γ. *flauescens.*

Talpa virginianus. niger, supinus, *Seb. thes. I p 51 tab. 32 fig. 3?*

Der virginische Maulwurf *Hall. vierf. p. 447?*

The yellow Mole *Penn. syn. quadr. p. 311 n. 241 β.*

Similis haec vulgari, at paullo maior. Pili molles, sericei, splendentes, basi profunde grisei, apice flauescenti-fulci, maxime flauent versus caput, obscuriores magis versus posteriora. Venter profunde cinnereo-fuscus. Pedes et cauda alba.

Habitat in America boreali.

δ. *supra splendens grisea, subtus flauescens.*

Eine bisher unbekannte Art von Maulwürfen, der graue eifelische Maulwurf *Hübisch: Naturf. III p. 98.*

Habitat circa Luciliburgum, rarior. Propriam speciem putat generos. de Hübisch.

longicaud. 2. T. cauda mediocri, pedibus pentadactylis, data. posticis squamosis.

The long-tailed Mole *Penn. syn. quadr. p. 314 n. 244 tab. 28 fig. 2.*

Paullo minor T. europaea. Cauda longitudine dimidia corporis. Palmae valde latae, structurae vt in europaea. Pedes postici valde squamosi, pilis rarioribus breuibus, digitis longis, gracilibus.

Pili

Pili corporis molles, longi, ferrugineo-fusci.
Cauda pilis breuibus.

Habitat in America boreali.

rubra.

3. T. cauda breuiore, palmis tridactylis, plantis tetradactylis.

Tucan seu Talparum indicarum quoddam genus *Fernand. anim. p. 7.*

Talpa rubra americana *Seb. thes. I p. 51 tab. 32 fig. 2.*

Talpa rubra americana *Klein. quadrup. p. 60.*

La Taupe rouge d'Amerique: Talpa (americana rufa) caudata, ex dilute cinereo rufa, pedibus anticis tridactylis, posticis tetradactylis *Briss. regn. an. p. 283 n. 5.*

Der amerikanische rothe Maulwurf *Hall. vierf. p. 447.*

Taupe rouge d'Amerique *Dictionn. anim. IV p. 288.*

Le Tucan *Buff. hist. nat. XV p. 159.*

The red Mole *Penn. syn. quadr. p. 315 n. 246.*

The mexican Shrew *Penn. syn. quadr. p. 309 n. 240?*

Der Purpurmaulwurf: Talpa virginea *Müll. Naturf. Suppl. p. 35.*

Der rothe Maulwurf: Talpa americana *Müll. Naturf. Suppl. p. 36.*

Paullo maior T. europaea, cui similis corpore et cauda. Pinguis, carnosa. Auriculae paruae, rotundatae. Oculi minimi. Color dilute ex cinereo ruber. Digni 3-4, vngue palmarum exteriori maximo, reliquis magnitudine decrefcentibus. Vngues plantarum aequales.

Habitat in America. Caro proba, esculenta.

Num forte Sorex?

- asiatica. 4. *T. ecaudata*, palmis tridactylis.
Talpa Sibericus verficolor, *Aspalax* dictus *Seb. thes. I*
p. 51 tab. 32 fig. 4 mas.
Talpa Siberica lupina *Seb. thes. I p. 51 tab. 32 fig. 5*
femina.
Talpa cauda nulla *Linn. syst. nat. 2 p. 45.*
Talpa ecaudata *Linn. syst. nat. 6 p. 7 n. 2.*
Talpa Sibiricus verficolor *Klein. quadrup. p. 60.*
Talpa acauda. The tailless Talpa: the painted Mole
Hill anim p. 563.
 La Taupe dorée de Sibérie: *Talpa (siberica aurea)*
ecaudata, ex viridi aurea, pedibus anticis trida-
 ctylis, posticis tetradactylis *Briff. regn. an. p. 284*
n. 6.
 Der bunte Siberische Maulwurf *Hall. vierf. p. 447*
tab. 26.
Talpa (asiatica) ecaudata, palmis tridactylis *Linn. syst.*
nat. 10, I p. 53 n. 2.
 Taupe dorée de Sibérie *Dictionn. anim. IV p. 289.*
 Siberische Mol: Mol zonder Staart, de Voorpooten
 drievingerig *Houtr. nat. hist. II p. 311 tab. 17 fig. 2.*
Talpa (asiatica) ecaudata, palmis tridactylis *Linn.*
syst. nat. 12, I p. 73 n. 2.
 La Taupe dorée *Buff: hist. nat. XV p. 145.*
 The Siberian Mole *Penn. syn. quadr. p. 313 n. 242.*
 Der asiatische Maulwurf *Müll. Naturf. I p. 299 tab.*
17 fig. 2.

Magnitudine circiter *Talpæ europææ*. Corpus cras-
 sitiei aequalis. Nasus brevior. Auriculæ nullæ.
 Digni 3-4: digito palmarum exteriori maiore
 (Plantis digiti quinque secundum *Sebam.*). Cauda
 nulla. Pili pulchre virides et aurei, luce varia-
 biles.

Habitat in Sibiria ad caput bona spes -

14. SOREX.

Dentes Primores superiores II bifidi.
inferiores IV: intermediis brevioribus (interdum II).

Laniarii vtrinque plures.

Nasus elongatus gracilis.

Pedes digitati.

criftatus. 1. *S. naribus carunculatis, cauda breuiore.*

Sorex (criftatus) naribus crifatis, cauda corpore brevior *Linn. syst. nat. 10, I p. 53 n. 2.*

Gekamde Spitsmuis: Spitsmais met gekamde Neusgaten, de Staart korter dan het Lighaam *Houtt. nat. hist. II p. 315.*

Sorex (criftatus) naribus carunculatis, cauda brevior *Linn. syst. nat. 12, I p. 73 n. 1.*

The radiated Mole *Penn. syn. quadr. p. 313 n. 243 tab. 28 fig. 1.*

Die Haarnase *Müll. Naturf. I p. 300.*

Corpus facie Talpae, atrum, pilis mollioribus, palmis niueis. Rostrum elongatum. Nares singulae caruncula stellato-palmata, radiis 10-15 subulatis, nudis, vt in Erinaceo. *Dentes Primores superiores* duo, *inferiores* quatuor. *Laniarii* vtrinque quatuor. *Pedes* antici breues, lati, vnguibus quinque longis albis. *Pedes* postici squamati, digitis quinque. Crura fortissima. Cauda subnuda, concolor, corpore dimidio breuior. Longitudo corporis $3\frac{3}{4}$ poll.

H 5

Habitat

Sorex criftatus atque *aquaticus* figura corporis et moribus valde accedunt ad Talpae genus: ex dentium tamen structura Sorices sunt.

Habitat in America boreali. Vicinat radicibus. Cuniculos Talpae more agit subterraneos in terra inculta, variis directionibus.

minutus. 2. S. rostro longissimo, cauda nulla.

Sorex (minutus) rostro longissimo, cauda nulla *Linn. Syst. nat.* 12, *Ip.* 73 n. 2.

Sorex (Pygmaeus) rostro longissimo, pedibus pentadactylis, cauda nulla *Laxm. Sibir. Br.* p. 72.

The minute Shrew *Penn. syn. quadr.* p. 308 n. 237.

Die Zwergmaus *Müll. Naturf.* I p. 301.

Minutum animal, longitudinis 2 poll. ponderis gran. 38. Caput magnitudine fere reliqui corporis: rostro attenuato subtus exarato. Mystaces oculos attingentes. Oculi parvi retractiles. Auriculae dilatatae, breues, fere nudaе. Pedes 5-5. Cauda nulla. Totum corpus pilis tenerrimis nitidum, supra obscure griseum, subtus albicans.

Habitat in Sibiriae locis humidiusculis sub arborum radicibus, nido e lichenibus confecto. Colligit femina; fodit; cito currit; urinatur. Vox vesperilionis.

pufillus. 3. S. auriculis rotundatis, cauda breui subdisticha.

Sorex pufillus *S. G. Gmel. Reis.* III p. 499 *tab.* 75 *fig.* 1.

Longitudo corporis 3 poll. 7 lin. caudae poll. 1 lin. 1.

Rostrum attenuatum. Mystaces canae. Auriculae rotundatae. Dentes primores superiores duo subulati, inferiores quatuor breues, obtusi, truncati. Laniarii supra tres, primo longiore; inferiores duo. Molares vtrinque quatuor. Pedes 5-5. Corpus supra

supra canum, subtus cinereum. Cauda pilis albidis subdisticha.

Habitat in desertis Persiae borealis.

aquaticus. 4. S. plantis palmatis, palmis caudaque breuiore albis.

Talpa virginianus niger, fupinus *Seb. thes. I p. 51 tab. 32 fig. 3?* videtur potius varietas Talpae europaeae.

La Taupe de Virginie: Talpa (virginiana) caudata, nigricans, ex saturate purpureo mixta, pedibus anticis et posticis pentadactylis *Briss. regn. an. p. 283 n. 4.*

Der virginische Maulwurf *Hall. vierf. p. 447?*

Sorex (aquaticus) plantis palmatis, palmis caudaque corpore breuiore albis *Linn. syst. nat. 10, I p. 53 n. 3.*

Taupe de Virginie *Dictioun. anim. IV p. 288.*

Water-Spitsmuis: Spitsmuis met gepalmdede Agterpooten, de Voorpooten en Staart, die korter dant 't Lighaam is, wit *Houtt. nat. hist. II p. 315 tab. 17 fig. 4* Sebae.

Sorex (aquaticus) plantis palmatis, palmis caudaque breuiore albis *Linn. syst. nat. 12, I p. 74 n. 3.*

The brown Mole *Penn. syn. quadr. p. 314 n. 245.*

A Mole from North America *Barrington: Phil. trans. LXI p. 292?*

Die Wassermaus *Müll. Naturf. I p. 302 tab. 17 fig. 4* Sebae.

Longitudo corporis $5\frac{1}{2}$ poll. Corpus cinereum siue fuscum, pilis mollibus, splendentibus. Nasus gracilis. Maxilla superior longior inferiore. Dentes primores supra duo, infra quatuor, intermediis breuissimis. Laniarum vtrinque plures, discreti (Penultimo nulli). Palmae albae, latae, unguibus fortioribus.

tioribus. Pedes postici parui. Digiti 5-5. Cauda gracilis, alba, corporis quarta parte breuior.

Habitat in America septentrionali.

Daubentonii. 5. S. cauda mediocri subnuda, corpore nigricante subtus cinereo, digitis ciliatis.

Vne autre espèce de musaraigne: Musaraigne d'eau Daubenton: *Mém. de l'acad.* 1756 p. 211 tab. I fig. 2.

La Musaraigne d'eau Buff. *hist. nat.* VIII p. 64 tab. II fig. I.

Musaraigne d'eau Bom. *dictionn.* III p. 172.

The Water - Shrew Penn. *syn. quadr.* p. 308 n. 236.

Toparagno acquatico Aless. *quadrup.* III tab. 104 fig. 2 Buff.

Die Wassertspitzmaus Mart. Buff. *vierf.* IV p. 265 tab. 75.

Die Wassertspitzmaus: forex aquaticus Müll. *Natursf. Suppl.* p. 36.

Paullo maior S. Araneo: longitudine corporis $3\frac{1}{4}$ poll, caudae 2 poll. Rostrum longum, gracile, at crassius quam in Araneo. Auriculae minutae. Oculi exigui, pilis occultati. Caput et corpus nigricans supra, gula, pectore et ventre pallide cinereis. Infra caudam macula nigricans triangularis. Cauda subnuda grisea. Mammae decem ventrales. Digiti fissi, ciliati margine pilis rigidis.

Habitat in Europa ad fontes, mane et vesperi; interdiu latet in fissuris rupium et intra terram. Parit vere nouem pullos.

murinus. 6. S. cauda mediocri, corpore fusco, pedibus caudaque cinereis.

Sorex (murinus) cauda mediocri, corpore fusco pedibus caudaque cinereis *Linn. syst. nat.* 12, I p. 74 n. 4.

The murine Shrew *Penn. syn. quadr. p.* 309 n. 238.
Der Maufekopf *Müll. Naturf. I p.* 302.

Corpus magnitudine Muris Musculi. Rostrum elongatum, subtus canaliculatum, cinereum, vibrissis longis. Auriculæ rotundatæ, nudiusculæ. Dentes primores duo acuti, paralleli. Pedes pentadactyli unguiculati. Cauda corpore paullo brevior, minus pilosa.

Habitat in Iava.

Araneus. 7. S. cauda mediocri, corpore subtus albedo.

Mus araneus *Plin. hist. nat. VII c.* 58 (c. 83 *Hard.*)
XXIX c. 4 (c. 27 *Hard.*).

Μογάλης Aelian. anim. II c. 37.

Mus araneus *Agric. an. subtr. p.* 35.

Mus araneus *Gesn. quadrup. p.* 844 cum fig. mediocri.

Mus araneus *Gesn. Schwencckf. zheriotr. p.* 114.

Mus araneus *Aldrov. digit. p.* 441 fig. p. 442 mala.

Mus araneus *Ionst. quadrup. p.* 168 tab. 66 fig. mala.

Mützer, Spitzmaus *Gesn. Thierb. p.* 271 cum fig. mal.

Mus araneus *Charlet. exerc. p.* 25.

Mus araneus *Rai. syn. quadr. p.* 239.

Sorex *Linn. syst. nat. 2 p.* 48.

Sorex *Linn. fn. suec. I p.* 11 n. 33.

Sorex *Linn. syst. nat. 6 p.* 10 n. 1.

Mus Araneus, rostro productiore *Klein. quadrup. p.* 58.

Sorex. The Shrew - mouse *Hill anim. p.* 522.

Sorex vulgaris *Linn. mus. Ad. Frid. I p.* 10.

La Musaraigne: Musaraneus (. . . .) supra ex fusco rufus, infra albicans *Briff. regn. an. p.* 178 n. 1.

- La Musfaraigne *Daubenton: Mém. de l'acad. 1756 p. 211 tab. I fig. I.*
- Sorex *Kram. Austr. p. 317.*
- Die Spitzmaus *Hall. vierf. p. 435.*
- Sorex (Araneus) cauda corpore longiore *Linn. syst. nat. 10, I p. 53 n. 1.*
- Musfaraigne *Dictionn. anim. III p. 202.*
- La Musfaraigne *Buff. hist. nat. VIII p. 57 tab. 10 fig. I.*
- Spitsmuis: Spitsmuis met de Staart langer dan 't Lyf *Houtr. nat. hist. II p. 312 tab. 17 fig. 3.*
- Sorex (Araneus) cauda corpore longiore *Linn. fu. Suec. 2 p. 9 n. 24.*
- The Shrew Mouse *Penn. brit. zool. p. 54 cum fig.*
- Angel - Muus *Pontopp. Dan. I p. 613.*
- Musfaraigne *Bom. dictionn. III p. 172.*
- Sorex (Araneus) cauda mediocri, corpore subtus albedo *Linn. syst. nat. 12, I p. 74 n. 5.*
- The faetid Shrew *Penn. syn. quadr. p. 307 n. 235.*
- Toporagno *Aless. quadr. III tab. 104 fig. 1 Buff.*
- Foetid Shrew *Forster: Philos. trans. LXII p. 380.*
- Die Spitzmaus *Müll. Naturf. I p. 302 tab. 17 fig. 3.*
- Sorex (Araneus) cauda mediocri, corpore subtus albedo *Müll. Dan. prodr. p. 4 n. 19.*
- Die Spitzmaus *Mart. Buff vierf. IV p. 263 tab. 74.*
- Toporagno *Italis.*
- Musfaraigne *Gallis.*
- Musgãño, Musaraña, Raton pequeño *Hispanis.*
- Murganho, Musaranho *Lusitanis.*
- Llygoden goch, Chwistlen, Llyg *Cambrensis.*
- Spitzmaus *Germanis.*
- Spitsmuis *Belgis.*
- Shrew, Shrew mouse *Anglis.*
- Nåbbmus *Suecis.*
- Angel - Muus *Danis.*
- Nebbe - Muus, Musel'kicæ. *Noruegis.*
- Zibak *Lapponibus.*

Paullo minor Musculo, longitudine corporis ad $2\frac{1}{2}$ poll. caudae $1\frac{1}{2}$ poll. Rostrum elongatum, gracile, vibrissatum. Oculi parui, pilis occultati. Auriculae breues, rotundatae. Caput et corpus supra canum vel cinereo-nigricans, venter fordide albus. Cauda pilis breuissimis. Crura breuia, digitis 5-5. nudis. Mammae sex ventrales.

Habitat in Europae siluis, ruderatis, cryptis subterraneis, prope fimeta: est quoque in freto Hudsonis.

Edit femina, insecta, quisquilias. Teter venenumque olens occiditur a Felibus, sed non editur. Parit quatuor ad sex. Morsus venenatus a vulgo creditur. Vox acuta. Paullo lentior Musculo.

brasiliensis. 8. S. Fuscus, dorso striis tribus nigris.

Mus araneus figura muris *Marcgr. Bras. p. 229.*

La Musaraigne du Brésil: Musaraneus (Brasiliensis) fuscus, tribus taeniis in dorso nigris *Briff. regn. an. p. 180 n. 2.*

La Musaraigne de Brasil *Buff. hist. nat. XV p. 160.*

The Brazilian Shrew *Penn. syn. quadr. p. 309 n. 239.*

Die brasilianische Spitzmaus: Sorex americanus *Müll. Naturf. Suppl. p. 36.*

Longitudo corporis 5 pollicum, caudae 2 poll. Nasus acutus. Corpus fuscum, striis dorsi longitudinalibus tribus nigris. Scrotum pendulum.

Habitat in Brasilia. Haud timet catum, neque ab eo laeditur.

moschatus. 9. S. pedibus palmatis, cauda compresso-lanceolata.

Mus aquaticus *Clus. exot. p. 375 cum fig. mediocr.*

Mus aquatilis *Aldrov. digit. p. 447. fig. p. 448 Clus.*

Mus

- Mus aquaticus *Ionst. quadrup. p. 169 tab. 73 fig. Cluf.*
 Mus aquaticus Clusii *Mus. Worm. p. 334.*
 Sorex moscouiticus *Charlet. exerc. p. 25.*
 Mus aquaticus exoticus *Cluf. Rai. syn. quadr. p. 217.*
 Castor cauda lineari plana *Linn. syst. nat. 2 p. 47.*
 Castor cauda longa lanceolata plana *Linn. fu. succ. I*
p. 9 n. 24.
 Die Biesamratte, Castor moschatus *Linn. Westgotb.*
p. 161.
 Castor cauda longa lanceolata plana *Linn. syst. nat.*
6 p. 10 n. 2.
 Glis moschiferus; odore Moschi *Klein. quadrup. p. 57.*
 Mus capite paruo, cauda lata. The broad-tailed
 Mus, with a small head: the Musk-Rat *Hill anim.*
p. 518.
 Mus aquaticus exoticus *Cluf. I. G. Gmelin: Nov. comm.*
petrop. IV p. 383.
 Mus aquaticus moschum redolens *Nov. comm. petrop.*
V tab. 13 fig. bon.
 Le Rat musqué: Castor (Mus moschiferus) cauda
 verticaliter plana, digitis omnibus membranis in-
 ter se connexis *Briff. regn. an. p. 135 n. 3.*
 Die wohlriechende Wasserratte *Hall. vierf. p. 426.*
 Castor (moschatus) cauda longa lanceolata plana
Linn. syst. nat. 10, I p. 59 n. 2.
 Rat musqué *Dictionn. anim. III p. 667.*
 Muskus-Rot: Bever met een lange, platte, Lancets-
 wyze Staart *Houtt. nat. hist. II p. 435.*
 Castor (moschatus) cauda longa compresso-lanceo-
 lata, pedibus palmatis *Linn. fu. succ. 2 p. 11*
n. 28.
 Die Biesem-Ratze an der Wolga *Schober: Müll. Samml.*
VII p. 41.
 Le Desman *Buff. hist. nat. X p. 1 tab. 2.*
 Castor (moschatus) cauda longa compresso-lanceo-
 lata, pedibus palmatis *Linn. syst. nat. 12, I p. 79*
n. 2.

Wychochol, Waffer oder Bifamratze *Rytſchk. Orenb.*
I p. 229.

Die Bifamratze *S. G. Gmelin Reif. I p. 28 tab. 3, 4*
figg. bon.

The longnoſed Beaver *Penn. ſyn. quadr. p. 260 n.*
192.

Desman *Aleſſ. quadrup. III tab. 114 fig. 2* Buff.

Die Bifamratte, *Sorex moſchatus Pallas Reif. I p.*
156.

Die Biberratte *Müll. Naturf. I p. 332.*

Dälman *Suecis:*

Выхохолъ (*Wychochol*), Выхухоль (*Wychuchol'*)
Ruffis.

Longitudo corporis ad 14 poll. cauda corpore paullo
breuior. Naſus elongatus, gracilis, apice ſupra
nigro, ſubtus ruſo. Oculi minutiffimi, pilis albi-
cantibus breuibus cincti. Auriculæ nullæ. Col-
lum breue. Corpus elongatum. Crura antica bre-
viſſima, poſtica paululum longiora, digitis 5-5
palmatis. Cauda lanceolata compreſſa, ſquamis
rotundis tecta, intermixtis pilis breuibus. Caput
et corpus ſupra ex cinereo nigricans, venter ex
cinereo albidus. Pili molliffimi. Veſica ſellea
nulla.

Ex dentium et roſtri figura omnino *Sorex* eſt, non
Caſtor.

Habitat in Lapponia, Ruſſia ad Wolgam alibique, in
caueis litoris, introitu ſub ipſa aqua. Viſcitatur in-
ſectis, vermibus, piſcibus. Moſchum ſpirat prae-
cipue verſus caudam, ex cuius folliculis exprimi
poſteſt moſchus vulgari valde ſimilis ad grana 20.
Editur a piſcibus maioribus, quorum carnem in-
ſicit odore moſchi forti, vt cibo ingratiſſima ſit.
Inceſſus lentus. Coit verno tempore. Vox Muſculi.

Species obscurae.

- * *Mus araneus capensis maximus* *Petiv. gazoph. tab. 23 fig. 9.*

Nasus longissimus. Auriculae magnae. Cauda longitudine corporis.

- ** Eine Art unglaublich kleiner Spitzmäuse *Pallas Reis. II p. 664.*

Minutissimum omnium Quadrupedum, ponderis granorum 30. Magis fuscus Araneo. Cauda crassa, basi tenuiore contracta.

Habitat in Sibiria, ad Ieniseiam alibique ad aquas.

- *** Shrew *Forster: Philos. trans. LXII p. 381.*

Corpus supra obscure griseum, subtus fordide album. Nasus gracillimus. Longitudo corporis ad $2\frac{1}{2}$ poll. caudae $1\frac{1}{4}$ poll. Cauda rarius pilosa, corpori concolor.

Habitat ad Fretum Hudsonis.

15. PTEROPVS.

Dentes Primores IV vtrinque.

Palmae corpore longiores, pollicibus brevissimis, membrana inter digitos expansa et ad crura postica extensa, pro volatu.

Mammae duae pectorales.

Vampyrus. 1. P. ecaudatus, naso simplici, membrana inter femora diuisa.

Vespertilio *Borlippae* *Gesn. av. p. 739.*

- Vespertilio ingens *Clus. exot. p. 94 fig. mediocr.*
 Strange Bats *Argenf. Molucc. p. 158.*
- Vespertilio admirabilis *Bont. Ind. or. p. 68 fig. p. 69*
 pessima.
- Chauvesouris *Dampier voy. II p. 70.*
- Chauve-Souris *Des March. voy. II p. 208.*
- Canis volans ternatana orientalis femina *Seb. thes. I*
p. 91 tab. 57 fig. 1.
- Canis volans mas *Seb. thes. I p. 91 tab. 57 fig. 2.*
- Vespertilio cauda nulla *Linn. syst. nat. 2 p. 45.*
- Der fliegende Hund von Ternate beyderley Geschlechts *Meyer Thiere III tab. 35 fig. Seb.*
- Vespertilio cauda nulla *Linn. syst. nat. 6 p. 7 n. 1.*
- Vespertilio Cynocephalus, Ternatanus *Klein quadrup. p. 61.*
- The great Bat from Madagascar *Edw. birds IV tab. 180.*
- Vespertilio cauda nulla. The Vespertilio, without a tail: The Eagle Bat *Hill anim. p. 564.*
- La Rouffette: Pteropus rufus aut niger, auriculis brevibus acutiuseculis *Briff. regn. an. p. 216 n. 1.*
- La Rouffette à col rouge: Pteropus fuscus, auriculis brevibus acutiuseculis, collo superiore rubro *Briff. regn. an. p. 217 n. 2.*
- Der fliegende Hund *Hall. vierf. p. 452 tab. 28.*
- Vespertilio (Vampyrus) ecaudatus, naso simplici, membrana inter femora diuisa *Linn. syst. nat. 10, I p. 31 n. 1.*
- Chien volant *Dictionn. anim. I p. 616 cum congeneribus.*
- Rouffette *Dictionn. anim. III p. 724.*
- Chien volant *Daubenton: Mém. de l'acad. 1759 p. 384.*
- Rouffette *Daubenton: Mém. de l'acad. 1759 p. 385.*
- Vliegende Hond van Ternate: Vledermuis zonder Staart, met een enkele Neus, het Vlies tusschen

de Beenen verdeeld *Hoult. nat. hist. I p. 407 tab. 8 fig. I* Seb.

La Roulette *Buff. hist. nat. X p. 55 tab. 14.*

La Rougette *Buff. hist. nat. X p. 55 tab. 17.*

Chauvefouris *Bom. dictionn. I p. 510 cum congenerebus.*

Vespertilio (Vampyrus) ecaudatus, naso simplici, membrana inter femora diuisa *Linn. syst. nat. 12, I p. 46 n. 1.*

Die Roulette und Rougette *Berl. Samml. II p. 423 cum figg. Buff.*

The Ternate Bat *Penn. syn. quadr. p. 359 n. 274.*

The lesser Ternate Bat *Penn. syn. quadr. p. 362 n. 274 β. tab. 31 fig. 1.*

Pipistrelli americani *Aless. quadrup. III tab. 108 fig. Buff.*

Der fliegende Hund *Müll. Naturf. I p. 152 tab. 8 fig. 1* Seb.

Der Blutfäuger: Vespertilio Vampyrus *Schreb. Sängth. I p. 153 n. 1 tab. 44 fig. Buff.*

Corpus magnitudine Sciuri. Dentes primores vtrinque quatuor, erecti, obtusiusculi. Laniarii superiores solitarii, antice ab inferiore dente sulcati. Inferiores bini, cum dente primore paruo obtuso inter vtrosque. Molares obtusiusculi, quinque vtrinque, supra primo maiore, reliquis ordine decrefcentibus. Oculi magni. Membrana nictitans in cantho oculi maiore. Auriculae breues, acutiufculae. Nares vix diuifae. Lingua acuta, papillis

PTEROPI cum *Vespertilionibus*, a quibus differunt dentium numero rostroque longiore, conueniunt praeter membranam volitantem rictu oris ingente, dentibus acutis, collo breuiufculo, pectore musculofo, digitis palmarum muticis; exceptis paucis, in quibus primus digitus vnguinaus est. Plantae digitis quinque breuibus, aequalibus, vnguinais.

pillis aculeatis terminata. Palmarum digitus primus separatus, unguiculatus; secundus membranae affixus. Plantae fissae, unguiculatae, digitis quinque, calcaneis postice exeuntibus in subulata cartilagine, membranae annexam. Ungues fortes, arcuati. Cauda nulla. Penis ingens, propendens. Caput obscure ferrugineum. Collum, humeri et corpus subtus pallidius rufa. Dorsum pilis brevioribus, nigricantibus, mollibus. Membrana volatilis nigricans, inter femora diuisa. Aest variat color, alii toti rufo-fusci, alii nigricantes.

Habitat in Guinea, Madagascar, insulisque omnibus in oceano indico. Gregarium animal, aerem obscurans, dum volat, ob copiam, apum examinis instar arboribus adhaerens.

Victitat fructibus. Dicitur et piscari. Inebriat se succo palmarum. Pinguescit valde, carne Indis expetita. Vox fortissima. Vehementer mordet. Fetet. Forte *Harpyia veterum*.

Varietas triplex:

- α. La Rouffette *Buffonii*, Chièn volant *Daubentonii*. Hanc pinxit *Edwardsius*. Corpore rufo.
- β. La Rougette *Buffonii*, la Rouffette *Daubentonii*: paullo minor praecedente, rostro acutiore, corpore fusco-griseo, collari fuluo, fere aurantio.
- γ. The lesser Ternate Bat *Pennanti*: minor prioribus, colore stramineo.

Spectrum. 2. P. ecaudatus, naso infundibuliformi lanceolato.

Arboribus inhaerent in calidioribus, in frigidioribus latent interdum rimis rupium, murorum etc. penduli ex pedibus posticis vel ex pollice palmarum; vespere euolant. Victitant praecipue insectis. Monogami.

Andira aca Brasiliensibus *Manegr. Bras. p. 213.*

Andira guacu *Pis. Ind. p. 290.*

Vespertilio rostro appendice auriculae forma donato
Sloan. Jam. II p. 330.

Canis volans maxima aurita femina ex noua Hispania
Seb. thes. I p. 92 tab. 58 fig. 1.

Murcielago carniceiro *Gum. Orin. II p. 223.*

Chauve-souris *Condarn. voy. p. 171.*

Les Chauvefouris *Vlloa voy. I p. 53.*

Die größte fliegende Hündinn aus Neuspanien *Meyer
Thiere III tab. 36 fig. Seb.*

The Cave-Bat *Hugh. Barb. p. 68.*

Vespertilio Cynocephalus, maximus, auritus, ex noua
Hispania *Klein. quadrup. p. 62.*

La Roufette à longues oreilles: Pteropus auriculis
longis, patulis, naso membrana antrorsum inflexa
aucto *Briff. regn. an. p. 217 n. 3.*

The Bat: Vespertilio minor angulis et extremitati-
bus alarum unguiculis uncinatis ornatis *Brown.
Jam. p. 486.*

Der größte fliegende Hund mit Ohren *Hall. vierf. p.
453.*

Vespertilio (Spectrum) ecaudatus, naso infundibu-
liformi lanceolato *Linn. syst. nat. 10, I p. 31 n. 2.*

Vliegende Hond van Nieuw Spanje: Vledermuis
zonder Staart, met een treyterswyze Neus, die
gelancet is *Houtt. nat. hist. I p. 408 tab. 8 fig. 2
Seb.*

Le Vampire *Buff. hist. nat. X p. 55.*

Andira-guachu *Bon. dictionn. I p. 112.*

Vespertilio (Spectrum) ecaudatus, naso infundibu-
liformi lanceolato *Linn. syst. nat. 12, I p. 46 n. 2.*

Surinamische Fledermäuse *Berl. Samml. I p. 53.*

Der Vampyr *Berl. Samml. II p. 423.*

The Spectre Bat *Penn. syn. quadr. p. 362 n. 275.*

Der Flatterer *Müll. Naturf. I p. 153 tab. 8 fig. 2
Seb.*

Die Trichternase: *Vespertilio Spectrum Schreb*
Singth. I p. 159 n. 3 tab. 45 fig. Seb.

Longitudo corporis $5\frac{1}{2}$ poll. Nasus elongatus, antice appendice longa infundibuliformi siue conica erecta, superne in foliolum lanceolatum adscendente. Auriculae ouatae, interius lacinia sabulata membranacea, longitudine auriculae. Laniarii solitarii, magni, approximati reliquis. Molares anteriores breuiores, obtusiores. Palmarum pollex breuis, ungue arcuato extra membranam: Digiti quatuor membrana connexi. Plantae digitis quinque aequalibus, unguibus arcuatis. Cauda nulla. Membrana inter femora non diuisa. Corpus pilis cinereis longioribus. Membrana fibris ramosis.

Habitat in America australi, Palmis inhaerens. Valde pinguescit.

Sanguinem dormientium noctu haurit haec, et praecedens forte, alis flabelli instar ventos incundissimos mouens, ne expergefiant.

Spasma. 3. P. ecaudatus, naso foliato obcordato.

Glis volans ternatanus *Seb. thes. I p. 90 tab. 56 fig. I.*
Vespertilio caudatus, naso foliato obuerse cordato
Linn. syst. nat. 2 p. 45.

Die fliegende Ratz von Ternate *Meyer Thiere III tab. 39 fig. Seb.*

Vespertilio caudatus, naso foliato obuerse cordato
Linn. syst. nat. 6 p. 7 n. 5.

Vespertilio Rattus Ternatanus Klein. quadrup. p. 61.

Vespertilio caudatus naso foliato obuerse cordato. The tailed *Vespertilio*, with a foliated and obuersely cordated nose: The flying Mouse *Hill anim. p. 565.*

La grande Chauve-fouris de Ternate: Vespertilio (maior Ternatanus) subrufus, pedibus omnibus pentadactylis, auriculis duplicibus, naso gemino *Briff. regn. an. p. 226 n. 4.*

Die fliegende Ratte *Hall. vierf. p. 451 tab. 27 B.*

Vespertilio (Spasma) caudatus, naso foliato obcordato *Linn. syst. nat. 10, I p. 32 n. 4.*

Vliegende Rot van Ternate: Vledermuis zonder Staart, de Neus bladerig in de gedaante van twee Harten, 't een met de punt in 't ander *Houtt. nat. hist. I p. 409 tab. 8 fig. 4 Seb.*

Vespertilio cauda nulla: naso foliato: auriculis maximis appendiculatis *Gronov. zooph. I p. 7 n. 27.*

Vespertilio (Spasma) ecaudatus, naso foliato obcordato *Linn. syst. nat. 12, I p. 47 n. 4.*

The cordated Bat *Penn. syn. quadr. p. 364 n. 278.*

Die fliegende Ratze *Müll. Naturf. I p. 154 tab. 8 fig. 4 Seb.*

Die Herznase: Vespertilio Spasma *Schreb. Säugth. I p. 158 n. 2 tab. 48 fig. Seb.*

Longitudo corporis 4 poll. latitudo extenti 12 poll. Dens lanarius vtrinque vnicus supra et infra, molares vtrinque sex. Auriculae longae lataeque, ouatae, erectae, intus appendice foliacea complicata lata. Nasus apice membrana cordiformi instructus. Cauda nulla. Membrana inter femora postica. Color faciei pallide rufus, corporis pallidior.

Habitat in Ceylona, Ternate.

hastatus. 4. P. ecaudatus nigricans, naso foliato hastato.

La Chauve-fouris d'Amérique: Vespertilio (americanus) murini coloris, pedibus anticis tetradactylis. posticis pentadactylis, naso cristato *Briff. regn. an. p. 228 n. 6.*

La chauve-fouris fer-de-lance *Buff. hist. nat. XIII*
p. 226 tab. 33.

Vespertilio hastatus *Pallas spicil. III p. 7.*

The Iavelin Bat *Penn. syn. quadr. p. 363 n. 276.*

Pipistrello ferro di lancia *Aless. quadrup. tab. 166 fig.*
 I Buff.

Die Kleeblattnase: Vespertilio hastatus *Schreb. Säugth.*
I p. 161 n. 5 tab. 46 B fig. Buff.

Die Kleeblattnase *Müll. Naturf. Suppl. p. 14.*

Longitudo corporis $3\frac{1}{2}$ poll. Nasi foliolum angustius
 margine narium, simileque folio trifolii absque
 petiolo. Auriculae capite breuiores, cum lacinia
 interiore acuta. Color e fusco nigricans.

Habitat in America australi.

perspicillatus. 5. P. subcaudatus rufus, naso foliato plano
 acuminato.

Vespertilio americanus vulgaris *Seb. thes. I p. 90 tab.*
55 fig. 2.

Vespertilio caudatus, naso foliato acuminato *Linn.*
syst. nat. 2 p. 45.

Vespertilio caudatus, naso foliato acuminato *Linn.*
syst. nat. 6 p. 7 n. 4.

Vespertilio Americanus vulgaris, longioribus auricu-
 lis, et e naso erecta cristula *Klein. quadrup. p. 61.*

Vespertilio caudatus naso foliato acuminato. The
 tailed Vespertilio, with a foliated, acuminated nose
Hill anim. p. 564.

Vespertilio (perspicillatus) ecaudatus naso foliato
 acuminato *Linn. mus. Ad. Frid. I p. 7.*

Die gemeine amerikanische Fledermaus *Hall. vierf.*
p. 541.

Vespertilio (perspicillatus) ecaudatus, naso foliato
 plano acuminato *Linn. syst. nat. 10, I p. 31 n. 3.*

Gebrilde Vledermuis: Vledermuis zonder Staart, met een bladerige vlakke gefcherbte Neus *Houtt. nat. hist. I p. 409 tab. 8 fig. 3* Seb.

Vespertilio (perispicillatus) ecaudatus, naso foliato plano acuminato *Linn syst. nat. 12, I p. 47 n. 3.*

Brillnase *Müll. Naturf. I p. 154 tab. 8 fig. 3* Seb.

Die Schaufelnase: Vespertilio perispicillatus *Schreb. Säugth. I p. 160 n. 4 tab. 46 A fig. propria.*

Minor praecedente, cui similis. Longitudo corporis $2\frac{1}{2}$ poll. Os breue, latum, quasi truncatum, atque in hoc segmento nares angusto marginatae; supra foliolum figura folii Teucris Mari, obtusius quam in antecedente. Auriculae longitudine capitis, rotundatae, angustiores quam in P. hastato, lacinia interiore breuiore obtusioreque. Cauda breuis, intra membranam. Membrana finuata ad caudam. Color animalis rufus.

Habitat in America australi.

foricinus. 6. P. subecaudatus canus, naso foliato ovali acuminato.

Small Bat *Edw. birds IV tab. 201 fig. 1.*

Feuille *Daubenton: Mém. de l'acad. 1759 p. 388.*

Vespertilio cauda breuissima: naso foliato, acuminato: auriculis subsimplicibus rotundatis *Gronov. zooph. I p. 7 n. 26.*

Une autre chauve-fouris *Buff. hist. nat. XIII p. 227.*

Vespertilio foricinus *Pallas miscell. p. 51 tab. 5.*

Vespertilio foricinus *Pallas spicil. III p. 24 tab. 3.*

Der Vampyr *Berl. Samml. II fig. Pallas.*

The leaf Bat *Penn. syn. quadr. p. 364 n. 277.*

Die Sperrnase: Vespertilio foricinus *Schreb. Säugth. I p. 161 n. 6 tab. 47. fig. Pall.*

Die Sperrnase *Müll. Naturf. Suppl. p. 14.*

Longitudo corporis ultra 2 poll. Rostrum conicum, longius acutiusque quam in praecedentibus. Nares marginatae, cum foliolo ovali, acuminato. Lingua cylindrica, acuta, papillis aculeatis. Auriculae parvae, rotundatae, lacinia interiore minuta, femirotunda. Cauda breuissima. Color murinus subrufus, subtus albicans: mares autem supra magis rufescunt, subtus magis grisei sunt ac feminae. Dentes primores nullos habet secundum Daubentonium.

Habitat in Iamaica, Surinamo, reliqua australi America, nec non ad Senegal fluvium, in caueis silvarum, quas stercore nitroso replet.

leporinus.

7. P. caudatus, labio superiore fisso.

Vne Chauve-Souris de la vallée d'Ylo *Feuill. Iouru.* II p. 623.

Vespertilio cato similis americanus mas *Seb. thes. I* p. 89 tab. 55 fig. 1.

Vespertilio caudatus, labio superiore bifido *Linn. syst. nat. 2* p. 45.

Die einer Katze ähnliche americanische Fledermaus, das Männlein *Meyer Thiere III* tab. 40 fig. Seb.

Vespertilio caudatus, labio superiore bifido *Linn. syst. nat. 6* p. 7 n. 3.

Vespertilio Americanus, capite globoso; ore leporino *Klein. quadrup. p. 61.*

Vespertilio caudatus labio superiore bifido. The tailed Vespertilio, with the upperlip bifid *Hill. anim.* p. 564.

Vespertilio (leporinus) caudatus, labio superiore bifido *Linn. mus. Ad. Frid. I* p. 7.

La Chauve-souris rousse d'Amérique: Vespertilio (americanus rufus) dilute rufus, pedibus anticis tetradactylis, posticis pentadactylis *Briff. regn. an. p. 227* n. 5.

Die

Die fliegende Katze *Hall. vierf. p. 450.*

Vespertilio (leporinus) caudatus, labio superiore bifido *Linn. syst. nat. 10, I p. 32 n. 5.*

Gestaarte Vledermuis, met de Bovenlip in tweeën gespleeten *Houtt. nat. hist. I p. 410.*

Noctilio (americanus) labio inferiore varicoso *Linn. syst. nat. 12, I p. 88 n. 1.*

Vespertilio leporinus *Pallas spicil. III p. 8.*

The peruvian Bat *Penn. syn. quadr. p. 365 n. 279.*

Amerikanische katzenartige Fledermaus *Müll. Naturf. I p. 361.*

Die Fledermaus mit der Hafenscharte: Vespertilio leporinus *Schreb. Säugth. I p. 162 n. 7 tab. 61 fig. propr.*

Die Hafenscharte *Müll. Naturf. Suppl. p. 15.*

Magnitudo Ratti mediocris. Longitudo extensi 2 ped. 5 poll. Caput rotundatum, fere Canis fricatoris. Auriculae magnae, acuminatae, nudaе. Oculi minuti, nigri. Labium superius diuisum, inferius varicosum lacunis tribus. Dentes primores superiores quatuor: interioribus maioribus, conicis; exterioribus minutissimis, remotiusculis, obtusis. Inferiores duo? didymi, retusi, laniariis? approximati, nisi hi ipsi sint primores. Nares prominulae, cylindricae, approximatae. Cauda membrana breuior, longitudine dimidia corporis. Color ferrugineo - griseus, cum stria albicante in dorso.

Habitat in America australi.

Varietatem β *habet Pennantus, minorem, longitudine corporis 5 poll. capite magno, labiis pendulis, superiore diuiso, naso bilobato, auriculis rectis angustis longis acuminatis, cauda breui, vnguibus plantarum magnis curuatis compressis, membrana nigri-*

nigricante valde tenui, capite dorsoque fuscis, ventre cinereo.

Habitat in Peru.

16. VESPERTILIO.

Dentes Primores supra et infra numero inaequales, variantes.

Palmae corpore longiores, pollicibus brevissimis, membrana inter digitos expansa et ad crura postica extensa, pro volatu.

Mammae duae pectorales.

a) *Dentibus primoribus supra quatuor, infra sex.*

auritus. I. V. naso oreque simplici, auriculis capite maioribus.

La Sourichauue *Belon. ois. p. 146.*

Nictæris en grec Vespertilio en latin *Belon. ois. fig. p. 147* mediocr.

Vespertilio *Aldrov. ornith. I p. 571 fig. p. 575* mal.

Vespertilio *Ionst. av. p. 49 tab. 20 fig. inferior, mediocr.*

Vespertilio *Mus. Worm. p. 308.*

Die Fledermaus Vespertilio la Chauve Souris *Frisch Vogel tab. 103 fig. mediocr.*

The Batt or Flutter-Mouse *Albin birds III p. 95.*

The

- - - - - minimam pro corpore vocem
Emittunt, peraguntque leues stridore querelas;
Tectaque, non silvas celebrant, lucemque perosae
Noctæ volant, seraque trahunt a vespere nomen.

OVID.

- The double eared Bat *Albin birds III tab. 101.*
- Vespertilio minor vulgaris *Klein. quadrup. p. 61.*
- Long-eared Bat *Edw. birds IV tab. 201 fig. 3.*
- La petite Chauve-fouris de nôtre pays: Vespertilio (minor) murini coloris, pedibus omnibus penta-dactylis, auriculis duplicibus *Briff. regn. an. p. 226 n. 3.*
- Vespertilio (auritus) caudatus, naso oreque simplici, auriculis duplicatis capite maioribus *Linn. syst. nat. 10, I p. 32 n. 6.*
- Chauve-fouris *Dictionn. anim. I p. 509 cum congeneribus.*
- L'oreillar *Daubenton: Mém. de l'acad. 1759 p. 379 tab. I fig. 2 capitis.*
- La seconde espece, la chauve-fouris à grandes oreilles, l'oreillar *Buff. hist. nat. VIII p. 118 tab. 17, fig. 1.*
- Gestaarte Vledermuis, met enkele Neus en Bek, de Ooren dubbeld en grooter dan de Kop *Houtt. nat. hist. I p. 410 tab. 8 fig. 5.*
- Vespertilio (auritus) naso oreque simplici, auriculis duplicatis capite maioribus *Linn. fn. suec. 2 p. 2 n. 3.*
- Vespertilio caudatus, naso simplici; auriculis maximis inappendiculatis *Gronov. zooph. I p. 6 n. 23.*
- The long-eared Bat *Penn. brit. zool. p. 56.*
- Vespertilio (auritus) caudatus, naso oreque simplici, auriculis duplicatis capite maioribus *Linn. syst. nat. 12, I p. 47 n. 5.*
- The long-eared Bat *Penn. syn. quadr. p. 371 n. 292.*
- Orecchione *Aless. quadrup. III tab. 110 fig. 1 Buff.*
- Langohr *Müll. Naturf. I p. 154 tab. 8 fig. 5 Houtt.*
- Die langöhrlige Fledermaus: Vespertilio auritus *Schreb. Säugth. I p. 163 n. 8 tab. 50 fig. Buff. et Daubent.*
- Vesper-

VESPERTILIONVM incessus singularis ob pedum structuram. In frigidioribus hibernant gregarii in caueis et ruderatis.

Vespertilio (auritus) caudatus, naso oreque simplici, auriculis duplicatis, capite maioribus *Müll. Dan. prodr. p. 4 n. 22.*

Longitudo corporis ad 2 poll. Rostrum elongatum, acutum. Nasus simus. Oculi parvi, rotundi. Pili longiores molles supra oculos. Auriculae fere longitudine corporis, ovales, tenues, fere pellucidae, rotundatae, in fronte coalitae, cum valvula siue lacinia interiore maiore, forte pro somno. Fissura in membrana ad digitum palmarum secundum et tertium. Cauda longitudine corporis, apice paullulum extra membranam prominente. Color e flavo canus, subtus ex flavescente albidoque griseus. Membrana subtus cinerea.

Habitat in Europa, vespera volans. Visitat phalaenis aliisque nocturnis insectis; penarias cellas intrat arroditque lardum aliaque varia. Saltans quasi volat. Parit duo. Hibernat in caueis, ruderatis, cauis arboribus gregatim, pedibus posticis inspensus, alis obvoluto corpore. Cibus strigum. Vox debilis.

murinus. 2. V. naso oreque simplici, auriculis longitudine capitis:

Nouregis Arist. hist. anim. I c. 2 n. 12. c. 6 n. 46.

Vespertilio *Plin. hist. nat. X c. 61 (c. 81 Hard.) XI c. 37 (62 Hard.) c. 39 (c. 94, 95 Hard.)*

Vespertilio *Agric. an. subtr. p. 24, 25.*

Vespertilio *Aldrov. ornith. I p. 571 fig. p. 574 mal.*

Vespertilio *Ionst. av. p. 49 tab. 20 figg. mediae mediocr.*

Vespertilio *Charler. exerc. p. 80.*

Vespertilio *Rai. syn. quadr. p. 243.*

Die Fledermaus, Vespertilio, la Chauve Souris *Frisch Vogel tab. 102 mediocr.*

Vespertilio caudatus, naso oreque simplici *Linn. syst. nat.* 2 p. 45.

Vespertilio caudatus, naso oreque simplici *Linn. fn. suec.* 1 p. 7 n. 18.

Eine Fledermaus *Meyer Thiere I tab.* 3 fig. mediocr
Vespertilio caudatus, naso oreque simplici *Linn. syst. nat.* 6 p. 7 n. 2.

Small Bat *Edw. birds IV tab.* 201 fig. 2.

Vespertilio maior vulgaris *Klein. quadrup.* p. 61.

Vespertilio caudatus, ore nasoque simplici. The Vespertilio, with a tail and with the mouth and nose simple: the Bat *Hill anim.* p. 563.

La grande Chauve-fouris de nôtre pays: Vespertilio (maior) murini coloris, pedibus omnibus pentadactylis, auriculis simplicibus *Briff. regn. an.* p. 224 n. 1.

Vespertilio caudatus, ore nasoque simplici *Kram. Austr.* p. 314.

Die gemeine Fledermaus *Hall. vierf.* p. 449.

Vespertilio (murinus) caudatus, naso oreque simplici, auriculis capite minoribus *Linn. syst. nat.* 10, I p. 32 n. 7.

La chauve-fouris *Daubenton: Mém. de l'acad.* 1759 p. 378 tab. 1 fig. 1 capitis.

La chauve-fouris commune, ou la chauve-fouris proprement dite *Buff. hist. nat.* VIII p. 118.

La chauve-fouris *Buff. hist. nat.* VIII tab. 16 fig. 1, 2.

Gestaarte Vledermuis, met enkele Neus en Bek, de Ooren kleiner dan de Kop *Houtt. nat. hist.* I p. 411 tab. 8 fig. 6.

Vespertilio (murinus) caudatus, naso oreque simplici, auriculis capite minoribus *Linn. fn. suec.* 2 p. 1 n. 2.

The short-eared Bat *Penn. brit. zool.* p. 55 cum fig. Seb.

Flagermus *Pontopp. Dan.* I p. 612.

Vespertilio (murinus) caudatus, naso oreque simplici, auriculis capite minoribus *Linn. syst. nat. 12, I p. 47 n. 6.*

The common Bat *Penn. syn. quadr. p. 371 n. 291.*

Mauseohr *Müll. Naturf. I p. 154 tab. 8 fig. 6* Houtt.

Die gemeine Fledermaus: Vespertilio murinus *Schreb.*

Singtb. I p. 165 n. 9 tab. 51 figg. Buff. et Daubent.

Vespertilio (murinus) caudatus, naso oreque simplici, auriculis capite minoribus *Müll. Dan. prodr. p. 4 n. 21.*

Nottolo, Nottola, Sportiglione, Vispistrello, Vilpestrello, Pipistrello *Ital.*

Murcielago, Morcielago, Murciegalo, Murceguillo *Hispan.*

Morcego *Lusitan.*

Chauve-fouris *Gallis.*

Ystlum *Cambrensibus.*

Fledermaus, Speckmaus *Germanis.*

Vledermuys *Belgis.*

Bat, Flittermouse, Rearmouse, Reremouse *Anglis.*

Läderlapp, Flädermus *Suecis.*

Naitblacka *Smolandis.*

Flaggermuus, Aftenbakke *Danis.*

Skind-Vinge *Noruegis.*

Nietopersz *Polonis.*

Нетопырѣ (Netopyr), Лепучая Мышь (Letuczaja mysch') *Russis.*

Kanatile-Tskan *Tataris.*

Omokolotsh *Tungusis.*

Irmisch *Burätis.*

Tschongischtsche-Kotja *Tscheremiffis.*

Sonatli Schüfchi *Tschuwafchis.*

Kédi-Milaù *Morduanis.*

Kúschhort *Permice.*

Kubort *Sirjänice.*

Maior praecedente, longitudine corporis $2\frac{1}{2}$ poll. Rostrum longum, largiusculum, crassius quam in aurito. Maxilla inferior prominens extra superiorem. Oculi minuti. Auriculae longitudine capitis, rotundatae, valvulis angustis, acuminatis, auricula dimidia breuioribus. Cauda fere longitudine corporis, tota intra membranam. Color corporis murinus subrufus, subtus pallide griseus, rostro ex flauo griseo, auricularum apicibus et membrana volitante fuscis.

Dentes primores supra 4 sunt, infra 6; at secundum Linneum inuerso ordine supra 6 acuti, distantes, inferiores 4 acuti contigui. Laniarii superiores duo, anteriore maiore; inferiores tres, antico maximo. Molares vtrinque tres tricuspидati.

Habitat in Europa. Noctu volat. Foetet. Victitat imprimis phalaenis, praedatur a Strigibus. De terra non euolat.

Hibernat in cauis arboribus, intra muros, in rudertis, e pedibus posticis pendulus alis inuolutus. Parit duo.

Noctula. 3. V. naso oreque simplici, auriculis capite brevioribus, corpore cano.

Vespertilio *Gesn. av. p. 733 cum fig. mal.*

Vespertilio *Aldrov. ornith. I p. 571 fig. p. 576 mal.*

La noctule *Daubenton: Mém. de l'acad. 1759 p. 380 tab. 2 fig. 1 capitis.*

La Noctule *Buff. hist. nat. VIII p. 118, 128 tab. 18 fig. 1.*

The Noctule Bat *Penn. syn. quadr. p. 369 n. 287.*

Die Speckmaus: Vespertilio Noctula *Schreb. Säugth. I p. 166 n. 10 tab. 52 fig. Buff. et Daubent.*

Die Speckmaus: *Vespertilio lardarius Müll. Naturf. Suppl. p. 15.*

Magnitudo V. murini. Rostrum brevius. Nasus subbilobatus. Frons minus conuexa. Oculi minuti, remotissimi. Auriculae breviores quam in murino, at latae, rotundatae, valvula parua, lata, rotundata. Verruca parua in mento. Pedes breviores. Cauda tota intra membranam. Corpus ex rufo cinereum, subtus pallidius, sed nasus, auriculae, membranaque cum pedibus splendide nigra.

Habitat in Gallia vulgaris, in Anglia, Germania.

Alte volat, non prope terram. Maxime foetet.

serotinus. 4. V. naso oreque simplici, auriculis capite minoribus, corpore ferrugineo.

La serotine *Daubenton: Mém. de l'acad. 1759 p. 380 tab. 2 fig. 2* capitis.

La Serotine *Buff. hist. nat. VIII p. 119, 129 tab. 18 fig. 2.*

The serotine *Bat Penn. syn. quadr. p. 370 n. 288.*

Serotina *Aless. quadrup. III tab. 110 fig. 2.*

Die blasse Fledermaus: *Vespertilio serotinus Schreb.*

Säugth. I p. 167 n. 11 tab. 53 fig. Buff. et Daubent.

Die blasse Fledermaus *Müll. Naturf. Suppl. p. 16.*

Paullo minor murino. Rostrum elongatum. Auriculae breues, at basi latae. Valvulae parvae, rotundatae. Corpus supra ferrugineo-fuscum, subtus pallidius. Membrana nigricans. Cauda longitudine fere corporis.

Habitat in Gallia atque Germania.

Pipistrel-5. V. naso oreque simplici, auriculis longitudine
lus. capitis, corpore subtus nigricante.

La pipistrelle *Daubenton*: *Mém. de l'acad.* 1759 p. 381
tab. 1 fig. 3 capitis.

La Pipistrelle *Buff.* *hist. nat.* VIII p. 119, 129 tab.
19 fig. 1.

The pipistrelle *Bat Penn. syn. quadr.* p. 370 n. 289.

Pipistrello *Aless. quadrup.* III tab. 107 fig. *Buff.*

Eine Art kleiner Fledermäuse *Pallas Reis.* I p. 41.

Die Zwergfledermaus: *Vespertilio Pipistrellus Schreb.*

Säugth. I p. 167 n. 12 tab. 54 fig. *Buff.* et *Daubent.*

Die Zwergfledermaus *Müll. Naturf. Suppl.* p. 16.

Omnium minimus, longitudine corporis circiter $1\frac{1}{2}$
poll. Rostrum breue. Labium superius tumidum
ad latera. Oculi parui, profundi. Auriculae capite
vix longiores, ouatae, latae, valvulis minutis,
obtusis. Frons pilis longis. Cauda vix longitudine
corporis, tota intra membranam. Color corporis
supra ex flauo fuscus, subtus nigricans, apicibus
pilorum flauis. Nasus, labia, auriculae, pedes,
cauda, cum membrana volitante nigricantia.

Habitat in Gallia, Germania, passimque in Europa.

Odor ingratus debilior. Vox minima.

Barbastel-6. V. buccis barbatis, auriculis longioribus fron-
lus. tem tegentibus.

La barbastelle *Daubenton*: *Mém. de l'acad.* 1759 p.
381 tab. 2 fig. 3 capitis.

La Barbastelle *Buff.* *hist. nat.* VIII p. 119, 130 tab.
19 fig. 2.

The Barbastelle *Bat Penn. syn. quadr.* p. 370 n. 290.

Das Kurzmaul: *Vespertilio Barbastellus Schreb. Säugth.*

I p. 168 n. 13 tab. 55 fig. *Buff.* et *Daubent.*

Das Kurzmaul *Müll. Naturf. Suppl.* p. 17.

Longitudo corporis 2 poll. Rostrum breuissimum. Buccae tumidae, valde pilosae. Nasus planus. Auriculae longae lataeque, supra rotundatae, marginibus interioribus approximatis, vt frontem tegant; valvulis longitudine dimidia auricularum. Oculi fere in auriculis, minuti. Cauda corpore paululum breuior, nonnihil prominens extra membranam. Corpus supra nigro-fuscum, subtus griseo-fuscum. In dorso pili longiores.

Habitat in Gallia.

hispidus. 7. V. auriculis longitudine capitis, fronte fulcata longius pilosa.

Le campagnol - volant *Daubenton: Mém. de l'acad. 1759 p. 387.*

Autre chauve-fouris *Buff. hist. nat. X p. 88.*

Chauve-fouris étrangere *Buff. hist. nat. X tab. 20 fig. 1, 2.*

The bearded Bat *Penn. syn. quadr. p. 367 n. 282.*

Die Bartfledermaus: Vespertilio hispidus *Schreb. Säugth. I p. 169 n. 14 tab. 56 fig. Buff.*

Die Bartfledermaus *Müll. Naturf. Suppl. p. 17.*

Longitudo corporis $1\frac{1}{2}$ poll. Rostrum longum, valde depressum sub fronte. Cartilago nasi fere nulla. Nares in sulco peculiari, cuius margo exterior quasi auritus, continuato vsque in frontis fossam nudam profundamque, margine pilis longioribus obuallato. Auriculae longae angustaeque. Cauda fere longitudine corporis. Caput et corpus supra rufo-fuscum, subtus fordide ex flauo album.

Habitat circa Senegal flumina.

b) *Dentibus primoribus supra quatuor, infra octo.*

pietus. 8. V. auriculis longitudine capitis, membrana volitante nigro striata.

Vespertilio ternatana femina *Seb. thes. I p. 91 tab. 56 fig. 2.*

Vespertilio ternatanus mas *Seb. thes. I p. 91 tab. 56 fig. 3.*

Vespertilio Rattus Ternatanus *Klein. quadr. p. 61?*

La petite Chauve-souris de Ternate: Vespertilio (minor Ternatanus) rufus, pedibus omnibus pentadactylis, auriculis simplicibus *Briff. regn. an. p. 226 n. 2.*

Die asiatische Fledermaus *Hall. vierf. p. 452 tab. 27 A.*

Le muscardin-volant *Daubenton: Mém. de l'acad. 1759 p. 388.*

Vespertilio caudatus, naso simplici; auriculis infundibuliformibus appendiculatis *Gronv. zooph. I p. 7 n. 25.*

Autre chauve-souris *Buff. hist. nat. X p. 92 tab. 20 fig. 3.*

Vespertilio pictus *Pallas spicil. III p. 7.*

The striped Bat *Penn. syn. quadr. p. 368 n. 284.*

Die Fledermaus mit bunten Fittigen: Vespertilio pictus *Schreb. Säugth. I p. 170 n. 15 tab. 49 fig. Buff.*

Der Buntflügel *Müll. Naturf. Suppl. p. 17.*

Kiriwula Ceylonensis.

Longitudo corporis 2 - 2½ poll. Rostrum breue. Auriculæ longitudine capitis, latae, ovato-acuminatae, antorsum versae, margine exteriori sinuatae; valvulis angustis, filiformibus, auricula dimidia brevioribus. Cauda longitudine corporis, tota intra membranam. Corpus supra rufo-fuscum, subtus

subtus sordide albidum. Membrana fusca siue nigricans, segmentis singulis pallide marginatis. Laniarii solitarii, molares sex vtrinque.

Habitat in Ceylona et Moluccis.

c) *Dentibus primoribus supra duobus, infra sex.*

Nigrita. 9. V. auriculis breuioribus, caudae apice extra membranam prominente, valuulis aurium acuminatis.

Marmotte - volante *Daubenton: Mém. de l'acad. 1759*
p. 385.

Vne Chauve-fouris *Buff. hist. nat. X p. 82.*

Chauve-fouris étrangere *Buff. hist. nat. X tab. 18.*

The Senegal Bat *Penn. syn. quadr. p 366 n. 281.*

Die spitzöhrige Fledermaus: *Vespertilio Nigrita Schreb.*

Säugth. I p. 171 n. 16 tab. 58 fig. Buff.

Das Spitzohr: *Vespertilio Marmotte Müll. Naturf.*

Suppl. p. 18.

Longitudo corporis 4 poll. Caput oblongum. Nasus crassus, apice subacutus. Auriculae breues, acuminatae, valuulis angustis, auricula dimidia breuioribus acuminatis. Cauda longitudine 3 poll., apice extra membranam prominente. Corpus supra canum, subtus pallidius, membrana nigricans. Laniarii solitarii, molares quatuor vtrinque. Primores inferiores lobati.

Habitat circa Senegal fluuium.

d) *Dentibus primoribus supra duobus, infra quatuor.*

Moloffus. 10. V. auriculis breuioribus, valuulis rotundatis, labiis pendulis.

Le mulot-volant. *Daubenton: Mém. de l'acad. 1759*
p. 387.

Autre chauve-souris *Buff. hist. nat. X p. 84.*

Chauve-souris étrangere *Buff. hist. nat. X tab. 19*
fig. 1.

Autre chauve-souris *Buff. hist. nat. X p. 87.*

Chauve-souris étrangere *Buff. hist. nat. X tab. 19*
fig. 2.

Vespertilio Molossus *Pallas spicil. III p. 8 tab. 4 fig. 11*
cranii.

The bull-dog Bat *Penn. syn. quadr. p. 366 n. 280.*

Die hundsmäulige Fledermaus: Vespertilio Molossus
Schreb. Säugth. I p. 171 n. 17 tab. 59 fig. Buff.

Das Hundsmaul *Müll. Naturf. Suppl. p. 18.*

Longitudo corporis 2 poll. Nasus crassus. Labia pendula. Auriculae breuiores, latae, rotundatae, marginibus interioribus supra frontem approximatis. Valvula brevis, lata, rotundata. Cauda longitudine fere corporis, tertia parte extra membranam prominente. Corpus supra fusco-cinereum, subtus pallidius, ventre fusco. Membrana nigricans. Dentes laniarii solitarii; molares supra vtrinque quatuor, infra quinque.

Habitat in America.

e) *Dentibus primoribus supra duobus, infra nullis.*

Cephalotes. *V. labio superiore fisso, naribus cochleatis, valvulis auricularum nullis.*

Vespertilio Cephalotes *Pallas spicil. III p. 10 tab. 1.*

The Molucca Bat *Penn. syn. quadr. p. 368 n. 285.*

Die grofsköpfige Fledermaus: Vespertilio Cephalotes
Schreb. Säugth. I p. 172 n. 18 tab. 60 fig. Pall.

Der Grofskopf *Müll. Naturf. Suppl. p. 19.*

Longitudo corporis fere 4 pollicum. Caput magnum. Rostrum crassum, retusum. Nares tubulosae, divergentes, extus cochleatae. Labia crassa, laxa, intus villis subularis. Labium superius diuisum. Lingua papillis aculeisque tecta. Oculi maiusculi, protuberantes, pupilla lineari-oblonga horizontali. Auriculae breues, ouales, absque valuulis. Pollex palmarum longior, membrana reliquis digitis iunctus. Digitus primus palmarum unguiculatus. Membrana inter femora profunde excisa, cauda breui extra membranam propendente, sursum curuata. Corpus supra griseo-cinereum, subtus fordide album. Venter canus. Membrana rufo-fusca. Dentes lanariii solitarii, inferiores approximati.

Habitat in Moluccis.

f) *Dentibus primoribus supra nullis, infra quatuor.*

Lepturus.

12. V. membrana ad cubitum faccata.

Die Beutelfledermaus: Vespertilio Lepturus *Schreb.*
Säugeth. I p. 173 n. 19 tab. 57.

Der Beuteltrager: Vespertilio marsupialis *Müll. Naturf. Suppl. p. 19.*

Longitudo corporis $1\frac{1}{2}$ poll. Rostrum mediocre, antice latiusculum, fetis subtilibus adpersum. Mentum fossula diuisum. Nares tubulatae, aperturis approximatis. Auriculae longae, obtusae, rotundatae, valuulis breuissimis obtusis. Dentes primores supra nulli, infra quatuor, denticulati. Lanariii longiores. Ad cubitum in membrana volitante faccus partus. Caudae apex ex membrana

prominulus. Corpus supra canum, subtus pallidius; auriculae atque membrana obscure fusca.

Habitat in Surinamo.

Ferrum 13. V. naso foliato ferri equini aemulo.

equinum. Le fer - à - cheval *Daubenton: Mém. de l'acad. 1759*
p. 382 tab. 2 fig. 4 capitis.

La chauve - fouris fer à cheval *Buff. hist. nat. VIII p.*
120, 131.

Le petit fer - à - cheval *Buff. hist. nat. VIII tab. 17.*
fig. 2.

Le fer - à - cheval *Buff. hist. nat. VIII tab. 20.*

The horse - shoe - Bat *Penn. syn. quadr. p. 369 n. 286.*

Ferro da Cavallo *Aless. quadrup. IV tab. 166 fig. 2*
Buff.

Die Hufeisennase: Vespertilio ferrum equinum
Schreb. Säugth. I p. 174 n. 20 tab. 62 fig. Buff.
et Daubent.

Die Hufeisennase: Vespertilio equinus *Müll. Naturf.*
Suppl. p. 20.

Longitudo corporis $2\frac{1}{2}$ poll. et ultra. Rostrum crassum.
Foliolum supra labium superius et nares, forma
ferri equini. Oculi minuti, profundi. Auriculae
longitudine capitis, basi latae, acuminatae, retror-
sum versae, valvulis nullis. Cauda longitudine
dimidii corporis, tota intra membranam. Cor-
pus supra ex rufo cinereum, subtus albicans; au-
riculae et membrana nigricantes.

Varietas minor, maiori perfecte similis.

Habitat in Gallia vulgaris, in Anglia, Germania.

g) *Dentibus primoribus nullis.*

nouebo- 14. V. apice nasi subbifido, macula alba ad ba-
racensis. fin membranae volitantis.

The New-York-Bat *Penn. syn. quadr. p. 367 n. 283*
tab. 31 fig. 2.

Die nordamerikanische Flödermaus *Schreb. Säugth. I*
p. 176 n. 21.

Der Neujorker: Vespertilio borealis *Müll. Naturf.*
Suppl. p. 20.

Longitudo corporis $2\frac{1}{2}$ poll. caudae $1\frac{4}{5}$ poll. Caput
murinum. Apex nasi subbifidus. Auriculae, bre-
ves, latae, rotundatae. Dentes primores plane
nulli, lanarii solitarii. Cauda longa, tota intra
membranam, acuminata. Crura postica gracillima.
Totum corpus cum membrana circa caudam supra
pilis longis mollibus pallide fuscis, antice palli-
dioribus. Venter magis pallefcit. Ad basin
membranae volitantis macula alba. Membrana nu-
da, nigricans.

Habitat in America boreali.

17. VRSVS.

Dentes Primores superiores VI, intus excavati alterni.

inferiores VI: laterales II longiores lobati; secundarii basi interiores.

Laniarii solitarii, conici.

Molares V f. VI: primo laniariis approximato.

Lingua laevis.

Membrana nictitans.

Nafus prominens.

Penis scatens offe curuato.

Arctos. I. V. fusco - nigricans, cauda abrupta.

Arctos Arist. hist. anim. II c. 5 n. 23. V c. 2 n. 18.

VI c. 30 n. 384-392. VIII c. 9 n. 103. c. 22 n. 181, 182. IX c. 7 n. 90, 91.

Vrfus Plin. hist. nat. VIII c. 35 (c. 53 Hard.) c. 36

(c. 54 Hard.) c. 58 (c. 83 Hard.) X c. 63 (c. 83

Hard.) c. 72 (c. 93 Hard.) c. 73 (c. 94 Hard.) XI

c. 37 (c. 48, 86 Hard.) c. 40 (c. 95 Hard.) c. 45

(c. 102, 105 Hard.) c. 49 (c. 109 Hard.) c. 50

(c. 111 Hard.).

Arctos Aelian. anim. II c. 19. V c. 49. VI c. 3, 9.

Arctos Oppian. Cyneg. III, 139.

Vrfus Agric. an subt. p. 43.

Vrfus Gesn. quadrup. p. 1065 cum fig. mediocr.

Vrfus Schwenckf. theriotr. p. 131.

Vrfus Aldrov. digit. p. 117 fig. p. 119 Gesn.

Vrfus Ionst. quadrup. p. 123 tab. 55 fig. bon.

Vrfus Mus. Worm. p. 318.

Bär Gesn. Thierb. p. 25 cum fig. Gesn.

L'Ours *Perr. anim. I p. 81 tab. 9 fig. bon.*

Vrfus *Charlet. exerc. p. 14.*

Vrfus, Vrfa *Wagn. Heluet. p. 187.*

Vrfus *Rai. syn. quadr. p. 171.*

Bear *Latson Carolin. p. 116 cum fig.*

Vrfus *Rzac. Polon. p. 225 auct. p. 321.*

The Bear *Catesb. Carol. app. p. XXV.*

L'animal Gin-hiung, l'homme-ours *Du Halde Chin. I p. 33.*

The Bear *Brick. North-Car. p. 110.*

Vrfus cauda abrupta *Linn. syst. nat. 2 p. 43.*

Der Bär *Riding. jagdb. Th. tab. 3 fig. bon.*

Ours *Condam. voy. p. 163.*

Vrfus cauda abrupta *Linn. fu. succ. I p. 1 n. 2.*

Der Bär *Meyer Th. I tab. 26 fig. bon.*

Vrfus cauda abrupta *Linn. syst. nat. 6 p. 4 n. 1.*

Vrfus nostras, Polonus *Klein. quadrup. p. 82.*

Vrfus cauda abrupta. The Vrfus, with an abrupt tail: the common Bear *Hill anim. p. 541 tab. 26 fig. mediocr.*

Der Bär *Kalm. Amer. II p. 265.*

L'Ours: Vrfus (. . . .) niger, cauda unicolore *Briff. regn. an. p. 258 n. 1.*

Vrfus cauda abrupta *Kram. Austr. p. 310.*

Vrfus maior pullus: the black Bear *Brown. Jam. p. 485.*

Vrfus medius canus: the grey Bear *Brown. Jam. p. 485.*

Der gemeine Bär *Hall. vierf. p. 541.*

Vrfus (Arctos) cauda abrupta *Linn. syst. nat. 10, I p. 47 n. 1.*

L'Ours *Du Pratz Louif. II p. 77.*

Ours *Dictioun. anim. III p. 296.*

L'ours *Buff. hist. nat. VIII p. 248.*

L'ours brun des Alpes *Buff. hist. nat. VIII tab. 31.*

L'ours blanc terrestre *Buff. hist. nat. VIII tab. 32.*

Beer met een geknotte Staart *Houtt. nar. hist. II p.*

- Ursus (Arctos) cauda abrupta *Linn. fn. suec. 2 p. 7 n. 19.*
 Biörn *Pontopp. Dan. I p. 607.*
 Ours *Bom. dictionn. III p. 314.*
 Ursus (Arctos) cauda abrupta *Linn. syst. nat. 12, I p. 69 n. 1.*
 Ursus Arctos *Forster: Philos. transact. LVII p. 342.*
 The black Bear *Penn. syn. quadr. p. 190 n. 138.*
 Orso *Aless. quadrup. II tab. 60 fig. Buff.*
 Orso bianco *Aless. quadrup. II tab. 61 fig. Buff.*
 Bär *S. G. Gmelin it. III p. 293.*
 Der gemeine Bär *Müll. Naturf. I p. 277.*
 Schwarzer Bär *Stell. Kamtsch. p. 113.*
 Ursus *Forsk. fn. orient. p. IV.*
 Ursus (Arctos) cauda abrupta *Müll. Dan. prodr. p. 3 n. 16.*
 Orso *Italis.*
 Ossa (*mas*); Ossa (*femina*) *Hispanis.*
 Urso, Uffo (*mas*); Urso, Uffa (*femina*) *Lusitanis.*
 Ours *Gallis.*
 Bär (*mas*); Bärinn (*femina*) *Germanis.*
 Beer *Belgis.*
 Bear *Anglis.*
 Biörn *Suecis et Danis.*
 Biörn, Ilgiersdyr, Græs-Dyr, Myre - Biörn *Noruegis.*
 Guouzhia (*species*); Aenak (*mas*); Aeste (*femina*)
Lapponibus.
 Niedźwiedź *Polonis.*
 Медвѣдь (Medwēd') (*mas*); Медвѣдица (Medwēditza) (*femina*) *Russis.*
 Ukschuk *Tungusis.*
 Kara-Gursu *Burätis.*
 Ajù *Tataris.*
 Maskjä *Tscheremissis.*
 Obäh *Tschuwafschis.*
 Gondir *Wotiakis.*
 Olufta *Morduanis.*

— Ofch *Permice et Sirjännice.*

Gaas, Gafa *Kamtſchadalis.*

د (Dubb) *Arabibus.*

Chors *Persis.*

Aju *Turcis.*

Ucumari *Peruanis.*

Longitudo corporis $5\frac{1}{2}$ ped. et ultra. Caput longum. Oculi parui, membrana nictitante torui. Auriculæ breues, rotundatæ. Artus fortes crassique, palmis plantisque magnis. Digiti 5 - 5. Pollex digitis angustior. Mammæ quatuor pectorales, duæ ventrales fere inguinales. Cauda brevissima abrupta. Corpus pilis longioribus floccosum, hispidum, deforme. Cranium tenuius, cerebrum maius.

Variat colore:

α. Niger, minor.

β. Fuscus aut ferrugineo-fuscus. Hic forte specie differt a præcedente *α*, vti Buffonio videtur.

γ. Albus, vel niger admixtis pilis albis, vulgo Germanis *der Silberbär.*

In Persia ex albo flavescit, minor.

Habitat solitarius in vliginosis siluaticis regionum borealium Europæ, Asiæ atque Americæ (vbi sola varietas *α*); nec non in alpinis regionibus Helvætiæ, Galliæ (præcipue varietas *β*), Persiæ, Iaponiæ, Ceylonæ, regniqve Peruani.

Vicitat radicibus, baccis, aliisque vegetabilibus; formicis, piscibus; amat maxime mel. Varietas *β* interdum carniuora, non *α*. Escam lubenter lavat, residuam in paludibus defodit. Aquam morfu vorat. Segnis nisi lacefferetur, neque sine iniuria hominem adoritur; tum agilissime erectus ambabus

bus palmis pugnat, raro dentibus. Ante pugnam pullos adscendere arbores cogit. Descendit prae-eunte cauda, cui valde metuit. Pediculis caret. Palmas cubans continuo lambit. Coit fine octobris mensis. Grauida latet, cum mares prolem edant. Vterum gerit 112 diebus. Parit pullos duo ad quinque, informes. Autumno pinguescit, carne proba esculenta. Hibernat abstemius a medio novembris in initium regelationis. Aetas 20 - 25 annorum. Vox grunniens. Iunior mansuescit. Bene natat. Olfactus fortissimus.

mariti-
mus.

2. V. albus, cauda abrupta, capite colloque elongatis.

Vrsus albus *Ionst. quadr. p. 126.*

Vrsus albus *Mus. Worm. p. 319.*

Weisser Bär *Mart. Spitzb. p. 73 tab. O fig. C mediocr.*

Ours *Egede Grönl. p. 42.*

The white Bear *Catesb. Carol. app. p. XXVI.*

Der weisse Bär *Ellis Hudf. p. 39.*

Vrsus albus Martensii *Klein. quadrup. p. 82.*

L'Ours blanc: Vrsus (albus) albus, cauda unicolore *Briff. regn. an. p. 260 n. 2.*

Der nordliche weisse Bär *Hall. vierf. p. 546.*

Vrsus (maritimus) albus maior, arcticus *Linn. syst. nat. 10, I p. 47 cum praecedente.*

Ours blanc *Dictionn. anim. III p. 292.*

Witte Beeren in Groenland *Houtt. nat. hist. II p. 219.*

Die weissen Bären *Cranz Groenl. I p. 98.*

Vrsus (maritimus) albus maior, arcticus *Linn. syst. nat. 12, I p. 70 cum praecedente.*

Ours blanc *Buff. hist. nat. XV p. 128.*

The polar Bear *Penn. syn. quadr. p. 192 n. 139 tab. 20 fig. I bona.*

Weisse Bären *Müll. Naturf. I p. 279.*

Vrsus

Capt. Cook's voyage to the Northern hemisphere vol. III. p. 252. tab. 7

Pallas spicily. fasc. . . .

Vifus albus *Müll. Dan. prodr. p. 3 n. 16 b.*
 Nennok *Groenlandis.*

Multo maior praecedente, ad pedes 13 longus. Caput magis elongatum, collumque tenuius. Corpus gracilius. Auriculae breves, rotundatae. Artus fortes. Pili longissimi, molles, albi, hinc inde flavescentes, nasi apice unguisque nigris. Cranium durius quam Arcto.

Distinguendus utique a varietate alba praecedentis.

Habitat intra circulum arcticum polarem, casu interdum a glacie defertur in regiones magis australes. Ad litora degit, inque glaciis insulis. Bene natat atque urinatur. Vicinat piscibus, phocis, cadaueribus cetorum, humanisque, avibus, voracissimus. Atrox magis hominem sponte adoritur. Hibernat sub niue in fossis profundis. Parit duo, eosque strenue defendit. Caro alba, sapore veruecinæ. Vox canis rauca.

Meles. 3. V. cauda concolore, corpore supra cinereo, subtus nigro, fascia longitudinali per oculos auresque nigra.

Melis *Plin. hist. nat. VIII c. 38 (c. 58 Hard.)*.

Meles *Gesn. quadr. p. 778 fig. p. 1103 mala*.

Taxus *Schwenckf. theiortr. p. 129.*

Taxus *Aldrov. digit. p. 263.*

Taxi canini foetus *Aldrov. digit. fig. p. 266 mala*.

Taxi suilli icon *Aldrov. digit. fig. p. 267 mediocr.*

Taxus *Ionst. quadrup. p. 146.*

Dachs *Ionst. quadrup. tab. 63 fig. mediocr.*

Taxus suillus *Ionst. quadrup. tab. 64 fig. mala.*

Porcus pumilo Taxus porcinus *Ionst. quadrup. tab. 48 fig. pessima, Porci potius.*

Dachs *Gesn. Thierb. p. 63 cum figg. mediocr.*

Erxl. Mammal.

L

Taxus

Taxus Charlet, exerc. p. 18.

Taxus, Melis Wagn. Helvet. p. 186.

Taxus fuillus Sibb. Scot. an. p. 11.

Taxus siue Meles Rai. syn. quadr. p. 185.

Melis Rzacz. Polon. p. 233. auct. p. 327.

Meles Rzacz. auct. p. 315.

Meles vnguibus anticis longissimis Linn. syst. nat. 2
p. 45.

Tachs Riding. jagdb. Tb. tab. 17 fig. bon.

Meles vnguibus anticis longissimis Linn. fn. suec. 1 p.
6 n. 15.

Der Dachs Meyer Thiere II tab. 31 fig. bon.

Meles vnguibus anticis longissimis Linn. syst. nat. 6
p. 6 n. 1.

Coati cauda breui; Taxus, Meles Klein. quadrup.
p. 73.

Meles vnguibus anticis longissimis. The Meles with
the anterior claws very long: the Badger Hill
anim. p. 555.

Dachs Kalm Amer. II p. 332.

Le Blaireau ou Taiffon: Meles (. . .) pilis ex
sordide albo et nigro variegatis vestita, capite tae-
niis alternatim albis et nigro variegato Briff. regn.
an. p. 253 n. 1.

Meles vnguibus anticis longissimis Kram. Anstr. p.
313.

Der Dachs Hall. vierf. p. 515.

Vrfus (Meles) cauda concolore, corpore supra cine-
reo subtus nigro, fascia longitudinali per oculos
auresque nigra Linn. syst. nat. 10, I p. 48 n. 3.

Le Blaireau Buff. hist. nat. VII p. 104 tab. 7, 8.

Blaireau Dictionn. anim. 1 p. 295.

Das: Beer met de Staart van eenerhande Kleur, het
Lyf van boyen Aschgrauw, van onderen zwart,
een breede streep in de langte over de Oogen
en Ooren heen Houtt. nat. hist. II p. 228.

Vrfus (Meles) cauda concolore; corpore supra cine-
reo,

reo, subtus nigro, fascia trans oculos auresque nigra *Linn. fn. suec. 2 p. 7 n. 20.*

The Badger *Penn. brit. zool. p. 30.*

Brok eller Grævling *Pontopp. Dan. I p. 609.*

Badger *Bell trav. II p. 74.*

Blaireau *Bom. dictionn. I p. 291.*

Vrfus (Meles) cauda concolore, corpore supra cinereo, subtus nigro, fascia longitudinali per oculos auresque nigra *Linn. syst. nat. 12, I p. 70 n. 2.*

Barfuk, Dachse *Rytfschk Orenb. I p. 226.*

The common Badger *Penn. syn. quadr. p. 201 n. 142.*

Taffo *Aless. quadrup. II tab. 76 fig. Buff.*

Der Dachs *Müll. Naturf. I p. 281.*

Der Dachs *Mart. Buff. vierf. IV p. 123, tab. 59.*

Vrfus (Meles) cauda concolore, corpore supra cinereo, subtus nigro; fascia longitudinali per oculos auresque nigra *Müll. Dan. prodr. p. 3 n. 17.*

Taffo *Italis.*

Texon, Bivaro *Hispanis.*

Teixugo, Texugo *Lusitanis.*

Blaireau, Taiffon *Gallis.*

Pryf Llwyd, Pryf penfrith *Cambrensis.*

Dachs, Tachs *Germanis.*

Das *Belgis.*

Badger, Brock, Gray *Anglis.*

Pate in *Anglia septentrionali.*

Gräf fvin *Suecis.*

Grævling, Erok *Danis.*

Grævling, Sviin-Sax *Noruegis.*

Iazwicz, Borsuk *Polonis.*

Барсукъ (Barfuk), Язвечъ (Iazwetz) *Ruffis.*

Dorrakon *Tungusis.*

Longitudo corporis $2\frac{1}{2}$ ped. caudae 8 poll. Caput vulpinum. Oculi parvi. Membrana nictitans ampla, totum oculum tegens. Auriculae breves rotunda-

tundatae. Collum breue, crassum. Crura breuia, crassa, digitis 5-5. Ungues palmarum longi, recti. Mammae sex: in pectore versus abdomen duae, in medio abdominis duae, ad inguina duae. Cavitas supra anum, sub cauda, magna, subrotunda, secernens liquorem album, sebaceum, leuiter graueolentem. Pili corporis longi, rigidi, basi fordide albi, medio nigri, apice cinerei. Corpus subtus nigrum. Cauda corpori concolor. Fascia nigra in capite per oculos et aures. Setae supra oculos tres nigrae.

Habitat in Europa, Asia (perperam id negante Buffonio) vsque in Sinam et ad mare caspium; in siluis umbrosis, depressis, lapidosis. Visitat insectis, ovis, radicibus, gramine, fructibus, carne. Subterraneus plures camaras effodit unico introitu. Hibernat super gramine. Admodum pinguescit, Calmyccis Sinensibusque edulis. Somniculosus quietem valde amat. Nocturnus venatur cuniculos. Stercus in distincto et determinato loco deponunt inhabitantes extra antrum singuli. Folliculum putorium supra anum haurit hibernans. Lente currit, at defendit se strenue, morfu periculoso vehementique. Parit quatuor aut quinque semel in anno. Mansuescit iunior, non adultus.

Diuisio in *caninum* et *suillum* haud necessaria.

Varietas alba noueboracensis:

Le Blaireau blanc: Meles (alba) supra alba, infra ex albo flauicans *Briff. regn. an. p. 255 n. 2.*
Blaireau blanc *Dictionn. anim. Ip. 298.*

Eiusdem forte speciei est.

The American Badger *Penn. syn. quadr. p. 202 n. 143.*

Minor

Minor vulgari. Linea alba ab apice nasi inter aures vsque ad initium dorfi, cui adstat vtrinque nigra vsque ad occiput, huic alia alba, tunc vero sequitur alia nigra inter praecedentem et aurem. Pili longi. Dorsum vt in vulgari. Latera flauicant. Venter cinereus. Crura nigricantia. Cauda pilis longis, fordide flauis, apicibus pilorum albis, caudae apice nigricante.

Habitat ad fretum Hudsonis.

Lotor. 4. V. cauda annulata, fascia per oculos transuersali nigra.

Mapach seu animal cuncta praetentans manibus *Ferriand. anim. p. I.*

Coaty *Thevet cosmogr. II fol. 937 a.*

Coati *Lact Amer. p. 553.*

Mapach *Nieremb. hist. nat. p. 175 cum fig. mediocr.*

Coati *Marcgr. Bras. p. 228 cum fig. mediocr.*

Coati *Ionst. quadrup. p. 137.*

Mapach *Ionst. quadrup. tab. 74 fig. Nieremb.*

Coati *Mus. Worm. p. 319 cum fig. bon.*

Vulpes Americana, Mapachi dicta *Charlet. exerc. p. 15.*

Vulpi affinis Americana; Coati Brasiliensibus *Marcgr. Rai. syn. quadr. p. 179.*

The Raccoon *Lawson Carolin. p. 121 cum fig. mediocr.*

Vulpi affinis americana *Sloan. Jam. II p. 329.*

Vulpi affinis americana. The Raccoon *Catesb. Carol. app. p. XXIX.*

Quanhpecotli seu felis montana americana *Seb. thes. I p. 68 tab. 42 fig. 2.*

The Raccoon *Brick. North-Carol. p. 123.*

Vrsus cauda elongata *Lin. syst. nat. 2 p. 43.*

Ein americanisches Thier *Linne: Act. holmief. 1747 p. 300 tab. 9.*

Stoff in Mem. de l'ac. de Berlin 1758. . . . t. XII. pp. Die

*Don. Schulze in Künigst Magaz. für Zergang. 1 B. 2 St.
a. t. Gorge natur, menschenleben u. beschreibung V B. p. 101 - 118.*

Die wilde amerikanifche Katze *Meyer Thiere III tab.*

18 fig. Seb.

Vrfus cauda elongata *Linn. syst. nat. 6 p. 4 n. 2.*

Coati Brasiliensium *Klein. quadrup. p. 72.*

Vrfus cauda elongata. The Vrfus with an elongated tail *Hill anim. p. 542.*

Der Bär mit dem langen Schwanze, Rakkoon *Kalm Amer. II p. 246.*

Der Raccoon den wir Sjupp nennen *Kalm Amer. II p. 351.*

Der Bär der Raccoon oder Espan genannt wird *Kalm Amer. III p. 31.*

Le Coati: Vrfus (Coati) cauda annulatim variegata *Briff. regn. an. p. 261 n. 4.*

Das Koati *Hall. vierf. p. 506.*

Amerikanifche Bär *Hall. vierf. p. 596.*

Vrfus (Lotor) cauda annulata, fascia per oculos transuerfali *Linn. syst. nat. 10, I p. 48 n. 4.*

Vrfus cauda annulatim variegata *Dictionn. anim. I p. 659.*

Le Raton *Buff. hist. nat. VIII p. 337 tab. 43.*

Beer met een geringde Staart en een dwarfe Streeplangs de Oogen hen *Houtt. nat. hist. II p. 237 tab. 15 fig. 1 Linn.*

Raton *Bom. dictionn. III p. 722.*

Vrfus (Lotor) cauda annulata, fascia per oculos transuerfali nigra *Linn. syst. nat. 12, I p. 70 n. 3.*

The Raccoon *Penn. syn. quadr. p. 199 n. 141.*

Volpe americana *Aless. quadrup. III tab. 111 fig. Buff.*

Der Coati *Müll. Naturf. I p. 284 tab. 15 fig. 1 Linn.*

Attigbro *Iroquesis.*

Paullo minor Vulpe, pedibus breuioribus. Digits 5-5. Corpus cinereum, pilis erectis, ferrugineis, apice nigris, vt umbra nigra cinctus vndique appareat.

paréat. Caput fuscum. Frons alba. Fascia nigra trans oculos, in medio interrupta, cum linea nigra perpendiculari interiecta. Nasus acutus, niger. Labium superius longius inferiore. Auriculæ breues, rotundatae. Oculi magni, subuirides. Collum breue. Cauda longitudine corporis, pilis longioribus nigris annulata. Folliculus putorius vtrinque ad anum. Penis ossè incuruato scatet.

Habitat in Americae maritimis. Edit lubenter oua, gallinas, pisces, conchas, cancos, diciturque cauda piscari. Cibum lauat, palmis ori eum admo-
vet. Odoratu tactuque excellit. Mentis tenacissimus. Dormit in arbore caua ab hora duodecima noctis in meridiem. Pellitur fetis porcinis. Lubenter scandit. Agilis, mitis, facile mansuescit, ludibundus. Omnia palmis examinat. Amat vehementer dulcia atque liquores spirituosos, quibus se inebriat. Parit maio mense in arboribus cauis pullos duo ad tres. Caro edulis. Pili boni pro pileis conficiendis.

Affinis nonnihil Lemuribus caudatis.

luscus. 5. V. cauda elongata, corpore ferrugineo, rostro fusco, fronte plagaque laterali corporis longitudinali pallida.

Vrsulo affinis americana. The Quickhatch *Catesb. Carol. app. p. XXX.*

The Carcajon or Queequehatch *Dobbs Hudf. p. 40.*

The Quick-hatch or Wolverene *Edw. birds II tab. 103.*

Der Quick-Hatch oder Wolverene *Ellis Hudf. I p. 40 tab. 4. fig. mala.*

Coati Vrsulo affinis, americanus *Klein. quadrup. p.*

74.

L'Ours de la Baye de Hudson: Ursus (Freti Hudsonis) castanei coloris, cauda unicolore, rostro pedibusque nigris *Briss. regn. an. p. 260 n. 3.*

Der größte amerikanische Halbfuchs *Hall. vierf p. 518.*

Ursus (luscus) cauda elongata, corpore ferrugineo, rostro fusco, fronte fasciaque laterali longitudinali albida *Linn. syst. nat. 10, I p. 47 n. 2.*

Ours de la baye d'Hudson *Dictioun. anim. III p. 297.*

Quick-hatch *Dictioun. anim. III p. 645.*

Wolfbeer: Beer met een lange Staart, het Lighaam Rostkleurig, de Snoet bruin, het Voorhoofd met een witagtige Streep, overlans, opzyde *Houtt. nat. hist. II p. 227.*

Carcajou *Bom. dictioun. I p. 423.*

Ursus (luscus) cauda elongata, corpore ferrugineo, rostro fusco, fronte plagaque laterali corporis *Linn. syst. nat. 12, I p. 71 n. 4.*

The Wolverene *Penn. syn. quadr. p. 195 n. 140 tab. 20 fig. 2.*

Der Wolfsbär *Müll. Naturf. I p. 285.*

Cambrie Eschmotic.

Longitudo corporis 28 poll. et ultra, caudae 13 poll. Facies nigra. Nasus acutus. Oculi parui. Auriculae breues, rotundatae, pilis fere occultatae. Pili capitis, dorsi et ventris longi dentique rufi, apicibus nigris, vt primo aspectu nigrum animal videatur. Latera e flauo fusca, cum stria concolore continuata supra caudam. Gula macula alba. Lunula alba in pectore. Pedes valde breues, fortes atque crassi, atri, digitis 5-5 (Pennanto et Catesbeio, 4-5 Edwardsio) non profunde diuisis. In palmis maculae aliquot albae. Pedes postici talis incedentes. Ungues acuti, fortes, apice albi. Cauda pilis longis, rigidis, basi rufis, apice nigris. Color corporis variat pro anni tempore.

Habitat in Fretto Hudsonis et Canada.

18. ERINACEVS.

Dentes Primores superiores II distantes.
inferiores II minus distantes.
Laniarii vtrinque II recumbentes.
Corpus spinis reatum.

- europae- i. E. auriculis rotundatis, naribus cristatis.
 us. *Erivos Arist. hist. anim. I c. 7 n. 62. III c. 1 n. 6. V*
c. 2 n. 19. IX c. 9 n. 107.
Herinaceus Plin. hist. nat. VIII c. 37 (c. 56 Hard.)
c. 58 (c. 83 Hard.). X c. 63 (c. 83 Hard.).
Erivos χειραιο; Aelian. anim. III c. 10. IV c. 17. VI c.
54, 64.
Erivos Oppian. cyneg. II, 598.
Erinaceus Agric. an. subtr. p. 10.
Echinus terrestris Gesn. quadrup. p. 399 fig. p. 400
bona.
Herinaceus Schwencckf. zheriortr. p. 96.
Echinus terrestris Aldrov. digit. p. 459.
Echinus terrestris Ionst. quadrup. p. 171.
Herinaceus, Igel, Sewigel Ionst. quadrup. tab. 68
fig. bona.
Echinus terrestris Mus. Worm. p. 334.
Herisson Flacourt Madag. p. 152.
Herinaceus. Ein Igel Gesn. Thierb. p. 227 cum fig.
bona.
Le Herisson Perr. anim. II p. 31 tab. 41 fig. bona.
Erinaceus Charlet. exerc. p. 19.
Erinaceus terrestris, Echinus Wagn. Helvet. p. 175.
Erinaceus Sibb. Scot. an. p. 11.
Echinus & Erinaceus terrestris Rai. Syn. quadr. p. 231.
Herinaceus Rzacz. Polon. p. 233. auct. p. 326.
Erinaceus parvus nostras Seb. thes. I p. 78 tab. 49 fig.
1, 2 bonae.
Erinaceus spinosus auriculatus Linn. syst. nat. 2 p. 45.

Erinaceus europaeus Linn. *Gotbland. p.* 264.

Erinaceus spinosus auriculatus Linn. *fn. suec. I p.* 6
n. 16.

Der Igel Meyer *Thiere I tab.* 95, 96 figg. bonae.

Erinaceus auriculatus Linn. *syst. nat. 6 p.* 6 n. 1.

Acanthion vulgaris nostras Klein *quadrup. p.* 66.

Erinaceus auriculatus. The Erinaceus with larger
ears: the Hedge-hog Hill *anim. p.* 558 *tab.* 27
fig. mediocr.

Erinaceus (vulgaris) auriculatus Linn. *mus. Ad. Frid. I*
p. 6.

Le Hériffon: Erinaceus (. . .) auriculis erectis *Briff.*
regn. an. p. 181 n. 1.

Erinaceus auriculatus Kram. *Austr. p.* 313.

Der gemeine Schweinigel Hall. *vierf. p.* 463.

Erinaceus (europaeus) Linn. *syst. nat. 10, I p.* 52
n. 1.

Heriffon *Dictionn. anim. II p.* 425.

Le Hériffon *Buff. hist. nat. VIII p.* 28 *tab.* 6.

Europische Egel *Houtt. nar. hist. II p.* 289 *tab.* 17
fig. 1.

Erinaceus (europaeus) auriculis rotundatis, naribus
cristatis Linn. *fn. suec. 2 p.* 8 n. 22.

The Hedge-hog or Urchin *Penn. brit. zool. p.* 51
cum fig. bona.

Pindsviin *Pontopp. Dan. I p.* 610.

Heriffon terrestre *Bom. dictionn. II p.* 451.

Erinaceus (europaeus) auriculis rotundatis, naribus
cristatis Linn. *syst. nat. 12, I p.* 75 n. 1.

Igel oder Schweinigel *Knorr delic. II tab.* K, 3 fig. 1
bona.

Erinaceus europaeus *Forster: Philos. transact. LVII*
p. 342.

The common Hedge-hog *Penn. syn. quadr. p.* 316
n. 247 *tab.* 28 fig. 3 bona.

Istrice *Aless. quadrup. II tab.* 85, 86 figg. *Buff.*

Der europäische Igel Müll. *Natursf. I p. 305 tab. 17*
fig. 1 Houtt.

Erinaceus Forsk. *fu. orient. p. III.*

Erinaceus (europaeus) auriculis rotundatis, naribus
 cristatis Müll. *Dan. prodr. p. 4 n. 20.*

Erizo *Hispanis.*

Ourizo *Lusitanis.*

Riccio *Italis.*

Herisson *Gallis.*

Draenog, Draen y coed *Cambrensisibus.*

Igel, Zaunigel, Schweinigel, Sauigel *Germanis.*

Egel, Yzervarken *Belgis.*

Hedge-hog *Anglis: Urchin obsolete.*

Pindsviin *Danis.*

Bustivil *Noruegis.*

Igelkott *Suecis.*

Iez *Pölonis.*

Енх (Iesh') *Ruffis.*

سور (Haerbe, Gansud) *Aegyptiis.*

Sora *in Madagascar.*

Longitudo corporis 10 pollicum, caudae pollicis
 vnus. Nasus acutus: narium foramina exteriori
 latere appendiculo membranaceo - carnosio crispo
 instructa. Auriculae rotundatae, latae, nudaе.
 Oculi parui, nigri. Totum corpus subtus et late-
 ribus tectum fetis flauicanti-cinereis, dorsum vero
 spinis albidis vel subcinereis, zonis fuscis variis
 notatis. Cauda spinis occultata. Crura breuia, sub-
 nuda, fusca. Digni 5-5, pollicibus breuioribus.
 Ungues longi, at molles. Plantae talis insistent-
 tes. Praeputium propendens. Mammae octo ad de-
 cem: ventralibus quatuor, pectoralibus sex. Tes-
 tes intus latent. Clauiculis instructus est.

Diuisio in *caninum* et *suillum* videtur imaginaria.

Habitat

Habitat in Europa, Sibiria, Aegypto, Madagafcar.
 Rarior in Suecia; in Noilandia vix occurrit. Do-
 mesticus cati loco ad Tanain.

Monogamus nidificat e musco in fruticibus sepibus-
 que. Hibernat in cauis arboribus. Nocturnus. Vi-
 ditat bufonibus, vermibus, coleopteris insectis,
 conchis, fructibus, auiculis, cadaueribus, radi-
 cibus. Natat facile. Mitis innocuusque, meticulo-
 sus iratusque mingit, inque globum decussatis spi-
 nis se contrahit inuulnerabilis. Compressis pedi-
 bus eiulat. Odor ambrosiacus, etiam stercoris.
 Pinguescit. Parit 3-5 initio aestatis. Coeunt verno
 tempore stantes ambo inter se complexi.

sibiricus. 2. E. auriculis planis, naso simplici.

Erinaceus sibiricus, superne conspicuus, capite ad
 pedes contracto *Seb. thes. I p. 79 tab. 49 fig. 4.*

Erinaceus sibiricus mas supinus *Seb. thes. I p. 79 tab.*
49 fig. 5.

Acanthion echinatus. Echinus sibiricus *Klein. quadrup.*
p. 66.

Le Hérisson de Sibirie: Erinaceus (sibiricus) auricu-
 lis planis *Briff. regn. an. p. 182 u. 2.*

Der sibirische Igel *Hall. vierf. p. 465.*

Hérisson de Sibérie *Dictionn. anim. II p. 426.*

Siberische Egel *Houtt. nat. hist. II p. 296.*

Der geöhrte Igel *S. G. Gmelin Reis. II p. 174?*

Auriculae breues, planae. Spinae saturate rufae,
 apicibus quasi deauratis. Pili subtus dilute ci-
 nerei, deaurati.

Habitat in Sibiria. Forte varietas est europaei.

inauris.

- inauris. 3. *E. auriculis nullis.*
Echinus indicus albus Rai. syn. quadr. p. 232.
Erinaceus americanus albus Seb. thes. I p. 78 tab. 49
fig. 3.
Erinaceus spinosus vix auriculatus Linn. syst. nat 2
p. 45.
Erinaceus subauriculatus Linn. syst. nat. 6 p. 6 n. 2.
Acanthion echinatus; erinaceus americanus albus
Klein. quadrup. p. 66.
Erinaceus subauriculatus. The Erinaceus, with very
small ears: the white Hedge-hog Hill anim. p. 558.
LeHérifson d'Amerique: Erinaceus (americanus) au-
riculis nullis Briff. regn. an. p. 184 n. 4.
Der weisse americanische Igel Hall. vierf. p. 464
tab. 31.
Hérifson d'Amerique Dictionn. anim. II p. 427.
Amerikaanische Egel Houtt. nat. hist. II p. 289, 297.
Erinaceus (inauris) auriculis nullis Linn. syst. nat. 12,
I p. 75 n. 2.
The american Hedgehog Bancr. Guian. p. 144.
Der Igel: Erinaceus surinamensis Fermin Surin. II
p. 103.
The Guiana Hedge-hog Penn. syn. quadr. p. 318
n. 249.
Der Kahlohr Müll. Naturf. I p. 307.

Auriculae nullae, foramina tamen auditoria. Magis
albescit quam nostras, cuius forte est varietas.
Longitudo octo pollicum.

Habitat in Guania.

- malaccen-4. *E. auriculis pendulis.*
 fis. *Porcus aculeatus, seu Hystrix Malaccensis Seb. thes. I*
p. 81 tab. 51 fig. 1.

Porci aculeati Malaccenses, catuli *Seb. thes. I p. 81*
tab. 51 fig. 2.

Hystrix pedibus pentadactylis, cauda exserta *Linn.*
syst. nat. 2 p. 46.

Hystrix pedibus pentadactylis, cauda truncata *Linn.*
syst. nat. 6 p. 9 n. 4.

Acanthion aculeis longissimis *Klein. quadrup. p. 66.*

Le Hérisson de Malacca: Erinaceus (malaccensis) au-
riculis pendulis *Briff. regn. an. p. 183 n. 3.*

Das Stachelschwein *Hall. vierf. p. 468 tab. 30.*

Hystrix (brachyura) pedibus pentadactylis, cauda ab-
breuiata *Linn. syst. nat. 10, I p. 57 n. 5.*

Hérisson de Malacca *Dictionn. anim. II p. 426.*

Malakke Stekelvarken: Stekelvarken met vyf-vinge-
rige Pooten en een korte Staart *Houtt. nat. hist. II*
p. 367 tab. 19 fig. 2 *Sebae.*

Erinaceus (malaccensis) auribus pendulis *Linn. syst.*
nat. 12, I p. 25 n. 3.

Der malaccische Igel *Müll. Naturf. I p. 308 tab. 19*
fig. 2. *Sebae.*

Longitudo corporis octo pollicum. Oculi magni, lu-
cidi. Auriculae fere nudaе, pendulae. Digni 5-5,
unguibus breuibis. Spinae longae dorsi, ad 6 poll.
longae, ex albo et nigro vel subrufo variegatae,
intermixtis fetis minoribus. Corpus subtus pilis
rufis breuibis.

Habitat in Iaua, Sumatra, praecipueque in Malacca.

Ex hoc concrementum biliarium, *Pedro del Porco*
dictum, de quo pluribus vide *Schultz. bil. p. 5.*

Videtur utique Erinaceus, nec Hystrix. Neque va-
rietas est Hystricis cristatae, quod Pennantus pu-
tat, cum sit pedibus 5-5, crista nulla, auribus
pendulis.

Species obscurae.

- * Tendrac *Flacourt Madag.* p. 152.
 Tendrac *Dictionn. anim.* IV p. 319.
 Le Tendrac *Buff. hist. nat.* XII p. 438 tab. 57.
 Tendrac *Bom. dictionn.* IV p. 338.
 Tendrac *Aless. quadrup.* III tab. 241 fig. 2 Buff.

Magnitudine Ratti maioris. Nasus longus, gracilis. Auriculæ breues, rotundatæ. Crura breuia. Corpus supra spinis breuibus, albis, medio ferrugineis tectum, subtus, vt facie et pedibus, pilis raris albicantibus. Cauda breuissima, spinis tectâ. Vibrissæ aliquot longiores versus nasum. Digi 5-5.

Forte eadem cum:

- ** Certaines bestes en l'isle Sainte Marie *Cauche Madag.* p. 127.
 Le Tanrec *Buff. hist. nat.* XII p. 438 tab. 56.
 Tanrec *Bom. dictionn.* IV p. 294.
 The asiatic Hedge-hog *Penn. syn. quadrup.* p. 317
 n. 248 coniunctim cum Tendrac.
 Tanrec *Aless. quadrup.* III tab. 141 fig. 1 Buff.

Maior præcedente: magnitudine Erinacei europæi. Rostrum longius quam in præcedente. Auriculæ magis apparentes. Corpus minus spinosum, tectum fetis flauicantibus, admixtis nigris aliquot longioribus. Spinae non nisi in vertice et occipite, in collo supra et lateralibus, nec non in humeris: in collo supra longiores, erectæ. Digi 5-5.

Habitat vterque in insulis indicis, Madagascar. Amat humida. Fodit. Vox Porci. Pinguescit valde. Fertilis.

tilis. Hibernat subterraneus per sex menses, et tunc pilos mutat. Caro insipida, Indis cibo usitata.

19. S V S.

Dentes Primores Superiores IV conuergentes.

Inferiores VI prominentes.

(*Variante paululum numero in variis.*)

Laniarii Superiores II breuiores.

Inferiores II exserti.

Rostrum truncatum, prominens, mobile.

Pedes bifulci.

Scrofa. I. S. dorso antice setoso, cauda pilosa.

Aper. a. Ferus. (Vna cum synonymis totius speciei.)

ῥς Arist. hist. anim. II c. 5 n. 23. c. 7 n. 23. V c. 13 n. 121-124. VI c. 8 n. 242-249. c. 28 n. 361-365. VIII c. 9 n. 109.

ῥς ἀγριος Arist. hist. anim. I c. 2 n. 23.

καρπος Arist. hist. anim. II c. 9 n. 45. c. 11 n. 71. V c. 13 n. 137.

Sus ferus Plin. hist. natur. VIII c. 51 (c. 78 Hard.).

Porcus Plin. hist. natur. XVIII c. 35 (c. 88 Hard.).

ῥς Aelian. anim. III c. 3. X c. 16.

Σος ἀγριος Aelian. anim. V c. 45.

καρπος Oppian. cyneg. III, 364.

Aper Gesn. quadrup. p. 1039 fig. p. 1040 mediocr.

Aper Schwenckf. theotr. p. 54.

Aper Aldrov. bifulc. p. 1013 fig. p. 1025 mediocr.

Aper Ionst. quadrup. p. 105.

Aper, Wildschwein Ionst. quadr. tab. 47.

Aper Wildschwein Ionst. quadrup. tab. 48.

Porcus pumilo Taxus porcinus Ionst. quadrup. tab. 48.

Wild Schwein *Gesn. Thierb. p. 336 cum fig. mala.*

Sus Charlet. exerc. p. 13.

Sus agrestis siue Aper Rai. syn. quadr. p. 96.

Aper seu Verres siluaticus Rzacz. Polon. p. 213. auct. p. 305.

Cochons sauvages, ou marons, ou Sanglier Des March. voy. III p. 296.

Sus dorso antice setoso, cauda pilosa Linn. syst. nat. 2 p. 49.

Wildes Schwein Riding. jagdb. Tb. tab. 6.

Sus dorso antice setoso, cauda pilosa Linn. fn. suec. I p. 12 n. 36.

Sus dorso antice setoso, cauda pilosa Linn. syst. nat. 6 p. 12 n. 1.

Porcus Klein. quadrup. p. 25.

Sus dorso antice setoso, cauda pilosa. The Sus, with a bristly back, and a hairy tail: the common Hog Hill anim. p. 571 tab. 28.

Le Sanglier Buff. hist. nat. V p. 99 tab. 14.

Le Marcassin Buff. hist. nat. V tab. 17 fig. 1.

Le Sanglier: Sus (Aper) caudatus, auriculis brevis, subrotundis, cauda pilosa Briss. regn. an. p. 108 n. 3.

Sus dorso antice setoso, cauda pilosa Kram. Austr. p. 318.

The Hog and wild Hog: Sus dorso antice setoso, cauda pilosa Brown. lam. p. 487.

Das wilde Schwein Hall. vierf. p. 359.

Sus (Scrofa) dorso antice setoso, cauda pilosa Linn. syst. nat. 10, I p. 49 n. 1.

Cochon Dictionn. anim. I p. 676.

Sanglier Dictionn. anim. IV p. 27.

Sus Scrofa Linn. amoen. acad. V p. 461.

Zwyn met het voorste van de Rug geborsteld, de staart hairig Houtt. nat. hist. II p. 250.

Sus (Scrofa) dorso antice setoso, cauda pilosa Linn. fn. suec. 2 p. 8 n. 21.

- Sus caudatus, auriculis oblongis acutis, cauda pilosa
Gronov. zooph. I p. 3 n. 11.
 Vild-Sviin *Pontopp. Dan. I p. 603.*
 Sanglier *Eom. dictionn. IV p. 87.*
 Sus (Scrofa) dorso antice setoso, cauda pilosa *Linn.*
syft. nat. 12, I p. 102 n. 1.
 Sus Scrofa *Forster: Philos. transact. LVII p. 342.*
 The common Hog *Penn. syn. quadr. p. 68 n. 54.*
 Cignale *Alciff. quadrup. II tab. 81 fig. Buff.*
 Das gemeine zahme, das Siamische und wilde Schwein
Mart. Buff. vierf. II p. 35.
 Der wilde Eber *Mart. Buff. vierf. II tab. 18 fig. 1.*
 Der Frischling oder das junge wilde Schwein *Mart.*
Buff. vierf. II tab. 19 fig. 1.
 Die Sau *Müll. Naturf. I p. 462.*
 Sus (Scrofa) dorso antice setoso, cauda pilosa *Müll.*
Dan. prodr. p. 6 n. 43.
 Puerco, Cochino (*mas*); Puerca, Cochina (*femina*)
Hispanis (tota species).
 Puerco montés, Puerco siluestre, Iabalí, Iavalí, Xa-
 vali (*aper*); Iabalina, Xavalina (*femina*); Lechon
 de Iabalí (*pullus*) *Hispanis.*
 Porco (*mas*); Porca (*femina*) *Lusitanis (tota spe-*
cies).
 Porco montez, Iabalí, Xavalí (*aper*); Leitão de
 Porco montez (*pullus*) *Lusitanis.*
 Porco *Italis (tota species).*
 Porco silvatico, Cinghiale (*aper*) *Italis.*
 Porc, Cochon *Gallis (tota species).*
 Sanglier (*mas*); Laye (*femina*); Marcassin (*pullus*)
Gallis.
 Schwein *Germanis (tota species).*
 Wild Schwein, Hauer, Käuler (*aper*); Wilde Sau,
 Bache (*femina*); Frischling (*pullus*) *Germanis.*
 Zwyn, Varken *Belgis (tota species).*
 Wild Zwyn (*aper*) *Belgis.*
 Hog *Anglis (tota species).*

Wild Boar (*aper*) *Anglis.*

Swin *Suecis (tota species).*

Will-Swin (*aper*) *Suecis.*

Sviin *Danis (tota species).*

Vild-Sviin (*aper*) *Danis.*

Wierpz *Polonis (tota species).*

Wierpz les'ny, Dz'ik (*aper*) *Polonis.*

Свинья (Swin'ja), Порося (Porofja) *Ruffis (tota species).*

Вепрь (Wep''), Дикая свинья (Dikaja swin'ja), Дикій боровъ (Dikii borov) (*aper*) *Ruffis.*

Кнуръ (Knur) (*aper*) *in Ucraina.*

Tukalanda *Tungusis.*

Chagni *Burätis.*

domesticus. p. Mansues.

Sus, Verres *Plin. hist. nat. VIII c. 51 (c. 77 Hard.).*

X c. 63 (c. 83 Hard.) c. 73 (c. 93 Hard.). XI c. 37 (c. 61 Hard.) c. 39 (c. 95 Hard.).

Sus *Gesn. quadrup. p. 982 fig. p. 983 mediocris.*

Sus *Schwenckf. theriotr. 123.*

Sus *Aldrov. bisulc. p. 937 fig. p. 1006 bona.*

Sus *Ionst. quadrup. p. 99.*

Verres, Eber *Ionst. quadrup. tab. 47.*

Scrofa, Mock *Ionst. quadrup. tab. 47.*

Das Schwein *Gesn. Thierb. p. 331 cum fig. mala.*

Sus *Sibb. Scot. an. p. 9.*

Sus seu Porcus domesticus *Rai. syn. quadr. p. 92.*

Porci *Rzac. Polon. p. 243 auct. p. 333.*

Sus seu porcus domesticus *Sloan. Iam. II p. 328.*

Das Schwein *Meyer Thiere I tab. 49.*

Le Cochon *Buff. hist. nat. V p. 99.*

Le Verrat *Buff. hist. nat. V tab. 16.*

Le Cochon de lait *Buff. hist. nat. V tab. 17 fig. 2.*

Le Cochon domestique: Sus (domesticus) caudatus, auriculis oblongis, acutis, cauda pilosa *Briss. regn. an. p. 106 n. 1.*

- Hausſchwein *Hall. vierf. p. 346.*
 The Hog *Penn. brit. zool. p. 19.*
 Svin *Pontopp. Dan. I p. 602.*
 Porco da Razza *Aleff. quadrup. II tab. 83 fig. Buff.*
 Der zahme Eber *Mart. Buff. vierf. II tab. 17.*
 Das Spanferkel, Sogſchwein *Mart. Buff. vierf. II tab. 19 fig. 2.*
 Das Maſtſchwein *Müll. Naturf. Suppl. p. 58.*
 Barraco, Berraco, Verraco, Cerdo (*mas*); Puerca, Cochina (*femina*); Cochinillo (*pullus*); Lechon, Lechoncillo, Lechoncito (*pullus lactens*) *Hispanis.*
 Porco barraõ (*mas*); Porca (*femina*); Porquinho, Bacoro, Bacorinho (*pullus*); Leytaõ, Leitãõ, Marraõ (*pullus lactens*) *Lusitanis.*
 Verrat (*mas*); Truye (*femina*); Cochon de lait (*pullus*) *Gallis.*
 Verro (*mas*); Porca, Scrofa (*femina*) *Italıs.*
 Baedd (*verres*); Hwch (*femina*); Mochyn (*maialis*) *Cambrenſibus.*
 Eber, Kempe (*verres*); Sau (*ſcrofa*); Barg, Bork, Bõrchern (*maialis*); Ferken, Ferkel (*pullus*); Sogferken, Spanferkel (*pullus lactens*) *Germanis.*
 Beer (*verres*); Zeug (*femina*); Big, Speenvarken (*pullus*) *Belgis.*
 Boar (*verres*); Sow (*ſcrofa*); Pig (*pullus*) *Anglis.*
 Rone, Orne (*mas*); Soe, Purke (*ſcrofa*); Griis (*pullus*) *Danis.*
 Swin *Suecis.*
 Wieprz *Polonis.*
 Боровъ (Borov) (*verres*); Свинья (Swin'ja) (*ſcrofa*); Кабанъ (Kaban) (*maialis*); Поросянокъ (Porosenok) (*pullus*) *Ruffis.*
 Dõngus (*adultus*); Dõngus-bállas (*pullus*) *Tataris.*
 Si-nàh (*adultus*); Sisnà-tga (*pullus*) *Tſcheremiſſis et Tſchuwaſchis.*
 Parſ (*adultus*); Pårspi (*pullus*) *Wotiakis.*
 Túa (*adultus*) Púrſos, Tulãux (*pullus*) *Morduanis.*

Sinensis. γ. *Sinensis.*

Iavanische Schweine *Kolbe vorgeb.* p. 165.

Chinesisches Schwein *Linn. Westgorb.* p. 62.

Chinesisches Schwein *Linn. Schon.* p. 99.

Le Cochon de Siam *Buff. hist. nat. V p. 99 tab. 15.*

Le Cochon de la Chine: *Sus (sinensis) caudatus*, ventre ad terram vsque propendente, cauda pilosa
Briff. regn. an. p. 108 n. 2.

Cochon de la Chine *Dictiom. anim. I p. 677.*

The Chinese Hog *Penn. syn. quadr. p. 70 n. 54 p.*

Porco di Siam *Aless. quadrup. II tab. 82 fig. Buff.*

Das Sianische Schwein *Mart. Buff. vierf. II tab. 18*

fig. 2.

a Cabinet of quadrupeds by Jⁿ Church p. 2^d. fig. bono

Aper a nigro canescens, lana nulla inter setas. Auricalae breviores, subrotundae. Rostrum productius. Dentes lanarii longiores. Setae profundius radicatae. Lardum nullum. Iunior flauescente et fusco longitudinaliter striatus.

Habitat in Europae australioris silvis. In Oelandiam introductus a Friderico I, Succiae rege. Non est in insulis britannicis terrisque borealibus maris balthici. In Asia reperitur a Syria ad lacum Balkal vsque. Est quoque in Africa boreali.

Les Cochons marons Americae, apri sunt e domesticis porcis feri rursus facti, passim copiosissimi.

The Warree hog *Wafer voy. p. 223. Bancr. Guian. p. 126* non videtur differre.

Domesticus β auriculis longioribus, acutis, subpendulis, colore saepe albicante, sed et luteo, nigro, rubro, cinereo, unicolor discolorue.

Hospitatur vbique, exceptis regionibus frigidissimis. In australioribus maior.

Sinensis γ minor, dorso subnudo, abdomine ad terram vsque dependente, pedibus brevioribus, cauda pendula. Ex albo nigroque variegatus, aut ex nigro paullulum canescens. Mundum magis animal. Caro albidior, sapidiorque. Nutritur passim et in Europa.

Monungula varietas domestica, Vpſaliae alibiſque frequens. Etiam Ariſtoteſi (*Hiſt. anim. II c. 7 n. 29.*) atque Plinio (*Hiſt. natur. XI c. 46 (c. 106 Hard.)*) nota in Illyrico.

Sus cornutus (Iconſt. quadrup. tab. 48) fabuloſus videtur. Forte fabula orta ex vitioſa Babyruſſae figura.

Caput oblongum, declinatum, deſinens in proboscidem, cum ſulco ab oculis verſus proboscidem vtrinque ducto. Auriculae onatae, acuminatae, integrae, lateribus ſeminudae, marginibus barbatis, intus rugis ſaepius quaternis profundis. Oculi parui, minus prominentes: pupilla atro-caerulea, orbiculari, dilatabili; iris obſcure cinerea. Membrana niſtitans, ſubgrifea. Palpebra ſuperior ciliata; inferior mutica. Supercilia pilis longis ornata. Proboscis ſenſim attenuata, oblonga, pilis breviffimis teſta: apice truncato, cordato, ſubcartilagineo, margine prominulo, nudo, laevi, punctis excauato, naribus perforato. Nares rotundae, parvae. Labia proboscide breviora, laevia, ſuperius ad dentes laniarios inflexa, verſus baſin rugoſam. Labium inferius brevius, acutius. Vibriffae nullae. Dentes molares ſuperiores ſex: quorum tres interiores obtuſi, tres vero exteriores cuneati, ſubtrilobi. Inferiores quini; duobus molaribus interioribus, tribus cuneiformibus, ſubtrilobis. Laniarii ſuperiores bini, breviores; inferiores bini,
remoti

remoti a se et reliquis: exteriore maiore, elongato, saepe extra labium prominente, recuruo, subtriangulari. Primores superiores quatuor, breviores: intermediis distantibus. Inferiores magis prominentes, sex: lateralibus minoribus. Veruca sub gula, fetis quinque longioribus rigidioribus instructa. Collum crassum, compressum, dorso magis nutans, ad duo vel tres pollices depressum. Truncus dorso rotundatus. Dorsum et collum supra fetis rigidioribus, longioribus, erectis, confertis, subfastigiatis subiubatum. Corpus reliquum vestitum pilis rigidiusculis, ad posteriora versis, at vero sub collo, a iugulo ad mentum, antrorsum reuersis. Cauda ad genua vsque pendula, saepius oblique curuata versus alterum latus, villis tecta. Mammae decem abdominales, saepe etiam duae papillae spuriae subiugulares. Pedes breviores, pilis tenuioribus vestiti, biungulati, et postice ungulis succenturiatis. Digiiti duo anteriores longiores, postice connexi; duo posteriores breviores, interius annexi anterioribus. Suturae quintuplices: a) dorsalis longitudinalis a capite ad caudam. b) abdominalis longitudinalis a iugulo a regionem pubis. c) inguinalis vtrinque extrorsum arcuata, ab umbilico ad femora. d) pedum anticorum postice a cubito ad ungulam succenturiatam exteriorem. e) pedum posticorum, postice a genu ad ungulam succenturiatam exteriorem.

Animal odore pollens, naribus fodiens terram; quisquillas, stercus, succulenta, radices variaque spurcata ipsamque prolem vorans; multa feligens; pinguisimum, adipe inter cutem et panniculum carnosum collecto, stupidam, somnolentam, lente festinans, tempestatum praenuncium et impatiens; apricatur in sole, non fert frigus, in coeno se volutat, immundum, grunniens agresteque fren-

dens, accurrit clamanti affini aduersus hostem spumante ore dentibusque inmane, Crotalis infestum; libidine subat; tardum venere: pene laxo longo; mammis numerosissimis, prole multa ad viginti. Aetas annorum 25 - 30. Dentes non amittit. Gravidamenses quatuor. Fera Sus parit Maio et Iunio mense.

Porcus. 2. S. dorso postice setoso, cauda longitudine pedum, umbilico cystifero.

Porcus guineensis *Marcgr. Bras. p. 230 cum fig. bona.*

Porcus Guineensis *Ionst. quadrup. tab. 46 fig. Marcgr.*

Porcus guineensis *Rai. Syn. quadr. p. 96.*

Sus dorso pone setoso, cauda nuda *Linn. syst. nat. 2 p. 49.*

Sus dorso pone setoso, cauda nuda *Linn. syst. nat. 6 p. 12 n. 2.*

Porcus guineensis *Klein. quadrup. p. 26.*

Sus dorso pone setoso, cauda nuda. The Sus, with the back bristly behind, and with a naked tail: the american Hog *Hill anim. p. 572.*

Le Cochon de Guinée: Sus (guineensis) caudatus, auriculis longis et acuminatis, cauda nuda *Briff. regn. an. p. 109 n. 4.*

The Guinea Hog: Sus dorso pone setoso, cauda subnuda *Brown. Jam. p. 487.*

Das langhörige Guineische Schwein *Hall. vierf. p. 366.*

Sus (Porcus) dorso postice setoso, cauda longitudine pedum, umbilico cystifero *Linn. syst. nat. 10, I p. 50 n. 2.*

Cochon de Guinée *Dictionn. anim. I p. 677.*

Guineesch Varken: Zwyn met het agterste van de Rug geborsteld, de Staart ter langte van de Pooten, een blaasje aan de Navel *Houtt. nat. hist. II p. 269.*

Porc de Guinée *Bom. dictionn. III p. 629.*

Sus (Porcus) dorso postice setoso, cauda longitudine pedum, umbilico cystifero *Linn. syst. nat. 12, I p. 103 n. 2.*

Le Cochon de Guinée *Buff. hist. XV p. 146.*

The Guinea Hog *Penn. syn. quadr. p. 69* (varietatem putat praecedentis).

Das guineische Schwein *Müll. Naturf. I p. 465.*

Affinis priori, ut adeo eiusdem varietatem putent Buffonius atque Pennantus. Corpus rufum, pilis brevibus rubris splendentibus; setis caret, nisi supra clunes. Caput minus Scrofae. Auriculae elongatae, acuminatae. Cauda nuda, ad talos usque propendens. Paulo minor Scrofa.

Habitat in Guinea, inde in Brasiliam translatus, ubi hodie copiosissimus cicur.

Tajassu.

3. S. dorso cystifero, cauda nulla.

Quauhila coymatl. Quapizotl *Hernand. Mex. p. 637 cum fig. mediocri.*

Coyametl seu Quauhcoyamatl *Fernand. anim. p. 8.*

Tajassoub, Sanglier *Thevet cosmogr. II fol. 936 b.*

Zainus *Nieremb. hist. nat. p. 170 cum fig. mala.*

Sues quibus umbilicus in dorso *Aldrov. bisulc. p. 939.*

Tajacu Caaigoara *Marcgr. Bras. p. 229 fig. mediocri: caudatum male pingit.*

Zainus s. Tajacu, Porcus siluester *Ionst. quadrup. p. 107 tab. 46 fig. Marcgr.*

Aper indicus, Zainus, aliis Coja Metl *Mus. Worm. p. 340.*

Tajacu *Pis. Ind. p. 98 cum fig. Marcgr.*

Le Iavaris *Rocheb. Antill. p. 138.*

Tajacu seu aper mexicanus moschiferus, or the anatomy of the Mexico Musk-hog *Tyson: Philos. transact. num. 153 p. 359.*

Porcus americanus *Charlet. exerc. p. 14.*

Tajacu *Rai. syn. quadr. p. 97.*

Espece de cochon, qu'on appelle Peccary *Waser*
voy. p. 222.

Sangliers appelez Pecaris *Des March. voy. III p. 296.*

Sus dorso cystifero, cauda nulla *Linn. syst. nat. 2*
p. 49.

Javalies o paquiras *Gum. Orin. I p. 293.*

Sus dorso cystifero, cauda nulla *Linn. syst. nat. 6*
p. 12 n. 3.

Sus minor, umbilico in dorso, Taiacu. Cochon noir
Barr. Fr. équ. p. 161.

Porcus moschiferus *Klein. quadrup. p. 25.*

Sus dorso cystifero, cauda nulla. The Sus, with a
cyst on the back, and with no tail: the Musk hog
Hill anim. p. 572.

Le Sanglier du Mexique: Sus (*Aper mexicanus*) ecau-
datus, folliculum inchorosum in dorso gerens *Briff.*
regn. an. p. 111 n. 6.

Das kurzgeschwänzte mexikanische Muskuschwein
Hall. vierf. p. 364 tab. 10.

Sus (Tajacu) dorso cystifero, cauda nulla *Linn. syst.*
nat. 10, I p. 50 n. 3.

Iavaris *Dictionn. anim. II p. 523.*

Tajacu *Dictionn. anim. IV p. 250.*

Muskus Zwyn: Zwyn met een Beursje op de Rug,
zonder Staart *Houtt. nat. hist. II p. 270.*

Sus dorso omnino setoso, cauda nulla *Gronov. zooph.*
I p. 3 n. 10.

Le Pecari ou le Tajacu *Buff. hist. nat. X p. 21 tab. 3, 4.*

Paquires *Bom. dictionn. III p. 332.*

Tajacu ou Pecari *Bom. dictionn. IV p. 283.*

Sus (Tajacu) dorso cystifero, cauda nulla *Linn. syst.*
nat. 12, I p. 103 n. 3.

The Picary *Bancr. Guian. p. 125.*

Pingo *Fermin Surin. II p. 79.*

The Mexican Hog *Penn. syn. quadr. p. 72 n. 56.*

Pecari o Cingiale d'America *Aless. quadrup. III tab.*
115 fig. Buff.

Das

Das Muscus oder Bisamfchwein *Müll. Naturf. I*
p. 465.

Paquiras Americanis.

Longitudo corporis ped. 3. Figura Scrofae finensis.
Dentes primores supra quatuor, infra sex; lanianus
vtrinque supra et infra vnicus; vix apparentibus
superioribus ore clauso, reliquis tectis. Auriculae
breues, erectae, acuminatae. Oculi parui.
Collum breue, crassum. Corpus fetis maioribus
quam Scrofae, ad spinas Erinacei accedentibus,
nigro-canescens, albo annulatis, in collo supra
et in dorso longissimis. Ab humeris versus pectus
stria alba. Cauda nulla. Dorsum pone cystiferum
liquore graeolente, odore fere Castorei. Ventriculi
tres secundum Tysonium, quod negat tamen
oculatissimus Daubentonius.

Habitat in calidissimis Americae australis, in Mexico,
Guania, Brasilia, Antillisque insulis, in siluis
montosis, gregarius. Non amat coenum, vt Scrofa.
Ferus, at mansuescit. Viuitat fructibus, radicibus,
serpentibus, amphibiiis; minus pinguescit ac
Scrofa. Caro proba, modo statim excindatur
post mortem animalis glandula dorsalis.

aethiopi- 4. S. facculo molli sub oculis.

cus. Porc Sanglier *Flacourt Madag. p. 151.*

Engalla Meroll. Cong. p. 667.

Sanglier hideux *Dampier voy. I p. 405.*

Engalo or Engulo *Barbot Guin. p. 487.*

Enorme sanglier d'Afrique *Adans. Seneg. p. 76.*

Engalo *Dictionn. anim. II p. 99.*

Engalo *Bom. dictionn. II p. 102.*

Aper aethiopicus *Pallas misc. p. 16 tab. 2.*

Sus (aethiopicus) sacco molli sub oculis *Lin. syst. nat.* 12, III p. 223.

Aper aethiopicus *Pallas spicil. II p. 3 tab. I fig. animalis XI p. 84 tab. 5 fig. 7* capitis.

Le Sanglier du cap vert *Buff. hist. nat. XV p. 148. XIV p. 409.*

The aethiopian Hog *Penn. syn. quadr. p. 70 n. 55.*

Das Schwein aus Aethiopien *Müll. Naturf. I p. 464.*

Das aethiopische Schwein *Müll. Naturf. Suppl. p. 59 tab. 3 fig. 2 Pallas.*

Hardlooper *Belgis ad caput bonae spei.*

† Kaunaba *Hopwood's. Sperm.*

Longitudo, nondum adulti quidem, 4 ped. 9 poll.

Huic dentes primores nulli (aliis duo supra, sex infra), at gingivae antice durae, conuexae, laeves. Laniarii infra minores, supra maiores, apice

In Aethiopia apud montes fere elephantini dantur quatuor, in nostris viginti, in americana cystifero 24, in Babylonia 20. Ita Camper in act. petropoli.

furfum verso. Molares vtrinque sex. Corpus crassum latumque. Caput ingens. Rostrum truncatum, deorsum flexum, fere corneum. Os paruum. Oculi in fummo capite, parui, propiores inter se auri- busque, quam in Scrofa. Sub oculis saccus molli- tis, cute laxa nigra, cum appendice duriore zygoma- tica vtrinque. Auriculae subacutae. Corpus nudiusculum, fetis fasciculatis fulco- nigris, in dorso longioribus, in nucha longissimis. Cauda nuda.

Habitat in calidissimis Africae, Madagascar.

Ferox, celer. Odorem fere Lamii purpurei spargit. Viuidior, agilior, astutiorque Scrofa. Non coit cum Scrofa, cuius varietatem putat Buffonius.

Babylus. S. dentibus caninis versus frontem reclinatis.

fa. Aper in India *Plin. hist. nat. VIII c. 52 (c. 78 Hard.).*

Ἰς τετρακερας *Aelian. anim. XVII c. 10.*

Strange hogs *Purch. Pilgr. II p. 1693.*

Hogges

Hogges with hornes *Purch. Pilgr. V* p. 566.

A certain strange creature *Nieuh. East-Ind. p. 195*
fig. p. 196 mediocris.

Baby rouffa *Bour. Ind. or. p. 61* cum *fig. mediocri.*

Babirouffa seu porcus indicus *Charlet. exerc. p. 14.*

The horned hog *Grew mus. reg. soc. p. 27 tab. I*
fig. cranii.

Porcus indicus Babyrouffa dictus *Rai. syn. quadr. p. 96.*

Babyruffa *Jacob. mus. reg. p. 5 tab. 2 fig. 5. Laur. mus.*
reg. tab. 3 fig. 28. cranii.

Babi-Roesa *Valent. Amb. III p. 268* cum *fig. me-*
diocri.

Aper indicus orientalis, Babi Roesa dictus *Seb. thes. I*
p. 80 tab. 50 fig. 2 bona.

Sus dentibus duobus fronti innatis *Linn. syst. nat. 2*
p. 49.

Sus dentibus duobus fronti innatis *Linn. syst. nat. 6*
p. 12 n. 14.

Porcus Babirouffa *Klein. quadrup. p. 25.*

Sus dentibus duobus fronti innatis. The Sus, with
two teeth growing on the forehead: the Baby-
rouffa *Hill anim. p. 573.*

Le Sanglier des Indes orientales; Sus (Aper orienta-
lis) caudatus, dentibus caninis superioribus ab ori-
gine sursum versis, arcuatis, cauda floccosa *Briff*
regn. an. p. 110 n. 5.

Das Babiroesa *Hall. vierf. p. 366.*

Sus (Babyruffa) dentibus duobus caninis fronti innatis
Linn. syst. nat. 10, I p. 50 n. 4.

Babi-Roesa *Dictionn. anim. I p. 196.*

Hoorn-Varken: Zwyn met twee Slagtanden op het
Voorhoofd *Houtr. nat. hist. II p. 274.*

Sus caudatus, dentibus caninis superioribus ab ori-
gine sursum versis, arcuatis; cauda floccosa *Gronov.*
zooph. I p. 3 n. 12.

Le Babirouffa *Buff. hist. nat. XII p. 379 tab. 48 fig.*
cranii.

Barbi-Ronfa *Bom. dictionn. I p. 243.*

Sus (Babyrussa) dentibus duobus caninis fronti innatis *Linn. syst. nat. 12, I p. 104 n. 5.*

Eberhirsch oder Hirscheber *Knorr delic. II tab. K, 7 fig. cranii.*

The indian Hog *Penn. syn. quadr. p. 73 n. 57 tab. II fig. I a* Lotenio allata ex India orient. -

Der Hirscheber *Müll. Naturf. I p. 467.*

Babi-rusa *Malais.*

Magnitudo Cerui. Dentes lanarii superiores duo perforantes maxillam superiorem, recurvati velut duo cornua; inferiores vtrinque solitarii, magni, prioribus adstantes, minus recurvi. Primores superiores quatuor, inferiores sex. Molares quinque vtrinque. Auriculae parvae, erectae, acutae. Corpus paullo tenuius quam in congeneribus, fere lanatum, at dorsum setis mollibus. Caput oblongum, angustum. Oculi minuti. Crura longa, gracilia. Cauda longa, apice floccosa, contorta. Color fusco-griseus. Feminam careere dentibus elongatis habet Valentyn.

Habitat in insula Buero s. Bouro prope Amboinam, nec non in Celebes; haud in continente.

Gregarius, odore pollet, victitat herbis foliisque. Bene natat et vrinatur. Dicitur dentibus vniciformibus innixus quiescere in ramis arborum. Caro proba. Vox Scrofae.

20. HYDROCHAERVS.

Dentes Primores II - X.*Laniarii* nulli.*Palmae* vngulis quatuor, *plantae* vngulis tribus.

- Tapir. 1. H. dentibus primoribus vtrinque decem.
 Tapihires *Thevet cosinogr. II fol. 937 b.*
 Beori animal *Laet Amer. p. 328.*
 Danta *Nieremb. hist. nat. p. 187.*
 Antes *Nieub. Brasil. p. 23.*
 Tapiirete Brasiliensibus, Lusitanis *Anta Marcgr. Bras. p. 229 cum fig. mediocri.*
 Danta *Ionst. quadrup. p. 216.*
 Tapiireté *Pis. Ind. p. 101 cum fig. Marcgr.*
 Tapiierete Brasiliensibus, Anta Lusitanis *Rai. syn. quadr. p. 126.*
 La vache montagnarde *Dampier voy. III p. 356 cum fig. mala.*
 Dantas *Cieza Peru p. 20.*
 Anta, la gran bestia *Gum. Orin. I p. 300.*
 L'Elan *Condam. voy. p. 163.*
 Sus aquaticus multifidus, Tapir, Maypoury *Barr. Fr. équ. p. 160.*
 Animal Tapiierete *Klein. quadrup. p. 36.*
 Hippopotamus acaudatus capite graciliore. The slender-headed Hippopotamus, without a tail: the Tapijerete *Hill anim. p. 569.*
 Le Tapir ou Manipouris: *Tapirus Briss. regn. an. p. 119 n. 1.*
 Hippopotamus (terrestris) pedibus posticis trifidus *Linn. syst. nat. 10, I p. 74 n. 2.*
 Anta *Dictionn. anim. I p. 139.*
 Dante *Dictionn. anim. II p. 7.*
 Manipouris *Dictionn. anim. III p. 19.*

Tapiirete

*sp. Barbar. hist. rec. in Brasil. gessae. tab. 1.**Brizhoffer Gesch. der Abipones T. 1. p. 334.*

Tapiirete *Dictioun. anim. IV p. 267.*

Rivierpaard met de Agterpooten in drieen gespleeten

Houtr. nat. hist. III p. 420.

Le Tapir ou l'Anta *Buff. hist. nat. XI p. 444 tab. 43.*

Anta *Bom. dictioun. I p. 131.*

Beoi *Bom. dictioun. I p. 277.*

Manipouris *Bom. dictioun. III p. 21.*

Wasserschwein *Knorr. delic. II tab. K, 13 fig. bona uti videtur, rostro minus acuto quam in Buffoniana.*

A species of the Hippopotamus or Water horse *Bancr.*

Guian. p. 127?

Sus aquaticus musticulus Fermin Surin. II p. 80.

The longnosed Tapir *Penn. syn. quadr. p. 82 n. 60.*

Tapir o Manipuris *Aleff. quadrup. I tab. 23 fig. Buff.*

Landhippopotamus *Müll. Naturf. I p. 460.*

Antathier *Mart Naturlex. II p. 616 cum fig. Buff.*

Anta *Lusitanis.*

Maipuri, Manipuri *Guianensibus.*

Tapiira *Brasiliensibus.*

Uagra *Peruanis.*

Magnitudo vaccae minoris. Corpus suillum. Nasus elongatus quasi in proboscidem tenuem, ultra maxillam inferiorem prominentem, extensilem, lateribus sulcatis; apicibus utriusque maxillae acuminatis. Oculi minuti. Auriculae erectae, subrotundae, maiusculae. Dentes primores decem utrinque, molares quinque supra et infra utrinque, laniarii nulli. Collum crassum, breue. Dorsum arcuatum. Pedes breues. Ungulae breues, antice quatuor, exteriore minima; postice tres, nigrae, cauae. Cauda breuissima, nuda. Pili in toto corpore breues, fusci, in iunioribus autem corpus albo maculatum. Cutis valde tenax.

Habitat in silvis et fluviis regionum orientalium Americae australis ab isthmo Darien vsque ad Amazo-

num fluuium. Gregarius. Animal Americae maximum.

Dormit interdum in siluis obscurissimis densissimisque, noctu cibum quaerit. Victitat gramine, saccharo, fructibus. Timefactus aquam intrat. Natat bene et urinatur, inque aquae fundo incedit. Salax. Mitis et meticulosus: pugnax tamen secundum Gumillam. Caro Americanis in cibo expetita, ingrata dicit Barrere.

- Capybara. 2. H. dentibus primoribus vtrinque duobus.
 Capy-bara Brasiliensibus *Marcgr. Bras. p. 230 cum fig.*
 Capy-bara Porcus fluuiatilis *Braf. Inst. quadrup. tab. 60 fig. Marcgr.*
 Capybára *Pis. Ind. p. 99 cum fig. Marcgr.*
 Capy-Bara Brasiliensibus porcus fluuiatilis *Marcgrauii Rai. syn. quadr. p. 126.*
 Chien d'eau *Dampier voy. IV p. 72?* (Cuchora de agua *Lusitanis.*)
 Capivard *Froger voy. p. 123 cum fig. mediocii.*
 Cochon d'eau *Des March. voy. III p. 298.*
 Irabùbo *Gum. Orin. II p. 311.*
 Sus maximus palustris. Cabiái. Cabionara *Barr. Fr. équ. p. 160.*
 Hippopotamus acaudatus capite crasso. The thick-headed Hippopotamus, with no tail: the Copy-Bara *Hill anim. p. 569.*
 Le Cabiái: Hydrochaerus *Briff. regn. an. p. 117 n. 1.*
 Amerikanisches Wasserfchwein *Hall. vierf. p. 368.*
 Cabiái *Dictioun. anim. I p. 364.*
 Capiverd ou Capivar *Dictioun. anim. I p. 425.*
 Brasiliaanse Water - Zwyn *Houtt. nat. hist. III p. 421.*

Exxl. Mammal.

N

I.e

Carai Capuz in Bras. gepaz. tab. 1.

Le Cabiai *Buff. hist. nat. XII p. 384 tab. 49.*

Cabiai ou porc de riviere *Bom. dictionn. I p. 358.*

Capiverd *Bom. dictionn. I p. 417.*

Sus (Hydrochaeris) plantis tridactylis cauda nulla

Linn. syst. nat. 12, I p. 103 n. 4. III p. 228.

The Laubba *Bancr. Guian. p. 128?*

Porcus fluviatilis f. Sus maximus palustris *Fermin Surin. II p. 80.*

The thicknosed Tapir *Penn. syn. quadr. p. 83 n. 61.*

Cabionara *Aless. quadrup. III tab. 138 fig. Buff.*

Das Sumpffschwein *Müll. Naturf. I p. 467.*

Die americanische Maus *Müll. Naturf. Suppl. p. 40.*

(Ignorantia auctoris, non studio, in Murem hic transfiguratur animal.)

Cabiai, Capibara, Cabionara *Americanis.*

Magnitudo Porci bimuli. Caput magnum, crassum, naso tumido, vibrissis longis, durioribus. Auriculae parvae, rotundatae. Oculi magni, nigri. Maxilla superior longior inferiore. Dentes primores duo utrinque, molares quatuor utrinque, tripartiti. Pedes breves, ungulis 4-3 longis, palmatis. Cauda nulla. Corpus pilis breuibus, durioribus, ex rufo fuscis. Folliculus excretorius pone, sed iuxta umbilicum, et porus excretorius supra clunes. Mammae decem: pectorales quatuor, ventrales sex.

Habitat in America australi ad fluuios maiores, gregarius atque nocturnus.

Lente currit, bene natat et diu sub aqua degit. Vitat fructibus aliisque vegetabilibus, nec non piscibus. Erectus cibos palmis ori admouet. Valde pinguescit. Caro bona, tenera, at piscino sapore infecta. Mitis. Facile mansuescit. Vox asini.

21. HIPPOPOTAMVS.

Dentes Primores superiores IV, per paria remoti.
inferiores IV prominentes: in-
 termediis longioribus.

Laniarii solitarii, inferiores maiores,
 recuruati, oblique truncati.

Pedes margine vngiculati.

amphibi- I. HIPPOPOTAMVS.

vs. Behemoth. *Iob. c. 40.*

Πεταχιος ιππος *Arist. hist. anim. II c. 7 n. 29. c. 12*
n. 81, 82.

Hippopotamus *Plin. hist. nat. VIII c. 25 (c. 39 Hard.)*
c. 26 (c. 40 Hard.). XI c. 12 (c. 14 Hard.). c. 37
(c. 61 Hard) c. 39 (c. 93 Hard.) XXXII c. 11
(c. 53 Hard.).

Ἴππος ποταμιος *Aelian. anim. V c. 53.*

Hippopotamus *Belon poiss. p. 47 fig. p. 50 mediocris.*

Hippopotamus *Bellon. obs. p. 104. Petri. Gyllii descriptio ele-*
phanti c. 3.

Hippopotamus *Gesn. aquat. p. 494 cum fig.*

L'hippopotame ou Cheval marin *Thevet cosmogr. I*
fol. 64.

Cheropotamus et Hippopotamus *Alpin. Aeg. Ip. 245*
tab. 22 fig. 1, 2; tab. 23, 24, 25 figg. inal.

Hippopotamo *Zerenghi monogr. † 1603 -*

Hippopotamus antiquorum *Column. aquat. p. XXVIII*
fig. p. XXX mala.

Hippopotamus *Aldrov. digit. p. 181 fig. p. 183 maris*
mala, p. 184 feminae pessima, p. 185 capitis
pessima.

Hippopotamus *Ionst. quadrup. p. 108 tab. 49 fig. infima*
mediocris.

Hippopotamus *Wasserochs Ionst. quadrup. tab. 49 fig.*
media pessima.

N 2

Hippo-

Boymii flora Sinenfis Vienn. 1665. fol. icon med.

Boethaove van den Behenod en Leviathan. Leid. 1737. 4.

icon hippopotami in museo acad. Leidensis.

Laonard ap. Buffon T. XII d. amst. icon melior einstantje
is Leidensis.

Hippopotame ou cheval marin *Thevenot. voy. Ip. 491.*

Le Cheval marin *Marmol Afr. I p. 51.*

Hippopotamus *Charlet. exerc. p. 14.*

Hippopotamus *Ludolf. Aeth. L. I c. 10 n. I cum fig. mal. comment. p. 155.*

The River-horse or Hippopotamus *Grew mus. reg.*

non egregia conari extat ap. Cheselden, osteography c. soc. p. 14 tab. V fig. cranii.
Hippopotamus *Rai. syn. quadr. p. 123.*

L'Hippopotame *Dampier voy. III p. 359 cum fig. mala.*

Hippopotami or river horses *Barbot Guin. p. 73.*

Water-Elephants; Ker - kamonou *Barbot Guin. p. 117.*

Seekuh *Kolb. Vorgeb. p. 168 tab. 6 fig. I mal.*

Hippopotame *Iussieu: Mém. de l'acad. 1724 p. 209 descriptio et figura cranii.*

Le cheval marin ou l'hippopotame *Lobo Abiss. I p. 288.*

L'Hippopotame *Maill. Aeg. II p. 31.*

The Hippopotamus *Shaw trav. p. 427.*

Hippopotamus *Linn. syst. nat. 2 p. 48.*

Hippopotamus *Linn. syst. nat. 6 p. 11 n. I.*

Hippopotamus *Klein. quadr. p. 34 tab. 3 fig. pessima.*

Hippopotamus cauda breui. The Hippopotamus, with a short tail: the Sea-horse *Hill anim. p. 568 tab. 28 fig. mala.*

L'Hippopotame: Hippopotamus *Briss. regn. an. p. 122 n. I.*

Hippopotamus *Hasselqu. Palaest. p. 280.*

Hippopotame ou cheval marin *Adans. Seneg. p. 73.*

Das Nilpferd *Hall. vierf. p. 372.*

Hippopotamus (amphibius) pedibus quadrilobis *Linn. syst. nat. 10, I p. 74 n. I.*

Hippopotame *Dictionn. anim. II p. 449.*

Rivier-Paard: Rivier-Paard met de Voeten in vieren verdeeld *Houtt. nat. hist. III p. 405 tab. 28 fig. bon. ad autographum in collectione Jo. Bu*

L'Hip-

non omnia optima ad exemplum musci Haga conitum in ia edit. Amst. operis Buffoni. T. XII. minus accurate repetita ab ipso Buffonio, Supplementi T. III. t. 6

M A M M A L I A. Hippopotamus. 197

L'Hippopotame *Buff. hist. nat. XII p. 22 tab. 3 fig.*
pulli *tab. 6 fig. 1* cranii, *fig. 2, 3* ped.

Hippopotame *Bom. dictionn. II p. 466.*

Hippopotamus (amphibius) pedibus quadrilobis *Linn.*
 Syst. nat. 12, I p. 101 n. 1.

Wasserochs *Knorr delic. II tab. K, 12. fig. bona.*

Das Nilpferd *Berl. Samml. I p. 514 cum fig.*

The Hippopotame *Penn. syn. quadr. p. 78 n. 59.*

Ippopotamo *Aless. quadrup. II tab. 65 fig. Buff.*

Der Behemoth *Müll. Naturf. I p. 457 tab. 28 fig.*
Houtt.

Hippopotamus *Forsk. fn. orient. p. IV.*

Foras Pbar, Abu mner *Aegyptiis.*

Bilhât *aethiopice.*

Gomari *amharice.*

Nilpferd, Seepferd *Germanis.*

Морская лошадь (Морская тошадъ) *Ruffis?*

Longitudo corporis 17 pedum, circumferentia 15,
altitudo fere ped. 7: femina paullo minor. Corpus
fuis. Caput magnum, bubulinum. Oris rictus in-
gens. Dentes durissimi, labiis crassis tecti, eburnei,
aetate non flavescentes. Vibrissae breues ad os.
Nares paruae. Oculi exigui. Auriculae paruae acu-
tae, intus pilis breuibus mollibusque repletae. Cu-
tis crassissima durissimaque nigricans, pilis rariori-
bus albidis. Iubae loco pili copiosiores in collo.
Cauda longitudine pedis vnus, crassa, compressa,
nuda, subquamosa. Pedes tetradactyli vngulati,
cruribus breuibus, crassis. Mammæ duae inguina-
les. Mandibulam superiorem mobilem esse dicunt,
quod singulare, si vera fabula.

Habitat in fluuiis Africae a Nigro vsque ad caput bo-
nae spei, nec non in Nilo superiore inque lacu-
bus Aethiopiae, quos transfuit Nilus; rarior in ostiis
fluuiorum. In Asia reperiri dubium.

Mitis, nisi laceffitus. Natat capite extra aquam protenfo, obambulatque fub aqua. Noctu terram ingreditur, vt edat faccharum, milium, oryzam, radices Colocasiae; vorat quoque pifciculos. Lupino occiditur. Lente incedit in terra, meticulofus; tertus in aquam fugit, intra quam laefus vulneratusque furit vehementer. Dormit in Infulis arenofis flauiorum. Vox fortiffima. Polygamus. Parit extra aquam vnicum pullum, quem lactat intra aquam. Bene manfuefcit. Crocodili hostis. Caro z vulgo editur.

22. RHINOCEROS.

Dentes Primores vtrinque II, remotiffimi, obtuli; *nifi forte lanarii fnt absque primoribus.*

Cornu folidum, conicum, nazo infidens.

Pedes vngulati.

vnicornis. I. RHINOCEROS.

Rhinoceros *Plin. hift. nat. VIII c. 20 (c. 29 Hard.)*

XVIII c. I (c. I Hard.).

Ῥινόκερος Aelian. anim. XVII c. 45.

Ῥινόκερος Oppian. cyneg. II, 551.

Rhinoceros *Gesn. quadrup. p. 952 fig. p. 953 Alb.*

Düreri, mala.

The Abada or Rhinoceros *Borri Cochinch. p. 797.*

Rhinoceros or Abadas *Purch. Pilgr. II p. 1001, 1773.*

Rhinoceros *Aldrov. bifulc. p. 878 fig. p. 884 Düreri.*

Rhinoceros *Ionst. quadr. p. 94.*

Rhinoceros, Hornnase, Rhinocer *Ionst. quadrup. tab.*

38 fig. Düreri.

Rhinoceros *Muf. Worm. p. 336.*

- Abada siue Rhinoceros *Bont. Ind. or.* p. 50 fig. p. 51 mala.
- Rhinoceros *Neub. Gesandtsch.* p. 370 cum fig. mediocri.
- Rhinocer *Gesn. Thierb.* p. 304 fig. p. 305 Düreri.
- Rhinoceros *Côarlet. exerc.* p. 12.
- Rhinoceros *Grey mus. reg. soc.* p. 29.
- Rhinoceros *Chardin voy. II* p. 60 tab. 40 fig. mediocris.
- Rhinoceros *Rai. syn. quadr.* p. 122.
- Nashorn oder Rhinoceros *Kolbe Vorgeb.* p. 159 tab. 4 fig. 2 pessima.
- Elephas naso cornigero *Linn. syst. nat.* 2 p. 48.
- Rhinoceros *Bergen orat. Trif ad Viadr. 1746.* 2
- Nashorn Rhinoceros *Ridinger tab. peculiari* 1748 fig. bona.
- Rhinoceros *Parsons: Philos. transact. num. 470* p. 523 tab. 1, 2 figg. mediocr.
- Rhinoceros *Parsons monogr.*
- Rhinoceros cornu vnico conico *Linn. syst. nat.* 6 p. II n. I.
- Das Nashorn *Meyer Thiere III* tab. 29, 30 figg. mediocr.
- Rhinoceros *Klein. quadrup.* p. 26.
- Rhinoceros cornu vnico. The Rhinoceros with a single horn: the common Rhinoceros *Hill anim.* p. 567 tab. 28 fig. mala.
- Le Rhinoceros: Rhinoceros *Briff. regn. an.* p. 114 n. I.
- Rhinoceros cornu vnico conico *Kram. Austr.* p. 317.
- Das Nafenhorn *Hall. vierf.* p. 368 tab. 5.
- Rhinoceros (unicornis) cornu vnico *Linn. syst. nat.* 10, I p. 56 n. I.
- The Rhinoceros *Edw. Glean. I* p. 24 tab. 221 fig. 2.
- Abada *Dictioun. anim.* I p. 1.
- Rhinoceros *Dictioun. anim.* III p. 690.
- Rhinoceros niet een enkelen Kegelvormigen Hoorn *Houtt. nat. hist.* II p. 329.

- Rhinoceros cornu vnico conico *Gronov. zooph. I p. 4 n. 13.*
- Le Rhinoceros *Buff. hist. nat. XI p. 174 tab. 7.*
- Abada *Bom. dictionn. I p. 1.*
- Rhinoceros ou Porte - corne *Bom. dictionn. IV p. 8.*
- Rhinoceros (unicornis) *Liun. syst. nat. 12, I p. 104. n. 1. III p. 227.*
- Nashorn *Knorr delic. II tab. K, 10 fig. bon.*
- Rhinoceros *Pallas: Nou. comment. petrop. XIII p. 447 tab. 9 fig. cranii fossilis, tab. 10 fig. cornu fossilis.*
- The one corned Rhinoceros *Penn. syn. quadrup. p. 75 n. 58.*
- Rinoceronte *Aless. quadrup. I tab. 14 fig. Buff.*
- Rhinoceros *Pallas: Nou. comment. petrop. XVII p. 585 tab. 15 fig. 1 capitis fossilis, fig. 2, 3 ped. fossilium, tab. 16 cranii.*
- Das einhornige Nasenhorn *Müll. Naturf. I p. 469 tab. 32 fig. 1, 2 Parsons.*
- Rhinoceros *Forsk. fn. orient. p. IV.*
- Das Nashorn: Rhinoceros unicornis *Schreb. Säugth. II p. 229 tab. 77 fig. Riding. tab. 77 B. fig. cran. Pallas.*
- Chartis, Carcand, Carcadden *Arabibus.*
- Carc, Gurg, Kerkedon *Perfis.*
- Lânduga *in regno Dekan.*
- Kand' â - mürrügam *malabarice.*
- Kad'ga - m'rügam *grendice.*
- Abada, Numba *Iauancensibus.*
- Tuabba, Nabba *Hottentottis.*
- Rinoceronte *Italis.*
- Rhinoceronte *Hispanis.*
- Rhinoceros, Porte - corne *Gallis.*
- Nashorn, Nasenhorn *Germanis.*
- Nozorozec *Polonis.*
- Носорог (Nosorog) *Ruffis.*

Magnitudo Elephantis, longitudine corporis ad 12 pedes, pedibus tamen breuioribus, vt 6 - 7 ped. altus fit. Caput suillum, longum, postice latum, occipite eleuato, versus nasum angustatum. Nares transuerfae. Cornu conicum, acuminatum, solidum, fibrosum, fere quatuor pedes longum, nigrum, laeue, supra nasum. Labia rigida, scabra. Labium superius longum, dependens, acuminatum, quasi prehensile, extensile. Dentes duo in angulis maxillae vtriusque, forsan laniarii; molares sex vtrinque (supra 5, infra 6 Pallas). Lingua laeuis. Auriculae maiores, erectae, acutae, pilosae. Oculi minimi versus rostri apicem. Collum breue, crassum. Corpus crassum, abdomine pendulo. Cauda attenuata, pedibus breuior, versus apicem pilis longis, nigris, crassis disticha. Pedes breues, antici incurui, vngulis tribus. Cutis nuda, verrucosa, e fusco nigricans, durissima, fetis raris fuscis aut nigris, hinc inde fasciculatis. Plicae circa collum, humeros, femora in cute molles, colore subincarnato. Penis praeputio quasi duplici.

Habitat intra tropicos in Asiae Africaeque humidioribus vmbrosis. Solitarius, segnis, mitis; irritatus crudeliter saeuens cornu, celer: coeno se volutat; victitat vepretis, spinis. Visu debili laborans excellit odore et auditu. Retrorsum mingit et coit. Parit vnicum, quem adulescere tertio anno dicunt, quod vix credibile. Vox grunniens, quasi Porci. Pugna cum Elephante vix verosimilis, neque lambendo trucidare animal lingua laeui instructum. Mansuescit. Caro mala raro editur. Flagella fiunt ex cute crassa.

Ex hoc forte orta fabula de cornuto asino apud Aristotelem, nec non de vnicornu terrestri.

bicornis. β. *cornibus duobus.*

L' Abada ou Bada *Lobo Abiff.* I p. 290.

Rhinoceros *cornibus duobus cuneiformibus* *Linn. syst. nat.* 6 p. 11 n. 2.

Rhinoceros *cornu gemino.* The double-horned Rhinoceros *Hill anim.* p. 565.

Rhinoceros *bicornis* *Linn. mus. Ad. Frid.* I p. 11.

Rhinoceros (*bicornis*) *cornibus duobus cuneiformibus* *Linn. syst. nat.* 10, I p. 56 n. 2.

Rhinoceros met twee Beitelswyze Hoornen *Houtt. nat. hist.* II p. 346.

Rhinoceros *Parsons: Philos. transact.* LVI p. 32 tab. 2 fig. *cornuum.*

Rhinoceros (*bicornis*) *cornibus duobus* *Linn. syst. nat.* 12, I p. 104 n. 1 β.

The twohorned Rhinoceros *Penn. syn. quadr.* p. 75 n. 58 a.

Zweyhörniges Nasenhorn *Müll. Naturf.* I p. 472.

Similis plane vnicorni, nisi quod alterum cornu idque minus, in fronte inter oculos positum sit. Num forte aetate differt ab vnicorni? Africanos bicornes; Asiaticos vnicornes putat Parsons. Raro et *tricornes* visi.

Cornua bicornis vide quoque apud *Jacob. mus. reg. tab.* 3 fig. 4. *Klein. quadrup. tab.* 2.

23. ELEPHAS.

Dentes Primores nulli vtrinque.

Laniarii superiores elongati.

Proboscis longissima, prehensilis.

Corpus nudiusculum.

maximus. I. ELEPHAS.

Ελεφας; *Arist. hist. anim.* I c. 9 n. 93. II c. 2 n. 3, 4.
c. 3 n. 6. c. 4 n. 8. II c. 5 n. 24. c. 8 n. 38. c. 9
n. 46, 51. c. 11 n. 79, 80. c. 18 n. 133. c. 19 n.
155. III c. 1 n. 7. c. 9 n. 118. IV c. 9 n. 293.
V c. 2 n. 24. c. 13 n. 140. VI c. 27 n. 359. VIII
c. 12 n. 116, 117. IX c. 72 n. 490-495.

Elephas, Elephantus, Luca bos *Plin. hist. nat.* VIII
c. 1-14 (c. 1-14 *Hard.*).

Ελεφας *Aelian. anim.* I c. 38. II c. 11, 18. III c. 46.
IV c. 10, 24, 31. V c. 49. VI c. 52, 61. VII c. 2,
15, 36. VIII c. 10, 15, 17, 27. IX c. 8, 56. X c.
1, 10, 17. XI c. 14, 15. XII c. 44. XIII c. 8, 9.
XIV c. 5, 6. XVI c. 18. XVII c. 7.

Ελεφας; *Oppian. cyneg.* II, 489.

Elephas *Gesn. quadrup.* p. 409 fig. p. 410 mala.

Elephas *Schwenkf. theiort.* p. 87.

The Elephant *Argensf. Molucc.* p. 122.

The Elephant *Borri Cochinch.* p. 795.

Elephants *Purch. Pilgr.* II p. 999, 1471, 1771.

Elephas *Nieremb. hist. nat.* p. 191.

Elephantus *Aldrov. solid.* p. 418 fig. p. 465 *Gesn.*

Elephantus *Ionst. quadrup.* p. 24 tab. 9, 10, 11 figg.
bonae.

Elephants *Boullaye voy.* p. 250.

Elephant *Neub. Gesandtsch.* p. 371 fig. p. 372 bona.

L'Elephant *Marmol Afr.* I p. 58.

Helfant

Bestimmung wasserschwimmender Elephanten in Jo. Wolffg. Heydts
angeltz v. Afr. u. Ost-Ind. Willhermsdorf. 1744. fol. hann.
XCIV. p. 281.

Helfant *Gesn. Thierb. p. 178 figg. p. 179, 180 me-*
diocr. p. 185 mala.

L'Elephant *Perr. anim. III p. 91 tab. 19 fig. bon.*

Elephas *Charlet. exerc. p. 5.*

Elephantus *Ludolf. Actb. L. I c. 10 n. 18 seqq. cum*
fig. comment. p. 147.

Elephant *Knox Ceylon. p. 21.*

Elephant *Blair: Philos. trasact. num. 326 p. 51 cum*
figg. partium et anatome.

Elephas *Rai. syn. quadr. p. 131.*

The Elephant *Barbot Guin. p. 141, 206.*

Elephant *Bossm. Guin. p. 284.*

Elephant *Kolbe Vorgeb. p. 148 tab. 4 fig. 3 mala.*

Elephantus *Hartenf. monogr. cum figg.*

Foetus Elephantis africani ineditus *Seb. thes. I p. 175*
tab. III fig. 1.

Elephas naso cylindraceo elongato *Linn. syst. nat. 2*
p. 48.

The Elephant *Moor. Afr. p. 24.*

Der Elephant *Meyer Thiere I tab. 69 fig. bon.*

Elephas *Linn. syst. nat. 6 p. 11 n. 1.*

Elephas *Klein. quadrup. p. 36.*

Elephas. The Elephant *Hill anim. p. 565 tab. 28 fig.*
bon.

Elephas indicus *Linn. mus. Ad. Frid. I p. 11.*

L'Éléphant; Elephas *Briss. regn. an. p. 45 n. 1.*

Elephant *Adanf. Seneg. p. 75.*

Der Elephant *Hall. vierf. p. 374.*

Elephas (maximus) *Linn. syst. nat. 10, I p. 33 n. 1.*

The Elephant *Edw. glean. I tab. 221.*

Éléphant *Dictionn. anim. II p. 86.*

Olyphant *Houtt. nat. hist. I p. 419.*

Elephas *Gronov. zooph I p. 2 n. 6.*

L'Éléphant *Buff. hist. nat. XI p. 1 tab. 1.*

Elephas (maximus) *Linn. mus. Ad. Frid. II p. 6.*

Elephant *Bom. dictionn. II p. 86.*

Elephas (maximus) *Linn. syst. nat. 12, I p. 48 n. 1.*

L'Elephant femelle. *Buffon suppl. T. III. t. 59.* The

The great Elephant *Penn. syn. quadr. p. 85 n. 62.*

Elefante *Aleff. quadrup. I tab. 11 fig. Buff.*

Der Elephant *Müll. Naturf. I p. 158 tab. 29 fig. 5.*

Der Elefant; *Elephas maximus Schreb. Säugth. II p. 241 tab. 78 fig. Buff. tab. 63 cran. Buff.*

Elefante, Leofante *Italis.*

Elephante *Hispanis.*

Elephant *Gallis.*

Elephant *Germanis.*

Olyfant, Olyphant *Belgis.*

Elephant *Anglis.*

Слонъ (Slon) *Ruffis.*

Naeghe *Aethiopicis.*

Manzao, Manzo *Congenfibus.*

Offon *Guineensibus.*

Wâranam *malabarice.*

Anei *tamulice.*

Maximum quadrupes, ad ped. 14 altum. Corpus canum aut cinereum, rarius albicans, rarissimeque maculatum. pilis raris adpersum. Cutis rugosa densissima. Caput paruum, quadratum quasi, fronte plana. Auriculae amplissimae, pendulae, dentatae. Oculi parui. Proboscis subtus plana, semicylindrica, apice truncato cum acumine digiti loco. Os paruum. Lingua bubula nonnihil maior. Dentes lanarii superiores sursum exserti, ad septem pedes longi, eburnei fibris crispis. Molares plani, quatuor vtrinque. Collum breue. Dorsum valde incuruum. Mammae duae iuxta pectus. Genua vtiq̄ue flexilia. Crura crassa. Pedes indiuisi: ungues supra apices quinque loborum pedum 5-5. Cauda porcina, apice setis crassis quasi disticha. Testes intra corpus latentes. Costarum paria viginti. Vesica fellea nulla. Epiglottis nulla, trachea ab oesophago disclusa.

Habitat

Habitat in India eiusque insulis maioribus et Africa: abundat in Africa australiore; hic autem Elephas magnitudine cedit indico, dentibus quamvis lanariis multo longioribus praeditus, qui in ceylonensi vix prominent ex ore, excepto primogenito mare. Ceylonenses omnium minimi.

Amat paludosas silvas degitque ad annes gregarius. Bene natat proboscide extra aquam prominente. Edit ramos, Cocos, Musae fructus, Guilandinae femina, frumentum: aquam potat turbidam. Docilis proximusque humanis sensibus, memoria benefactorum et malefactorum maxime pollens. Proboscidem longissimam, extensilem, acute odorantem loco manus habet; ea cibum potumque haurit hostemque pellit; eaque praecisa occiditur. Dormit saepe stando. Murem metuit sub somno, ob tracheae insertionem. Retro coit et mingit. Portat ad 2000 libras, proboscide eleuat 200. Obedientissimus homini, rectore collo insidente uncoque ferreo instruente animal. Vulnuscule inter axin et atlantem furiosus occiditur. Mitis, nisi vulneratus aut oestro furens; solitarius autem magis timendus. Femina fortior, at multo pauidior mare. Monogamus. Vterum gerit ultra annum, an biennium? Parit unicum, adolescentem anno trigesimo. Aetas forsan 200-300 annorum. Celerinus. Caro insipida molliuscula editur ab Africanis, proboscide delicatissima. Excrementa equina. Ignem timet. Quiescit supra abdomen. Vox quasi tubae.

Embryo, rarissimum exemplum, est in museo regis Sueciae, olim Sebae.

Dentes et Sceleta fossilia reperiuntur in Sibiria et America passim; haec autem Pennantus deriuat
ex

ex specie aliqua americana huius generis ignota, in interioribus Americae degente, quam vocat: the American Elephant *syn. quadr. p. 91 n. 63.*

Animal obscurum, forte huius generis.

* Sucotyro or Sucotario *Nieuh. East. Ind. p. 360 cum fig.*

Sukotyro ou Sucotario *Bom. dictionn. IV p. 275.*

Sucotyro *Penn. syn. quadr. p. 93.*

Magnitudo Bouis maioris. Os porci. Auriculae magnaë. Cauda crassa iubata. Oculi in summo capite, loco maxime insueto. Cornua duo longa, aut dentes exserti, tenuiores ac in Elephante.

Habitat in Iaua. Visitat vegetabilibus. Rarius captum animal.

24. EQVVS.

Dentes Primores Superiores VI, obtuse truncati.

Inferiores VI, prominentiores.

Laniarii solitarii, vtrinque remoti.

Pedes vngula indiuisa.

Mammae II inguinales.

Caballus. I. E. cauda vndique fetosa.

ἵππος Arist. hist. anim. I c. 5 n. 35. c. 7 n. 63, II c.

5 n. 23. c. 8 n. 43. c. 18 n. 126, 130. III c. 10

n. 133. V c. 11 n. 128, 129. VI c. 22 n. 308-334.

VII c. 17 n. 212-214, 228-236. VIII c. 11 n.

114, 115. IX c. 5 n. 78.

Equus, Equa Plin. hist. nat. VIII c. 42 (c. 64-67

Hard.). X c. 63 (c. 83 Hard.). XI c. 37 (c. 64, 70

Hard.). XXVIII c. 11 (c. 49 Hard.).

Equi-

- Equiferus *Plin. hist. nat. XXVIII c. 10* (c. 45 *Hard.*),
 Ἴππος *Aelian. anim. III c. 2. IV c. 6, 7, 8, 11.*
 Ἴππος *Oppian. cyneg. I, 166.*
 Equus *Gesn. quadrup. p. 442 fig. p. 443.*
 Equus *Schwenkf. theriotr. p. 89.*
 Equus *Aldrov. solid. p. 2 fig. p. 21.*
 Equus *Ionst. quadrup. p. i tab. 1, 2, 3, 4.*
 Cheval sauvage *Marmol Afr. I p. 51.*
 Ross *Gesn. Thierb. p. 306 fig. p. 307.*
 Equus *Charlet. exerc. p. 3.*
 Equus *Wagn. Helvet. p. 174.*
 Equus *Sibb. Scot. an. p. 6.*
 Equus *Rai. syn. quadr. p. 62.*
 Equiferus *Rzac. Polon. p. 217 auct. p. 310.*
 Equi *Rzac. Polon. p. 240 auct. p. 332.*
 Equus *Sloan. Jam. II p. 327.*
 Equus cauda vndique setosa *Linn. syst. nat. 2 p. 48.*
 Equus cauda vndique setosa *Linn. fn. suec. I p. 12*
n. 34.
 Das Pferd *Meyer Thiere I tab. 24.*
 Equus cauda vndique setosa *Linn. syst. nat. 6 p. 11*
n. 1.
 Equus domesticus *Klein. quadrup. p. 4.*
 Equus cauda vndique setosa. The Equus, with the tail
 hairy all over: the Horse *Hill anim. p. 570 tab.*
28.
 Le Cheval *Buff. hist. nat. IV p. 174 tab. 1.*
 Le Cheval; Equus (. . . .) auriculis breuibus
 erectis, iuba longa *Briff. regn. an. p. 100 n. 1.*
 Equus cauda vndique setosa *Kram. Austr. p. 317.*
 Equus cauda vndique setosa: the Horse *Brown. Jam.*
II p. 487.
 Equi feri *Hasselqu. Palaest. p. 282.*

Das

EQVI pedibus posticis calcitrant. Mares utique mammas habent.

Das Pferd *Hall. vierf. p. 227.*

Equus (Caballus) cauda vndique setosa *Linn. syst. nat. 10, I p. 73 n. 1.*

Cheval *Dictionn. anim. I p. 583.*

Hengst: Paard met de Staart overal Hainig *Houtr. nat. hist. III p. 333.*

Equus (Caballus) cauda vndique setosa *Linn. fn. succ. 2 p. 15 n. 47.*

The Horse *Penn. brit. zool p. 1 n. 1.*

Heste *Pontopp. Dan. I p. 593.*

Wild hofes *Bell trav. I p. 212.*

Cheval *Bom. dictionn. I p. 542.*

Equus (Caballus) cauda vndique setosa *Linn. syst. nat. 12, I p. 100 n. 1.*

Tarpany *Rytschk. Orenb. I p. 233.*

Equus Caballus *Forster: Philos. transact. LVII p. 345.*

Wilde Pferde *S. G. Gmel. Reis. I p. 44 tab. 9.*

The Horse *Penn. syn. quadr. p. 1. n. 1.*

Cavallo *Aless. quadrup. II tab. 5 fig. Buff.*

Wilde Pferde *Pallas Reis. I p. 211.*

Das Pferd *Mart. Buff. vierf. I p. 13.*

Das barbarische Pferd *Mart. Buff. vierf. I tab. 1.*

Das spanische Pferd *Mart. Buff. vierf. I tab. 2.*

Das englische Pferd *Mart. Buff. vierf. I tab. 3.*

Das neapolitanische Pferd *Mart. Buff. vierf. I tab. 4.*

Das friesische Pferd *Mart. Buff. vierf. I tab. 5.*

Das Pferd *Mart. Buff. vierf. I tab. 6.*

Der Hengst *Müll. Naturf. I p. 446.*

Equus (Caballus) cauda vndique setosa *Müll. Dan. prodr. p. 6 n. 42.*

Cavallo (*mas*); Cavalla (*femina*); Cavallo castrato (*castratus*); Polledro (*pullus*) *Italis.*

Cavallo, Caballo (*mas*); Yegua (*femina*); Caballo castrado (*castratus*); Potranca (*pullus triennis*); Potro (*pullus quadriennis*) *Hispanis.*

Cavallo (*mas*); Egoa (*femina*); Cavallo castrado (*castratus*) Faca, Faquinha (*pullus*) *Lusitanis.*

- Cheval (*mas*); Cavale, Jument (*femina*); Cheval
 öngre (*castratus*); Poulain (*pullus*) *Gallis*.
- March, Ceffyl (*mas*); Cafeg (*femina*); Dispaiddfarch
 (*castratus*) *Cambrenfibus*.
- Pferd, Roß (*totā species*); Hengft (*mas*); Stute, Stutte
 (*femina*); Wallach (*castratus*); Füllen (*pullus*) *Ger-*
manis.
- Paard, Paerdt (*totā species*); -Hengft (*mas*); Mere (*fe-*
mina) *Belgis*.
- Horfe (*mas*); Mare (*femina*); Gelding (*castratus*);
 Colt (*pullus*) *Anglis*.
- Helt (*totā species*); Hingft (*mas*); Hoppe (*femina*)
Danis et Noruegis.
- Häft *Succis*.
- Koń *Polonis*.
- Конь (Kon'), Лошадь (Lofchad') (*totā species*);
 Жеребецъ (Sherebetz) (*mas*); Кобыла (Koby-
 la) (*femina*); Меренъ (Meren), Волохъ (Wo-
 loch'), Кладенои конь (kladenoï kon') (*castra-*
tus); Жеребенокъ (Sherebenok) (*pullus*) *Ruffis*.
- Alafchäh (*totā species*); Aiger (*mas*); Baitäl, Biä
 (*femina*); Tai (*pullus*) *Tataris*.
- Imnä (*totā species*); Ôfcha (*mas*); Wüllä (*femina*);
 Alafchäh (*castratus*); Tſchäma (*pullus*) *Tſchere-*
miſſis.
- Ut (*totā species*); Irjä (*mas*); Kſrjäh (*femina*); Ti-
 chäh (*pullus*) *Tſchuwaſchis*.
- Wal (*totā species*); Uloſchò (*mas*); ürwal (*femina*);
 Tſchüni (*pullus*) *Woriakis*.
- Uſchmäh (*totā species*); Aiger (*mas*); Eldä (*femina*);
 Parna, Wäſchina (*pullus*) *Morduanis*.
- Wüll (*totā species*); Tſchan (*pullus*) *permice*.
- Wöll (*totā species*); Wöll (*mas*); Kobüllä (*femina*);
 Uſch (*castratus*); Tſchan (*pullus*) *firjänice*.

Habitat ferus utique circa Tanañ et per omnem Ta-
 tariam magnam in deſertis gregatim: *boſpatur*
 hodie

hodie fere vbique; in America ignotus ante Hispanos. Ex mansueto ferus rursus factus reperitur hodie passim gregarius, mare aliquo duce, minor, vix domandus.

Animal generosum, superbum, fortissimum in currendo (visus qui cucurrit $82\frac{1}{2}$ ped. angl. in minuti secundi tempore), portando, trahendo; aptissimum equitando, cursu furens. Silais delectatur. Posteriora curat; cauda Conopes Tabanosque abigit. Alterum scalpit. Pullum iniuriae obnoxium reponit; hinnitu socium vocat. Calcitrando pugnat; sudans se volutat. Vegetabilia edit Boue propius; femina disseminat; ventriculo exiguo, intestino colo coccoque maximo; sterCUS incalescit; cystide fellea caret; non vomit. Equuleus Hippomane natus pedibus elongatis. Laeditur globulo auris, acicula pedis, nasi capistro, dentibus sebo illitis, Padi herba, Phellandrii Curculione? Conope irritante. Edit impune Aconitum. Vtero gerit 290 diebus. Laniarios dentes anno quinto acquirit, primores mutat anno secundo, tertio, quarto. Caro Tataris esculenta.

Equus cornutus, monstrosus *Mus. Worm. p. 341 cum fig.*

* * *

Equus Hemionus, Mongolis Dshicketaei dictus *Pallas: Nou. comm. petrop. XIX p. 394. †*

Habitat ferus in Mongolia. Caro edulis Mongolis et Tungusis. Distinguit hunc doctiss. Pallas, sed nondum vidi tomum recentissimum operis.

* * *

Afinus. 2. E. cauda extremitate setosa, cruce nigra supra humeros.

ferus. α) *Ferus*, cum synonymis specie.

Afinus filuestris *Plin. hist. nat. VIII c. 30* (c. 46 *Hard.*).

Onager *Plin. hist. nat. VIII c. 44* (c. 69 *Hard.*) c. 58 (c. 73 *Hard.*).

Onager, Onager siue Afinus filuestris *Gesn. quadrup. p. 19.*

Onager *Aldrov. solid. p. 352.*

Afinus cornutus *Aldrov. solid. p. 382 fig. p. 383 pessima.*

Onager *Ionst. quadrup. p. 20.*

Onager, Waldefel *Ionst. quadrup. tab. 7 fig. mala cornuta.*

Onager Aldro: Waldefel *Ionst. quadrup. tab. 8 fig. Aldrov.*

L'Asne sauvage *Marmol Afr. I p. 53.*

Esel *Gesn. Thierb. p. 91 cum fig. mediocri.*

Afinus *Charlet. exerc. p. 4.*

Onager *Rai. syn. quadr. p. 63.*

Equus cauda extrema setosa *Linn. syst. nat. 2 p. 48.*

Equus cauda extrema setosa *Linn. syst. nat. 6 p. 11 n. 2.*

Afinus filuestris, Afiniferus, Onager *Klein. quadrup. p. 7.*

Tschigitai *I. G. Gmel. Sibir. II p. 107?*

Equus cauda extrema setosa. The Equus, with the tail hairy at the end: the As *Hill anim. p. 570.*

L'Asne *Buff. hist. nat. IV p. 377 tab. 11.*

L'Ane sauvage: Equus (Onager) auriculis longis, iuba breui, pelle tuberculis paruis scabra *Briff. regn. an. p. 104 n. 5.*

Der wilde Esel, Waldefel *Hall. vierf. p. 252.*

Equus (Afinus) cauda extremitate setosa, cruce nigra supra humeros *Linn. syst. nat. 10, I p. 73 n. 2.*

Ané sauvage *Dictionn. anim. I p. 122.*

Ezel:

Ezel: Paard met de Staart aan 't end Hairig, een
zwart Kruis boven op de Rug *Houtt. nat. hist. III*
p. 385.

Wild Asses *Bell trav. I p. 212.*

Ane *Bom. dictionn. I p. 113.*

Equus (Asinus) cauda extremitate setosa, cruce nigra
supra humeros *Linn. syst. nat. 12, I p. 100 n. 2.*

Kulany *Rytscbk. Orenb. I p. 233?*

The Ass *Penn. syn. quadr. p. 3 n. 3.*

Der Esel *Mart. Buff. vierf. I p. 187 tab. 8.*

Der Esel *Müll. Naturf. I p. 453.*

Онaгръ (Onagr) *Russis.*

domesticus. β) domesticus.

Onos *Arist. hist. anim. I c. 7 n. 63 II c. 18 n. 130. V*
c. 11 n. 130 VI c. 23 n. 335-351.

Asinus *Plin. hist. nat. VIII c. 43 (c. 68 Hard.).*

Asinus *Gesn. quadrup. p. 3 fig. p. 4 bona.*

Asinus *Schwenckf. theriotr. p. 61.*

Asinus *Aldrov. solid. p. 295.*

Asinus *Ionst. quadrup. p. 16 tab. 6.*

Asne *Tavern. voy. I p. 344.*

Asinus *Sibb. Scot. an. p. 6.*

L' Ane *Chardin voy. III p. 33.*

Asinus *Rai. syn. quadr. p. 63.*

Asinus *Sloan. Iam. II p. 327.*

Equus cauda extremo setosa *Linn. fn. suec. I p. 12*
n. 35.

Der Esel *Meyer Thiere II tab. 44.*

Asinus *Klein. quadrup. p. 6.*

L' Ane: Equus (Asinus) auriculis longis, flaccidis,
iuba breui *Briff. regn. an. p. 102 n. 3.*

Equus cauda extrema setosa *Kram. Austr. p. 318.*

Equus cauda extrema setosa: the Ass *Brown. Iam. p.*
487.

Der Esel *Osborn. Ostind. p. 35.*

Der Esel *Hall. vierf.* p. 247.

Ane *Diſtionn. anim.* I p. 121.

The Aſs *Penn. brit. zool.* p. 5 n. 3.

Uſchaki oder Eſel *Rytſchbk. Orenb.* I p. 230.

Aſino *Aleſſ. quadrup.* II tab. 52 fig. Buſſi.

Aſino, Miccio (*mas*); Miccia (*femina*) *Italis.*

Aſno, Borrico (*mas*); Borrica (*femina*) *Hispanis.*

Burro (*mas*); Aſna, Burra (*femina*) *Lufitanis.*

Ane (*mas*); Aneſſe (*femina*) *Gallis.*

Aſyn (*mas*); Aſen (*femina*) *Cambrenſibus.*

Eſel (*mas*); Eſelinn (*femina*) *Germanis.*

Eczel, Ezel *Belgis.*

Aſs *Anglis.*

Aſna *Suecis.*

Осе́лб (Oſel) (*mas*); Ослѣ́ца (Oslitza) (*femina*)
Ruffis.

Habitat in Tataria meridionali, gregarius, celerri-
mus; cultus degener hoſpitatur hinc inde: opti-
mus in calidioribus. In Anglia non ante regnum
Elifabethae reginae.

Minor Caballo. Capud grande. Labia craſſa. Auri-
culae magnae flaccidae. Iuba brevis. Cauda lon-
gior quam Caballo, extremitate tantum piloſa. Co-
lor cinereus aut fulcus, linea dorſali nigra, nec non
transverſali ſcapularum. Penis ingens.

Tardus inceſſuque piger, manſuetus ſtupidusque, ru-
dens, libidinoſus, frigoris impatiens; plagarum et
penuriae tolerantiffimus, laborioſiſſimusque. Non
niſi aſſuetos potat fontes, in cibo minus delicatus
eſt ipſisque ſpinis carduiſque, contentus. Parit
poſt dies 290 unicum, raro imo rariffime gemel-
lum. Aetas ad annum trigefimum.

*Mulus.*γ) *Hybridus ex Asino et Equa.*Ορεος *Arist. hist. anim. I c. 7 n. 63. II c. 5 n. 23. VI c. 24 n. 352-356.**Mula, Mulus Plin. hist. nat. VIII c. 44 (c. 69 Hard.). XI c. 37 (c. 74 Hard.).**Mulus Gesn. quadrup. p. 793 cum fig. bona.**Mulus Schwenckf. theriotr. p. 62.**Mulus Aldrov. solid. p. 358.**Mulus Ionst. quadrup. p. 21 tab. 6 fig. bon.**Maulesel Gesn. Thierb. p. 108 cum fig. bon.**Mulus Charlet. exerc. p. 4.**Mulus Rai. syn. quadr. p. 64.**Mulus Sloan. Iam. II p. 327.**Asinus biformis Klein. quadrup. p. 6.**Les grands mulets Buff. hist. nat. IV p. 401.**Le Mulet: Equus (Mulus) auriculis longis, erectis, iuba breui Briff. regn. an. p. 103 n. 4.**Die Maulesel Osb. Ostind. p. 35.**Der Maulesel Hall. vierf. p. 251.**Muilezel Houtt. nat. hist. III p. 397.**The Mule Penn. brit. zool. p. 6.**Mulet et Mule Bom. dictionn. III p. 162.**Mulus Linn. syst. nat. 12, I p. 101 n. 2 β.**The Mule Penn. syn. quadr. p. 3.**Die grossen Maulesel Mart. Buff. vierf. I p. 223.**Der Maulesel Mart. Buff. vierf. I tab. 9.**Das Maulthier, dessen Vater der Esel, und die Mutter ein Pferd ist Müll. Naturf. I p. 455.**Mula Italis.**Mulo, Mula, Macho, Azemila (id est: iumentum)**Hispanis. Patrem dicunt Garañon.**Mu (mas); Mula (femina) Lusitanis.**Mulet, Mule Gallis.**Mul (mas); Mules (femina) Cambrensis.**Maulthier, Maulesel Germanis.**Muyl, Muylezel Belgis.**Mule Anglis.*

Mulâna *Suecis.*

Лошакъ (Lofchak), Мулъ (Mul'), Мескъ (Mefk)
Ruffis.

Sterilis vti reliqua hybrida animalia, rarissime tamen parere visa est. Optimus mulus hispanicus est, maximus in Sabaudia.

Hinnus. δ) *Hybridus ex Equo et Asina.*

Γιννος *Arist. hist. anim. I c. 7 n. 63.*

Mula, *Hinnus Plin. hist. nat. VIII c. 44 (c. 69 Hard.).*

Hinnus, Innus et Ginnus Gesn. quadrup. p. 18.

Hinnus Aldrov. solid. p. 358.

Hinnulus, Hinnus Ionst. quadrup. p. 21.

Hinnus Charlet. exerc. p. 4.

Hinnus seu Hinnulus Rai. syn. quadr. p. 64.

Les petits mulets *Buff. hist. nat. IV p. 401.*

Hinnus Linn. syst. nat. 12, I p. 101 n. 2 γ.

Die kleinen Maulesel *Mart. Buff. vierf. I p. 223.*

Das Maulthier, dessen Vater ein Pferd, und die Mutter ein Esel ist *Müll. Naturf. I p. 455.*

Minus bonus Mulo. Minor, plerumque rubicundior, auriculis equi, iuba. et cauda asini.

Zebra. 3. *E. fasciis fuscis transuersis.*

Ουαγρο; *Oppian. cyneq. III, 183.*

The Zebra *Purch. Pilgr. II p. 1001.*

Zebra Nieremb. hist. nat. p. 168.

Zebra indica Aldrov. solid. p. 416 fig. p. 417 mala.

Zebra indica Ionst. quadrup. p. 21.

Zebra indica, indianisch Maulthier Ionst. quadrup. tab. 5 fig. mala.

Equus indicus, indianisch Pferd Ionst. quadrup. tab. 5 fig. mala.

Asne de beauté extraordinaire Thevenot. voy. II p. 473.

India-

Indianisch Maulthier, eine Art Maulthier *Gesr. Thierb.*
p. 120 cum fig. mala.

Zebra *Charlet. exerc. p. 4.*

Zecora *Ludolf. Aeth. I c. 10 n. 35. Comment. p. 150*
cum fig.

Zebra *Rai. syn. quadr. p. 64.*

Equus brasiliensis *Iacob. mus. reg. p. 3 tab. 2 fig. 1*
Laur. mus. reg. tab. 3 fig. 18 figg. capitis.

Une espece de fort beaux anes *Dampier voy. II p.*
250.

Zebra *Barbot Guin. p. 486.*

Wilder Esel *Kolbe Vorgeb. p. 146 tab. 3 fig. 2 me-*
diocr.

Zeura ou Zecora *Lobo Abiss. I p. 291.*

Equus lineis transuersis vericolor *Linn. syst. nat. 2*
p. 48.

Equus lineis transuersis vericolor *Linn. syst. nat. 6*
p. 11 n. 3.

Equus ferus, genere suo; Zebra, Zecora *Klein. qua-*
drup. p. 5.

Equus lineis transuersis vericolor. The transversely
streaked Equus: the Zebra or wild Ass *Hill anim.*
p. 571 tab. 28 fig. mala.

Le Zébre ou l'âne rayé: Equus (Zebra) auriculis
breuibus erectis, iuba breui, lineis transuersis
vericolor *Briff. regn. an. p. 101 n. 2.*

Das Zebra *Hall. vierf. p. 245 tab. 1.*

Equus (Zebra) fasciis fuscis vericolor *Linn. syst. nat.*
10, I p. 74 n. 3.

The Male Zebra *Edw. glean. I tab. 222.*

The Female Zebra *Edw. glean. I tab. 223.*

Une sauvage du cap de bonne esperance *Dictionn.*
anim. I p. 123.

Zebre au âne rayé *Dictionn. anim. IV p. 587.*

Paard met Streepen dwars over 't Lyf, van gemen-
gelde Kleur *Houtr. nat. hist. III p. 400.*

Le Zébre *Buff. hist. nat. XII p. 1 tab. 1, 2.*

Zebre ou âne rayé *Bomm. dictionn. IV p. 645.*

Equus (Zebra) fasciis fuscis versicolor *Linn. syst. nat. 12, 1 p. 101 n. 3.*

Africanisches Tygerpferd oder Eselpferd *Knorr delic. II tab. K, 8 fig. mediocr.*

The Zebra *Bancr. Guian. p. 486.*

The Zebra *Penn. syn. quadr. p. 2 n. 2.*

Zebra *Aless. quadrup. II tab. 89 fig. Buff.*

Der gestreifte Esel *Müll. Naturf. I p. 456.*

Zebra *Congenfibus.*

Burro do Matto *Lusitanis.*

Magitudo equi mediocris. Figura magis accedit ad asinum vel potius ad mulum quam ad equum: capite grandiore, rostro crasso, auriculis longis, erectis. Iuba colli brevis fastigiata. Color feminae albidus, maris rufescens, fasciis nigris digitos tres latis per totum corpus transuersis. Cauda Asini.

Habitat in Africae meridionali parte, praecipue ad promontorium bonae spei. Gregarius, celerrimus; malignus indocilisque.

25 CAMELVS.

Dentes Primores superiores nulli.

Inferiores VI spathiformes.

Laniarii distantes: superiores III; inferiores II.

Cornua nulla.

Labium superius fissum.

Pedes subdidactyli.

Dromeda- I. C. topho dorsi vnico.

rius. Καμηλος αραβιος *Arist. hist. anim. II c. 4 n. 17. c. 6 n. 26. c. 8 n. 42. c. 9 n. 50. c. II n. 62. V c. 2*

n. 23. c. 13 n. 139. VI c. 26 n. 358. VIII c. II n. 115-117. IX c. 73 n. 496, 497.

Camelus Arabiae *Plin. hist. nat. VIII c. 18 (c. 26 Hard.) XI c. 41 (c. 96 Hard.)*

Camelus Dromas *Gesn. quadr. p. 171 fig. p. 172.*

Camelus Dromas *Alpin. Aeg. I p. 223 tab. 12 fig. bon.*

Camelus Dromedarius *Schwenckf. theriotr. p. 73.*

Camelus *Aldrov. bisulc. p. 889.*

Camelus baëtrianus *Aldrov. bisulc. p. 908 fig. mala.*

Camelie *Olear. Reis. p. 570.*

Camelus *Ionst. quadrup. p. 95 tab. 42, 44 figg. bonae; tab. 43 fig. mala.*

Dromedarii *Ionst. quadrup. tab. 41 figg. mediocr.*

Les Chameaux *Boullaye voy. p. 255.*

Camells *Ligon Barb. p. 58.*

Le Chameau *Marmol Afr. I p. 48.*

Dromedary, ein Art Kamelthier *Gesn. Thierb. p. 234 fig. p. 235 mediocr.*

Le Chameau *Perr. anim. I p. 69 tab. 7 fig. bon.*

Le Chameau *Tavern. voy. I p. 106.*

Comelus arabicus *Charlet. exerc. p. 12.*

Dromedarius *Charlet. exerc. p. 13.*

Le Chameau *Chardin voy. III p. 37.*

Camelus vnico in dorso gibbo seu Dromedarius *Rai. syn. quadr. p. 143.*

The Dromedary *Barbot Guin. p. 53.*

A Cabo verde Camel *Barbot Guin. tab. B.*

The Camel *Shaw trav. p. 239.*

The Mithary, Dromas or Dromedary *Shaw trav. p. 240.*

Camelus topho dorfi vnico *Linn. syst. nat. 2 p. 49.*

The Camel *Pocock. orient. I p. 207.*

Camelus topho dorfi vnico *Linn. syst. nat. 6 p. 13 n. 1.*

Camelus, Imel, Arabicus *Klein. quadrup. p. 42.*

Camelus minimus; Dromedarius *Klein. quadrup. p. 42.*

Camelus topho dorfi vnico. The Camelus, with a single bunch on the back: the Dromedary *Hill anim. p. 573 tab. 28 fig. mala.*

Le Dromadaire: Camelus (Dromedarius) vnico in dorſo tubere *Briff. regn. au. p. 55 n. 2.*

Camelus topho dorfi vnico *Kram. Austr. p. 318.*

Camelus topho dorfi vnico, vertice glanduloſo: the Camel *Brown. Iam. p. 488.*

The Turkman Camel *Ruff. Alepp. p. 56.*

The Arab Camel *Ruff. Alepp. p. 57.*

The Dromedary *Ruff. Alepp. p. 57.*

Das Kameel *Haffelqn. Palæſt. p. 281.*

Der Dromedar *Hall. vierf. p. 386 tab. 14.*

Das kleine Poſtkameel mit kleinerm Haarſattel *Hall. vierf. p. 388.*

Camelus (Dromedarius) topho dorfi vnico *Linn. ſyſt. nat. 10, I p. 65 n. 1.*

Dromadaire *Dictionn. anim. II p. 57.*

Kemel met écne Bult op de Rug *Houtt. nat. hiſt. III p. 11.*

Dromadaire *Bom. dictionn. I p. 471.*

Camelus (Dromedarius) topho dorfi vnico *Linn. ſyſt. nat. 12, I p. 90 n. 1.*

The Arabian Camel *Penn. ſyn. quadr. p. 60 n. 50.*

Dromedario *Aleſſ. quadrup. I tab. 3 fig. Buſſi.*

Das Kameel *Müll. Naturf. I p. 365.*

Camelus vulgaris, Djämmel *Forsk. fn. orient. p. IV.*

Camelus Dromedarius, Hadjin *Forsk. fn. orient. p. IV.*

Dromedario, Dromedal *Hispanis.*

Dromedario *Lufitanis.*

Dromedario *Italis.*

Le Dromadaire *Gallis.*

Dromedar *Germanis.*

Dromedary *Anglis.*

Верблюды скоро бѣгающія (Werblud ſkoro be'ga-jusczii) *Ruffis.*

Egin *Mauris.*

Altitudo corporis $6\frac{1}{2}$ pedum. Caput paruum. Auriculae breues. Collum longum, gracile, curuatum, pilis longioribus. Tophus in dorso vnicus, pilis longioribus vestitus. Calli in pedibus anterioribus quatuor, in posterioribus duo, in sterno vnus. Cauda pedibus breuior. Pedes bifidi. Corpus pilis mollioribus vestitum. Color ex rufo cinereus, in topho obscurior. Ventriculus secundus cellulofus pro aqua pura diutius asseruanda in siticulosis desertis. Os et gingivae mira cartilagine inductae, ne nocent spinae plantarum deserti, quae omnes fere armatae sunt, quasque cetera animantia horrent, quarum vero heluo Camelus est.

Habitat ferus in desertis Asiae temperatae; cultus in Oriente, vtilissimus pro itineribus in desertis arenosis siticulosis. Introductus quoque in insulas Iamaicam et Barbados, at male cultus.

Portat ad 1200 libras. Lente festinat, nec ultra adfuetum procedit spatium, nec plus instituto onere recipit; lassus iacet supra pectus. Famem fert patientissime, potuque caret facile per dies plures. Mitis, excepto oestri tempore, vbi furit. Amat musicam. Caro vitulorum Arabibus in deliciis est.

Varietates plures propriis distinctae nominibus in terris orientalibus: portant aliae onera, aliae itinerebus velocioribus destinantur. Raguahil, siue Elmahari Arabum per nouem dies quotidie currit ultra milliaria viginti germanica.

Bactria- 2. C. tophis dorfi duobus.

nus. Καμηλος βακτριανός *Arist. hist. anim. II c. 3 n. 17. c. 6 n. 26.*

Camelus Bactriae *Plin. hist. nat. VIII c. 18 (c. 26 Hard.).*

- Καμηλος *Aelian. anim. III c. 47. IV c. 55. VI c. 60.*
 X c. 3.
 Καμηλος *Oppian. cyneg. III, 482.*
 Camelus *Gesn. quadrup. p. 162 fig. p. 163 bon.*
 Camelus *Schwenkf. theriotr. p. 72.*
 Camelus turcicus *Alpin. Aeg. I p. 223 tab. 13 fig.*
 mediocr.
 Camelus *Aldrov. bisulc. p. 889.*
 Arabes Cameli *Aldrov. bisulc. p. 907 fig. mala.*
 Dromedarii *Olear. Reis. p. 570.*
 Cameli bactriani *Ionst. quadrup. p. 97.*
 Dromedarii *Ionst. quadrup. tab. 42 fig. mediocr.*
 Camelus bactrianus seu Dromedarius *Ionst. quadrup.*
tab. 43 fig. mala.
 Dromedarius *Ionst. quadrup. tab. 44 fig. mediocr.*
 Kamelthier *Gesn. Thierb. p. 231 fig. p. 232 mediocr.*
 Camelus bactrianus *Charlet. exerc. p. 13.*
 Camelus duobus in dorso tuberibus, seu Bactrianus
Rai. syn. quadr. p. 145.
 Camelus tophis dorfi duobus *Linn. syst. nat. 2 p. 49.*
 Camelus tophis dorfi duobus *Linn. syst. nat. 6 p. 13*
n. 2.
 Camelus, Beschet; Bactrianus fortissimus *Klein. qua-*
drup. p. 41.
 Camelus tophis dorfi duobus. The Camelus, with
 two bunches on the back: the Bactrian Camel
Hill anim. p. 574 tab. 28 fig. mediocr.
 Le Chameau: Camelus (. . . .) duobus in dor-
 so tuberibus *Briff. regn. an. p. 53 n. 1.*
 Camelus tophis dorfi duobus *Kram. Austr. p. 318.*
 The Camel with two bunches on its back *Ruff. Alepp.*
p. 57.
 Das baktrianische Kameel *Hall. vierf. p. 384.*
 Camelus (Bactrianus) tophis dorfi duobus *Linn. syst.*
nat. 10, I p. 65 n. 2.
 Chameau *Dictienn. anim. I p. 478.*

Kemel

Kemel met twee Bulten op de Rug *Houtr. nat. hist.*
III p. 22.

Le Chameau *Buff. hist. nat.* XI p. 211, 426 tab. 22.

Chameau *Bom. dictionn.* I p. 471.

Camelus (baetrianus) tophis dorsi duobus *Linn. syst.*
nat. 12, I p. 90 n. 2.

Trampelthier oder Dromedar *Knorr delic.* II tab. K,
6 fig. mediocr.

Camelus Baetrianus *Forster: Philof. transact.* LVII
p. 343.

The baetrian Camel *Penn. syn. quadr.* p. 63 n. 51.

Camello *Aless. quadrup.* I tab. 19 fig. Buff.

Kamele *Pallas Reis.* I p. 397.

Der Dromedar *Müll. Naturf.* I p. 369.

Camelus Baetrianus, Böcht *Forsk. fu. orient.* p. IV.

Camello *Italis.*

Camello *Hispanis.*

Camello *Lusitanis.*

Chameau *Gallis.*

Kameel *Germanis.*

Kemel *Belgis.*

Camel *Anglis.*

Верблюды (Werblūd) *Ruffis.*

Düä *Tataris.*

Tüë *Tscheremiffis.*

Tüä *Tschuwafchis.*

Duï *Woriakis.*

Ischim, Werblūd *Morduanis.*

Similis praecedenti, iungitque utrosque Buffonius.

Hic autem maior, tophisque dorsi duobus, postico
maiore. Calli utriusque in Dromedario. Praeputium
longissimum retro versum.

Habitat ferus in India boreali et versus Sinense im-
perium in desertis. Cultus in Oriente rarior occurrit.

Mores Dromedarii, vsusque iidem. Coit difficillime, Februario mense. Ventrem fert menses duodecim, paritque vnicum, quem lactat per duo annos. Adolefcit anno tertio. Buxo occiditur.

Sunt quoque *hybridi Cameli* huius et praecedentis.

- Llama. 3. C. dorso laeui, top̄o pectorali.
 Pelon Ichiatl Oquitli Ouis peruana *Hernand. Mex. p. 660 cum fig. mala.*
 Peruichcatl *Fernand. anim. p. 111.*
 Llama *Laet Amer. p. 405.*
 Guanaco siue Huanacu *Laet Amer. p. 406.*
 Aries Moromorus *Nieremb. hist. nat. p. 182 fig. mala.*
 Sheep *Ovalle Chile p. 44.*
 Guanaco's, wild Goats *Ovalle Chile p. 44.*
 Ελαφοκαμηλος *Marcgr. Brasil. p. 243 cum fig. bon.*
 Ελαφοκαμηλος *Marcgr. de Chili regn. p. 38 cum fig. eadem.*
 Ouis peruana *Ionst. quadrup. tab. 46 fig.*
 Ceruo-camelus *Ionst. quadrup. tab. 29 fig.*
 Hirschkamel *Gesn. Thierb. p. 239 cum fig. Marcgr.*
 Ouis peruana *Charlet. exerc. p. 9.*
 Camelus peruvianus Glama dictus Rai. *syn. quadr. p. 145.*
 Sheep of Peru *Cieza Peru p. 232.*
 Guanacos *Cieza Peru p. 233.*
 Moutons *Fenill. Journ. III p. 23.*
 Moutons de Perou *Frezier voy. I p. 264 tab. 22 fig. A bona.*
 Camelus dorso laeui, pectore gibboso *Linn. syst. nat. 2 p. 49.*
 Camelus dorso laeui, pectore gibboso *Linn. syst. nat. 6 p. 13 n. 3.*
 Llama *Ulloa voy. I p. 365 tab. 24 fig. 5 mediocr.*
 Le Guanaco *Ulloa voy. I p. 366.*
 Huanaco, Taruga *Ulloa voy. I tab. 24 fig. 5 mediocr.*

Amida ap. Ulr. Schmidel Straubingenen 7. 72 ed. noyember 1602.

Camelus spurius, Peruanus, Glama dictus *Klein. quadrup. p. 42.*

Camelus dorso laeui, pectore gibboso. The Camel, with the back even, and the breast gibbose: the Glama *Hill anim. p. 574.*

Le Chameau du Perou: Camelus (Peruanus) pilis breuissimis vestitus *Briff. regn. an. p. 56 n. 3.*

Die Kameelsziege *Hall. vicrf. p. 309.*

Camelus (Glama) dorso laeui, topho pectorali *Linn. syst. nat. 10, I p. 65 n. 3.*

Glama *Diçtionn. anim. II p. 267.*

Guanaco *Diçtionn. anim. II p. 356.*

Peruviaansche Kemel: Kemel met een gelyke Rug en een Bult aan de Borst *Houtt. nat. hist. III p. 26.*

Glama *Bom. diçtionn. II p. 327.*

Guianacoes *Bom. diçtionn. II p. 410.*

Le Lama *Buff. hist. nat. XIII p. 16.*

Camelus (Glama) corpore laeui, topho pectorali *Linn. syst. nat. 12, I p. 91 n. 3.*

The Llama *Penn syn. quadrup. p. 64 n. 52.*

Das Guianicoe *Hawkesw. Secreif. I p. 148 cum fig. bon.*

Das peruvianische Schaafkameel *Müll. Naturf. I p. 371.*

Das Schafdromedar: Camelus Guanicoe *Müll. Naturf. Suppl. p. 50.*

Llama (*femina*); Urco (*mas*) *Peruanis.*

Chillehueque *Chiliensibus.*

Carnero de la tierra *Hispanis.*

Longitudo corporis ♂ pedum; altitudo 4 - 4½ ped. Caput paruum. Oculi magni, nigri. Auriculae erectae, antrorsum versae. Collum longum arcuatum. Corpus absque lana, pilis tectam, longioribus in feris, breuibus in mansuetis. Cauda breuis. Tophus sub pectore liquorem fecernens (an sic natura aut mor-

bo?) Color subflauus, in ventre albicans: man-
fuetus albo, nigro, fuscoque variegatus.

Habitat in montibus altioribus regni Peruani, sub no-
mine Guanico s. Guanaco, celerrimus, gregarius:
cultus Llama audit.

Frigoris impatiens. Mitis, portat ad 150 libras, fat
lente, ad milliaria germanica tria quotidie per
dies tre aut quatuor, tunc autem quiescit per diem
vnum. Fatigatus succumbit; obstinatus compressis
testiculis compellitur; vomitu siue salina ad pas-
sus decem eiecta corrosua hostem pellit. Sitim
fert ad dies quatuor aut quinque, neque cibo de-
licatus est. Caro sapore veruecinæ, haud bona.
Salax; coit difficillime: diem consumit, antequam
actum ipsum venereum incipiat et absoluat. Parit
vnicum vel gemellos. Adolefcit anno tertio. Pili
lanæ loco inseruiant.

- Pacos. 4. *C. tophis* nullis, corpore lanato.
Alia species Pacos dicta *Hernand. Mex. p. 663.*
Paco Laet Amer. p. 405.
Vicunna Laet Amer. p. 406.
Vicuna Nieremb. hist. nat. p. 184 fig. p. 185 pessima.
Ovis chilensis Marcgr. Brasil. p. 244 cum fig.
Ovis-Camelus Marcgr. de Chili reg. p. 37 cum fig.
Veruex alius peregrinus Ionst. quadrup. tab. 23 fig.
bona exceptis pedibus anticis.
*Camelus seu Camelo congener Peruvianum lanige-
rum Pacos dictum Rai. syn. quadr. p. 147.*
Vicunna Cieza Peru p. 233.
Les Vicognes ou Vicuñas Frezier voy. I p. 266.
Alpaque Frezier voy. I p. 267.
Camelus gibbis nullis Linn. syst. nat. 2 p. 49.
Camelus gibbis nullis Linn. syst. nat. 6 p. 13 n. 4.
Vicunna Ulloa voy. I p. 506, 525 tab. 24 fig. 3 mala.
Camelus

Camelus laniger, peruanus, Pacos *Klein. quadrup. p. 42.*

Camelus gibbis nullis. The Camel, without any gibbosity *Hill anim. p. 575 tab. 28 fig. bona.*

La Vigogne: Camelus (. . .) pilis prolixis toto corpore vestitus *Briff. regn an. p. 57 n. 4.*

Das Peruanische Schaafkameel *Hall. vierf. p. 389* confundit tamen cum antecedente.

Camelus (Pacos) tophis nullis corpore lanato *Linn. syst. nat. 10, I p. 66 n. 4.*

Paco *Dictionn. anim. III p. 313.*

Vigogne *Dictionn. anim. IV p. 526.*

Schaap van Chili: Kameel zonder Bulten, het Lighaam met Wol bekleed *Houtt. nat. hist. III p. 28.*

Vigogne ou Vicogne *Bom. dictionn. IV p. 597.*

Le Paco *Buff. hist. nat. XIII p. 16.*

Camelus (Pacos) tophis nullis, corpore lanato *Linn. syst. nat. 12, I p. 91 n. 4.*

The Pacos *Penn. syn. quadr. p. 66 n. 53.*

Das Chilische Schaafkameel *Müll. Naturf. I p. 372.*

Minor praecedente. Caput et auriculae minores. Corpus totum lana mollissima praestantissimaque vestitum, colore profunde purpureo, subtus album. Mansuetus variegatus colore nigro, albo, rufoque, atque minor est.

Habitat in montibus altioribus regni Peruani, gregarius. Timidus celerimusque. Non portat ultra 50-70 libras. Bezoar quoque est ex huius ventriculo. Caro minus bona. Adstupet funi cum alligatis panniculis.

26. BOS,

Dentes Primores superiores nulli.
inferiores VIII.

Laniarii nulli.

Cornua concava, antrorsum versa, lunata,
laevia.

Pedes ungulati.

Mammæ inguinales.

Taurus. I. B. cornibus teretibus extrorsum curvatis, pallearibus laxis.

Vrus. a) *Ferus, cum synonymis totius speciei.*

Bovs Arist. hist. anim. V c. 11 n. 131. VI c. 17 n. 215 - 218. c. 21 n. 292 - 307. VIII c. 10 n. 110 - 113. IX c. 5 n. 76, 77.

Vri Caes. Gall. VI c. 28.

Bos ferus Plin. hist. nat. VIII c. 15 (c. 15 Hard.).

Bovs Aelian. anim. IV c. 35. XII c. 19, 20.

ταυρος Oppian. cyneg. II, 43.

Vrus Gesn. quadrup. p. 157 cum fig.

Vrus Aldrov. bisulc. p. 347 fig. p. 348.

Vrus Ionst. quadrup. p. 50.

Vrus Awerochs Ionst. quadrup. tab. 20.

Bifon wilder Ochs Wisent Ionst. quadrup. tab. 16?

Bifon magnus Ionst. quadrup. tab. 17?

Vrus iubatus gewohnter Awerochs Ionst. quadrup. tab. 19?

Auwerochs oder Urstier Gesn. Thierb. p. 299 cum fig. mediocr.

Bos filuestris Charlet. exerc. p. 8.

Vrus

BOVES cornu feriunt; pascua depressa amant.

Vrus, Germanis Urochs feu Aurochs *Rai. syn. quadr.*
p. 70.

Vrus, Bos siluaticus *Rzacz. Polon. p. 228 auct. p. 323.*

Bos cornibus teretibus flexis *Linn. syst. nat. 2 p. 51.*

Bos cornibus teretibus flexis *Linn. syst. nat. 6 p. 15*
n. 1.

Vrus, Bifon; Urochs, Auer - Ochs α) europaeus *Klein.*
quadrup. p. 11.

Bos cornibus teretibus flexis. The Bos, with cylin-
dric, crooked horns: the Bull *Hill anim. p. 583.*

L'Aurochs: Bos (Vrus) cornibus crassis, breuibus,
sursum reflexis, fronte crispa *Briff. regn. an. p. 80*
n. 3.

Der Aurochs *Hall. vierf. p. 280.*

Bos (Taurus) cornibus teretibus extrorsum curuatis,
palearibus laxis *Linn. syst. nat. 10, Ip. 71 n. 1.*

Aurochs *Dictionn. anim. I p. 185.*

Urus *Dictionn. anim. IV p. 568.*

Stier: Koe met de Hoornen kegelrond, naar buiten
gekromd, en ruime Keelkwabben of Kosslems
Houtt. nat. hist. III p. 270.

The Urus or uhr-ox *Bell trav. I p. 211.*

L'Aurochs *Buff. hist. nat. XI p. 284.*

Aurochs *Bom. dictionn. I p. 207.*

Bos (Taurus) cornibus teretibus extrorsum curuatis,
palearibus laxis *Linn. syst. nat. 12, I p. 98 n. 1.*

Bos Taurus *Forster: Philos. transact. LVII p. 345.*

The Bull *Penn. syn. quadrup. p. 4 n. 4.*

Der Stier *Müll. Naturf. I p. 432.*

Urochs, Aurochs *Germanis.*

BOVIS difficile genus, in quo vix certis limitibus circumscriptae
species. Definitio autem difficillima sunt omnia animalia do-
mestica et culta prae reliquis, quod et in Ovis et Caprae gene-
re apparet, ubi facile varietates vnus eiusdemque speciei pro
diuersis speciebus habentur, et vice versa.

Tur, Wol dziki *Polonis.*

Буйволъ (Buiwol), Буйль (Buil'), ЛѢСНОЙ БЫКЪ
(Le'snyi byk) *Ruffis.*

domesticus. β) *Mansuetus, cultus.*

Bos, Taurus *Plin. hist. nat. VIII c. 45, 46 (c. 70, 71 Hard.).*

Bos *Gesn. quadrup. p. 24 cum fig.*

Vacca *Gesn. quadrup. 25 cum fig.*

Taurus *Gesn. quadrup. p. 103 cum fig.*

Vitulus *Gesn. quadrup. p. 124.*

Bos *Schwenckf. theriotr. p. 63.*

Taurus *Schwenckf. theriotr. p. 63.*

Vacca *Schwenckf. theriotr. p. 65.*

Vitulus *Schwenckf. theriotr. p. 70.*

Bos *Aldrov. bisulc. p. 13 fig. p. 36.*

Bos domesticus *Ionst. quadrup. p. 36. tab. 14.*

Taurus castratus Bos Verschnittener Ochs *Ionst. quadrup. tab. 13.*

Taurus Ochs *Ionst. quadrup. tab. 15.*

Kuh und Kalb *Ionst. quadrup. tab. 13.*

Bos Stier junger Ochs *Ionst. quadrup. tab. 15.*

Vitulus Kalb *Ionst. quadrup. tab. 15.*

Ochs, Kuh *Gesn. Thierb. p. 277 cum figg.*

Stier *Gesn. Thierb. p. 291 cum fig.*

Kalb *Gesn. Thierb. p. 294 cum fig.*

Bos domesticus *Charlez. exerc. p. 8.*

Bos, Taurus, Vacca *Wagn. Heluet. p. 167.*

Bos *Sibb. Scor. an. p. 7.*

Bos domesticus *Rai. syn. quadr. p. 70.*

Boves *Rzacz. Polou. p. 237 auct. p. 329.*

Taurus *Sloan. Iam. II p. 327.*

Bos cornibus teretibus flexis *Linm. fn. succ. I p. 15 n. 44.*

Der Ochs *Meyer Thiere tab. 41.*

Der Stier *Meyer Thiere tab. 42.*

- Taurus domesticus cum Vacca *Klein. quadrup. p. 10.*
 Le Boeuf *Buff. hist. nat. IV p. 437 tab. 14.*
 Bos (domesticus) cornibus teretibus inflexis *Linm. mus. Ad. Frid. I p. 12.*
 Le Boeuf domestique: Bos (domesticus) cornibus lae-
 uibus teretibus, rursus reflexis *Briss. regn. an. p. 78 n. 1.*
 Bos cornibus teretibus flexis *Kram. Austr. p. 322.*
 Bos cornibus teretibus arcuatis: the Bull and Cow
Brown. Jam. p. 438.
 Der zahme Ochs *Hall. vierf. p. 260.*
 Boeuf *Dictionn. anim. F p. 303.*
 Taureau *Dictionn. anim. IV p. 292.*
 Vache *Dictionn. anim. IV p. 437.*
 Veau *Dictionn. anim. IV p. 471.*
 Bos (Taurus) cornibus teretibus extrorsum curuatis,
 palearibus laxis *Linm. fn. suec. 2 p. 15 n. 46.*
 The Ox *Penn. brit. zool. p. 7.*
 Oxe, Koe *Pontopp. Dan. I p. 597.*
 Bakeleys *Bom. dictionn I p. 221?*
 Taureau *Bom. dictionn. IV p. 306.*
 Bue *Aless. quadrup. II tab. 53 fig. Buff.*
 Der Ochse *Mart. Buff. vierf. I p. 232 tab. 10.*
 Die Kuh und das Kalb *Mart. Buff. vierf. I tab. 11.*
 Der Mastochse *Müll. Naturf. Suppl. p. 57.*
 Bos (Taurus) cornibus teretibus extrorsum curuatis,
 palearibus laxis *Müll. Dan. prodr. p. 6 n. 41.*
 Toro (*mas*); Bue (*castratus*); Vacca (*femina*); Vi-
 tello (*vitulus*) *Italis.*
 Toro (*mas*); Buey (*castratus*); Vaca (*femina*); Ter-
 nera (*vitulus*) *Hispanis.*
 Touro (*mas*); Boy (*castratus*); Vaca (*femina*); Vi-
 tela (*vitulus*) *Lusitanis.*
 Taureau (*mas*); boeuf (*castratus*); vache (*femina*);
 veau (*vitulus*) *Gallis.*
 Tarw (*mas*); Ych, Eidion (*castratus*); Buwch (*fe-*
mina); Llo (*vitulus*) *Cambrensisibus.*

- Stier (*mas*); Ochse, Rind (*castratus*); Kuh (*femina*);
Kalb (*vitulus*) *Germanis*.
- Stier (*mas*); Os (*castratus*); Koe (*femina*); Kalf (*vitulus*) *Belgis*.
- Bull, Steer (*mas*); Ox (*castratus*); Cow (*femina*);
Haifer (*femina iunior*); Calf (*vitulus*) *Anglis*.
- Тур, Охе (*mas*); Нöd (*castratus*); Koe (*femina*)
Danis.
- Tiur (*mas*) Nöt (*castratus*); Ko (*femina*); Kalf
(*vitulus*) *Suecis*.
- Wol *Polouis*.
- Быкъ (Вук) (*mas*); Болъ (Wol) (*castratus*);
Корова (Korowa) (*femina*); Теля (Telja) (*vitulus*) *Ruffis*.
- Юнецъ (Iunetz), Телецъ (Teletz) (*bos iunior*);
Телица (Telitza), Телушка (Telufchka), Юница
(Iunitza) (*vacca iunior*) *flaouice*.
- Uggus (*mas*); Sir (*femina*); Bufaù (*vitulus*) *Tataris*.
- üfchküfch (*mas*); üfchkäl (*femina*); Prjéfe (*vitulus*)
Tfcheremiffis.
- Wukor (*mas*); Inè (*femina*); Perù (*vitulus*) *Tfchuwa-*
fchis.
- Ofch (*mas*); Iskäl (*femina*); Kunjan (*vitulus*) *Wo-*
riakis.
- Búka (*mas*); íkal (*femina*); Wâs (*vitulus*) *Morduanis*.
- Müfs (*femina*); Kukan (*vitulus*) *Permice*.
- öfch (*mas*); Mos, Möfs (*femina*); Kukan (*vitulus*)
Sirjänice.

Animal notiffimae figurae.

Habitat ferus in Poloniae, Lithuaniae, Prussiae Sibi-
riaeque orientalis depressis graminosis; olim et
in Germania, Scotia. Mansuetus minor cornibus
maioribus hospitatur vbique. Maximus in Holsa-
tia, Belgio atque Polonia, minimus in Scotia bo-
reali, saepeque ibi e cornis in utroque sexu. Varie-

tas alia maior e cornis passim in Anglia occurrit, e Polonia oriunda: e cornis quoque in Islandia.

Laeditur a Cicuta, Aconito, Anemone. Vterum fert nouem mensibus. Viuit ad annos 14-15. Primo vitulus est et vitula, dein iuuençus et iuuenca, porro taurus et vacca. Sterilis vacca taura est, praegrans horda.

Fronte torua, crispa validaque, praecipue valet colli et capitis robore. Animosus, iracundus, furibundus cornibus hostem petit.

Iumarus hybridus ex equa vel asina et tauro omnino fabulosus est:

Peculiare quoddam mulorum genus, *Iumar Gesn. quadrup. p. 19.*

Muli vel inni genus ex asina et tauro *Gesn. quadrup. p. 106.*

Quartum muli genus *Gesn. quadrup. p. 799.*

Jumar Aldrov. solid. p. 358.

Hippobus vel Hippotaurus *Wagn. Heluet. p. 188.*

The Kumrah *Shaw trav. p. 239* (ex asino et vacca).

Iumar Bom. dictionn. II p. 611.

Iumarra Hoult. nat. hist. nat. III p. 400.

Ochsenesel oder Ochsenpferd *Müll. Naturf. I p. 455.*

Maulochsen, Onotauri, *Iumars, Gemars Mart. Buff. vierf. I p. 224.*

Iumarus Blumenb. gen. hum. var. p. 13.

Bonafus. 2. B. cornibus deorsum inflexis, iuba longissima.

Βονασσος Arist. hist. anim. II c. 5 n. 23. c. 7 n. 31. IX c. 71 n. 476-489.

Bonafus Plin. hist. nat. VIII c. 15 (c. 16 Hard.).

Μονωψ Aelian. anim. VII c. 3?

Bonafus Gesn. quadrup. p. 145 cum fig. capitis.

- Bonafus *Aldrov. bifalc. p. 358 fig. p. 361* capit. Gefneri.
 Bonafus *Iouft quadrup. p. 51.*
 Bonafus Munifter. Wild Ochfengefchlecht *Iouft. quadrup. tab. 18.*
 Bonafus alius *Iouft. quadrup. tab. 19.*
 Muniftier, oder Mäneftier *Gefn. Thierb. p. 297 cum fig. cap.*
 Bonafus *Charlet. exerc. p. 8.*
 Bonafus *Rai. fyn quadr. p. 71.*
 Bos iuba longiffima, cornibus in fe flexis *Linn. Syft. nat. 2 p. 51.*
 Bos iuba longiffima, cornibus in fe flexis *Linn. Syft. nat. 6 p. 15 n. 2.*
 Bos iuba longiffima, cornibus inflexis. The Bos, with a very long mane, and bent horns: the Bonafus *Hill anim. p. 583 tab. 28 fig. mala.*
 Le Bœuf fauvage: Bos (Bonafus) cornibus deorfum inflexis, iuba fupra collum longiffima *Briff. regn. an. p. 84 n. 8.*
 Bos iuba longiffima, cornibus in fe flexis *Kram. Austr. p. 322.*
 Bos (Bonafus) cornibus in fe flexis, iuba longiffima *Linn. Syft. nat. 10, I p. 71 n. 2.*
 Bonafus *Dictionn. anim. I p. 318.*
 Koe met de Hoornen naar elkander geboogen en zeer lange Maanen *Houtt. nat. hift. III p. 322.*
 Le Bonafus *Buff. hift. nat. XI p. 284.*
 Bos (Bonafus) cornibus in fe flexis, iuba longiffima *Linn. Syft. nat. 12, I p. 99 n. 2.*
 Afrikanifcher wilder Ochs *Müll. Naturf. I p. 437.*
- A Tauro differt corpore tumidiore, iuba colli frontisque longiffima, cornuumque flexura propria. Cornua nigra, fplendentia. Cauda brevis.

Habitat in Africa et Asia.

Defendit se stercore ad aliquot passus deiecto, com-
burente.

Bifon. 3. B. cornibus diuaticatis, iuba longissima, dorso
gibboso.

Iubatus Bifon *Plin. hist. nat. VIII. c. 15 (c. 15 Hard.)*.

Pisones Oppian. cyneg. II, 159.

Taurus mexicanus *Hernand. Mex. p. 587 cum fig.*
mediocr.

Tauri vaccaeque Quiuirae regionis *Fernand. anim. p.*
10.

Bifon *Gesn. quadrup. p. 143.*

The bunchbaked Oxen *Purch. Pilgr. IV p. 1561.*

Armenta *Laet Amer. p. 303 cum fig. Hernand.*

Taurus Quiuirensis *Nieremb. hist. nat. p. 181 fig.*
Hernand.

Tauri noui orbis *Nieremb. hist. nat. p. 182.*

Bifon *Aldrov. bisulc. p. 353 figg. p. 355, 356 me-*
diocr.

Bifon albus scoticus seu Calydonius *Aldrov. bisulc.*
p. 357.

Bifon *Ionst. quadrup. p. 51.*

Bifon iubatus *Ionst. quadrup. tab. 17 fig. mediocr.*

Locobardus Bifon *Ionst. quadrup. tab. 17 fig. mala.*

Bifon wilder Ochs Wisent *Ionst. quadrup. tab. 16 fig.*
mal.

Bifons magnus *Ionst. quadrup. tab. 17 fig. mal.*

Vrus iubatus gewohnter Awerochs *Ionst. quadrup.*
tab. 19 fig. mala.

Wyfent *Gesn. Tbierb. p. 296 fig. mediocr.*

Indianischer Ochs *Gesn. Tbierb. p. 301 cum fig. mal.*

Bifon iubatus *Charlez. exerc. p. 8.*

Bifon scoticus *Sibb. Scot. an. p. 7.*

Bifon *Rai. syn. quadr. p. 71.*

The Buffelo *Lawson Carolin. p. 115 cum fig. me-*
diocr.

Bifon *Rzac. Polon. p. 214.*

v. de Herberstein commun. de rebus moscoviticis. Bas. 1556. fol. p. 112
The c. fig. sah36000
enninger Erclerung der Preuss. Landthaffel. Königsb. 1595. f. p. 250. ii. m.
ne. Lopez de Gomara historia general de las Indias. 2.
ip. Caragoza 1553. fol. pag. cxvi. 6 c. fig. mediocr.
las vacas corcobadas que ay en Quivira.

The Buffalo ^{Buffalo} *Catesb. Carol. app. p. XXVII fig. app. tab. 20.*

The Buffalo, or wild Beef *Brick. North-Carol. p. 107 cum fig. mala.*

Bos iuba longissima, dorso gibboso *Linn. syst. nat. 2 p. 51.*

Le Boeuf du Canada *Charlev. nouv. Fr. III p. 131.*

Le Boeuf musqué *Charlev. nouv. Fr. III p. 131.*

The Musk Ox *Dobbs Hudf. p. 18, 25.*

The American Oxen or Beeves *Dobbs Hudf. p. 41.*

Bos iuba longissima, dorso gibboso *Linn. syst. nat. 6 p. 15 n. 3.*

Vrus, Bison ρ indicus, Bison Catesbeji *Klein. quadrup. p. 13.*

Bos iuba longissima, dorso gibboso. The Bos, with a very long mane, and a gibbose back: the Bison *Hill anim. p. 584.*

Wilde Ochsen und Kühe *Kalm Amer. II p. 350, 425 III p. 351.*

Le Bison blanc: *Bos* (*Bison albus*), cornibus sursum reflexis, iuba longissima *Briff. regn. an. p. 82 n. 5.*

Le Bison: *Bos* (*Bison*) cornibus sursum reflexis, dorso gibboso, iuba barbaque longissima *Briff. regn. an. p. 82 n. 6.*

Le Bison d'Amérique: *Bos* (*Bison Americanus*) cornibus sursum reflexis, dorso gibboso, capite pilis longissimis obsito *Briff. regn. an. p. 83 n. 7.*

Der Amerikanische Auerochs *Hall. vierf. p. 281.*

Bos (*Bison*) cornibus diuarcatis, iuba longissima, dorso gibboso *Linn. syst. nat. 10, I p. 72 n. 3.*

Boeuf sauvage *Du Pratz Louif. II p. 66 cum fig.*

mediocr.

Bison Dictionn. anim. I p. 289.

Koe met van elkander wykende Hoornen, zeer lange Maanen en een bult op de Rug *Houtt. nat. hist. III p. 324.*

Le Bison *Buff. bist. nat. XI p. 284.*

Le boeuf ou taureau sauvage. Hennepin *nouvelle decouvert*
p. 187. icon etc

Bison

Bifon *Bom. dictionn.* I p. 288.

Bos (Bifon) cornibus diuaticatis, iuba longissima, dorso gibbo *Linn. syst. nat.* 12, I p. 99 n. 3.

The American Bull *Penn. syn. quadrup.* p. 8, n. 6 tab. 2 fig. 2.

Bifon giubato *Aleff. quadrup.* I tab. 12.

Der Bifon *Müll. Naturf.* I p. 439.

Bifon oder der Buckelochse *Titius: Berl. Samml.* V p. 36 cum fig.

Wisent *olim Germanis.*

Zubr Polonis.

Magnitudo Tauri maioris, at cornibus amplissimis, barba longissima, fronte, collo pectoreque vndique Vrsi instar hirsutis, dorso gibbo, cruribus breuibus, crassis, cauda nuda apice floccosa. Color ex fusco nigricans. Hieme totus pilis longioribus tectus est, aestate cute nuda, nigra, rugosa, exceptis anterioribus partibus, quae semper villosae.

Habitat in borealibus incultis Europae Americaeque. Amat loca vliginosa. Gregarius, ferox, mansuescit tamen. Caro odore moschi, melior tamen bouina, praecipue ex dorsi tubere desumta. Pedibus sternit hostem.

Coire hunc cum Tauro Pennantus, eiusdemque esse speciei Buffonius.

grunniens. 4. B. cornibus teretibus introrsum curuatis, vel lere propendente, cauda vndique iubata.

Vacca grunniens, villosa, cauda equina *I. G. Gmelin: Nou. comm. petrop.* V p. 339 tab. 7.

Another species of oxen, called bubuls by the Tartars *Bell trav.* I p. 212.

Beliani H. A. l. xv. c. 14.

Bos (grunniens) cornibus teretibus extrorsum curuatis, vellere propendente, cauda vndique iubata
Linn. syst. nat. 12, I p. 99 n. 4.

La vache de Tartarie *Buff. hist. nat. XV p. 136.*

The grunting Bull *Penn. syn. quadr. p. 5.*

Der asiatische Brummochse *Müll. Naturf. I p. 441.*

Sarluk *Calmyccis.*

Longitudo corporis $5\frac{1}{2}$ pedum. Similis Tauro. Cornua introrsum versa. Dorsum eleuatum. Cauda tota iubata. Corpus Hirci instar totum hirtum pilis ad genua vsque propendentibus, nigrum; at album fronte, spina dorsi, cauda, pedibus posterioribus.

Habitat in Asia boreali.

Ferox. Grunnit suis instar, non mugit.

Buffonius hunc cum Bifonte conuenire putat, Penantus pro Tauri varietate habet.

Bubalis. 5. B. cornibus resupinatis intortis antice planis.

Bubalus *Gesn. quadrup. p. 139 cum fig. mala.*

Buffelus siue Bubalus vulgaris *Aldrov. bisulc. p. 365. fig. p. 366 pessima.*

Buffelus *Ionst. quadrup. p. 53.*

Bubalus Büffel *Ionst. quadrup. tab. 20 fig. bona.*

Alius Bubalus Taurus syluester *Ionst. quadrup. tab. 20 fig. mala.*

Büffel Bubalus *Gesn. Thierb. p. 58 fig. mala.*

Buffelus *Charlet. exerc. p. 8.*

Boues inusitatae magnitudinis: Taurelephantes *Ludolf.*

Aesh. I c. 10 n. 1 Comment. p. 145.

Bubalus *Rai. syn. quadr. p. 72.*

Buffalo *Barbor Guin. p. 209, 486.*

Büffelochsen *Koloe Vorgeb. p. 143 tab. 5 fig. 2 bona.*

Bos cornibus vastis intortis *Linn. syst. nat. 2 p. 51.*

Der

Der Büffel *Meycr Thiere II tab. 43.*

Bos cornibus vastis intortis resupinatis Linn. syst. nat. 6 p. 15 n. 4.

Buffelus, Büffel *Klein. quadrup. p. 10.*

Bos cornibus vastis, intortis, resupinatis. The Bos, with very large, crooked, and resupinated horns: the Buffalo *Hill anim. p. 584.*

Le Buffle: *Bos (Bubalus) cornibus compressis, sursum reflexis, resupinatis, fronte crispa Briss. regn. an. p. 81 n. 4.*

Bos cornibus vastis intortis resupinatis Kram. Austr. p. 322.

Der Büffelochs *Hall. vierf. p. 278.*

Bos (Bubalis) cornibus resupinatis intortis antice planis Linn. syst. nat. 10, I p. 72 n. 4.

Buffle *Dictioun. anim. I p. 349.*

Buffel: Koe met agterover leggende gedraaide Hoor-
nen die van vooren plat zyn *Houtt. nat. hist, III p. 327.*

Le Buffle *Buff. hist. nat. XI p. 284 tab. 25.*

Buffle *Bom. dictioun. I p. 349.*

Bos (Bubalis) cornibus resupinatis intortis antice planis Linn. syst. nat. 12, I p. 99 n. 5.

Buffalus Pallas: Nou. comment. petrop. XIII p. 460 tab. 11, 12 fig. cran. fossil.

The Buffalo *Penn. syn. quadr. p. 7 n. 5.*

Buffalo *Aless. quadrup. I tab. 20 fig. Buff.*

Der Büffel *Müll. Naturf. I p. 441.*

Buffalo *Italis.*

Buffalo *Hispanis.*

Buffle *Gallis.*

Büffel *Germanis.*

Buffalo *Anglis.*

Maior Tauro, corpore crassiore, robustiore, cute durissima, capite paruo, fronte crispa. Cornua nigra, crassa, paullulam compressa, sursum reflexa, parum-

parumper resupinata. Pili corporis nigri aut rubri.

Habitat in Asia; cultus hodie ab anno inde 600 in Italia ad trahendum atque lactinia, nec non in Hungaria. Mugitus fortis animalis iracundi, annulo narium regendi. Ossa fossilia in Sibiria.

Varietas nuda ex India orientali *Penn. syn. quadr. tab. 2 fig. 1.*

indicus. 6 B. cornibus aure brevioribus, dorso gibbo, iuba nulla.

Bos scythicus gibbosus *Charlet. exerc. p. 8.*

The little Indian Buffalo *Edw. birds IV tab. 200.*

Bos (indicus) cornibus aure brevioribus, dorso gibbo, iuba nulla *Linn. syst. nat. 10, I p. 72 n. 5.*

Koe met de Hoornen korter dan de Ooren, een Bult op de Rug, dog zonder Maanen *Houtt. nat. hist. III p. 329 tab. 27.*

Le Zebu *Buff. hist. nat. XI p. 285.*

Un Zebu *Buff. hist. nat. XI p. 439 tab. 42.*

Zebu *Bom. dictionn. IV p. 647.*

Bos (indicus) cornibus aure brevioribus, dorso gibbo, iuba nulla *Linn. syst. nat. 12, I p. 99 n. 6.*

The Indian Bull *Penn. syn. quadr. p. 6 tab. 1 fig. 2*
(varietatem Tauri putat.)

Bue da soma africano *Aless. quadrup. I tab. 21 fig. Buff.*

Der kleine indianische Büffelochs *Berl. Samml. IV p. 310 cum fig. Edw.*

Zwergbüffel *Müll. Naturf. I p. 442 tab. 27.*

Magnitudo vituli semestris. Cornua minuta auricalis nudis breviora. Pili corporis ex caeruleo cinerei, pectore albo. Venter subnudus. Pedes nigro maculati.

Habitat

Habitat in India.

Pentinere huc omnino videtur:

Elegans et parvus africanus bos, quem veteres Graeci Bubalum appellarunt *Bellon. obs. p. 119 cum fig.*

Iuuenca filuestris *Alpin. Aeg. I p. 233 tab. 14 fig. 2.*

The Dante *Purch. Pilgr. II p. 1002.*

Africanus bos *Aldrov. bisulc. p. 363 fig. p. 364 Bellon.*

Africanus bos *Ionst. quadrup. p. 52.*

Bubalus africanus *Ionst. quadrup. tab. 18 fig. Bellon.*

Le Dante *Marmol Afr. I p. 52.*

Der africanische Büffel *Gesn. Thierb. p. 60 cum fig. Bellon.*

Bos africanus *Rai. syn. quadr. p. 73.*

The Bekker el Wafh *Shaw trav. p. 242?*

Exiguus africanus bos *Klein. quadrup. p. 11.*

Le Buffle d'Afrique: Bos (Bubalus Africanus) cornibus teretibus, sursum reflexis, in sese recurvis *Briss. regn. an. p. 79 n. 2.*

Der kleine afrikanische Zwergochs *Hall. vierf. p. 278.*

Le petit boeuf de Belon *Buff. hist. nat. XI p. 299.*

The dwarf Bull *Penn. syn. quadr. p. 9 n. 7 tab. 1 fig. 1 animal. tab. 2 fig. 3 cornuum. (Propriam speciem putat.)*

Magnitudine inter Ceruum et Capreolum est. Cornua nigra, teretia, basi plana, lunata, in se flexa. Collum crassum, breue, palearibus exiguis. Humeri elati, pleni. Crura breuia. Cauda ad poplites vsque pilis nigris obsita, equinis duplo crassioribus. Corpus pilis flauis splendentibus laeue; venter magis rufescit, dorsum subfuscum est.

Habitat in Africa, mitis.

Non est Bubalus veterum.

27. OVIS.

*Dentes Primores superiores nulli.
inferiores VIII.*

Laniarii nulli.

Cornua concava, retrorsum versa, intorta, rugosa.

Pedes ungulati.

Mammae inguinales.

Aries. 1. O. cornibus compressis lunatis.

Προβατων Arist. hist. anim. V c. 11 n. 134. VI c. 19 n. 250-263. VIII c. 13 n. 118-123. IX c. 4 n. 70-74.

Pecus, Aries, Ovis Plin. hist. nat. VIII c. 47, 48 (c. 72-75 Hard.).

Προβατων Aelian. anim. VII c. 27.

Ovis Gesn. quadrup. p. 872 fig. cornuatae p. 873.

Aries Gesn. quadrup. p. 912.

Veruex Gesn. quadrup. p. 925.

Agnus Gesn. quadrup. p. 927.

Aries Schwenckf. theriotr. p. 55.

Ovis Schwenckf. theriotr. p. 56.

Agnus Schwenckf. theriotr. p. 60.

Veruex Schwenckf. theriotr. p. 60.

Ovis Aldrov. bisulc. p. 370.

Ovis Ionst. quadrup. p. 54.

Aries Wieder Ionst. quadrup. tab. 22.

Veruex Hamel Ionst. quadrup. tab. 22.

Agnus Lam Ionst. quadrup. tab. 22.

Schaaf Gesn. Thierb. p. 320 fig. p. 321.

Widder

OVES cornibus arietant, pedibus calcitrant; aprica sicutifera amant.

- Widder *Gesn. Thierb. p. 327 cum fig.*
 Hammel *Gesn. Thierb. p. 329.*
 Lamb *Gesn. Thierb. p. 329 cum fig.*
 Ouis *Charlet. exerc. p. 8.*
 Ouis *Sibb. Scot. an. p. 8.*
 Ouis domestica *Rai. syn. quadr. p. 73.*
 Ouis *Rzacz. Polon. p. 242 auct. p. 332.*
 Ouis domestica, cuius mas aries dicitur, foetus agnus
Sloan. Lam. II p. 328.
 Ouis cornibus compressis lunatis *Linn. syst. nat. 2 p.*
 51.
 Ouis cornibus compressis lunatis *Linn. fn. succ. I p. 15*
n. 43.
 Der ungarische Widder *Meyer Thiere I tab. 50.*
 Das Schaaf *Meyer Thiere I tab. 51.*
 Ouis cornibus compressis lunatis *Linn. syst. nat. 6 p.*
 15 *n. 1.*
 Aries Widder Ouis Schaaf *Klein. quadrup. p. 13.*
 Ouis cornibus compressis lunatis. The Ovis, with
 compressed and lunated horns: the Sheep *Hill*
anim. p. 582.
 Ouis *Linn. monogr. Amoen. acad. IV p. 169.*
 La Brebis *Buff. hist. nat. V p. 1 tab. 2.*
 Le Belier *Buff. hist. nat. V tab. 1.*
 La Brebis domestique: Aries (ouis domestica) lani-
 ger, cauda rotunda breui *Briss. regn. an. p. 74 n. 1.*
 Ouis cornibus compressis lunatis *Kram. Austr. p. 321.*
 Ouis cornibus compressis lunatis: the Sheep *Brown.*
Lam. p. 488.
 Widder, Schaf *Hall. vierf. p. 281 tab. 11.*
 Ouis (Aries) cornibus compressis lunatis *Linn. syst. nat.*
 10, I p. 70 *n. 1.*
 Agneau *Dictionn. anim. I p. 54.*
 Belier *Dictionn. anim. I p. 270.*
 Brebis *Dictionn. anim. I p. 332.*
 Mouton *Dictionn. anim. III p. 187.*

Ram: Schaap met de Hoornen platagtig, halfmaanswyze krom *Houtz. nat. hist. III p. 221.*

Ouis (Aries) cornibus compressis lunatis *Linn. fn. suec. 2 p. 15 n. 45.*

The Sheep *Penn. brit. zool. p. 10.*

+ Faar *Pontopp. Dan. I p. 600.*

Agneau *Bom. dictionn. I p. 65.*

Belier *Bom. dictionn. I p. 263.*

Ouis (Aries) cornibus compressis lunatis *Linn. syst. nat. 12, I p. 97 n. 1.*

Ouis Aries *Forster: Philos. transact. LVII p. 344.*

The Ram *Penn. syn. quadr. p. 10 n. 8.*

Ariete *Aless. quadrup. II tab. 54 fig. Buff.*

Pecora *Aless. quadrup. II tab. 55 fig. Buff.*

Der Widder und das Schaaf *Mart. Buff. vierf. I p. 286 tab. 12.*

Der Widder *Müll. Naturf. I p. 422.*

Ouis (Aries) cornibus compressis lunatis *Müll. Dan. prodr. p. 6 n. 40.*

Montone, Ariete (*mas*); Castrone (*veruex*); Pecora (*femina*); Agno, Agnello, Agna (*agnus*) *Italis.*

Carnero, Carnero entero, Carnero cajudo, Moruéco (*mas*); Carnero castrado (*veruex*); Oveja (*femina*); Cordero (*agnus*) *Hispanis.*

Carneiro (*mas*); Ovelha (*femina*); Cordeiro (*agnus*) *Lusitanis.*

Belier (*mas*); Mouton (*veruex*); Brebis (*femina*); Agneau (*agnus*) *Gallis.*

Hwrdd, Maharen (*mas*); Dafad (*femina*); Oen (*agnus*) *Cambrensis.*

Widder, Schaafbock (*mas*); Hammel, Schöps (*veruex*); Schaaf (*femina*); Lamm (*agnus*) *Germanis.*

Ram (*mas*); Schaep (*femina*); Lam (*agnus*) *Belgis.*

Ram (*mas*); Sheep (*femina*) *Anglis.*

Faar, Lam; Gimmer - Lam *Danis.*

Soud, Smale, Kaas *Noruegis.*

Wadur (*mas*); Får (*femina*); Lamb (*agnus*) *Suecis.*

Owca,

Owca, Owieczka *Polonis.*

Баранъ (Baran), Овенъ (Owen) (*mas*); Кладеный баранъ (Kladenii baran) (*veruex*); Овца (Owza) (*femina*); Агнецъ (Agnetz) (*agnus*); Ярка (Iarka) (*agna*) *Ruffis.*

Takàh (*mas*); Saràk (*femina*); Bâran (*agnus*) *Tataris.*
Tagàh (*mas*); Schórok (*femina*); Schórok Paràn (*agnus*) *Tfcheremiffis.*

Tagàh (*mas*); Sóroch (*femina*); Potjak (*agnus*) *Tfchuwafchis.*

Tackàh (*mas*); Ifch (*femina*); Ifchpi (*agnus*) *Wotiakis.*
Baràn (*mas*); Réwä (*femina*); Wirös, Rewelau (*agnus*) *Morduanis.*

Baràn (*mas*); Bala (*femina*); Dfchàla (*agnus*) *Permice.*
Mefch (*mas*); üfch (*femina*); Balápi, Baljápi (*agnus*) *Sirjünice.*

Rostrum compressum, anterius nudum. Dentes primores infra VIII, supra nulli. Laniarii nulli. Molares sinuato-acuti. Os papillis albis cartilagineis interne vestitum. Labium superius a naribus ad os nudiusculum, lacuna exaratum. Mentum subrotundum, conuexum, molle, margine labii inferioris inflexo, denticulato. Vibriffæ oris quatuor ordinum. Pilus distinctus supra nares, longus. Narium foramina oblonga, sinu vel margine superiore medio gibbo; posteriore obtusiore. Oculi subcaerulei, glauci, in prominentia sincipitis ovali. Pupilla de die oblonga. Cavitas ante canthum oculi anteriorem profunda, gluten fecernens; aliaque minus profunda pone canthum oculi posteriorem. Lingua mollis, sulco longitudinali notata. Vertex prominens, inter cavitates depressas pone oculos. Auriculæ oblongæ, margine integro; superiore versus basin inflexo; intra aurículas lineæ tres, cleuatae, longitudinales. Cornua spiritaliter retorta, rugosa, introrsum angulata,

plana, apice complanata. Collum compressum, capite longius, lanatum. Dorsum latum, teretiusculum, circa lumbos tamen latius. Pectus prominulum, pilis breuibus tectum. Abdomen plano-convexum. Mammae inguinales, nudaе binae, coalitae, cum papillis duabus spuriiis ad basin anticam. Scrotum mamillis duabus notatum. Cauda teres, genubus breuior, pilis tecta. Femora compressa. Genua crassiora in anticis pedibus; in posticis prominentia. Tibiae anticae teretiusculae, posticae magis compressae. Ungulae geminae: margine exteriori conuexo; interiore acuto, concauo. Ungulae succenturiatae geminae, minores, rugosae. Liquor glutinosus seceritur e foramine paruo intra sinum supra ungulas anticar, fere ad earum basin. Vellus pilis contortis siue crispatis, mollissimis: longis in dorso, lateribus et collo; at breuioribus, rectis, imbricatis et laevibus in capite ante oculos et cornua, in auribus, pectore, ventre et pedibus. Sutura in inguinibus spiralis.

Hospitatur vbique, maximeque variat:

anglica. α) Mutica, cauda scrotoque ad genua vsque pendulis *Linn.*

Ovis anglicana *Linn. amoen. acad. IV p. 174.*

The hornless Sheep *Penn.*

Das engländische Schaaf *Müll. Naturf. I p. 422.*

Vulgaris hinc inde in Anglia, alibique; maxima in Lincolnshire.

rustica. β) Cornuta *Linn.*

Ovis rustica *Linn. amoen. acad. IV p. 174.*

The common Sheep *Penn.*

Nordisches Schaaf *Müll. Naturf. I p. 422.*

Ouis brachyura *Pallas spicil. XI p. 61.*

Passim et mutica est; at cauda et scrotum non attingunt genua. Lana breuior, minus crispa et rigidior. Degit in Europa boreali.

hispanica. γ) Cornuta, cornuum spira extrorsum tracta *Linn.*

Die spanischen Schaaf *Linn. Westgoth. p. 58.*

Die spanischen Schaaf *Linn. Schon. p. 90.*

Die spanischen Schaafböcke *Linn. Schon. p. 172.*

Ouis hispanica *Linn. amoen. acad. IV p. 174.*

Das spanische Schaaf *Müll. Naturf. Ip. 423.*

Cornibus contortis, spira extrorsum dilatata, lana circa oculos copiosa, ut ea fere aperti sint. Lana molliore atque copiosiore gaudet.

polycerata. δ) Polycerata *Linn.*

Ouis sexcornis *Aldrov. bisulc. p. 397 fig.*

Ouis tricornis *Aldrov. bisulc. p. 397 fig.*

Schaaf *Linn. Gotbland. p. 248.*

Ouis polycerata *Linn. amoen. acad. IV p. 174.*

Brebis à plusieurs cornes *Buff. hist. nat. XI p. 354.*

Le Belier d'Islande *Buff. hist. nat. XI p. 387 tab. 31.*

La Brebis d'Islande *Buff. hist. nat. XI tab. 32.*

The manyhorned Sheep *Penn. syn. quadr. tab. 3 fig. 2 animal. fig. 3 cornuum.*

Montone d'Islanda *Aless. quadrup. I tab. 28 fig. Buff.*

Pecora d'Islanda *Aless. quadrup. I tab. 30 fig. Buff.*

Das Gothländische Schaaf *Müll. Naturf. Ip. 423.*

Cornua quatuor, rarius sex; duobus interioribus erectis, lateralibus reuolutis. Cauda breui, lana dari-

duriuscula rudi. Vulgaris in Islandia terrisque
reliquis borealibus.

africana. ε) *Africana* Linn.

Ouis aethiopica Charlet. exerc. p. 9.

Ouis africana Rai. syn. quadr. p. 75.

Ouis africana pro vellere lanoso pilis breuibus hirtis vestita Sloan. Iam. II p. 328.

Ouis africana Linn. amoen. acad. IV p. 173.

La Brebis d'Afrique: Aries (ouis africana) pilosus, pilis breuibus vestitus Briff. regn. an. p. 76
n. 4.

Das africanische Schaaf Müll. Naturf. I p. 423.

Pro lana pilis breuibus hirta est. In Africa.

laticauda. ζ) *Arabica platyura* Linn.

Ouis agrestis Aelian. anim. X c. 4.

Schaaff deren Schwantz gar feißt Rauwolf Reif. III
p. 26.

Arabiae oues Aldrov. bisulc. p. 404 fig. p. 405
mala.

Persische und Tartarische Schafe Neub. Gesandtsch.
p. 369.

Ein arabisches Schaaf mit einem breiten Schwantz
oben an den Rippen Gesn. Thierb. p. 326 cum
fig. pessima.

Ouis Turcica Charlet. exerc. p. 9.

Ouis cauda obesa Ludolf Acth. I c. 10 n. 14 cum
fig. Comment. p. 146.

Moutons de Barbarie ou à grosse queue Chardin
voy. III p. 37.

Ouis laticauda Rai. syn. quadr. p. 74.

The broad-tailed Sheep Shaw trav. p. 241.

Aries s. *Ouis πλατυκερος orientalis* Klein. quadrup.
p. 14.

Ouis

Ovis Krymia velleribus agrestibus griseis

Pallas R. in di. Russk. Oest. J. 1793. II, p. 464. t. 2

Ouis laticauda, Platyceros f. arabica Linn. *amoen. acad. IV p. 173.*

Ouis laticauda I. G. Gmelin: *Nou. comment. petrop. V p. 343 tab. 8.*

La Brebis à large queue: Aries (ouis laticauda) laniger, cauda latissima Briff. *regn. an. p. 75 n. 2.*

The other sheep Ruff. *Alepp. p. 51.*

Die hiesigen Schaafte Osb. *Ostind. p. 188.*

Das arabische breitschwänzige Schaaf Hall. *vierf. p. 301.*

Mouton de Barbarie, mouton d'Arabie Buff. *hist. nat. XI p. 355 tab. 33.*

The broad tailed Sheep Penn. *syn. quadr. p. 4. tab. 1.*

Montone di Barberia Aleff. *quadrup. I. tab. 25 fig. Buff.*

Das arabische Schaaf Müll. *Natursf. Ip. 423.*

Ouis steatopyga Pallas *spicil. XI p. 63 tab. 4 fig.*

I bicornis. *fig. 2 b* quadricornis, *fig. 2 a* eornis.

Ouis bucharica Pallas *spicil. XI p. 78 (affinis certe).*

Cauda crassissima, 30-40 saepe librarum, interdum subdidyma; pinguis adipe, non sebo. Auriculae saepe pendulae. Interdum quadri-quinque- et sexcornis est. Hospitatur inter gentes nomadicas Asiae fere omnes, inque Persia, Sina, Oriente, Syria, Arabia, Aegypto.

longicauda. 1) Arabiae oues Aldrov. *bisulc. p. 404.*

Schafte Olear. *Reis. p. 567.*

Ouis arabica Iouft. *quadrup. tab. 23.*

Ein ander arabisch Schaaff Gesn. *Thierb. p. 326 cum fig. pessima.*

Alterum genus Rai. *syn. quadr. p. 74.*

La Brebis à longue queue: Aries (Ouis longicauda) laniger, cauda longissima Briff. *regn. an. p. 76*

n. 3.

Das arabische langschwänzige Schaf *Hall. vierf.*
p. 302.

Ovis dolichura siue tscherkeßica *Pallas spicil. XI*
p. 60.

Cauda ad tres pedes longa. Hospitatur cum praecedente. Colitur quoque in Russia australi et Poloniae finitinis, ad Caucasum atque in Mauritania occidentali.

capensis. 9) The Cape Sheep *Penn. syn. quadr. in explicat. iconum tab. 4 fig. 2.*

Auriculae longae, pendulae. Cauda magna, ex adipe vix prominens.

Edit imprimis Festucam ouinam, in aruis Bursam pastoris; laeditur a Pruno spinosa, Equiseto, Ranunculo Flammula, Antherico ossifrago, Kalmia, Myosotide aquatica, Anemone nemorosa. Parum bibit. Mutat aetate dentes. Timida minatur hosti calcitrando mingendoque, pellit eum arietando. Balat. Mas vnus sufficit viginti feminis, grauidis 23 hebdom. Parit vnum, interdumque duo, rarius tres. Adolefcit anno secundo. Stupidissimum maximeque imbecille forte omnium quadrupedum. Aetas 12 - 14 annorum.

Ammon. 2. O. cornibus arcuatis semicircularibus subtus planisculis, palearibus laxis pilosis.

Musmon *Plin. hist. nat. VIII c. 49 (c. 75 Hard.)*.

Ophion *Plin. hist. nat. XXVIII c. 9 (c. 42 Hard.)*
XXX c. 15 (c. 52 Hard.)?

Musmon s. Musimon *Gesn. quadrup. p. 934*.

Tragelaphus *Bellon. obs. p. 54 cum fig. mediocr.*

Das wilde Schaaf: eine Art frembder Böcke und Schaaf *Gesn. Thierb. p. 155 cum fig. mediocr.*

Das miffelstier. *Det. Münster's cosmographie p. m. 279.* Der

Der Weifsars der Alten *Gesn. Thierb. p. 154 fig. p. 155* mediocr.

Musimon *Rai. syn. quadr. p. 75.*

Tragelaphus *Bellonii Rai. syn. quadr. p. 82.*

The Fishtäll or Lerwee *Shaw trav. p. 243?*

Tragelaphus. *Moufflon Klein. quadrup. p. 20.*

Stepnie Baranni *I. G. Gmelin Sibir. I p. 368.*

Rupicapra cornibus arietinis *I. G. Gmelin: Nou. comment. petrop. IV p. 388 summar. p. 53 tab. 8 b fig. 2 maris, fig. 3 feminae* mediocr.

La Chevre du Levant: *Hircus (Capra orientalis) cornibus supra rotundatis, infra planis, semicirculum referentibus* *Briff. regn. an. p. 71 n. 12.*

Capra (Ammon) cornibus arcuatis, collo subtus barbato, cauda nigra *Linn. syst. nat. 10, I p. 70 n. 12.*

Chevre du Levant *Dictionn. anim. I p. 595.*

Geit met hoogswyze Hoornen, een Baard onder aan de Keel, de Staart zwart *Houtt. nat. hist. III p. 217.*

Le Moufflon *Buff. hist. nat. XI p. 352 tab. 29.*

Moufflon *Bom. dictionn III p. 146.*

Capra (Ammon) cornibus arcuatis semicircularibus subtus planiusculis, palearibus laxis pilosis, gula imberbi *Linn. syst. nat. 12, I p. 97 n. 12.*

Das orientalische Schaaf *S. G. Gmelin Reis. III p. 486 tab. 55 fig. mala.*

The Siberian Goat *Penn. syn. quadr. p. 18 n. 11.*

Musione *Aless. quadrup. I tab. 7 fig. Buff.*

Die sibirische Ziege *Müll. Naturf. I p. 417.*

Kamenni Barani oder Musimons *Steller Kamtsch. p. 127.*

Ovis fera sibirica vulgo Argali dicta *Pallas spicil. XI p. 3 tab. 1 fig. inferior maris annosi, hieme; fig. superior feminae senioris, hieme; tab. 2 fig. inferior feminae depilis, aestate; fig. superior iunioris: bonae.*

Musio-

*uncan. McGillivray on y mountain Ram of N. America in the (a
can) Medical Repository vol. VI. New-York 1803. p. 237 & c. ic. bonae*

*species in Wright's winter magazine. x 11 6. p. 499 f. c. in. capitis et
cranium*

Mufione in *Corfica et Sardinia.*

Степной Баранъ (Stepnoi Baran'), Каменной Баранъ
(Kamennoi Baran'), Дикой Баранъ (Dikoi Baran')

Ruffis.

Guldfhah (*mas*); Argali (*femina*) *Mongolis.*

Kyr-taka *Tataris europaeis.*

Tfchúbhuku *Iacutis.*

Dfholadfehàn *Lamutis.*

Goádinachtfeh, Goadinadatfeh *Kamtſchadalis.*

Кутуп *Korjäkis.*

Kulem, Kulehm *Ukinzis.*

Kotfehkuí, Kotfeh-kohi *Persis.*

Dachkutfch *Turcis.*

Magnitudo Ceruae minoris. *Aestate:* in tergore, ceruice et plearibus cinereo-fufcefcens, admixto grifeo. Area lutefcens circa caudam, per quam friga fufca in ipfam caudam excurrit. Foffa cervicalis et area pone armos fufca. Caput cinerafcens, reliqua e cinero albida funt. Pili vix 4 lin. longi. *Hieme:* rostrum apice album, area tranſverſa fufca verſus frontem e grifeo cinerafcentem. Gula et collum ſubtus cinerafcente albida, colore eodem per parotides ad aures dilatato. Ceruix et dorſum ferrugineo-grifeum, colore verſus clunes magis luteſcente. Brachia extus, vt et fascia lata thoracis vtrinque latera occupans, anguſtior in hypochondriis, latior ad femora, nec non ipſa femora extus e fuſco nigricantia. Intus femora nigra, armi fuſco-canefcentes. Abdomen longitudinaliter e grifeo albicans. Clunes a cauda albescunt, paullo inferius albiffimae, fascia alba poſtice per femora continuata. Pedes extremi toti a genibus ad ungulas albi, niſi in poſticipis umbra fuſcefcente leui a calcaneo diſuſa. Cauda alba, apice fuſcefcens. Pili ſeſquipollicares ſubcriſpi. Caput arietinum. Collum et thorax barbata.

bata. Auriculæ acutæ erectæ. Cornua magna, reflexa, compressa, spiralia, annulata, albida; feminis minora, tenuia, falcata, non spiralia. Cauda brevissima. Pedes postici longiores anticis. Palearia laxa. Oculi magni; iride fusca s. caerulea. Vere deponit pilos longiores.

Habitat in apricis rupestribus tractus alpini Asiae mediae, in desertis; in Kamtschatka, insulis kurilis, forte etiam in California et America reliqua occidentali; est quoque in Barbariae, Sardiniae, Corsicae, Graeciae montibus altissimis, subgregaria.

Celerrima, agilis, fera, cornubus pessime ferit. Videtur Aries ferus. Caro egregia, imprimis adeps delicata. Aetas 12-14 annorum. Parit Martio mense unicum vel binos. Cornua tertio mense progerminant. Adolefcit anno secundo.

guineen- 3. O. auribus pendulis, palearibus laxis pilosis,
fis. occipite prominente.

Aries guineensis seu angolensis *Marcgr. Bras. p. 234*
cum fig. bon. *Vierling p. m. - 183.*

Aries guineensis *Ionst. quadrup. tab. 46 fig. Marcgr.*

Adim-mayn *Marmol Afr. I p. 59.*

Caper Mambrinus *Charlet. exerc. p. 10.*

Ovis guineensis seu angolensis *Marcgrav. Rai. syn. quadr. p. 75.*

Ovis Guineensis seu Angolensis *Marcgr. Sloan. Iam. II p. 328.*

Les Moutons de Guinée *Des March. voy. I p. 129.*

The Sheep of the Sahara *Shaw trav. p. 241.*

Ovis auribus pendulis, palearibus laxis, occipite prominente *Linn. syst. nat. 2 p. 51.*

Ovis auribus pendulis, palearibus laxis, occipite prominente *Linn. syst. nat. 6 p. 15 n. 3.*

Aries guineensis Klein. *quadrup.* p. 14.

Ovis auribus pendulis, palearibus laxis, occipite prominente. The Ovis, with pendulous ears, a lax dew-lap, and with the back of the head prominent: the Angolan Sheep *Hill anim.* p. 583.

La Brebis de la Guinée: *Aries* (*Ovis guineensis*) pilosus, pilis breuibus vestitus, iuba longissima, auricularis longis pendulis *Briff. regn. an.* p. 77 n. 5.

Les Moutons *Adanf. Seneg.* p. 37.

Das Guineische Schaf *Hall. vierf.* p. 301.

Ovis (*guineensis*) auribus pendulis, palearibus laxis pilosis, occipite prominente *Linn. syst. nat.* 10, I p. 71 n. 2.

Schaap met hangende Ooren, groote Keelkwabben, het Agterhoofd uitpuilende *Houtt. nat. hist.* III p. 266.

Belier du Senegal *Buff. hist. nat.* XI p. 359.

Le Belier des Indes *Buff. hist. nat.* XI p. 392 tab. 34.

Autre Belier des Indes *Buff. hist. nat.* XI tab. 35.

La Brebis des Indes *Buff. hist. nat.* XI tab. 36.

Ovis (*guineensis*) auribus pendulis, palearibus laxis pilosis, occipite prominente *Linn. syst. nat.* 12, I p. 98 n. 2.

The african Sheep *Penn. syn. quadr.* p. 12.

Montone d'India *Aless. quadrup.* I tab. 26 fig. Buff.

Altro Montone d'India *Aless. quadrup.* I tab. 27 fig. Buff.

Pecora Indiana *Aless. quadrup.* I tab. 29 fig. Buff.

Das guineische Schaaf *Müll. Naturf.* I p. 428.

Memerian bacala *Congensibus.*

Magnitudo Arietis, cuius forte est varietas. Variat colore. Caput crassum. Occiput prominens. Auricularae longae, pendulae. Cornua parva, deorsum vsque ad oculos incurvata. Cauda genua attingens. Iuba sub collo pendula. Pili breves hircini.

hircini. Feminam solam cornutam haud recte dicit Marmol.

Habitat in Guinea, culta in America.

Strepficeros. 4. O. cornibus rectis carinatis flexuoso-spiralibus.

Strepficeros *Plin. hist. nat. XI c. 37 (c. 45 Hard.)*.

Οἰς ἑζυδοί *Oppian. cynege. II, 376*.

Cretensis Aries Strepficeros nominatus *Bellon. obs. p. 20 fig. p. 21*.

Cretenses Arietes *Aldrov. bisulc. p. 406 fig. p. 407*,
Bellon.

Ovis cretenfis *Ionst. quadrup. tab. 45 fig. Bellon.*

Die wilde Straubengeyz, eine Art der wilden Geylsen *Gesn. Thierb. p. 151 fig. p. 152 mediocr.*

Ovis Strepficeros cretica Bellonii *Rai. syn. quadr. p. 75*.

Ovis cornibus rectis spiralibus *Linn. syst. nat. 2 p. 51*.

Ovis cornibus erectis spiralibus *Linn. syst. nat. 6 p. 15 n. 2*.

Aries Strepficeros *Klein. quadrup. p. 14*.

Ovis cornibus erectis spiralibus. The Ovis, with erect and spiral horns: the Cretic Sheep *Hill anim. p. 582*.

La Chevre de la Crête: Hircus (Capra cretenfis) laniger, cornibus teretibus, erectis, ab imo ad summum spiraliter intortis *Briss. règn. an. p. 73 n. 15*.

Ovis cornibus erectis spiralibus *Kram. Austr. p. 322*.

Das hochgehörnte kretische Schaf *Hall. vietf. p. 302*.

Ovis (Strepficeros) cornibus rectis spiralibus *Linn. syst. nat. 10, I p. 71 n. 3*.

L'Ovis Strepficeros *Dictionn. anim. I p. 333*.

Chevre de la Crête *Dictionn. anim. I p. 595*.

Schaap met regte, Slangswyze gedraaide Hoornen *Houtt. nat. hist. III p. 267*.

Strepficheros *Buff. hist. nat. XI p. 358*.

Ovis (Strepficeros) cornibus rectis, carinatis flexuoso-
spiralibus *Linn. syst. nat.* 12, I p. 98 n. 3.

The Cretan Sheep *Penn. syn. quadr. p.* 11 tab. 3 fig.

I cornuum.

Das cretenfische Schaaf *Müll. Naturf.* I p. 429.

Zackl *Austriacis.*

Magnitudo Arietis, cui similis figura corporis: at cor-
nua teretia, recta, erecta, spiraliter torta. Ideoque
Briffonio Capra est.

Habitat in Creta, Archipelago. *Colitur* copiose in
Hungaria et Austria.

28. CAPRA.

Dentes Primores superiores nulli.
inferiores VIII.

Laniarii nulli.

Cornua concaua, fursum versa, erecta, com-
pressa, scabra.

Mentum barbatum.

Pedes vngulati.

Mammae inguinales.

Hircus. I. C. cornibus carinatis arcuatis.

Ἰρκαί Arist. *hist. anim.* V c. 11 n. 135.

Αἰρες Arist. *hist. anim.* VI c. 15 n. 250-263. VIII
c. 13 n. 18-23. IX c. 4 n. 70-75.

Capra *Plin. hist. nat.* VIII c. 50 (c. 76 *Hard.*).

Αἰξ *Oppian. cynege.* II, 326.

Capra

CAPRAE cornibus digladiant, montosa amant. Eas cum Oibus con-
trahit hodie in vnicum genus doctiss. Pallas.

- Capra *Gesn. quadr. p. 270 cum fig. bon.*
 Hircus *Gesn. quadr. p. 301 fig. p. 302 bon.*
 Hoedus *Gesn. quadrup. p. 314.*
 Hircus *Schwenckf. theriotr. p. 97.*
 Capra *Schwenckf. theriotr. p. 98.*
 Hoedus *Schwenckf. theriotr. p. 100.*
 Caper *Schwenckf. theriotr. p. 101.*
 Capra et Hircus *Aldrov. bisulc. p. 619 fig. p. 635 hirci
 et caprae bon.*
 Capra et Hircus domesticus *Ionst. quadrup. p. 65.*
 Capra Geifs *Ionst. quadrup. tab. 26 fig. bona.*
 Hircus Bock *Ionst. quadrup. tab. 27 fig. bona.*
 Caper hispanicus *Ionst. quadrup. tab. 26?*
 Die Geys *Gesn. Thierb. p. 127 fig. p. 128 bona.*
 Der Bock *Gesn. Thierb. p. 135 cum fig. mediocr.*
 Hircus domesticus *Chariet. exerc. p. 9.*
 Hircus *Sibb. Scoz. an. p. 8.*
 Capra Rai. *syn. quadr. p. 77.*
 Zahme Böcke *Kolbe Vorgeb. p. 141.*
 Capri et Caprae *Rzacz. Polon. p. 239 auct. p. 331.*
 Capra domestica *Sloan. Iam. II p. 328.*
 Capra cornibus carinatis arcuatis *Linn. syst. nat. 2
 p. 50.*
 Capra cornibus carinatis arcuatis *Linn. fn. suec. I p.
 15 n. 42.*
 Der Ziegenbock mit vier Hörnern *Meyer Thiere I tab.
 67.*
 Die Ziege *Meyer Thiere I tab. 68.*
 Capra cornibus carinatis arcuatis *Linn. syst. nat. 6 p.
 14 n. 1.*
 Tragus domesticus *Klein. quadrup. p. 15.*
 Capra cornibus carinatis arcuatis. The Capra with
 carinated, arcuated horns: the Goat *Hill anim. p.
 579.*
 La Chevre *Buff. hist. nat. V p. 59 tab. 9.*
 Le Bouc *Buff. hist. nat. V tab. 8.*

- Le Bouc, la Chevre domestique: *Hircus* (et *capra domestica*) cornibus interius cultratis, exterius rotundatis, infra carinatis, arcuatis *Briss. regn. au. p. 62 n. 1.*
- Capra cornibus carinatis arcuatis *Kram. austr. p. 319.*
- Capra cornibus carinatis arcuatis: the Nanny-goat *Bron. Jam. p. 488.*
- Der Ziegenbock, die Ziege *Hall. vierf. p. 302.*
- Capra (*Hircus*) cornibus carinatis arcuatis *Linn. syst. nat. 10, I p. 68 n. 1.*
- Bouc *Dictionn. anim. I p. 323.*
- Chevre *Dictionn. anim. I p. 593.*
- Bok: Geit met de Hoornen gekield en boogswyze krom *Houtt. nat. hist. III p. 156.*
- Capra (*Hircus*) cornibus carinatis arcuatis *Linn. fn. suec. 2 p. 15 n. 44.*
- The Goat *Penn. brit. zool. p. 13.*
- Gedder *Pontopp. Dan. I p. 602.*
- Bouc *Bom. dictionn. I p. 331.*
- Capra (*Hircus*) cornibus carinatis arcuatis, gula barbata *Linn. syst. nat. 12, I p. 94 n. 1.*
- Capra *Hircus* *Forster: Philos. transact. LVII p. 344.*
- Unser Haufsbock *S. G. Gmelin Reis. III p. 496.*
- The domestic Goat *Penn. syn. quadr. p. 14.*
- Becco *Aless. quadrup. II tab. 56 fig. Buff.*
- Capra *Aless. quadrup. II tab. 57 fig. Buff.*
- Die Ziege *Mart. Buff. vierf. II p. 3 tab. 14.*
- Der Ziegenbock *Mart. Buff. vierf. II tab. 13.*
- Der Bock *Müll. Naturf. I p. 404.*
- Capra (*Hircus*) cornibus carinatis arcuatis, gula barbata *Müll. Dan. prodr. p. 6 n. 39.*
- Becco (*hircus*); Capra (*capra*); Capretto (*boedus*) *Italis.*
- Cabron (*hircus*); Cabra (*capra*); Cabrito (*boedus*) *Hispanis.*
- Cabram (*hircus*); Cabra (*capra*); Cabrito (*boedus*) *Lusitanis.*

Bouc (*bircus*); Chevre (*capra*); Chevreau (*boedus*)
Gallis.

Bwch (*bircus*); Gafr (*capra*); Mynn (*boedus*) *Cam-*
brenfibus.

Bock, Ziegenbock (*bircus*); Ziege, Geiß (*capra*);
Kitzchen (*boedus*) *Germanis*.

Bok (*bircus*); Geit (*capra*); Bokje (*boedus*) *Belgis*.
Goat *Anglis*,

Buk (*bircus*); Gied (*capra*) *Danis et Noruegis*.

Bock (*bircus*); Get (*capra*); Kiid (*boedus*) *Suecis*.

Koziel *Polonis*.

Коза (Koza) (*capra*); Козелъ (Kozel) (*bircus*)
Ruffis.

Kafah *Tataris et Tſcheremiſſis*.

Kafa *Tſchuwafchis*.

Gurt-Ketſch *Wotiakis*.

Sfää *Morduanis*.

Pecus infidum, petulans, bellicofum, falienſ, falax,
hircum olens, frigoris impatiens, arbores decor-
ticans; corio tenaci indutum, lana caprina teſtum,
aranco barbatum, caſcoſum. Edit etiam Cicu-
tam. Colore variat albo nigroque. Haud raro
ecornis, ſed et quadricornis occurrit. Parit 1 - 2,
rariusque 3 aut 4. Grauida quinque menſes. Ado-
leſcit anno ſecundo. Aetas 10 - 12 annorum.

Amat loca montofa, viſitans ramulis variis frondi-
buſque arborum, Lichenibus. Ferus rurfus factus
ex manſueto hodie copioſus reperitur in inſula Iuan
Fernandez.

Angorenfis. Varietas Angorenfis:

Αἰξ ἐν Λυκίᾳ *Aelian. anim. XVI c. 30.*

Chevre d'Angora *Tournef. voy. II p. 185 cum fig.*
mediocr.

La Chevre d'Angora *Buff. hiſt. nat. V p. 71 tab. 11.*

Le Bouc d'Angora *Buff. hist. nat. V tab. 10.*

La Chevre d'Angora: *Hircus (Capra Angorensis)*
pilis longissimis crispis toto corpore vestitus. *Briff.*
regn. an. p. 64 n. 2.

Capra Angolensis Hasselqu. Palaeft. p. 285.

Der angorische Bok *Hall. vierf. p. 307 tab. 12.*

Geiten van Angora *Houtt. nat. hist. III p. 163.*

Capra Angorensis Linn. syst. nat. 12, I p. 95.

Capra Hircus angorensis Forster: Philos. transact.
LVII p. 344.

The Angora Goat *Penn. syn. quadr. p. 15.*

Becco d'Angora *Aless. quadrup. II tab. 58 fig. Buff.*

Capra d'Angora Aless. quadrup. II tab. 59 fig. Buff.

Der angorische Bock *Mart. Buff. vierf. II p. 24 tab.*
15.

Die angorische Ziege *Mart. Buff. vierf. II p. 24 tab.*
16.

Ziegen von Angora *Müll. Naturf. I p. 406.*

Hospitatur circa Angoram.

Lana ad pedes usque dependet niuea, splendens,
mollissima, fericum prouocans, camelina dicta.
Cornua minora, torta, ad latera protracta ut Ouis
hispanicae. Auriculae planae, lanceolatae, decli-
natae, nec erectae, canaliculatae. Corpus bre-
uius. Pedes longiores.

Aegagrus. *Hircus domesticus* ortus videtur omnino ex
Argagro Pallasi:

Fera quaedam montana caprini generis *Kaempf.*
amoen. exot. p. 398 fig. p. 407 fig. 2.

Die Ziege, welche den Bezoar liefert *S. G. Gmelin*
Reis. III p. 493.

Aegagrus Pallas spicil. XI p. 45 tab. 5 fig. 2, 3 crani cum corn.

يازن (Pafèn) *Arabibus.*

Ibice minor, maior Hirco. Caput caprinum, antice nigrum, lateribus rufefcente fulcoque mixtum. Aruncus insignis vna cum gula castaneo fulcoque mixtus. Corpus ceruinum. Animal totum griseum vel cinereo-rufefcens, linea dorsali longitudinali atra a collo ad caudam vsque. Cauda atra. Cernua feminae nulla vel exigua: mari magna, arcuata, reclinata, parum diuergentia, apicibus introrsum declinata; compressa, anterieus carinata.

Habitat in Caucaſo, Tauro; num et in Alpibus europaeis?

Ex hoc, ſed non ex hoc ſolo, Paſahr concrementum lapideum ventriculi, nobis Bezoar dictum, ſed nec vbique nec in omnibus reperiendum. Obtinetur praecipue ex prouincia Laar et Choraſan Perſiae. Vid. *Bayhini monogr. Tavernier voy. II p. 318. Daubenton hiſt. nat. XII p. 278.*

Animal vt plurimum confuſum cum Ibice, primus bene diſtinxit doctiſſ. Pallas.

Ibex. 2. C. cornibus lunatis rotundatis ſupra nodofis in dorſum reclinatis.

Ibex Plin. hiſt. nat. VIII c. 53 (c. 79 Hard.).

Αἰγες αἰγίοι ἐν Λιβύῃ Aelian. anim. XIV c. 16.

Ibex Geſn. quadrup. p. 331 cum fig. mediocri.

Capricorni vel potius Ibiſcis maris figura *Geſn. quadrup. p. 1099* melior.

Hirci ſeri quoddam genus Cretae familiare *Bellon. obſ. p. 26* cum fig. mediocr.

R 3

Ibex

Version Phœnix Comte de Foix (†. 1390) livre de la chasse (in Jaqu. de Fouilloux Veneria. Rouen 1650. 2.) pag. 98.

- Ibex *Aldrov. bisulc. p. 730 fig. p. 732 mala.*
 Ibex *Ionst. quadrup. p. 75.*
 Ibex Steinbock *Ionst. quadrup. tab. 25 fig. mediocr.*
 Trais vel Ibex *Ionst. quadrup. tab. 28 fig. Gesneri altera.*
 Capra Lybica *Ionst. quadrup. tab. 25?*
 Flirus *Ionst. quadrup. tab. 25?*
 Steinbock, Ybschen oder Ybsch - Geys *Gesn. Thierb. p. 148 cum fig. mediocr.*
 Ibex *Charlet. exerc. p. 10.*
 Ibex vulgo Capricornus *Wagn. Helvet. p. 176.*
 Ibex, Germanis Steinbok *Rai. syn. quadr. p. 77.*
 Capra cornibus nodosis in dorsum reclinatis *Linn. syst. nat. 2 p. 50.*
 Steinbock *Riding. jagdb. Th. tab. 11. An potius Aëgagri figura? videtur Pallasio.*
 Capra cornibus nodosis in dorsum reclinatis *Linn. syst. nat. 6 p. 14 n. 6.*
 Ibex *Klein. quadrup. p. 16.*
 Capra cornibus nodosis in dorsum reclinatis. The Capra, with nodose horns bending towards the back *Hill anim. p. 580 tab. 28 fig. mediocr.*
 Le Bouc - Estain: Hircus (Ibex) cornibus supra nodosis, infra rotundatis, in dorsum reclinatis *Briss. regn. an. p. 64 n. 3.*
 Capra cornibus nodosis in dorsum reclinatis *Kram. Austr. p. 321.*
 Capra cornibus nodosis in dorsum reclinatis: the bastard Ibex *Brown. Jam. p. 488? vix.*
 Der Steinbok *Hall. vierf. p. 312.*
 Capra (Ibex) cornibus nodosis in dorsum reclinatis *Linn. syst. nat. 10, 1 p. 68 n. 2.*
 Bouc sauvage ou bouc - étain *Dictionn. anim. 1 p. 324.*
 Ibex *Dictionn. anim. II p. 523.*
 Steenbok: Geit met knobbelige Hoornen, die naar de Rug omgeboogen zyn *Houbr. nat. hist. III p. 176.*

Le

Fr. Meisner's museum der N. G. Helvetiens 1807. A

Museum Severianum vol. 1. p. III. tab. 26.

Le Bouquetin *Buff. hist. nat. XII p. 136 tab. 13 fig. mala iunioris, fig. 14 cornuum.*

Bouc sauvage *Bon. dictionn. I p. 334.*

Capra (Ibex) cornibus supra nodosis in dorsum reclinatis, gula barbata *Linn. syst. nat. 12, I p. 95 n. 2.*

Steinbock *Knorr delic. II tab. K, 5 fig. 2 cornu.*

The wild Goat *Penn. syn. quadr. p. 13 n. 9.*

Capra selvatica *Aless. quadrup. III tab. 131 fig. Buff.*

Der Steinbock *Müll. Naturf. I p. 407.*

Capra Ibex *Forsk. fu. orient. p. IV.*

Ibex alpium sibiricarum *Pallas spicil. XI p. 31 tab. 3 fig. animalis, tab. 5 fig. 4 cornu.*

Capra selvatica *Italis.*

Bouquetin *Gallis, olim Bouc - estain.*

Steinbock *Germanis.*

Takja *Mongolis.*

Tau - Tökké *Kirgis.*

Baeden *Aegyptiis.*

Procul dubio varia ex his synonymis potius ad Aegagrum pertinent: sed quisnam distinguet?

Maior Hirco. Caput breue, rostro crasso, compresso, subarcuato. Oculi minusculi. Cornua vasta, supra nodosa, infra rotundata, magis quam in Aegagro arcuata et quasi lunata, in dorsum reclinata, griseo-nigricantia. Crura gracilia. Cauda breuis, subrus nuda, ceterum feris longis iubata, basi lateribusque alba, supra et extremitate atra. Pili corporis longi, fului vel cani, in dorso linea nigricans, macula magna atra supra et infra genua antica, quae alba. Mas arunco nigro prolixo, versus gulam dilatato. Femina minor, cornibus minoribus, arunco minore. Iuniores fordide grisei linea dorsali nigra obsoleta.

Habitat in Alpibus Penninis, Italicis, Sibiricis, Kamtschaticis, Salisburgiensibus, Cretae; olim et in Heluetia, vbi hodie vix occurrit. Amat praerupta inaccessa. Est quoque in Hedsjas.

Agillimum animal, pernicitatis mirandae; salit in rupibus praecipitibus. Degit in gregibus parvis. Parit 1 - 2.

Huius omnino *varietas* videtur, nisi forte ad Hircum pertineat:

Capricornus. Le Capricorne *Buff. hist. nat. XII p. 146 tab. 15 fig. Sceleti.*

The Capricorn Goat *Penn. syn. quadrup. p. 16.*

Cornua brevia, apicibus antrorsum versis, lateribus annulatis.

mambrica. 3. C. cornibus reclinatis, auriculis pendulis.

Capra indica *Gesn. quadrup. p. 1097 fig. mediocr.*

Capra indica, aut mambrina, aut syriaca potius *Gesn. quadrup. p. 1098 figg. mediocr.*

Geyssen mit hangenden Ohren *Rauwolff Reis. III p. 26.*

Capra auribus oblongis *Alpin. Aeg. I p. 229.*

Capra auribus demissis *Aldrov. bisulc. p. 769 fig. p. 768 mediocris.*

Capra Indica et mambrina syriaca *Ionst. quadrup. p. 81.*

Caper mambrinus *Ionst. quadrup. tab. 26 fig. Gesn.*

Capra mambrina *Ionst. quadrup. tab. 26 fig. Gesn.*

Eine Indianische Geys *Gesn. Thierb. p. 153 figg. p. 154 mediocres.*

Capra Mambrina siue Syriaca *Gesneri Rai. syn. quadr. p. 81.*

Capra auribus pendulis longissimis *Linn. syst. nat.* 2
p. 51.

Capra auribus pendulis longissimis *Linn. syst. nat.*
6 p. 14 n. 11.

Capra auribus pendulis longissimis. The Capra
with very long, pendulous ears: the long-eared,
syrian Goat *Hill anim.* p. 582.

La Chevre de Sirie: Hircus (capra syriaca) cornibus
minimis, erectis, parumper retrorsum incurvis, au-
riculis longissimis, pendulis *Briff. regn. an.* p. 72
n. 13.

The other kind of goats *Ruff. Alepp.* p. 52.

Das sirsche Schaf mit lappigen Ohren *Hall. vierf.* p.
302.

Capra (mambrica) auribus pendulis longissimis *Linn.*
syst. nat. 10, 1 p. 70 n. 11.

Chevre de Syrie *Dictionn. anim.* 1 p. 595.

Geit met zeer lange neerhangende Ooren *Houtt.*
nat. hist. III p. 216.

La chèvre Mambrine ou chèvre du Levant *Buff. hist.*
nat. XII p. 152, 154.

Capra (mambrica) cornibus reclinatis, auribus pen-
dulis, gula barbata *Linn. syst. nat.* 12, 1 p. 95 n. 3.

The syrian Goat *Penn. syn. quadr.* p. 15 tab. 5 fig.
1, 2.

Die sirsche Ziege *Müll. Naturf.* 1 p. 408.

Paullo maior Hirco. Auriculae longissimae, pendu-
lae. Cornua parua, erecta, parumper retrorsum
recuruata, nigra. Pili fului.

Habitat in Syria.

Videtur antem Hirci varietas, nec propria species.

depressa. 4. *C. cornibus depressis incuruis minimis cranio incumbentibus.*

Capra cornibus depressis incuruis minimis cranio incumbentibus *Linn. syst. nat. 2 p. 50.*

Capra cornibus depressis incuruis minimis cranio incumbentibus *Linn. syst. nat. 6 p. 14 n. 2.*

La petite Chevre d'Amerique: *Hircus* (*Capra parua Americana*) cornibus depressis incuruis minimis, cranio incumbentibus *Briff. regn. an. p. 65 n. 4.*

Capra (depressa) cornibus depressis incuruis minimis cranio incumbentibus *Linn. syst. nat. 10, I p. 69 n. 4.*

Kleine Geit van Amerika: Geit met kleine, kromme, tegen't Hoofd aan leggende Hoornen *Houtt. nat. hist. III p. 193.*

L'autre petite chevre à cornes rabattues *Buff. hist. nat. XII p. 154.*

Le Bouc d'Afrique *Buff. hist. nat. XII tab. 18.*

La Chevre naine *Buff. hist. nat. XII p. 154 tab. 19.*

Capra (depressa) cornibus depressis incuruis minimis cranio incumbentibus, gula barbata *Linn. syst. nat. 12, I p. 95 n. 5.*

The African Goat *Penn. syn. quadr. p. 16.*

Becco d'Africa *Aless. quadrup. IV tab. 163 fig. Buff.*

Capra nana *Aless. quadrup. III tab. 133 fig. Buff.*

Der Zwergbock *Müll. Naturf. I p. 411.*

Magnitudo hoedi *Hirci*. Pili longi, penduli. Cornua triangula, lunata, crassa, vix digitum longa, cranio adpressa, vt fere cutem perforent.

Habitat in Africa; culta hodie in Surinamo aliisque terris americanis.

Buffonio, Pennanto atque Pallasio *Hirci* varietas est.

- reuerfa. 5. *C. cornibus erectis apice recuruis.*
Capra cornibus erectis apice recuruis Linn. syst. nat.
 2 p. 50.
- Capra cornibus erectis apice recuruis Linn. syst. nat.*
 6 p. 69 n. 5.
- Le petit chamois d'Amerique: *Hircus* (*Ibex paruus americanus*) *cornibus erectis apice recuruis Briff. regn. an. p. 65 n. 5.*
- Capra* (reuerfa) *cornibus erectis apice recuruis Linn. syst. nat. 10, I p. 69 n. 5.*
- Kleine Gems van Amerika: Geit met opstaande Hoornen, die aan de toppen voorwaards gekromd zyn *Houtr. nat. hist. III p. 194.*
- La petite chevre à cornes droites et recourbées à la pointe *Buff. hist. nat. XII p. 154.*
- Le Bouc de Iuda *Buff. hist. nat. XII p. 154, 186 tab. 20.*
- La Chèvre de Iuda *Buff. hist. nat. XII p. 154 tab. 21.*
- Capra* (reuerfa) *cornibus erectis apice recuruis Linn. syst. nat. 12, I p. 95 n. 6.*
- The Whidaw Goat *Penn. syn. quadr. p. 16.*
- Becco die Giuda *Aless. quadrup. IV tab. 164 fig. 1 Buff.*
- Capra* di Giuda *Aless. quadrup. IV tab. 164 fig. 2 Buff.*
- Die amerikanische Gemse *Müll. Naturf. I p. 411.*
- Magnitudo hoedi *Hirci* vnus anni. Pili breues, cervini. Cornua vix digitum longa, antrorsum recuruata apice.
- Habitat* in regno Iudae Africae. Linneus et hanc americanam dicit.

Buffonio et Pennanto Hirci varietas est. Doctiff.
Pallas refert ad Antilopen Damam; ab hac vero
certe differt le Bouc de Iuda Buffonii.

Coibat cum praecedente et pullum non diu supersti-
tem in viuario Cliffortiano producebat. *Lim.*

29. ANTILOPE.

Dentes Primores superiores nulli.
inferiores VIII.

Laniarii nulli.

*Cornua concaua, sursum versa, teretia, an-
nulata vel spiralia.*

Mentum imberbe.

Pedes vngulati.

Mammae inguinales.

a) *Cornibus erectis recuruis uncinatis.*

Rupicapra. I. A. cornibus erectis uncinatis, corpore supra
ferrugineo.

Rupicapra *Plin. hist. nat. VIII c. 53 (c. 79 Hard.) XI*
c. 37 (c. 45 Hard.).

Αἰξ αἰγίος Oppian. cyneget. II, 338.

Rupicapra *Gesn. quadrup. p. 321 fig. p. 319 mediocr.*

Rupicapra *Bellon. obs. p. 57.*

Dorcus siue Rupicapra *Aldrov. bisulc. p. 725 figg. p.*
727 mal.

Rupicapra *Ionst. quadrup. p. 74 tab. 27 fig. mal.*

Rupicapra *Gems Ionst. quadrup. tab. 32 fig. bon.*

Die *Gems Gesn. Thierb. p. 140 cum fig. superiore*
mala, inferiore mediocri.

Le Chamois *Perr. anim. I p. 201 tab. 29 fig. bon.*

Rupicapra *Charlet. exerc. p. 9.*

Rupicapra, Rupicaprea *Wagn. Helvet. p. 183.*

Rupi-

Rupicapra Rai. *syn. quadr.* p. 78.

Rupicapra Scheuchz. *it. alp.* I p. 155.

Gemse Kolbe *Vorgeb.* p. 151?

Rupicapra Rzacz. *Pelon.* p. 223 *auct.* p. 319.

Capra cornibus surrectis vncinatis Linn. *syst. nat.* 2
p. 50.

Eine Gemse Riding. *jagdb. Th. tab.* 12 fig. bon.

Die Gems Meyer *Thiere* I tab. 66.

Capra cornibus erectis vncinatis Linn. *syst. nat.* 6 p
14 n. 5.

Tragus Dorcas, Rupicapra, Caprea Klein. *quadrup.*
p. 17.

Capra cornibus erectis vncinatis. The capra, with
erect, uncinated horns: the Rupicapra or Camoise
Hill anim. p. 579 tab. 28 fig. mala.

Le Chamois ou l'Yzard: Hircus (Rupicapra) corni-
bus teretibus erectis, rugosis, ad apicem leuibus
et vncinatis *Briss. regn. an.* p. 66 n. 6.

Capra cornibus erectis vncinatis *Kram. Austr.* p. 320.

Capra cornibus erectis vncinatis, pedibus longioribus:
the Rupi-goat *Brown. Jam.* p. 488?

Die Gemse Hall. *vierf.* p. 314 tab. 3.

Capra (Rupicapra) cornibus erectis vncinatis Linn.
syst. nat. 10, I p. 68 n. 3.

Chamois *Dictionn. anim.* I p. 483.

Gems: Geit met regt opstaande haakswyze Hoornen
Houtt. nat. hist. III p. 180.

Le Chamois *Buff. hist. nat.* XII p. 136, 177 tab. 16.

Chamois *Bon. dictionn.* I p. 476.

Capra

ANTILOPES pleraeque calidiora orbis antiqui inhabitant, Americae plane exules, inque collibus, rarius in planis degunt, Timidae, agiles celeresque, corpore pedibusque graciliores, gregariae incedunt saepe ad aliquot millia. Edunt fruticulos. Caro nonnullarum moschum redolet. Feminae haud raro eornes.

Capra (Rupicapra) cornibus erectis vncinatis *Lin.*

Syst. nat. 12, I p. 95 n. 4.

Antilope Rupicapra *Pallas miscell.* p. 4.

Antilope Rupicapra *Pallas spicil.* I p. 7.

The Chamois *Penn. syn. quadr.* p. 17 n. 10.

Camuza *Aless. quadrup.* III tab. 132 fig. Buff.

Die Gems *Müll. Naturf.* I p. 409.

Die Gemse, Felsengeis *Mart. Naturlex.* II p. 656.

Die Gemse: Antilope europaea *Müll. Naturf. Suppl.*

p. 53.

Camorcia *Italis.*

Camuza, Cabra montès *Hispanis.*

Cabra montez *Lusitanis.*

Jzard amid vaj- Chamois *Gallis, obsolete Yfard, Sarris. Bellonius*
cones pyrenaeos Gemse *Germanis.*

Gems *Belgis.*

Chamois *Anglis.*

Koza skalna, dzika *Polonis.*

Дикая коза (Dikaja koza) *Ruffis.*

Magnitudine Hirci, at crura longiora. Corpus pilis breuioribus rufo-fuscum, dorso linea nigricante, sed album fronte, vertice, gula, auribus intus. Cornua in utroque sexu nigra, teretia, erecta, rugosa, ad apicem laeuius et vncinata. Sinus cutaneus singularis pone cornua. Labium superius subfissum. Genua barbata. Cauda breuis, etiam subtus nigricans. Hieme corpus longius villosum, magis griseum. Stat pedibus inferius maxime approximatis.

Distin-

Species ANTILOPVM multae, neque satis bene determinatae a plerisque auctoribus: difficile itaque genus. Sequutus sum imprimis Pennantum.

Distinguunt Heluetii minores magis rufescentes ex alpibus altissimis (*Gratzthiere*), et maiores magis fuscas (*Waldthiere*).

Habitat in alpibus helueticis, rhaeticis praecipue, italicas, delphinatus, Graeciae, Cretae, in Pyrenaeis, Carpatis, non tam alte ac Capra Ibex. Gregaria. Visitat arbusculorum ramulis, radicibus, herbis. Timida excellit visu, olfactu, auditu. Celerrima. Hieme latet in speluncis rupium. Coi-
mense octobris et nouembris. Parit 2 - 3 martio vel Aprili. Vox sibilans. Ex huius ventriculo Aegagropilae.

Coniungit hanc cum Capra Hirco Buffonius, quod mirum maxime.

leuco-
phaea. 2. A. cornibus erectis retrorsum flexis, corpore supra caeruleo.

Blaue Böcke *Kolbe Vorgeb.* p. 141.

Der himmelblaue afrikanische Bock *Halt. vierf.* p. 308.

Africanische Gems *Knorr delic. II tab. K, 4?*

Antilope leucophaea *Pallas miscell.* p. 4.

Antilope leucophaea *Pallas spicil.* I p. 6.

The blue Antelope *Penn. syn. quadr.* p. 24 n. 13
fig. capitis p. 39.

Die lichtgraue Antilope *Mart. Naturlex. II p. 681.*

Der blaue Bock: Antilope capensis *Müll. Naturf. Suppl.* p. 52.

Maior

Separandum utique ANTILOPVM genus diuersissimum a Caprino, a quo maxime differt.

Maiores Ceruo Dama. Cornua 20 poll. longa, acuta, conica, retrorsum flexa, annulis infra 20, apice laevia. Auriculae acutae. Cauda septem pollices longa, apice alba, pilis longioribus floccosa. Color viui animalis eleganter caeruleus, mortui e caeruleo griseus. Litura ante oculos alba. Venter et pedes albi.

Habitat ad caput bonae spei.

b) *Cornibus rectis.*

recticor- 3. A. cornibus teretibus rectissimis basi annula-
nis. tis.

Gazella indica cornibus rectis longissimis nigris, prope caput tantum annulatis *Rai. syn. quadr. p. 79.*

Das africanische Elendthier *Kolbe Vorgeb. p. 145 tab. 3 fig. 1.*

Capra cornibus teretibus rectissimis longissimis: basi annulatis *Linn. syst. nat. 2 p. 50.*

Capra cornibus teretibus rectissimis longissimis: basi annulatis *Linn. syst. nat. 6 p. 14 n. 8.*

Capra cornibus teretibus, rectissimis, longissimis, basi annulatis. The Capra, with cylindric, straight, and very long horns, annulated at the base: the Indian Antelope, or Bezoar-goat *Hill anim. p. 581.*

La Gazelle des Indes: Hircus (Gazella indica) cornibus teretibus, longissimis, rectis, basi tantum annulatis *Briss. regn. an. p. 67 n. 7.*

Capra Gazella africana *Hasselqu. Palaeft. p. 283.*

Der weißgestreifte, rundhörnige afrikanische Bok *Hall. vierf. p. 309.*

Capra

ANTILOPES mediae sunt Capras inter atque Ceruos: habitu cervino, cornibus capriinis: Cystide fellea instruantur. Oculi pulcherrimi nigri.

Capra (Gazella) cornibus teretibus rectissimis longissimis: basi annulatis *Linn. syst. nat.* 10, I p. 69 n. 7.

Gazelle *Dictionn. anim.* II p. 251 cum congeneribus.

Gazelle: Geit met ronde, zeer regte en lange Hoor-
nen, die aan 't onder - end geringd zyn *Houtt.*
nat. hist. III p. 197 tab. 24 fig. 1.

Capra cornibus teretibus rectissimis longissimis basi
annulatis *Gronov. zooph.* I p. 3 n. 8.

La Gazelle du Bézoard, que les Orientaux appellent
Pafan *Buff. hist. nat.* XII p. 212 tab. 33 fig. 3 cor-
num.

Capra (Gazella) cornibus teretibus rectissimis longif-
simis: basi annulatis *Linn. syst. nat.* 12, I p. 97
n. 7.

Antilope bezoartica *Pallas miscell.* p. 8.

Antilope bezoartica *Pallas spicil.* I p. 14.

Gazella refticornis *Pallas: Nou. comment. petrop.* XIII
p. 468 tab. 10 fig. 5 cornu fossilis.

The aegyptian Antelope *Penn. syn. quadr.* p. 25 n. 14.

Die Gafelle *Müll. Naturf.* I p. 412 tab. 24 fig. 1.

Bezoarantilope, Bezoarziege *Marr. Naturlex.* II p.
640.

Capra Gazella *Forsk. fn. orient.* p. IV.

Der Bezoarbock *Müll. Naturf. Suppl.* p. 55.

ظبي (Dabi), غزال (Ghazell) *Aegyptiis.*

Magnitudo Cerui Damae. Cornua fere 3 ped. lon-
ga annulata basi; ad basin macula nigra triangu-
laris, aliaque alba. Linea nigra a nuca ad lum-
bos vsque. Corpus supra cinereum, pectus ven-
terque alba. Cauda longitudine pedis vnus, api-
ce nigra, pilis longioribus.

Habitat in Aegypto, Arabia, totoque Oriente, in
India, ad caput bonae spei; in planis.

bezoarti- 4. A. cornibus teretibus subarcuatis totis an-
ca. nulatis.

Gazella quae veteribus Oryx dicta *Bellon. obs. p. 120.*

Gazella *Alpin. Aeg. I p. 232 tab. 14 fig. 1 mala.*

Capra siue Hircus Bezoarticus *Aldrov. bisulc. p. 755 fig. p. 756?*

Hircus bezoarticus *Charlet. exerc. p. 11.*

Animal bezoarticum orientale *Rai. syn. quadr. p. 80.*

Bock der keinen Namen *Kolbe Vorgeb. p. 142 tab. 2 fig. 2 (male sub nomine der blaue Bock)?*

Tragus Bezoarticus, Bezoarbock *Klein. quadrup. p. 19.*

Capra cornibus teretibus, perfecte annulatis, arcuatis. The capra, with cylindric, arched, and perfectly annulated horns: the african Antelope *Hill anim. p. 581 tab. 28 fig. mala.*

La Gazelle du Bezoar: Hircus (Gazella bezoartica) cornibus teretibus rectis, ab imo ad summum fere annulatis, apice tantummodo laevi *Briff. regn. an. p. 69 n. 9.*

Der Bezoarbock, Hirschziege *Hall. vierf. p. 318.*

Algazel *Buff. hist. nat. XII p. 211 tab. 33 fig. 1, 2 cornuum.*

Gazelle *Bom. dictionn. II p. 288 cum congener.*

Capra (bezoartica) cornibus teretibus arcuatis totis annulatis, gula barbata *Linn. syst. nat. 12, I p. 96 n. 9.*

The Bezoar Antelope *Penn. syn. quadr. p. 26 n. 15.*

Der Bezoarbock *Müll. Naturf. I p. 415.*

Antilope mit bogenförmig gekrümmten Hörnern *Marr. Naturlex. II p. 676.*

De hac quid sentiam, fere ignoro. Confusa tantum non omnia synonyma. Forte Capra Aegagrus est.

Magnitudo Hirci. Corpus ex cinereo rufum. Dorsum stria longitudinali alba. Cauda nigra. Cornua ad 3 pedes longa, gracilia, erecta, subrecuruata, magis minusue annulata. Femina eornis. Mentum barbatum.

Habitat in montibus inaccessis Persiæ. Celer atque timida, numquam in plana descensura. Gregaria. Est quoque in Aegypto. Mansuescere facile eam Alpinus habet.

Oryx. 5. A. cornibus rectis ultra medietatem basi spiritaliter tortis, corpore griseo.

Oryx *Plin. hist. nat. II c. 40 (c. 4 Hard.). X c. 73 (c. 94 Hard.). XI c. 46 (c. 106 Hard.).*

Empalagna *Purch. Pilgr. II p. 1002.*

Oryx *Ionst. quadrup. p. 81.*

Les Nil-gaux ou boeufs gris *Bernier voy. II p. 245.*

Empakasse *Dictionn. anim. II p. 99.*

Le Coudous *Buff. hist. nat. XII p. 357 tab. 46 Bis figg. corn.*

Empakasse ou Impanguezze *Bom. dictionn. II p. 103.*

Empalagna *Bom. dictionn. II p. 103.*

Antilope Oryx *Pallas miscell. p. 9.*

Antilope Oryx *Pallas spicil. I p. 15.*

The indian Antelope *Penn. syn. quadr. p. 26 n. 16.*

Grosse wilde Ziegenantilope *Marr. Naturlex. II p. 685.*

Der Cudu *Müll. Naturf. Suppl. p. 55.*

Maior, magnitudine Equi. Cornua 2 ped. longa, crassa, recta, nigra, cum prominentiis duabus spiralibus ad duas tertias, apice laeuia. Color corporis dilute griseus, linea per dorsum, et pedum extremitatibus nigricantibus. Animal itidem obscurum.

Habitat in India et Africa. Mitis, monogama. Vox fortis. Caro proba.

Ceruum Mazame *Sebae* huius deteriorem figuram esse doctiss. Pallas iudicat.

scripta. 6. A. cornibus rectis spiraliter tortis, corpore rufo-fusco striis albis.

Le Guib *Buff. hist. nat. XII p. 305, 327 tab. 40 fig. animalis, tab. 41 fig. I cornu.*

Guib *Bon. dictionn. II p. 411.*

Antilope scripta *Pallas miscell. p. 8.*

Antilope scripta *Pallas spicil. I p. 15.*

The harnessed Antelope *Penn. syn. quadr. p. 27 n. 17.*

Guib *Aless. quadrup. III tab. 134 fig. Buff.*

Die bunte Antilope *Marr. Naturlex. II p. 643.*

Der Creutzbock *Müll. Naturf. Suppl. p. 55.*

Oualofes, Zalofes *Aethiopibus ad Senegal fluvium.*

Magnitudo fere Cerui Damae. Cornua recta, novem pollices longa, retrorsum versa, cuni spiris duabus longitudinalibus. Auriculae latae. Color corporis obscure ex rufo fuscus. Macula alba infra utrumque oculum. Latera corporis fasciis duabus transuersis albis, per quas transeunt forma crucis duae aliae a dorso ad ventrem vsque. Venter dorso concolor lineis tribus albis utrinque. Femora albo maculata. Cauda longitudine decem pollicum, pilis longis.

Habitat in planis et siluis Senegaliae, gregaria.

Grimmia. 7. A. cornibus rectis basi subannulatis, inter cornua fasciculo piloso.

Capsa siluestris americana *Grimm. Miscell. nat. curios. dec. II ann. 4 p. 131 fig. 13 mala.*

Capra

Capra siluestris Africana Grimmii Rai. syn. quadr.
p. 80.

Capra capite fasciculo piloso, cauitate infra oculos
Linn. syst. nat. 2 p. 51.

Capra capite fasciculo tophoso, cauitate infra oculos
Linn. syst. nat. 6 p. 14 n. 10.

Tragus, Capra siluestris Africana Grimmii Klein. qua-
drup. p. 19.

Capra capite fasciculo tophoso, cauitate infra oculos.
The Capra, with a tophose bunch on the head, and
a hollow under the eyes *Hill anim. p. 581.*

Le Chevrotain d'Afrique: *Tragulus (africanus) in*
medio capite fasciculum pilosum erectum gerens
Briss. regn. an. p. 97 n. 4.

Die amerikanische Gazelle mit dem Haarbüschel auf
dem Kopfe *Hall. vierf. p. 318.*

Capra (Grimmia) capite fasciculo tophoso, cauitate
infra oculos Linn. syst. nat. 10, I p. 70 n. 10.

Geit met een knobbelagtig bondeltje Hair op't Voor-
hoofd en een holligheid onder de Oogen *Houtt.*
nat. hist. III p. 215.

La Grimme *Buff. hist. nat. XII p. 307, 329 tab. 41*
fig. 2, 3 capitis.

Moschus (Grimmia) capite fasciculo tophoso Linn.
syst. nat. 12, I p. 92 n. 2.

Antilope *Grimmia Pallas miscell. p. 1 tab. 1.*

Antilope *Grimmia Pallas spicil. I p. 15, 38 tab. 3.*

The Guinea Antelope *Penn. syn. quadr. p. 27 n. 18.*

Afrikanische Moschus *Müll. Naturf. I p. 376.*

Grimmische Antilope *Mart. Naturlex. II p. 668 cum*
fig. Pall.

Der Jungfernbock *Müll. Naturf. Suppl. p. 55.*

Magnitudo pulli *Cerui Damae bimestris. Cornua*
18 poll. longa, recta, nigra, gracilia, acuta, basi
longitudine trium pollicum laeuiter annulata. Au-
riculae largae. Oculi obscuri. Infra eos fossa

cum liquore oleoso graueolente. Inter cornua cristata pilorum nigrorum. Corpus supra fuscum, admixto cinereo flauoque. Venter albus. Cauda breuis, supra nigra, subtus alba. Femina ecornis.

Habitat in Guinea. Timida, pernix.

- regia. 8. A. cornibus breuissimis rectiusculis, corpore rufo-fusco.
- Der Hirschhe ihre Könige *Bossm. Guin. p. 294.*
- Biches d'une petiteſſe extraordinaire *Des March. voy. I p. 275.*
- Cervus iuuenus perpusillus, Guineensis *Seb. theſ. I p. 70 tab. 43 fig. 3.*
- Capra pedibus digito humano angustioribus *Linn. ſyſt. nat. 2 p. 50.*
- Capra pedibus digito humano angustioribus *Linn. ſyſt. nat. 6 p. 14 n. 4.*
- Traguli Guineensis *Klein. quadrup. p. 21.*
- Capra pedibus digito humano angustioribus. The Capra, with feet smaller than a man's finger: the Guinea-deer *Hill anim. p. 579.*
- Capra (perpusilla) pedibus digito humano angustioribus *Linn. muſ. Ad. Frid. I p. 12.*
- Petite eſpece de biches *Adanf. Seneg. p. 114.*
- Das kleinſte Guineeiſche Hirschgen *Hall. vierf. p. 321 tab. 6.*
- Capra (pygmaea) cornibus teretibus conicis obtusis curuis: latere incuruato rugoso *Linn. ſyſt. nat. 10, I p. 69 n. 6.*
- Guineeiſch Geitje: Geit met de Hoornen Kegelvormig rond, aan 't end ſtomp, krom, en aan de ingeboogen Zyde rimpelig *Houtt. nat. hiſt. III p. 194.*
- Capra? pedibus bifulcis, pilis longis obſcure fuluis *Gronov. zooph. I p. 3 n. 7?*

Le Chevrotain du Senegal *Buff. bist. nat. XII p. 815*
tab. 43 fig. 2 cornu.

The royal Antelope *Penn. syn. quadr. p. 28 n. 19.*
 Guevei *Guineensibus.*

Altitudo corporis vix nouem pollicum. Crura crassitie pennae anferinae. Cornua breuissima, nigra, polita, longitudine 2 pollicum. Auriculae magnae. Color corporis rufo - fuscus. Femina ecornis.

Habitat ad Senegal fluuium, inque calidissimis reliquis Africae. Agilis, mitis. Non fert nostrum clima. Vide quoque Moschum pygmaeum.

c) *Cornibus in frontem reduncis.*

Tragocamelus. 9. A. cornibus in frontem reduncis, corpore supra cinereo, fronte macula rhombea nigra.

Biggel *Mandelst. Reis. I p. 122.*

Tragelaphus Caii apud Gesnerum *Rai. syn. quadr. p. 82?*

A Quadruped brought from Bengal *Parsons: Philos. transact. num. 476 p. 465 tab. 3 fig. 9.*

Der Bokhirsch *Hall. vierf. p. 319.*

Antilope Tragocamelus *Pallas miscell. p. 5.*

Antilope Tragocamelus *Pallas spicil. I p. 9.*

The Indostan Antelope *Penn. syn. quadr. p. 29 n. 20.*

Bockskameel *Mart. Naturlex. II p. 643.*

Der Kameelbock *Müll. Naturf. Suppl. p. 53.*

Altitudo circiter 5 pedum. Cornua 7 poll. longa, antice versa. Oculi pulchri nigri. Collam fere Cameli. In vertice iuba breuis. Palearia Tauri cum pilis longioribus. Cauda 22 poll. longa, pilis longioribus terminata. Crura gracilia. Corpus pilis breuibus, mollibus, supra cinereis, sub-

tus albis. Cauda corpori concolor. In fronte macula rhombea nigra.

Habitat in Bengala. Cameli more procumbit.

albipes. 10. A. cornibus in frontem reduncis, maculis albis supra vngulas.

The whitefooted Antelope *Penn. syn. quadr. p. 29 n. 21 tab. 6 fig. 1* feminae; *fig. 2* maris.

The Nyl-ghau *Hunter: Philos. transact. LXI p. 170 cum fig.* maris.

Altitudo vsque ad humeros quatuor pedum. Cornua breuia, paullulum antrorsum versa. Auriculae magnae, striis duabus nigris. Iuba brevis in collo dimidioque dorso nigra. Crista pilosa nigra in medio collo subtus, cum macula magna alba supra eam, aliaque in pectore inter crura antica. Macula alba in utroque pede antico supra vngulam, in posticis vtrinque duae. Cauda longa, pilis longis nigris. Color corporis obscure griseus: in femina magis fuscus. Huic cornua nulla, et pedes supra vngulas circumdati fasciis tribus nigris et duabus albis alternis.

Habitat in India. E vivis descriptionem et figuras dedit Pennatus, eodemque tempore Hunterus.

Dama. 11. A. cornibus in frontem reduncis, corpore supra fuluo, subtus albo.

Dama *Plin. hist. nat. VIII c. 53 (c. 79 Hard.) XI c. 37 (c. 45 Hard.)*.

Dama *Plinii et veterum Gesn. quadrup. p. 334*.

Dama *Aldrov. bisulc. p. 729 cum fig.* mala.

Dama veterum *Ionst. quadrup. p. 75 tab. 27 fig.* Aldrov.

Dama veterum *Rai. syn. quadr. p. 83*.

Le Nanguer ou Nanguer *Buff. hist. nat. XII p. 213*
tab. 34 fig. anim. tab. 32 fig. 3 cornu.

Antilope Dama *Pallas miscell. p. 5.*

Antilope Dama *Pallas spicil. I p. 8.*

The swift Antelope *Penn. syn. quadr. p. 30 n. 22.*

Nanguer *Aless. quadrup. IV tab. 162 fig. Buff.*

Damantilope oder Damhirschantilope *Mart. Naturlex.*
II p. 645.

Die africanische Gemse *Müll. Naturf. Suppl. p. 53.*

Nanguer, Nanguer *ad Senegal fluvium.*

Longitudo corporis fere quatuor pedum, altitudo 2 ped. 8 poll. Cornua teretia, octo pollices longa, apice reuerfa, in vtroque sexu. Corpus supra fuluum, subtus album; pectus macula alba: videtur autem variare color.

Dentes primores infra tantum seni, quorum duo medii latissimi, subobliqui, acie recta transuersa terminati; laterales parui lineares. *Pallas.*

Habitat ad Senegal. Animal celerrimum, facile mansuescens.

redunca. 12. A. cornibus in frontem reduncis, corpore toto rufo.

Le Nagor *Buff. hist. nat. XII p. 326 tab. 46.*

Antilope reuerfa *Pallas miscell. p. 5.*

Antilope redunca *Pallas spicil. I p. 8.*

The red Antelope *Penn. syn. quadr. p. 30 n. 23.*

Nagor *Aless. quadrup. III tab. 136 fig. Buff.*

Antilope mit vorwärts gebogenen Haken *Mart. Naturlex. II p. 672.*

Das Krummhorn *Müll. Naturf. Suppl. p. 53.*

Longitudo corporis 4 pedum, altitudo 2 ped. 3 poll.

Cornua $5\frac{1}{2}$ pollices longa, ad basin annulo vno

vel altero laeui. Auriculae 5 poll. longae. Corpus pallide rufum totum.

Habitat ad Senegal.

Idem animal est iudice perill. Buffonio:

Mazame, seu Ceruus cornutus, ex noua Hispania *Seb.*

tbef. I p. 69 tab. 42 fig. 3.

Der gehörnte Hirsch aus Neufpanien *Meyer Thiere III tab. 19 fig. Sebae.*

Tragulus Mazame *Klein. quadrup. p. 21.*

La chèvre de la nouvelle Espagne: Hircus (Capra nouae Hispaniae) cornibus teretibus, erectis, ab imo ad summum spiraliter intortis *Briff. regn. an. p. 72 n. 14.*

Das neufpanische Mazame oder röthliche Hirschgen *Hall. vierf. p. 320.*

Chevre de la nouvelle Espagne *Dictionn. anim. I p. 595.*

Sebam autem figuram suam mutuatum fuisse ex picturis capensibus, quas olim habuit Boerhaauus, hodie Io. Burmannus vir doctiss. eamque ad Antilopen Orygem potius pertinere Pallas monet.

Mazame Hernandezii aliud plane animal est Ceruini generis.

d) *Cornibus spiralibus.*

Strepsice- 13. A. cornibus spiralibus, facie nigricante V al-
ros. bo notata.

Strepsiceros *Gesn. quadrup. p. 323.*

Bos Strepsiceros *Aldrov. bisulc. p. 368 fig. p. 369 mala.*

Strepsiceros *Ionst. quadrup. p. 54.*

Capra Strepsiceros *Ionst. quadrup. tab. 24.*

Tragus Strepsiceros *Klein. quadrup. p. 18.* (Forte ad sequentem pertinet.)

Houtr. nat. hist. III tab. 26 fig. 1 bona; fig. 2 cornu.

Le Condoma *Buff. hist. nat. XII p. 301 tab. 39 fig. 1 cranii, fig. 2 cornu.*

Un Cerf du çap de bonne esperance *Colini: comm. palatin. I p. 487 cum fig. bon.*

Africanischer Cutu *Knorr. delic. II tab. K, 5 fig. 1 capitis, fig. 4 cornu, tab. K, 11 animalis.*

Antilope Strepsiceros *Pallas miscell. p. 9.*

Antilope Strepsiceros *Pallas spicil. I p. 17.*

The striped Antelope *Penn. syn. quadr. p. 31 n. 24.*

Das Africanische Koutou oder Kututhier *Müll. Naturf. I p. 429 tab. 26 fig. 1 bona; fig. 2 cornu.*

Antilope mit gewundenen Hörnern *Mart. Naturlex. II p. 677.*

Der Condoma *Müll. Naturf. Suppl. p. 55.*

Longitudo corporis 9 pedum, altitudo 4 ped. Cornua longitudine 3 ped. 9 poll. laevia, spiralia, lateribus compressa, cum ruga longitudinali pallide fusca, apicibus acutis 2 ped. $7\frac{1}{2}$ poll. distantibus a se inuicem. Corpus gracile e griseo rubens. Stria alba per dorsum vsque ad caudam, septemque aliae transuersae. Iuba brevis. Crista supra pectus. Pectus cum ventre griseum. Cauda longitudine duorum pedum, supra fusca, subtus alba, apice nigro. Facies nigricans, lineis duabus albis ab angulo oculi vtriusque ad nasum vsque. Crura gracilia. Genua antica nigra.

Habitat ad caput bonae spei.

Ceruica- 14. A. cornibus spiralibus annulatis, corpore supra- supra fusco, subtus albo.

Strepsiceros, quem Addacem Africa appellat *Plin. hist. nat. XI c. 37 (c. 45 Hard.)?*

Gazella

Gazella *Ionst. quadrup. tab. 29* fig. bon.

La Gazelle *Perr. anim. I p. 93 tab. 11* fig. bon.

Gazella africana *Rai. syn. quadr. p. 79*.

Capra cornibus teretibus dimidiato annulatis arcuatis
Linn. syst. nat. 2 p. 50.

Die afrikanische Gazelle *Meyer Thiere III tab. 33* fig.
Perr.

Capra cornibus teretibus dimidiato annulatis arcua-
tis Linn. syst. nat. 6 p. 14 n. 7.

Capra cornibus teretibus dimidiato arcuatis, annula-
tis. The Capra, with the horns cylindric, and
half way arched. Hill anim. p. 580.

La Gazelle: *Hircus (Gazella) cornibus teretibus, di-*
midiato-annulatis, bis arcuatis Briff. regn. an. p.
68 n. 8.

Die afrikanische Gazelle *Hall. vierf. p. 316 tab. 4*.

Capra (Cervicapra) cornibus teretibus dimidiato-
annulatis contortis Linn. syst. nat. 10, I p. 69
n. 8.

Bezoarbock: Geit met ronde Hoornen, die ter halver
langte geringd zyn en bogtig *Hourt nat. hist. III*
p. 206 tab. 24 fig. 2?

L'Antilope *Buff. hist. nat. XII p. 215 tab. 35* fig.
sceleti, tab. 36 fig. 1 cranii, *fig. 2* cornu.

Capra (Cervicapra) cornibus teretibus dimidiato-an-
nulatis flexuosis contortis Linn. syst. nat. 12, I p.
96 n. 8.

Antilope *Cervicapra Pallas miscell. p. 9*.

Antilope *Cervicapra Pallas spicil. I p. 18, 19 tab. 1*
fig. maris, tab. 2 feminae.

The common Antelope *Penn. syn. quadr. p. 32 n. 25*.

Der Hirschbock *Müll. Naturf. I p. 414 tab. 24*
fig. 2?

Der Bezoarbock *Marr. Naturlex. II p. 673*.

Die bengalische Antilope: *Antilope rupicapra Müll.*
Naturf. Suppl. p. 56.

Paullo minor Ceruo Dama. Corpus supra e rufo obscure fuscum, in colli lateribus et per humeros longitudinaliter fere nigrum, ceruice griseo - fulvescente. Caput nigricans. Orbitae albae. Os fuscum. Corpus subtus pedesque intus albi. Cauda brevis, supra nigra, subtus alba. Cornua nigra, erecta, spiralia, fere tota annulata, interdum vero laevia (*Buff. hist. nat. XII tab. 36 fig. 3*), longitudine circiter quatuordecim pollicum, apicibus 16 poll. ab inuicem distantibus. Femina e cornis, griseo - flavescentes, stria per dorsum latera utrinque albicante.

Habitat in Africa. Gravida 9 mens. unipara.

Varietas videtur:

The Lidmee *Shaw trav. p. 243?*

Antilope des Indes *Buff. hist. nat. XII. p. 217.*

The brown common Antelope. *Penn. syn. quadr. p. 32.*

Magnitudo Cerui Capreoli. Corpus supra obscure fuscum, subtus album. Macula nigra supra vngulas. Cauda supra nigra, subtus alba. Cornua Ceruicaprae.

Habitat in Bengala.

e) *Cornibus medio flexis.*

Dorcas. 15. A. cornibus teretibus annulatis medio flexis apicibus approximatis.

Δορκας Aelian. anim. XIV c. 14.

Algazel ex Aphrica *Hernand. Mexic. p. 893 cum fig. mediocr.*

Gazella Africana cornibus brevioribus, ab imo ad summum fere annulatis, et circa medium inflexis *Rai. syn. quadr. p. 80.*

Capra

Capra cornibus teretibus perfecte annulatis arcuatis
Linn. syst. nat. 2 p. 51.

Capra cornibus teretibus perfecte annulatis arcuatis
Linn. syst. nat. 6 p. 14 n. 9.

La Gazelle d'Afrique: Hircus (*Gazella africana*) cornibus teretibus, arcuatis, ab imo ad summum fere annulatis, apice tantummodo laeui *Briff. regn. an. p. 69 n. 10.*

Capra (*Dorcas*) cornibus teretibus perfecte annulatis contortis *Linn. syst. nat. 10, I p. 69 n. 9.*

Geit met ronde Hoornen, die byna tot boven toe gerind zyn en bogtig *Houtt. nat. hist. III p. 213 tab. 24 fig. 3.*

La Gazelle, la Gazelle commune *Buff. hist. nat. XII p. 201, 249 tab. 23 fig. animalis, tab. 31 fig. I cranii.*

Capra (*Dorcas*) cornibus teretibus perfecte annulatis recurvatis contortis *Linn. syst. nat. 12, I p. 96 n. 10.*

Lybische Ziege *Knorr delic. II tab. K, 5 fig. 3 cornu.*

Antilope *Gazella Pallas miscell. p. 7.*

Antilope *Dorcas Pallas spicil. I p. 11.*

The Barbary Antelope *Penn. syn. quadr. p. 33 n. 26 cum fig. capitis in titulo libri.*

Gazella Aleff. quadrup. II tab. 90 fig. Buff.

Die afrikanische Ziege *Müll. Naturf. I p. 416 tab. 24 fig. 3 Houtt.*

Die gemeine Gazelle *Mart. Naturlex. II p. 646.*

Die Gazelle *Müll. Naturf. Suppl. p. 54.*

Cervus Dama dimidio minor. Cornua pollices 12 longa, teretia, antrorsum versa apicibus, annulis circiter tredecim prope basin. Corpus supra rufum, subtus album, linea nigricante utrumque colorem separante in lateribus. Genua longius pilosa. Cauda supra nigra, subtus alba.

Habitat

Habitat in Barbaria, Aegypto, Oriente.

Kevella. 16. A. cornibus planis annulatis medio flexis apicibus approximatis.

Steinbock *Kolbe Vorgeb.* p. 166?

Le Kevel *Buff. hist. nat.* XII p. 204, 258 *tab.* 26
fig. animal. *tab.* 31 fig. 2 cranii.

Antilope Kevella *Pallas miscell.* p. 7.

Antilope Kevella *Pallas spicil.* I p. 12.

The flat-horned Antelope *Penn. syn. quadr.* p. 34
n. 27.

Afrikanische Antilope oder Kevella *Marr. Naturlex.*
II p. 649.

Das Plathorn *Müll. Naturf. Suppl.* p. 54.

Cornua antecedentis, at lateribus plana, annulisque pluribus 14-20 circumdata, nigra; feminae minor. Corpus magnitudine Capreoli minoris. Color supra rufo-fuscus, subtus albus. Fascia nigricans per latera. Auriculae striis tribus albis. Cauda nigra.

Habitat ad Senegal fluvium.

Antilopen Corinnam huius esse feminam Pallas habet *spicil.* I p. 12: Buffonius tamen utrumque describit sexum. Hic varietatem potius putat Dorcadis.

Pygargus. 17. A. cornibus medio flexis apicibus approximatis, facie alba.

Antilope Dorcas *Pallas miscell.* p. 6.

Antilope Pygargus *Pallas spicil.* I p. 10.

The white Antelope *Penn. syn. quadr.* p. 34 n. 28.

Der Weisarsch *Müll. Naturf. Suppl.* p. 54.

Cornua ut in Kevella et Dorcade, longitudine 14½ pöll.

Corpus maius Hirci. Auriculae longitudine septem

septem pollicum. Facies alba. Dorsum cinereum admixto rubro, in medio linea nigra. Latera et humeri e nigro fusci. Venter albus, supra linea nigricante terminatus. Cauda longitudine septem pollicum, nigra.

Hanc cum proxime sequente coniungit Pallasius, quod taxat Pennantus.

orientalis. 18. A. cornibus basi annulatis medio flexis, corpore rufescente.

Eine Art Hirsche, Ahu genannt Olear. *Reis. p. 449.*

Capra Ahu *Kaempf. amoen. exot. p. 403 fig. p. 407 n. 1.*

Dfheren *I. G. Gmelin Sibir. II p. 103.*

Caprea campestris gutturosa, cornibus nec ramosis, nec deciduis *I. G. Gmelin: Nov. comm. petrop. V p. 347 tab. 9 fig. mediocr.*

Besoarbok: Geit met ronde Hoornen, die ter halver langte geringd zyn en bogtig *Houtt. nat. hist. III p. 206 tab. 24 fig. 2?*

Le Tzeiran *Buff. hist. nat. XII p. 207 tab. 31 fig. 6* cornu (nisi forte ad A. leucophaeam pertineat).

Das Thier Ahu *S. G. Gmelin Reis. III p. 496?* (nisi forte Ceruus Pygargus sit.)

The Chinese Antelope *Penn. syn. quadr. p. 35 n. 29.*

Der Hirschbock *Müll. Naturf. I p. 414 tab. 24 fig. 2?*

Tzeiran *Mart. Naturlex. II p. 652.*

Джеренъ (Dfheren) (mas); Она (Ona) (femina)

Russis et Mongolis.

Ahu *Persis.*

Tzeiran *Turcis.*

Magnitudo Cerui Capreoli, eiusdemque coloris et morum. Cornua gracilia, medio paullulum curvata, ad basin annulata, versus apicem laevia nigerimaque;

rimaque; feminis exigua vel nulla. Larynx valde prominens extus in mare.

Habitat in Persia, regno Sinenfi reliquaue Asia trans Backal lacum, ad ripas fluuiorum, per quos facile natat. Caro esculenta.

scythica. 19. A. cornibus rectiusculis diaphanis, corpore albido.

Colos *Gesn. quadrup.* p. 893.

Suhak Scytharum *Aldrov. bisulc.* p. 763.

Andere Art wilder Schaaf: ein Straubschaaf *Gesn. Thierb.* p. 156 *cum fig.* mediocr.

Suhak Scytharum *Charlet. exerc.* p. 11.

Suhak animal Caprae filuestri simile *Rzacz. Polou.* p. 224.

Suhak Polonis, Akoim Turcis, Akkiik Tartaris *Rzacz. auct.* p. 320.

Saiga I. G. *Gmelin Sibir. I* p. 212.

Ibex imberbis I. G. *Gmelin: Nov. comm. petrop. V* p. 345.

Ibex imberbis *Nov. comm. petrop. VII summar.* p. 39 *tab. 19* fig. maris et feminae.

Das Ziegeneinhorn *Hall. vierf.* p. 322.

A species of deer *Bell trav. I* p. 41.

Le Saiga *Buff. hist. nat. XII* p. 198 *tab. 22* fig. 2 cornu.

Saiga *Bom. dictionn. IV* p. 71.

Capra (tatarica) cornibus teretibus rectiusculis perfecte annulatis apice diaphanis, gula imberbi *Linn. syst. nat. 12, I* p. 97 n. 11.

Wilde Ziegen die Saigi genannt werden *Ryzschk. Orenb. I* p. 231.

Antilope Saiga *Pallas miscell.* p. 6.

Antilope scythica *Pallas spicil. I* p. 9.

Capra Sayga *Forster: Philos. transact. LVII* p. 344.

Die Ziegen Saigaki genannt *S. G. Gmelin Reif. II p. 174 tab. 12.*

Capra Saiga *S. G. Gmelin: Nov. comm. petrop. XIV p. 512.*

The scythian Antilope *Penn. syn. quadr. p. 35 n. 30.*

Die wilde Steppenziege *Pallas Reif. I p. 211.*

Die tatarische Ziege *Müll. Naturf. I p. 417.*

Skytische Antilope *Marr. Naturlex. II p. 682.*

Der Tartar: Antilope scythica *Müll. Naturf. Suppl. p. 53.*

Маргачь (Margacz') (*mas*); Саига (Saiga) (*femina*) *Ruffis.*

Magnitudo Hirci et maior. Cornua longitudine pedis vnus, flaua, subdiaphana, medio paullulum cūruata, apicibus introrsum versis; laeuibus, reliqua parte annalis minus eleuatis. Caput ouillum. Auriculæ erectæ, latiusculæ, in mucronem obtusum desinentes. Nasus latus arcuatus, cum linea longitudinali eleuata. Nares tubulatae, magnae. Labium superius pendulum. Dentēs parum fixi, vt facile excutiantur. Corpus supra fordide album cum stria subfusca in dorso, subtus candidum. Cauda tenuis, longitudine trium pollicum. Mas lana caprina vestitus, odore forti, femina pilis mollioribus, ecornis.

Habitat in vastis desertis Tanain inter et Borysthenem vsque ad Astracan; etiam in Poloniae finitimis visa. Gregaria. Mirae pernicitatis animal. Vox ouis. Retro it dum edit. Mares defendunt feminas intra peripheriam circuli collectas, quam ipsi occupant, contra hostes. Iunior facile mansuecit. Caro editur ad Irtsch flanium vulgatissima. Parit vere vnum aut gemellos.

Corinna. 20. A. cornibus medio flexis, faciei lateribus linea alba.

Der gefchekzte africanifche Bok *Hall. vierf. p. 309.*

La corine *Buff. hift. nat. XII p. 205, 261 tab. 27*
fig. animalis, tab. 31 fig. 3, 4 cornu.

Bunter Bock *Knorr delic. II tab. K, I fig. I capitis.*

Antilope Corinna *Pallas miscell. p. 7.*

The spotted Antelope *Penn. fyn. quadr. p. 37 n. 31.*

Corina *Aleff. quadrup. IV tab. 161 fig. Buff.*

Minor Ceruo Capreolo. Faciei latera linea alba notata. Cornua gracilia, longitudine sexpollicum, rugofa, annulis minus eleuatis ad 60. Corpus supra rufum, subtus album, linea nigra vtrumque colorem diftinguente. Genua longius pilofa. Cauda nigra. Corpus interdum albo maculatum.

Effe Kevellae feminam *Pallas fpicil. I p. 12; varietatem vero Dorcadis Buffonius.*

Habitat ad Senegal fluuium.

Bunter Bock *Kolbe Vorgeb. p. 142* Ceruo maior est.

Cornua paullulum reclinata, infra annulata, supra glabra. Mentum barba infigni. Pedes infra genua nigro-fufci. Animal gregarium, ad caput bonae fpei; num huius generis?

Bubalis. 21. A. cornibus medio flexis fpiralibus, faciei linea nigra.

Bubalus *Plin. hift. nat. VIII c. 15 (c. 15 Hard.).*

Βουβαλος *Oppian. cyneg. II, 300.*

Bubalus *Gefn. quadrup. p. 330.*

Bubalus veterum *Aldrov. bifulc. p. 363.*

Bubalus *Aldrov. bifulc. p. 365 cum fig. mala.*

Bubalus veterum *Iouft. quadrup. p. 52.*

- La Vache de Barbarie *Perr. anim. II p. 24 tab. 39*
fig. bon.
- Bufelaphus Io. Cui apud Gesnerum seu Moschelaphus
Rai. syn. quadr. p. 81.
- The Bekker el Wafh *Shaw trav. p. 242?*
- Das Rindvieh aus der Barbarei *Hall. vierf. p. 277*
tab. 2.
- Le Bubale *Buff. hist. nat. XII p. 294 tab. 37* fig.
sceleti, *tab. 38 fig. 1, 2* cranii.
- Vache de Barbarie *Bom. dictionn. IV p. 497.*
- Antilope Bufelaphus *Pallas miscell. p. 7.*
- Antilope Bubalis *Pallas spicil. I p. 12.*
- The cervine Antelope *Penn. syn. quadr. p. 37 n. 32.*
- Afrikanische Kuhantilope *Mart. Naturlex. II p. 679.*
- Die Blafengazelle *Müll. Naturf. Suppl. p. 54.*

Magnitudo Cerui Elaphi. Corpus figura fere Cerui
Vaccaeque mixtum, robustius et formae minus
elegantis, quam in congeneribus. Caput magnum
bouinum. Cranium vertice inter aures alte promi-
nulum, vnde exoriuntur cornua. Cornua extrorsum
retrorsumque curuata, apicibus distantibus, spiralia
annulataque, fortia, nigra, longitudine viginti
pollicum. Oculi cornibus approximati. Labium
inferius nigrum, ad marginem vtrinque singulari
mystace seu fasciculo pilorum nigrorum notatum.
Rostrum antice fascia nigra, terminata ad fron-
tem, topho pilorum vorticoso ante cornua obsessam.
Cauda longitudine pedis vnus et ultra, atra, apice
floccosa. Color e griseo fuluescens, in capite et
collo magis ferrugineus, in dorso fuscidus, in clu-
nibus pedibusque pallidulus. Lineae nigricantes
per ceruicem vna, et per humeros antice longitu-
dinales. Litura triangularis nigricans ad flexu-
ram clunium.

Habitat in Barbaria. Animal mite.

Ceruum Temamaçane Sebae huc pertinere forte Pallas.

Koba. 22. A. cornibus medio flexis, macula genuum nigricante.

Le Koba *Buff. hist. nat. XII p. 210, 268 tab. 32 fig. 2* cornuum.

The Senegal Antelope *Penn. syn. quadr. p. 38 n. 33 fig. p. 39* capitis.

Die große braune Kuh von Senegal *Mart. Naturlex. II p. 678.*

La grande Vache brune *Gallis ad Senegal.*

Magnitudo Cerui. Cornua 17 poll. longa, lateribus plana, circa medium extrorsum, porro introrsum, dein rursus extrorsum flexa, apicibus distantibus ad 6 poll. annulis prominentibus 11 - 12, apicibus laevis acutissimis. Caput magnum 18 poll. longum, rostro elongato. Auriculae 7 poll. longae. Corpus supra rufo-fuscum, venter sordide albus. Genua macula nigricante notata. Ungulae parvae. Cauda longitudine pedis vnius, nigra, pilis longioribus.

Habitat ad Senegal.

Kob. 23. A. cornibus medio flexis basi annulatis, apicibus maxime approximatis.

Le Kob *Buff. hist. nat. XII p. 210, 267 tab. 32 fig. 1* cranii.

The Gambian Antelope *Penn. syn. quadr. p. 39 n. 34.*

Die kleine braune Kuh von Senegal *Mart. Naturlex. II p. 678.*

La petite Vache brune *Gallis ad Senegal.*

Magnitudo Cerui Damae. Cornua 13 poll. longa, apicibus et basibus valde approximata, medio longe distantia, annulis 8 - 9, apicibus laeuibus.

Habitat ad Senegal.

Varietatem A. orientalis putat Buffonius.

30. CERVVS.

Dentes Primores superiores nulli.
inferiores VIII.

Laniarii nulli (interdum solitarii superius).

Cornua solida, annua, tenera corio hirto tecta apiceque crescentia, denudata.

Pedes ungulati.

Mammae inguinales.

Camelo- I. C. cornibus simplicissimis, pedibus anticis
pardalis. longissimis.

Camelopardalis, ovis fera *Plin. hist. nat. VIII c. 18*
(c. 27 *Hard.*).

Καμηλοπάρδαλις *Oppian. cyneq. III, 461.*

Camelopardalis *Gesn. quadrup. p. 160 cum fig. mediocr.*

Gyrafia, quam Arabes Zurnapa, Graeci et Latini Camelopardalin nominant *Bellon. obs. p. 118 fig. p. 119 mala.*

Giraffes bestes rares et belles *Thevet cosmogr. I fol. 388 b fig. fol. 389 a mediocr.*

Camel-

CERVI pedibus anterioribus calcitrant; siluis delectantur. Cystide fellea carent.

- Camelopardalis quem Arabes Zurnap et nostri Giraf-
fam appellant *Alpin. Aeg. I p. 236 tab. 14 fig. 4*
mediocr.
- Grassa *Nieremb. hist. nat. p. 191.*
- Camelopardalis *Aldrov. bisulc. p. 927 fig. p. 931*
mediocr.
- Camelopardalis. *Ionst. quadrup. p. 98.*
- Camelo-pardus seu Girafra *Ionst. quadrup. tab. 39*
fig. mala.
- Camelo-pardalus *Ionst. quadrup. tab. 39 figg. bon.*
- Camelus Indicus, Indianiseh Camel, Ind. Kamelthier
Ionst. quadrup. tab. 40 figg. malae.
- Alius Camelus *Ionst. quadrup. tab. 40 fig. pessima.*
- Camelus Indicus versicolor *Ionst. quadrup. tab. 40 fig.*
pessima.
- Camelo-Pardalis *Ionst. quadrup. tab. 45 fig. mala.*
- Kamelpard *Gesn. Thierb. p. 236 fig. p. 237 mal.*
238 pessima.
- Camelopardalus *Charlet. exerc. p. 13.*
- Camelopardalis *Ludolf Aeth. I c. 10 n. 33 comm.*
p. 149.
- Camelopardalis *Rai. syn. quadr. p. 90.*
- La Giraffe *Lobo Abiss. I p. 292.*
- Cervus cornibus simplicissimis, pedibus anticis lon-
gissimis *Linn. syst. nat. 2 p. 49.*
- Cervus cornibus simplicissimis, pedibus anticis lon-
gissimis *Linn. syst. nat. 6 p. 13 n. 1.*
- Cervus Camelopardalis *Hasselquist: Act. vpsal. 1750*
p. 15.
- Tragus, bisulcorum mixtus. Giraffa *Klein. quadrup*
p. 22.
- Cervus cornibus simplicissimis, pedibus anticis lon-
gissimis. The Cervus; with the simple horns, and
the fore-legs very long: the Camelopardalis *Hill*
anim. p. 576 tab. 28 fig. mala.
- La Giraffe: Giraffa Camelopardalis *Briss. regn. an. p.*
61 n. 1.

La Giraffe extat in Mich. Baudier Histoire generale de
l'Asie de la cour du grand Seigneur. Paris. 1633. 82 pag. 175
vignette: cette fig. a été tirée après nature de celui qui
courri à une lieue de Constantinople avec les egyptiens du grand
Seigneur.

Ceruus Camelopardalis *Hasselqu. Palaeft. p. 282.*

Die Giraffe *Hall. vierf. p. 322.*

Ceruus (Camelopardalis) cornibus simplicissimis, pedibus anticis longissimis *Linn. syst. nat. 10, I p.*

66 n. 1.

Caméléopard *Dictionn. anim. I p. 386.*

Giraffe *Dictionn. anim. II p. 263.*

Kemel-Pardel: Hert met geheel enkele Hoornen, de Voorpooten by uitstek lang *Houtt. nat. hist. III p. 36.*

Cameleopard *Bom. dictionn. I p. 388.*

La Giraffe *Buff. hist. nat. XIII p. 1.*

Ceruus (Camelopardalis) cornibus simplicissimis, pedibus anticis longissimis *Linn. syst. nat. 12, I p. 92 n. 1.*

Die Giraffe oder das Kameel-Parder. *Berl. Samml. I p. 611 cum fig.*

The Camelopard *Penn. syn. quadr. p. 10 n. 12.*

Camello-Pardo *Aless. quadrup. IV tab. 199.*

Das Kameelparder *Müll. Naturf. I p. 379.*

دورق (Zuraphate) *Arabibus.*

Iirataka ein *Ambarice.*

Magnitudo Cameli mediocris: forma elegantissima.

Caput prominens, oblongum, lateribus parum compressum, antice conuexum, fronte protuberans. Labium superius crassum, inferius tenuius. Nares oblongae, amplae, remotae, in apice labii superioris. Pili rigidi, longiusculi, sparsi in utroque labio, anterie et ad latera. Supercilia rigida, distinctissima, serie vna pilorum composita. Oculi laterales, vertici quam rostro, ut et fronti quam collo, propiores. Cornua in utroque sexu, at feminae minora, in vertice capitis sita, parum remota, simplicissima, breuissima, cylindrica, basi crassiora, versus apicem tenuiora, pilosa, basi pilis breuissi-

breuissimis rigidis tecta, apice pilis longioribus, erectis, rigidissimis, apicem superantibus, cincta. Apex cornuum intra hos pilos, obtusus, nudus. Eminentia in fronte, infra cornua, inferius oblonga, humilior, superius eleuatur, subrotunda, postice parum depressa, dura, superficie aequalis. Auriculae ad latera capitis, pone cornua, illis paullo inferius positae, oblongae, haud magnae. Collum erectum, compressum, longissimum, versus caput angustissimum, basi latiusculum. Dorsum subconuexum. Latera fere aequalia, conuexa, vix protuberantia. Linea pilorum rigidorum, longiorum, erectorum, per dorsi cacumen integrum et per collum vsque ad caput extensa. Crura cylindrica: anteriora posterioribus plus quam dimidio longiora, vt antice 17 ped. postice 9. ped. altus fit. Tuberculum crassum, durum in flexura genu. Ungues bifurci, unguati. Cauda teres, lumborum dimidia longitudine, non iubata. Pili corporis breuissimi, rigidi, decumbentes. Color totius animalis ex maculis fuscis et ferrugineis variegatus: maculae palmari latitudine, figura irregulari, in viuo animali ex lucidiore et obscuriore variantes.

Habitat in regione Sennar inter Aegyptum superiorem et Aethiopiam, in Aethiopia et Abissinia; in siluis frondosis, rarior. Mitis, timidus, celerimus, vt raro visus a zoologis. Pronus cubat more Cameli; gramen depascitur diuaticatis pedibus anticis: sed arborum imprimis vescitur foliis.

Animal obscurum, Brissonio et Pennanto proprium genus efficiens. Ego etiamnum inter Ceruos pono, donec magis innotescat ipsum animal, praecipue vero cornuum natura.

- Alces. 2. *C. cornibus acaulibus palmatis.*
 Alces *Caes. bell. gall. VI c. 27.*
 Alce *Plin. hist. nat. VIII c. 15 (c. 16 Hard.).*
 Achlis *Plin. hist. nat. VIII c. 15 (c. 16 Hard.).*
 Alces *Gesn. quadr. p. 1 cum fig. mediocri; fig. cornu*
p. 2.
 Alce *Schwenckf. theriorr. p. 53.*
 A certain beast, that the Natiues call a *Mosse Purch.*
Pilgr. IV p. 1829.
Mosse Laet Amer. p. 68.
 Alce *Aldrov. bisulc. p. 866 fig. maris p. 869; femi-*
nae p. 870 pessimae.
 Alces *Ionst. quadrup. p. 92 tab. 30 fig. fem. mediocris.*
 Alce. *Elendgeschlecht Ionst. quadrup. tab. 30 fig.*
fem. pessima.
 Alce *Mas Ionst. quadrup. tab. 31 fig. mediocr.*
 Alce. *Elend Ionst. quadrup. tab. 31 fig. maris pes-*
sima.
 Alce *Mus. Wormian. p. 336.*
 Elend *Gesn. Thierb. p. 84 figg. maris p. 84, 86 su-*
perior, 88 pessimae; p. 86 inferior mediocris;
fig. feminae p. 85, 87 superior mediocr.
 L'Elant *Perr. anim. I p. 178 tab. 25 fig. feminae.*
 Alces *Scheff. Lapp. p. 336.*
 Alces *Charlet. exerc. p. 12.*
 The Mose-Deer in America *Dudley: Philos. trans-*
act. num. 368 p. 165.
 The Mose-Deer of New-England *Dale: Philos.*
transact. num. 444 p. 384 cum fig. corn.
 Alce *Rai. syn. quadr. p. 86.*
 Alce *Heinsf. monogr.*
 The Elk *Lawson Carol. p. 123.*
 L'Original ou l'Elan *Dicrev. Acad. p. 122.*
 Alce seu Alces *Rzac. Polon. p. 212 auct. p. 304.*
 Alce maxima americana nigra, the Moose or Elk
Citesb. Carol. app. p. XXVII.
 The Elk *Brick. North-Carol. p. 108 cum fig. mal.*

Cervus

Alce canadensis. Jo Fr Miller page. 11. tab. 4.

Cervus cornibus acaulibus palmatis Linn. *syst. nat.* 2
p. 50.

Original *Charlev. nouv. Fr.* III p. 126.

Cervus cornibus acaulibus palmatis Linn. *fn. succ.* I
p. 13 n. 37.

Cervus cornibus acaulibus palmatis Linn. *syst. nat.* 6
p. 13 n. 2.

Cervus Palmatus Alce; vera et legitima Klein. *quadrup.* p. 24.

Cervus cornibus acaulibus palmatis. The Cervus, with the horns palmated, and without a stem: the Elk Hill *anim.* p. 577 tab. 28 fig. mediocris maris.

Elendsthier Kalm *Amer.* III p. 582.

L'Elan: *Cervus* (Alces) *cornibus ab imo ad summum palmatis* Briff. *regn. an.* p. 93 n. 9.

Das Elendthier, Elendkuh Hall. *vierf.* p. 338 tab. 8.

Elende, Elendthiere Müll. *Samml.* III p. 552.

Cervus (Alces) *cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturali* Linn. *syst. nat.* 10, I p. 66 n. 2.

Alce *Dictionn. anim.* I p. 88.

Elan *Dictionn. anim.* II p. 82.

Mose *Dictionn. anim.* III p. 126.

Eland: Hert met Hoornen, die van den Wortel af breed en plat zyn; en aan de Keel een Kwab hebbende *Houtt. nat. hist.* III p. 40.

Cervus (Alces) *cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturali* Linn. *fn. succ.* 2 p. 13 n. 39.

Elk *Bell trav.* I p. 5, 221.

L'Elan *Buff. hist. nat.* XII p. 79 tab. 7 fig. maris, tab. 8, 9 fig. cornuum.

Elan ou Ellend *Bom. dictionn.* II p. 84.

Mose ou Moos *Bom. dictionn.* III p. 126.

Cervus (Alces) *cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturali* Linn. *syst. nat.* 12, I p. 92 n. 2.

The Elk Penn. *syn. quadr.* p. 40 n. 35 tab. 7 fig. I feminae americanae, fig. 2 cornuum.

Alce.

Stralsundt Magazin 163. v. 11. St. p. 384. 57

Alce *Aleff. quadrup. III tab. 130 fig. Buff.*

Das Elendthier *Müll. Naturf. I p. 381.*

Cervus (Alces) cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturali *Müll. Dan. prodr. p. 5 n. 34.*

Alce *Italica et Hispanica.*

Elän *Gallis.*

Original *Gallis in America.*

Elend, Elendthier *Germanica, Elk obsoleto.*

Eland *Belgica.*

Elk *Anglica.*

Moose-deer, black Moose-deer *Anglica in America.*

Elsdiur *Danica.*

Elg, Els dyr, Ellgur *Noruegica.*

Ælg *Suecica.*

Los *Polonica.*

Лось (Los) *Russica.*

Сохатъ (Sochat) *in Sibiria.*

Took *Tungusica.*

Bogu *Burütica.*

Bulän *Tatarica et Tschuwassica.*

Schórda *Tscheremissica.*

Puschè *Wotiacica.*

Sjärda *Morduanica.*

Löf, Iöra *Sirjünica.*

Magnitudo Equi. Cornua ingentia, ponderosa, feminae nulla. Oculi parvi. Auriculæ elongatae, asininae. Nares magnae. Labia magna, crassa. Collum breue, cum iuba dorsali, supra humeros erectiuscula, nigra. Caruncula sub gula, magnitudine pollicis, tecta barba nigra (aliis in femina saltim non visa). Cauda breuissima, supra nigricans, subtus alba. Ungulae magnae. Ungulae succenturiatae ad palmas diuaticatae, ad plantas parallelae, retrospectantes. Corpus pilis longioribus canescens, versus faciem magis griseum.

Habitat

Habitat in borealibus Europae, Asiae, Americae;
amat Populeta.

Vngula ferit; 50 miliaria de die percurrit, vngulis
crepitantibus. Corium globum plumbeum fere
eludit. Mitis excepto oestri tempore. Caro bona.

Elaphus. 3. C. cornibus ramosis totis teretibus recurvatis.

Ελαφος *Arist. hist. anim. II c. 7 n. 37. c. 18 n. 130.*

VI c. 29 n. 366-382. IX c. 6 n. 79-89.

Ceruus *Plin. hist. nat. VIII c. 32 (c. 50 Hard.).*

Ελαφος *Aelian. anim. VI c. 11, 13. VII c. 39. XII
c. 18.*

Ελαφος *Oppian. cyneg. II, 176.*

Ceruus *Gesn. quadrup. p. 354 cum fig. mediocr.*

Ceruus *Schwenckf. theriotr. p. 81.*

Ceruus *Agricola monogr.*

Ceruus *Aldrov. bisulc. p. 769 fig. p. 774 mar. et
fem. bon.*

Ceruus *Ionst. quadrup. p. 82 tab. 35 fig. maris mala.*

Cerua *Hinde Ionst. quadrup. tab. 32 fig. mala.*

Ceruus *Musf. worm. p. 338.*

Ceruus *Graba monogr.*

Hirsch *Gesn. Thierb. p. 189 cum fig. mediocr.*

Cerui *Scheff. Lapp. p. 337.*

Ceruus *Charlet. exerc. p. 11.*

Ceruus *Wagn. Heluet. p. 173.*

Ceruus *Sibb. Scot. anim. p. 9.*

Ceruus *Rai. syn. quadr. p. 84.*

Ceruus *Rzacz. Polon. p. 216 auct. p. 308.*

A Species of the Deer-Kind *Shaw trav. p. 243.*

Ceruus cornibus ramosis teretibus incurvatis *Linn.
syst. nat. 2 p. 50.*

Der edle Hirsch *Riding. jagdb. Th. tab. 4.*

Ein Wild oder Thier *Riding. jagdb. Th. tab. 5.*

Ceruus cornibus ramosis teretibus incurvatis *Linn. fn.
suec. I p. 13 n. 38.*

Der Hirsch *Meyer Thiere I tab. 22.*

Cervus cornibus ramosis teretibus incurvatis Linn. syst. nat. 6 p. 13 n. 3.

Cervus nobilis Klein. quadrup. p. 23.

Cervus cornibus ramosis, teretibus, incurvis. The Cervus, with ramose, cylindric and crooked horns: the Stag Hill anim. p. 577 tab. 28 fig. bon.

Cervus (vulgaris) cornibus ramosis teretibus incurvis. Linn. mus. Ad. Frid. I p. 11.

Le Cerf *Buff. hist. nat. VI p. 63 tab. 9 fig. maris.*

La Biche *Buff. hist. nat. VI tab. 10.*

Le Faon du Cerf *Buff. hist. nat. VI tab. 12.*

Le Cerf: *Cervus (.) cornibus teretibus ad latera incurvis Briss. regn. an. p. 86 n. 1.*

Cervus cornibus ramosis teretibus incurvis Kram. Austr. p. 319.

Der Hirsch *Hall. vierf. p. 326.*

Cervus (Elaphus) cornibus ramosis teretibus incurvis Linn. syst. nat. 10, I p. 67 n. 3.

Hirsche *Müll. Samml. III p. 553.*

Cerf *Dictionn. anim. I p. 464.*

Hert met rolronde getakte Hoornen, die niet krom staan *Houtt. nat. hist. III p. 59.*

Cervus (Elaphus) cornibus ramosis teretibus recurvatis Linn. fn. suec. 2 p. 13 n. 40.

The Stag or Red Deer *Penn. brit. zool. p. 15.*

Adel-Hiorte *Pontopp. Dan. I p. 604.*

Cerf *Bom. dictionn. I p. 458.*

Cervus (Elaphus) cornibus ramosis totis teretibus recurvatis Linn. syst. nat. 12, I p. 93 n. 3.

The Stag *Penn. syn. quadr. p. 49 n. 38.*

Cervo Aless. quadrup. I tab. 38. fig. Buff.

Cerva Aless. quadrup. I tab. 39 fig. Buff.

Cerviatto Aless. quadrup. I tab. 41 fig. Buff.

Der Hirsch *Mart. Buff. vierf. III p. 23 tab. 41.*

Die Hirschkuh *Mart. Buff. vierf. III tab. 43.*

Das Hirschkalb *Mart. Buff. vierf. III tab. 44.*

Der Hirsch *Müll. Naturf. I p. 389.*

Cereus (Elephus) cornibus ramosis, totis teretibus recurvatis *Müll. Dan. prodr. p. 5 n. 35.*

Cervio (mas); Cervia (femina) *Italica.*

Ciervo (mas); Cierva (femina) *Hispanica.*

Cervo (mas); Cerva (femina) *Lusitana.*

Cerf (mas); Biche (femina); Faon (pullus); Daguët (subulo) *Gallia.*

Carw (mas); Ewig (femina); Elain (pullus) *Cambrensis.*

Hirsch (mas); Hinde, Hindinn, Wild, Thier (femina); Hirschkalb, Schmalthier (pullus); Spießler (subulo); Gabelhirsch (furcarius) *Germanica.*

Hert (mas); Hinde (femina) *Belgica.*

Hart, Red Deer (tota species); Stag (mas); Hind (femina); Pricket (subulo) *Anglica.*

Hiort, Kronhiort, Adelhiort *Danica.*

Röd-Dyr (mas); Dyrkolle (femina) *Noruegica.*

Hiort, Kronhiort (mas); Hint (femina) *Suecica.*

Ielen *Polonica.*

Исубр (Isubr) *in Irkutsk et ad fines regni sinensis,*

Мараль (Maral') *ad Irriſch fluvium, (mas).* Лань (Lan') (femina) Олень пряморогои (Olen' prāmorogoi) (subulo) *Ruffica.*

Kunaka *Tungusica.*

Gohu *Burätica.*

Corpus $3\frac{1}{2}$ ped. altum. Pulchrum animal. Color rufo-fuscus, subniger in facie et in dorso, in ventre albescens, raro totus albus. Caput oblongum. Oculi et auriculae maiusculae. Fossa lacrymalis ante oculos. Collum longum, gracile. Cauda brevis. Crura gracilia. Iuniores albo maculati. Femina eornis, raro cornuta. Castrato cornua non decidunt, neque recreſcunt, ſi antea deiecta fuerint. Cornuum rami numero quotannis augentur: Rami teretes, acuminati, antroſum verſi.

Habitat

Habitat in Europa, Africa boreali? Asia boreali, nec non in America boreali. Gregarius mare duce. Mitis, oestro furit mense Augusto et Septembri, maribus inter se ob feminam pugnantibus vehementer. Cornua amittit fine Februarii et Martio mense, crescunt Iulio. Amat fistulam. Grauida mens. 8 parit vnicum, rarius gemellos. Ceruina senectus fabulosa; aetas triginta annorum. Bene natat.

Hippelaphus.

α) *Varietas* maior, pilis in collo longioribus, quasi iubata; senior:

Ἴππελαφος *Arist. hist. anim. II c. 5 n. 23.*

Τραγελαφος *Plin. hist. nat. VIII c. 33 (c. 50 Hard.).*

Tragelaphus *Gesn. quadrup. p. 1101 cum fig.*

Hippelaphus mas, Rosshirsch *Ionst. quadrup. tab. 35.*

Brandhirsch *Gesn. Thierb. p. 199 cum fig. mala.*

Ein Pferdhirsch *Gesn. Thierb. p. 210 cum fig. mediocr.*

Tragelaphus *Charlet. exerc. p. 12.*

Le Cerf d'Allemagne: Cervus (germanicus) cornibus teretibus, ad latera incuruis, collo infra iubato
Briss. regn. an. p. 87 n. 2.

Hippelaphe *Dictionn. anim. II p. 447.*

Deutsch en Borgondisch Hert *Houtt. nat. hist. III p. 85.*

Tragelaphe *Bom. dictionn. IV p. 439.*

Edler Hirsch mit 66 Enden *Marr. Buff. vierf. III tab. 42.*

Derf d'Ardenne *Gallis.*

Brandhirsch *Germanis.*

Ad hunc accedit der Berghirsch, Gebirghirsch *Germanorum.*

Corficanus. β) *Varietas* corficana, vulgari dimidio minor, fusca.
Le Cerf de Corse *Buff. hist. nat. VI p. 95 tab. 11.*

- Klein Hert van Corfica *Houtt. nat. hist. III p. 85 tab. 22 fig. 2.*
 Cervo di Corfica *Aless. quadrup. I tab. 40 fig. Buff.*
 Der kleine Corficanische Hirsch *Müll. Naturf. I p. 394 tab. 22 fig. 2 Houtt.*
 Der Corficanische Hirsch *Mart. Buff. vierf. III p. 80 tab. 45.*

Canadensis. γ) *Varietas canadensis, cornibus amplissimis.*

Le Cerf de Canada *Perr. anim. II p. 65 tab. 45 fig. bon.*

A Sort of Stag in Virginia *Dale: Philos. transact. num. 444 p. 384.*

The Stag of Carolina *Lawson. Carol. p. 123.*

The Stag of America *Catesb. Carol. app. p. XXVIII.*

The Stag *Brick. North-Carol. p. 109.*

Le Cerf de Canada: *Ceruus (canadensis) cornibus teretibus ab imo ad summum cute pilosa tectis*
Briss. regn. an. p. 88 n. 3.

Ceruus cornibus ramosis teretibus incurvis: the red Deer
Brown Lam. p. 488.

Hert van Kanada *Houtt. nat. hist. III p. 83 tab. 22 fig. 1.*

Hirsch von Canada *Müll. Naturf. I p. 393 tab. 22 fig. 1 Houtt.*

Grey Moose *Anglis in America.*

Moschelaphus Wagn. Helvet. p. 188 hybridus ex Ceruo et Vacca.

Tarandus. 4. C. cornibus ramosis recurvatis teretibus: summitatibus palmatis.

Tarandus Plin. hist. nat. VIII c. 34 (c. 52 Hard.)?

Ταράνδος Aelian. anim. II c. 16?

Rangifer Gesn. quadrup. p. 950 cum fig. mala.

Tarandus Alarov. bisulc. p. 859 fig. p. 861 mediocr.

- Rangifer *Aldrov. bisulc. p. 863 cum fig. pessima.*
 Tarandus *Ionst. quadrup. p. 90.*
 Ceruus mirabilis *Ionst. quadrup. tab. 36 fig. mala.*
 Rangifer; Reinhier *Ionst. quadrup. tab. 37 fig. pessima.*
 Ceruus palmatus *Ionst. quadrup. tab. 37 fig. mala.*
 Tarandus Tarandthier Reinhiersgeschlecht *Ionst. quadrup. tab. 37 fig. pessima.*
 Rangifer *Mus. worm. p. 337.*
 Reinhier. *Gesn. Thierb. p. 206 figg. p. 206, 207, 208 malae.*
 Tarandthier *Ges. Thierb. p. 209 cum fig. mala.*
 Eine seltzame Art Hirsch *Gesn. Thierb. p. 210 cum fig. mediocr.*
 Tarandus *Scheff. Lapon. p. 321 fig. p. 327 mediocr.*
 Rangiferi siluestres *Scheff. Lapon. p. 338.*
 Hirsch den man Rehe nennt *Marz. Spitzb. p. 7² tab. O fig. a mala.*
 Tarandus *Charlet. exerc. p. 12.*
 Rangifer *Charlet. exerc. p. 12.*
 Ceruus Rangifer *Rai. syn. quadrup. p. 88.*
 Caprea Groenlandica *Rai syn. quadr. p. 90.*
 Rangifer *Hulden monogr.*
 Rendieren *Bruin Reiz. I p. 9.*
 Renschiéron *Rzac. auct. p. 318.*
 Les Rénes *Egede Groenl. p. 43.*
 The Greenland Deer *Catesb. Carol. app. p. XXVIII.*
 Ceruus cornibus ramosis teretibus: summitatibus palmatis *Linn. syst. nat. 2 p. 50.*
 Le Renne *Mauperr. oeuvr. III p. 197.*
 The Greenland Buck *Edw. birds I tab. 51.*
 Le Caribou *Charlev. nouv. Fr. III p. 129.*
 Cariboux *Dobbs Hudf. p. 20, 22.*
 Ceruus cornibus ramosis teretibus: summitatibus palmatis *Linn. fn. suec. I p. 14 n. 39.*
 Rennthiere *Höchst. Lapp. p. 107.*

- Cervus cornibus ramosis teretibus: summitatibus palmatis *Linn. syst. nat. 6 p. 13 n. 4.*
- Cervus Rangifer. Rennthier *Klein. quadrup. p. 23 tab. I fig. capitis mala.*
- Cervus cornubus ramosis teretibus, summitatibus palmatis. The Stag, with the horns ramose and cylindrical; and their ends palmated: the Reindeer *Hill anim. p. 578.*
- Cervus (Rangifer) cornibus ramosis teretibus: summitatibus palmatis *Linn. mus. Ad. Frid. I p. 11.*
- Cervus Tarandus *Linn. amoen. acad. IV p. 144 tab. I.*
- Le Cerf de Groenland: Cervus (groenlandicus) cornibus teretibus, ab imo ad summum cute pilosa testis, naso piloso *Briss. regn. an. p. 88 n. 4.*
- Le Karibou: Cervus cornibus rectis, ad basin ramovnico antrorsum verso *Briss. regn. an. p. 91 n. 6.*
- Le Rhenne: Cervus (Rangifer) cornuum summitatibus omnibus palmatis *Briss. regn. an. p. 92 n. 8.*
- Cervus cornibus ramosis teretibus: summitatibus palmatis *Kram. Austr. p. 319.*
- Das Rennthier *Hall. vierf. p. 343.*
- Cervus (Tarandus) cornibus ramosis teretibus: summitatibus palmatis *Linn. syst. nat. 10, I p. 67 n. 4.*
- Rennthiere *Müll. Samml. III p. 553.*
- Caribou *Dictionn. anim. I p. 434.*
- Rhenne *Dictionn. anim. III p. 687.*
- Groenlandisch Hert *Houtt. nat. hist. III p. 86 tab. 22 fig. 3 mala.*
- Rendier: Hert met ronde takkige Hoornen, aan de top-enden plat *Houtt. nat. hist. III 96 tab. 23 fig. bon.*
- Cervus (Tarandus) cornibus ramosis teretibus: summitatibus palmatis *Linn. fn. succ. 2 p. 14 n. 41.*
- Le Renne *Buff. hist. nat. XII p. 79 tab. 10, 11 figg. cornuum, tab. 12 sceleti.*
- Caribou *Bom. dictionn. I p. 427.*

V 2

Rhenne

Frankfurt. Magaz. 1781, 5tes St. p. 294. c. ii. touc.

Köllin in Schriften der Berlin. Gesellschaft. nat. u. med. vol. 1. 1780. p. 107

empis naturkundige Verhandlungen. Amst. 1782. 4. pag. 193 - 200

Confetti's tour through Sweden & Land. 1789. 4. tab. III. p. 67.

Rhenne ou Renne, Rhantier, ou Ranglier, ou Ram-
fier *Bom. dictionn. IV p. 1.*

Rennthier *Cranz Groenl. I p. 95.*

Cervus (Tarandus) cornibus ramosis recurvatis tere-
tibus: summitatibus palmatis *Linn. syst. nat. 12,*

I p. 93 n. 4.

The Rein *Penn. syn. quadr. p. 46 n. 36 tab. 8 fig. 1.*

Tarando *Aless. quadrup. IV tab. 200.*

Der Groenländische Hirsch *Müll. Naturf. I p. 394*
tab. 22 fig. 3 Hoult.

Das Rennthier *Müll. Naturf. I p. 394 tab. 23 fig.*
Hoult.

Rennthier *Stell. Kamtsch. p. 113.*

Cervus (Tarandus) cornibus ramosis recurvatis tere-
tibus: summitatibus palmatis *Müll. Dan. prodr.*

p. 5 n. 36.

Renne *Gallis.*

Rennthier *Germanis.*

Ren, Rens-Dyr, Hrein-Dyr, Graa-Dyr, Halsbuk
Noruegis.

Rhen *Suecis.*

Godde *Lapponibus danicis.*

Voetsi Lapponibus suecicis. v. Eric. Lindahl & So. Ö.

Lexicon Lapponic. Holm. 1780.

Олень (Olen') (*mas*); Оленьца (Olenitza) (*femina*)

Ruffis.

Sagau *Tungusis et Burütis.*

Pfchi *Tataris.*

Pütsche *Tscheremissis.*

Bulàn *Tschuwafschis.*

Puschè *Woriakis.*

Olèn *Morduanis.*

Kür *permice.*

Kör *srjänice.*

Tukto *Groenlandis.*

Caribu *in America septentrionali.*

Altitudo domestici 3 ped. longitudo 4 ped. at feri multo maiores, magnitudine bouis biennis. Corpus pilis densissimis fuscis, aestate sensim canescentibus, tandem fere albis; subtus album. Oculorum regio semper nigricans. Collum subtus pilis longioribus. Os albicat, vt et cauda cum ani regione et perinaeo. Pedes cincti annulo albo ad vngulas. Cornua $2\frac{1}{2}$ ped. longa, teretia, summitatibus compressis palmatisque. Ramus vnus vel alter frontalis ex basi fere cornu, longitudine capitis. Femina cornibus minoribus, tenuioribus, minus ramosis. Nares oblique oblongae. Vngulae magnae crepitantes. Cauda breuis. Praeputium propendens, cylindricum. Mammae quatuor cum duabus spuris.

Habitat in borealibus Europae, Asiae vsque in Kamtschatkam, Americae. In Lapponia per aestatem alpes incolit, per hiemem deserta plana. Cultus in Lapponia, non in Kamtschatka, pro lacte, carne, pelle, cet. et vt rhedam trahat.

Edit imprimis Lichenem rangiferinum, quem sub niue sepultum odore detegit. Parit in Lapponia medio Maii saepe gemellos; prurit circa finem Septembris mensis, grauida in 33 hebdomades. Mas cornua amittit mox a pruritu, fine Nouembris, femina ad initium. Haec retinet cornua vsque dum pariat; non foecundata amittit ea hieme. Castratus raro cornua amittit ante nouum annum. Aetas (domestici) 14-16 annorum. Vtilissimus Lapponi. Caro bona.

Dama. 5. C. cornibus ramosis recuruatis compressis: summitate palmata.

Platyceros *Plin. hist. nat. XI c. 37 (c. 45 Hard.)*.

Ἐλαφος εὐρυκέρας *Oppian. cyneg. II, 293.*

τοκεος *Oppian. cyneg. II, 296.*

Dama vulgaris siue recentiorum *Gesn. quadrup. p. 335 fig. p. 1100* mediocr.

Platogni *Bellon. obs. p. 57.*

Dama vulgaris *Schwenckf. theriotr. p. 87.*

Dama vulgaris *Aldrov. bisulc. p. 741 cum fig. mala.*

Dama vulgaris *Ionst. quadrup. p. 77.*

Dama - Cereus Damhirsch *Ionst. quadrup. tab. 31 fig. mala.*

Gemeiner Damhirsch *Gesn. Thierb. p. 202 fig. p. 203 mala.*

La Biche de Sardaigne *Perr. anim. II p. 65 tab. 45?*

Cereus Platyceros *Rai. syn. quadr. p. 85.*

Dama *Rzac. Polon. p. 217 auct. p. 308.*

Cereus cornibus ramosis compressis: summitatibus palmatis *Linn. syst. nat. 2 p. 50.*

A fallow Deer *Moor. trav. p. 205?*

Der Damhirsch *Riding. jagdb. Th. tab. 7 fig. bona.*

Cereus cornibus ramosis compressis: summitate palmata *Linn. fn. suec. I p. 14 n. 40.*

Der Tannhirsch mit kleinen Flecken *Meyer Thiere II tab. 71 fig. bona.*

Das Thier vom Tannhirschen *Meyer Thiere II tab. 72 fig. bona.*

Cereus cornibus ramosis compressis: summitatibus palmatis *Linn. syst. nat. 6 p. 13 n. 5.*

Cereus Palmarus. Dama. Dama - Cereus *Klein. quadrup. p. 25.*

Cereus cornibus ramosis compressis, summitatibus palmatis. The Cereus, with ramose, compressed horns, palmated at the top: the Fallow Deer *Hill anim. p. 578.*

Le Dain *Buff. hist. nat. VI p. 167 tab. 27.*

La Daine *Buff. hist. nat. VI tab. 28.*

Le Dain: Cereus (Dama vulgaris) cornuum vnica et altiore summitate palmata *Briss. regn. an. p. 91 n. 7.*

Cervus cornibus ramosis compressis: summitatibus palmatis *Kram. Austr. p. 319.*

Der Dammhirsch *Hall. vierf. p. 342.*

Cervus (Dama) cornibus ramosis compressis: summitatibus palmatis *Linn. syst. nat. 10, I p. 67 n. 5.*

Daim *Dictioun. anim. II p. 4.*

Damhert of Dein: Hert met platagtige takkige Hoorrien, die aan 't end breed uitloopen *Houtt. nat. hist. III p. 126 tab. 22 fig. 4.*

Cervus (Dama) cornibus ramosis compressis: summitate palmata *Linn. fn. suec. 2 p. 14 n. 42.*

The Buck *Penn. brit. zool. p. 15.*

Daim *Bow. dictioun. II p. 1.*

Cervus (Dama) cornibus ramosis recurvatis compressis: summitate palmata *Linn. syst. nat. 12, I p. 93 n. 5.*

The Fallow Deer *Penn. syn. quadr. p. 48 n. 37.*

Daino *Aless. quadrup. I tab. 43 fig. Buff.*

Damma *Aless. quadrup. I tab. 44 fig. Buff.*

Der Damhirsch *Müll. Naturf. I p. 399 tab. 22 fig. 4 Buff.*

Der Damhirsch *Mart. Buff. vierf. III p. 110 tab. 46.*

Weibchen des Damhirsches *Mart. Buff. vierf. III tab. 47.*

Cervus (Dama) cornibus ramosis recurvatis compressis: summitate palmata *Müll. Dan. prodr. p. 6 n. 37.*

Daino (*mas*); Damma (*femina*) *Italis.*

Gamo (*mas*); Corza (*femina*); Venadito (*pullus*) *Hispanis.*

Corza (*femina*); Veado (*pullus*) *Lusitanis.*

Daim, Dain (*mas*); Dairie (*femina*) *Gallis.*

Hydd (*mas*); Hyddes (*femina*); Elain (*pullus*) *Cambrensibus.*

Damhirsch, Tammhirsch, Tannbock (*mas*); Tannwildpret, Tangeis (*femina*) *Germanis.*

Dend *Austriacis.*

Dëin, Damhert *Belgis.*

Buck (*mas*); Fallow-Deer, Doe (*femina*) *Anglis.*

Damhiort, Daa-Dyr *Danis.*

Dof, Dofhiort *Suecis.*

Daniel *Polonis.*

Серна (*Serna*) *Ruffis.*

Minor Elapho. Cornua summitate palmata. Color rufus, fuscus, albo maculatus, totus albus. Femina ecornis.

Habitat in Europa, rarior Elapho. Abundat in variis Angliae. Forte quoque est in Africa. In Hispania magnitudine fere Elaphum aequat. Facile mansuescit. Gregarius. Grauida 8 mens. parit unicum, rarius duo, vix tres. Aetas viginti annorum. Caro proba.

Differtne vere *americanus* uti Pennanto videtur? Altior est, cruribus longioribus, colore magis cinereo, cornibus parum palmatis, cauda longiore:

Dama virginiana *Rai. syn. quadr. p. 86.*

Fallow-Deer *Lawson Carol. p. 123.*

Cervus platyceros *Sloan. Iam. II p. 328.*

The Fallow Deer *Catesb. Carol. app. p. XXVIII.*

The fallow-Deer *Brick. North-Carol. p. 109.*

Chevreuil *Du Pratz Louif. II p. 69.*

The virginian Deer *Penn. syn. quadr. p. 51 n. 39*

o tab. 9 fig. 2 corn.

Habitat in Virginia, Carolina. Gregarius, agilis.

Axis.

6. C. cornibus ramosis teretibus erectis: summitate bifida, corpore albo maculato.

Axis *Plin. hist. nat. VIII c. 21 (c. 31 Hard.)?*

Cervi genus Platiceroti simile, olim Axis nuncupatum

Bellon. obs. p. 120.

La

La Biche de Sardaigne *Perr. anim. II p. 65 tab. 45?*

Axis Plinii Bellonio *Rai. syn. quadr. p. 89.*

Axis *Dictionn. anim. I p. 193.*

L'Axis *Buff. hist. nat. XI p. 397 tab. 38 fig. maris, tab. 39 feminae.*

The Axis *Penn. syn. quadr. p. 51 n. 40.*

Axis maschio *Aless. quadrup. I tab. 6 fig. Buff.*

Axis femmina *Aless. quadrup. I tab. 8 fig. Buff.*

Magnitudo Cerui Damae. Cornua gracilia, trifurca, ramo laterali primo ad basin, altero supra: utroque sursum verso. Color corporis pallide rufus maculis albis. In lateribus abdominis linea utrinque alba. Cauda supra rufa; subtus alba, longior ceruina.

Habitat ad ripas Gangis, vulgaris; in Iaua, Ceylona. Fert nostrum clima, beneque mansuescit. Olfactu subtilissimo gaudet.

Cornua multo maiora, ceteroquin simillima, sunt in museo britannico, quae Pennantus refert ad aliam speciem quam vocat the great Axis *syn. quadr. p. 52 n. 41.*

Capreolus. 7. C. cornibus ramosis teretibus erectis: summitate bifida, corpore fusco-rufo.

Caprea *Plin. hist. nat. VIII c. 53 (c. 79 Hard.). c. 58 (c. 83 Hard.). X c. 72 (c. 92 Hard.). XI c. 37 (c. 44, 74 Hard.).*

Caprea siue Capreolus et Dorcas *Gesn. quadr. p. 324 cum fig. mediocri, aliaque p. 1098.*

Capreolus *Schwenckf. theriotr. p. 78.*

Caprea Plinii siue Capreolus *Aldrop. bisulc. p. 738.*

Caprea Plinii *Ioust. quadrup. p. 77 tab. 31 fig. feminae mediocr.*

- Capreolus. Rehe *Ionst. quadrup. tab. 33* fig. mediocr.
 Capreolus, Dorcas *Mus. worm. p. 339.*
 Rehbock *Gefn. Thierb. p. 144 figg. p. 144, 145*
 mediocr.
 Dorcas *Charlet. exerc. p. 12.*
 Capreolus, Dorcas seu Caprea *Wagn. Helvet. p. 173.*
 Capreolus *Sibb. Scot. an. p. 9.*
 Caprea Plinii, Capreolus vulgo *Rai. syn. quadr. p. 89.*
 Dorcas *Rzac. Polon. p. 217 auct. p. 309.*
 Cervus cornibus ramosis teretibus erectis *Linn. syst.*
nat. 2 p. 49.
 Ein Rehbock *Riding. jagdb. Th. tab. 9.*
 Cervus cornibus ramosis teretibus erectis *Linn. fr.*
succ. I p. 14 n. 41.
 Der Rehebock *Meycr Thiere II tab. 73.*
 Das Rehe *Meycr Thiere II tab. 74.*
 Cervus cornibus ramosis teretibus erectis *Linn. syst.*
nat. 6 p. 13 n. 6.
 Cervus minimus, Capreolus *Klein. quadrup. p. 24.*
 Cervus cornubus ramosis, teretibus, erectis. The
 Cervus, with ramose, cylindric, and erect horns:
 the Roe - deer *Hill anim. p. 578.*
 Cervus (Capreolus) cornibus ramosis teretibus erectis
Linn. mus. Ad. Frid. I p. 11.
 Le Chevreuil *Buff. hist. nat. VI p. 198 tab. 32.*
 La Chevette *Buff. hist. nat. VI tab. 33.*
 Le Chevreuil: Cervus (Capreolus) cornibus tereti-
 bus erectis *Briff. regn. an. p. 89 n. 5.*
 Cervus cornibus ramosis teretibus erectis *Kram. Austr.*
p. 319.
 Das Rehe *Hall. vierf. p. 334.*
 Cervus (Capreolus) cornibus ramosis teretibus ere-
 ctis: [summitate bifida *Linn. syst. nat. 10, I p.*
68 n. 7.
 Chevreuil *Dictionn. anim. I p. 599.*
 Rhee: Hert met rolronde opstaande Hoornen, die aan't
 end tweetakkig zyn *Houtt. nat. hist. III p. 141 tab.*
22 fig. 5. Cervus

Cervus (Capreolus) cornibus ramosis teretibus erectis: summitate bifida *Linn. fn. Suec.* 2 p. 14 n. 43.

The Roebuck *Penn. brit. zool.* p. 18 cum fig.

Chevreuil *Bom. dictionn.* I p. 560.

Cervus (Capreolus) cornibus ramosis teretibus erectis: summitate bifida *Linn. syst. nat.* 12, I p. 94 n. 6.

The Roe *Penn. syn. quadr.* p. 53 n. 43.

Capriuolo *Aless. quadrup.* I tab. 45 fig. Buff.

Capriuola *Aless. quadrup.* I tab. 46 fig. Buff.

Der Rehbock *Mart. Buff. vierf.* III p. 123 tab. 48.

Das Reh *Mart. Buff. vierf.* III tab. 49.

Das Reh *Müll. Naturf.* I p. 401 tab. 22 fig. 5 Houtt.

Cervus (Capreolus) cornibus ramosis teretibus erectis; summitate bifida *Müll. Dan. prodr.* p. 6 n. 38.

Capriuolo (*mas*); Capriuola (*femina*) *Italis.*

Zorlito, Cabronzillo montès *Hispanis.*

Cabra montès *Lustranis.*

Chevreuil (*mas*); Chevrette (*femina*) *Gallis.*

Iwrch (*mas*); Iyrchell (*femina*) *Cambrensibus.*

Rehbock (*mas*); Reh, Rehziege, Rehgeiß, Ricke (*femina*) *Germanis.*

Rhee *Belgis.*

Roe *Anglis.*

Raa, Raa-Dyr, Raa-Buk *Danis et Noruegis.*

Rådjur *Suecis.*

Sarn, Sarna, Koza lesna *Polonis.*

Ко́за ди́кая (Ко́за ди́кая) *Russis.*

Giffchan *Tungustis.*

Grichun *Burätis.*

Longitudo corporis fere 4 ped. altitudo $2\frac{1}{2}$ ped. Cauda brevissima, longitudine pollicis vnius. Cornua 6-8 poll. longa, trifurca, raro quadrifurca. Pili aestate breues, molles, rufi, apicibus griseis; hieme longiores, subgrisei, dorso nigricante. Facies

caerules nigricans, praecipue circa os et oculos. Corpus subtus album. Crura gracilia.

Habitat in Europa et Asia. Deest in Britannia australi. Amat filvas minores montosas, gregibus parvis incedit.

Agilis. Caro optima. Prurit initio Nouembris. Vterum fert 20-22 hebdom. Parit gemellos mense Aprilis: Cornua deponit autumno, acquirit hieme.

Huc pertinere videntur:

Teuhtlamaçame *Hernand. Mex. p. 325.*

Temamaçame *Hernand. Mex. p. 325 cum fig.*

Cuguaca-apara *Marcgr. Bras. p. 235.*

Cuguacu-ete *Marcgr. Bras. p. 235.*

Capreolus Marinus *Ionst. quadrup. tab. 33.*

Cugaçu-apará et Cugaçu-eté *Pis. Ind. p. 97 fig. p. 98.*

Cuguacu-ete et Cuguacu-apara *Marcgr. Rai. syn. quadr. p. 90.*

Cervus Macatlichiltic siue Temamacama dictus *Seb. thes. I p. 69 tab. 42. fig. 4.*

Le Chevreuil *Charlev. nouv. Fr. III p. 132.*

Der Hirsch Macatlichiltis oder Tecamacama genannt *Meyer Thiere III tab. 20 fig. Seb.*

Cervus maior: corniculis breuissimis. Biche des bois *Barr. Fr. équ. p. 151.*

Cervus minor palustris; corniculis breuissimis. Biche des Paletuviers *Barr. Fr. équ. p. 151.*

Tragulus Temacama *Klein. quadrup. p. 21.*

La Gazelle de la nouvelle Espagne; Hircus (Gazelle de la nouae Hispaniae) cornibus teretibus, circa medium inflexis, ab origine ad flexuram spiraliter canaliculatis, a flexura ad apicem leuibus *Briss. regn. an. p. 70 n. 11.*

Das Temamaçama *Hall. vierf. p. 320.*

Das

Das brasiliſche Rehe, Cagua-cuete *Hall. vierf. p. 337.*

Das brasiliſche Cagua-cuapara *Hall. vierf. p. 337.*

Ceruus (Bezoarticus) cornibus ramosis teretibus erectis: ramis tribus *Linn. ſyſt. nat. 10, I p. 67 n. 6.*

Bezoar-Hert: Hert met rolronde opſtaande Hoor-
nen, die drietakkig zyn *Houtr. nat. hiſt. III p.*

134.

Ceruus cornibus ramosis teretibus erectis: ramis tri-
bus *Gronov. zooph. I p. 3 n. 9.*

Les Mazames *Buff. hiſt. nat. XII p. 317.*

Le Cariacou *Buff. hiſt. nat. XII p. 347 tab. 44. fig. feminae.*

The Baieu *Bancr. Guian. p. 122.*

Die Waldhindinn, la biche des bois *Fermin Sarin. II p. 89.*

The Mexican Deer *Penn. ſyn. quadr. p. 54 n. 44 tab. 9 fig. 3 corn.*

Cariacu *Aleſſ. quadrup. III tab. 137 fig. Buff.*

Habitat in Mexico, Guiania, Braſilia.

In quorum animalium, ſi vere differant, characteres inquirant autoptae. Vide quoque *Moschum americanum.*

Pygargus. 8. C. cornibus trifurcis, cauda nulla.

Rehe *Pallas Reiſ. I p. 97.*

Ceruus Pygargus *Pallas Reiſ. I p. 453.*

Der wilde Hirsch *Müll. Naturf. Suppl. p. 51.*

Дикая Коза (Dikaja Koz) *Ruffis.*

Saiga *Tataris.*

Magnitudo ſupra Damam. Color fere Capreoli.

Cornua trifurca vt in Capreolo, baſi tuberculis multiformibus muricata, gemina vernante pilis arrectis vndique hirsutiſſima et barbata. Aures

intus

intus albo villosissima. Oculi ciliis pilisque circa orbitam sparsis, longis, nigris. Cauda nulla, papilla tantum supra anum cutacea, crassa. Clunes area magna niuea ad dorsum usque ascendente. Vellus altissimum, subtus artubusque lutescens; ambitus nasi et latera labii inferioris nigra, ipso tamen labii apice albo.

Habitat in campestribus et montanis fruticosis ultra Wolgam.

Species obscurae.

* The porcine Deer *Penn. syn. quadr. p. 52 n. 42 tab. 8 fig. 2.*

Cornua gracilia trifurca, 13 poll. longa, apicibus 6 poll. ab inuicem distantibus. Caput longitudine 10½ poll. corpus ab apice nasi ad caudam 3 ped. 6 poll. longum. Altitudo antice 2 ped. 2 poll. postice 2 ped. 4 poll. Cauda 8 poll. longa. Corpus crassiusculum. Pedes graciles. Color supra fuscus, subtus pallidus.

Habitat in India. The Hog-Deer, ob crassitiam corporis vocatum.

** Ceruus (guineensis) griseus subtus nigricans *Linn. mus. Ad. Frid. I p. 12.*

Ceruus (guineensis) griseus subtus nigricans *Linn. syst. nat. 10, I p. 68 n. 8.*

Guineesch Rheetje: Hert dat grys is van kleur, van onderen zwartagtig *Houtt. nat. hist. III p. 153.*

Ceruus (guineensis) griseus subtus nigricans *Linn. syst. nat. 12, I p. 94 n. 7.*

The grey Deer *Penn. syn. quadr. p. 55 n. 45.*

Das Guineifche Reh *Müll. Naturf. I p. 403.*

Est in museo regis Sueciae: num pullus? Huius corpus magnitudine cati, griseum, at linea atra inter aures. Macula magna atra supra oculos. Ingulum vtrinque longitudinaliter atrum. Sternum in medio atrum. Latera abdominis vsque ad poplites nigra. Ab ano ad genua vsque postica linea nigricans. Genua anteriora etiam antice nigra, et linea angusta nigra ad pedes ducta. Auriculae longiusculae. Cauda subtus nigra. Tibiae duplo crassiores quam in Moscho Pygmaeo. Cornua defunt.

Habitat in Guinea.

An Ceruus? Antilope? Moschus?

31. MOSCHVS.

Dentes Primores superiores nulli.
inferiores VIII.

Laniarii superiores solitarii exserti,

Cornua nulla.

Pedes unguulati.

Mammae inguinales.

moschife-I. M. folliculo vmbilicali.

rus. Moschi capreolus *Gesn. quadrup. p. 786.*

Certains animaux qui portent le musec *Della Valle voy. II p. 387.*

Animal moschiferum *Nieremb! hist. nat. p. 184.*

Capra Moschi *Aldrov. bisulc. p. 743 fig. p. 744*
mediocr.

Capra Moschi *Ionst. quadrup. p. 78.*

Gebäude der Petersburgl Acad. der wissensch. Tab. X. fig. Capreo. bona

- Capreolus Moschi Bifemthier *Ionst. quadrup. tab. 29*
fig. mediocr.
- Bifemthierlein Xé genant *Neuh. Gesandtsch. p. 373*
cum fig. bona.
- Moschus *Schroeck monogr. cum figg. mediocr.*
- Bifemthier, Moschi capreolus *Gesn. Thierb. p. 50 figg.*
p. 50, 51. mediocr.
- Animal qui produit le musc *Tavern. voy. II p. 316*
cum fig. mediocr.
- Capra Moschi *Charlet. exerc. p. 10.*
- The Musk Deer *Grew mus. reg. soc. p. 21.*
- Animal moschiferum *Rai. syn. quadr. p. 127.*
- Muskus - of Muskeljaat dier *Ysbr. Reif. p. 45 cum*
figg. bonis.
- Cabardyn *Sirablenb. Af. p. 335.*
- Hiang-tchang'tse *Du Halde Chin. I p. 33.*
- L'animal qui porte le musc *Du Halde Chin. I p.*
129.
- Moschus *Linn. syst. nat. 6 p. 13 n. 1.*
- Tragus moschiferus. Moschus *Klein. quadrup. p. 13.*
- Animal moschiferum, Kabarga dictum *I. G. Gmelin:*
Nou. comm. petrop. IV p. 393.
- Moschus. The Musk Animal *Hill anim. p. 575.*
- Le Musc: *Tragulus (Moschus) ad umbilicum folli-*
culum moschiferum gerens *Briff. regn. an. p. 97*
n. 5.
- Der Muskusbok *Hall. vierf. p. 317.*
- Moschus (moschiferus) *Linn. syst. nat. 10, I p. 66*
n. 1.
- Kabarga *Müll. Samml. III p. 561.*
- Chevreuil de la Chine *Dictionn. anim. I p. 601.*
- Musc *Dictionn. anim. III p. 203.*
- Xé des Chinois *Dictionn. anim. IV p. 575.*
- Muskus Dier *Houtt. nat. hist. III p. 29.*
- A creature called Kaberda *Bell trav. I p. 233 II*
p. 79.
- Le Musc *Briff. hist. nat. XII p. 361.*

Xé des Chinois *Bon. dictionn. IV p. 636.*

Moschus (moschiferus) folliculo umbilicali *Linn. syst. nat. 12, I p. 91 n. 1.*

The Tibet Musk *Penn. syn. quadr. p. 56 n. 46 tab. 10 fig. 1.*

Das tartarische Bisamthier *Müll. Naturf. I p. 375.*

Кабарга (Kabarga) in *Krasnojarsk Russis.*

Canra (Saiga) in *Irkutsk, Ilimsk et ad Lenam fluvium Russis.*

Honde *Tungusis.*

Budek *Burüzis.*

Xe, Hiang-tchang-tse *Sinensibus.*

Longitudo corporis $3\frac{1}{2}$ ped. altitudo $2\frac{1}{2}$ ped. Figura Cerui Capreoli. Rostrum acutum. Maxilla superior longior inferiore, cum laniario utrinque gracili longitudine $2\frac{1}{2}$ poll. extra os prominente. Molares utrinque sex. Aurigulae longae, erectae. Pili totius corporis longi, erecti, versus apicem grisei, apicibus ipsis ferrugineis. Ungulae graciles, nigrae. Ungulae succenturiatae in palmis longissimae. Cauda vix pollicem longa. Penis occultatus, vix visibilis, scrotum ruberrimum. Cornutum animal dicit Bell, contrarium asserentibus reliquis autoptis. Femina minor mare, naso obtusiore absque laniariis elongatis, mammis duabus parvis.

Habitat in Tibetano regno, prouincia Mohang Meng Sinenfi, in Tonkin et Bontan, ad lacum Baikal, ad Ienifeiam atque Argunum; in pinetis montosis, solitarius, misanthropus. Asilum quaerit in summis rupibus. Mansuescit tamen.

Moschus est substantia vinctuosa ambrosiaca odore fortissimo, praecipue aestiu tempore, ex maris tumore magnitudinis oui gallinacei infra abdomen pone

umbilicum sito, ouificiisque duobus minoribus instructo, altero nudo, altero pilis longis obtecto. Moschus nullus ex femina obtinetur. Tibetanus optimus est atque carior reliquo. Maris caro moschi odore infecta ingrata.

Memina. 2. M. supra cinereo-oliuaceus, subtus albus, lateribus albo maculatis.

Meminna *Knox Ceylon. p. 21.*

Le Chevrotain à peau marquetée de taches blanches
Buff. hist. nat. XII p. 315.

The Indian Musk *Penn. syn. quadr. p. 59 n. 48 tab. 10 fig. 2.*

Longitudo corporis $1\frac{1}{2}$ ped. Corpus supra ex cinereo oliuaceum, subtus album gutture, pectore, ventre: latera albo maculata lineataque. Auriculae longae. Cauda breuissima.

Habitat in Ceylona.

Pygmaeus. 3. M. supra fusco-rufus, subtus albus, ungulis succenturiatis nullis.

Cerua paruula africana, ex Guinea, rubida sine cornibus *Seb. thes. I p. 70 tab. 43 fig. 1.*

Hinnulus seu Ceruus iuuenis pergracilis Africanus
Seb. thes. I p. 70 tab. 43 fig. 2.

Ceruus africanus pilo rubro *Seb. thes. I p. 73 tab. 45 fig. 1.*

Tragulus; Ceruula paruula Africana ex Guinea, acornis *Klein. quadrup. p. 22.*

Tragulus sive Hinnulus aut Ceruus iuuenis, pergracilis, Africanus *Klein. quadrup. p. 22.*

Tragulus Guineensis pilo rubro longiore *Klein. quadrup. p. 22.*

- Le Chevrotin des Indes: *Tragulus (indicus) pilis breuib. supra fulvis, infra albicantibus Briff. regn. an. p. 95 n. 1.*
- Le Chevrotain de Guinée: *Tragulus (Guineensis) pilis longissimis obscure fulvis Briff. regn. an. p. 96 n. 2.*
- Das schwächte Afrikanische Hirschgen-ohne Hörner *Hall. vierf. p. 320.*
- Das ungehörnte Afrikanische Hirschgen mit gekräuseltem in die Höhe geschlagenen Hundschwanz *Hall. vierf. p. 321.*
- Das Afrikanische Hirschgen mit rothem Haar *Hall. vierf. p. 321.*
- Chevrotin des Indes *Diçtionn. anim. I p. 602.*
- Chevrotin de Guinée *Diçtionn. anim. I p. 602.*
- Die kleine braunrothe. Hirschgenähnliche Zwergziege aus Guinea *Mus. barurb. p. 5 tab. 3 fig. bon.*
- Le Chevrotin des Indes orientales *Buff. hist. nat. XII p. 315, 341 tab. 42 fig. animalis; tab. 43 fig. I capitis; fig. 3-8 pedum.*
- Moschus (Pygmaeus) pedibus humano digito angustioribus *Linn. syst. nat. 12, I p. 92 n. 3.*
- The Guinea Musk *Penn. syn. quadr. p. 59 n. 49.*
- Tragolo *Alessi. quadrup. III tab. 135 fig. Buff.*
- Das kleine Guineische Reh *Müll. Naturf. I p. 377.*

X 2

Longi-

ANTILOPE *regia;*
 CERVUS *Capreolus americanus;*
 MOSCHUS *Meminna;*
 Pygmaeus;
 americanus;

extricatu difficillimae species apud auctores, neque vllum ex Mammalium classe animal plus molestiae mihi creavit hisce. Ego vero quinque haec animalia vere differre inter se fere credo; nisi forte Moschus Pygmaeus feminae sit Antilopis-regiae ipseque conueniat cum Moscho Meminna; Moschus autem americanus cum Ceruo Capreolo americano. Synonymia imprimis, obscura Sebae, Kleinii, Hallerii.

Longitudo corporis $9\frac{1}{2}$ poll. caudae pollicis vnus.
Corpus supra e fusco rufum, subtus album. Vngulae
succenturiatae nullae. Dentes laniarii supra
duo ex ore prominentes. Auriculae magnae.

Habitat in India orientali, Guinea.

Num forte plane idem animal fit cum Antilope regia,
dubius adhuc haereo.

america- 4. M. rufo-fuscus, ore nigro, gula alba.

nus. Biche de Guiane *Des March. voy. III p. 281.*

Ceruula surinamensis subrubra, albis maculis notata
Seb. thes. I p. 71 tab. 44 fig. 2.

Tragulus Surinamensis *Klein. quadrup. p. 22.*

Le Chevrotain de Surinam: Tragulus (surinamen-
sis) ex rufo luteus, maculis albis variegatis *Briff.
regn. an. p. 96 n. 3.*

Das Surinamische röthliche Hirschgen mit weissen
Flecken und langen Ohren *Hall. vierf. p. 321.*

Chevrotain de Surinam *Dictionn. anim. I p. 602.*

The Wirrebocerra *Bancr. Guian. p. 123.*

Die zwote Art von Hirschchen *Fermin. Surin. II p. 89.*

The Brasilian Musk *Penn. syn. quadr. p. 58 n. 47.*

Magnitudo Capreoli (Bancroftio tertia parte minor).

Auriculae longitudine quatuor pollicum. Oculi

magni, nigri. Nares magnae. Oris regio ni-

gra. Crura postica longiora anticis. Cauda bre-

vis. Pili breues mollesque, capitis collique supra

fusci, colli subtus albi, corporis crurumque rufo-

fusci. Vngulae nigrae.

Habitat in Guiania et Brasilia. Timidissimus, celer-
rimus, agilis. Natat per fluuios. Caro bona.

Species obscura.

* Stags without horns *Nieub. East-Ind. p. 209.*

Habitat in insula Formosa, magnitudine fere cerui Elaphi.

32. L E P V S.

Dentes Primores vtrinque II: superiores duplicati: interioribus f. palatinis minoribus.

Laniarii nulli.

Pedes digitati, digitis 5 - 4.

timidus. I. L. cauda abbreviata, pedibus posticis longitudine corporis dimidii, auriculis apice nigris.

Lepus *Plin. hist. nat. VIII c. 55, 56 (c. 81, 82 Hard.).*

c. 58 (c. 83 Hard.). X c. 63 (c. 83 Hard.). XI c.

37 (c. 54 Hard.). c. 39 (c. 94 Hard.).

Λαγώς *Aelian. anim. II c. 12. VI c. 47. XIII c. 12-15.*

Πρωξ *Oppian. cyneg. III, 507.*

Lepus *Gesn. quadrup. p. 681 c. fig. mediocr.*

Lepus *Schwenckf. theriotr. p. 103.*

Lepus *Waldung. monogr.*

Lepus *Aldrov. digit. p. 347.*

Lepus *Ionst. quadrup. p. 158.*

Lepus *Hale Ionst. quadrup. tab. 65 figg. mediocr.*

Lepus *Mus. Worm. p. 321.*

Has *Gesn. Thierb. p. 167 c. fig. mediocr.*

Lepus *Charlet. exerc. p. 23.*

Lepus *Sibb. Scot. an. p. 11.*

Lepus *Paullini monogr.*

Lepus *Rai. syn. quadr. p. 204.*

Lepus *Rzacz. Polon. p. 219 auct. p. 311.*

Lepus cauda abrupta, pupillis atris *Linn. syst. nat. 2*

p. 46. ^{12910v}

Hale *Riding. jagdb. Th. tab. 13.*

- Lepus cauda abrupta; pupillis atris *Linn. fn. succ. I*
p. 8 n. 19.
- Der Has *Meyer Thiere II tab. 32 fig. bon.*
- Lepus cauda abrupta, pupillis atris *Linn. syst. nat. 6*
p. 9 n. 2.
- Lepus vulgaris, cinereus *Klein. quadrup. p. 51.*
- Lepus cauda abrupta, pupillis atris. The Lepus,
 with an abrupt tail, and black eyes: the common
 Hare *Hill anim. p. 525 tab. 25 fig. mediocr.*
- Lepus (vulgaris) cauda abrupta, pupillis atris *Linn.*
mus. Ad. Frid. I p. 9.
- Le Lièvre *Buff. hist. nat. VI p. 246 tab. 38.*
- Le Lièvre: Lepus (. . .) caudatus, ex cinereo
 rufus *Briff. regn. an. p. 138 n. 1.*
- Lepus cauda abrupta, pupillis atris *Kram. Austr. p.*
315.
- Der Hase *Hall. vierf. p. 408.*
- Lepus (timidus) cauda abbreviata, auribus apice
 nigris *Linn. syst. nat. 10, I p. 57 n. 1.*
- Haafen *Müll. Samml. III p. 525.*
- Lièvre *Dictionn. anim. II p. 649.*
- Haas met een kort Staartje, de Ooren aan de tippen
 zwart *Houtt. nat. hist. II p. 371.*
- Lepus (timidus) cauda abbreviata, auriculis apice
 nigris *Linn. fn. succ. 2 p. 9 n. 25.*
- The Hare *Penn. brit. zool. p. 41.*
- De Danske Harer *Pentopp. Dan. I p. 606.*
- Lièvre *Bom. dictionn. II p. 675.*
- Lepus (timidus) cauda abbreviata, auriculis apice ni-
 gris *Linn. syst. nat. 12, I p. 77 n. 1.*
- Lepus timidus *Forster: Philos. transact. LVII p. 343.*
- The common Hare *Penn. syn. quadr. p. 248 n. 184.*
- Lepre *Aless. quadrup. I tab. 42 fig. Buff.*
- Der Feldhase *Müll. Naturf. I p. 318.*
- Haafen *Stell. Kamtsch. p. 126.*
- Der Hase *Mart. Buff. vierf. III p. 147 tab. 50.*
- Lepus *Forsk. fn. orient. p. IV.*

Lepus (timidus) cauda abbreviata, auriculis apice
nigris Müll. *Dan. prodr. p. 4: n. 23.*

Lepre, Lievora *Italis.*

Liebre (*adultus*); Lebreçilla (*pullus*) *Hispanis.*

Lebre (*adultus*); Lebrinho, Lebracho (*pullus*) *Lu-*
sitanis.

Lievre (*mas*); Hase (*femina*); Levraut (*pullus*)
Gallis.

Yfgyfarnog, Ceinach *Cambrensisibus.*

Hase, Rammeler (*mas*); Setzhase, Häsinne (*femina*)
Germanis.

Haas *Belgis.*

Hare (*adultus*); Levetet (*pullus*) *Anglis.*

Hare *Danis.*

Hase *Noruegis.*

Hare *Succis.*

Niaamel *Laponibus.*

Zaiac *Polonis.*

Заецъ (Zaetz'), Заяць (Zajatz'), Русакъ (Rufak)
Ruffis.

Ушнапъ (Ufchnap'), Ушкапъ (Ufchkan) *in Sibiria.*

Toufchak *Tungusis.*

Schandalgan *Burätis.*

Koiän *Tataris.*

Merän *Tfcheremiffis.*

Molgâtsch *Tfchuwaschis.*

Lâd ketfch *Woriakis.*

Numola *Morduanis.*

Kütfeh *permice.*

Kötfeh *firjänice.*

عزب (Arnäh) *Arabibus.*

Longitudo corporis pedum 2. Auriculæ elongatæ, apice
nigræ. Oculi magni, exstantes, membrana
nîctitante, somno aperti. Mentum album. My-
staces ad os fetis numerosis longis: superioribus
nigris, inferioribus albis. Nares humidæ, mo-

titantes. Labium superius fissum. Pili faciei, dorsi et laterum basi albi, medio nigri, apice rufi. Gula cum pectore rufa. Venter albus. Cauda supra nigra, subtus alba. Femora postica crassa et longiora anticis. Pedes vsque ad apices lanati. Cavitas vtrinque e regione pubis. Clitoris magna, inde difficilis sexus distinctio, fabulaeque de leporibus hermaphroditis.

Habitat vbiq̄ue in Europa perque totam fere Asiam, in Ceylona, Aegypto, Barbaria, America boreali vbi minor et sola varietas alpina reperitur, nisi forte propria species sit.

Vicitat ruminans ramulis fruticum, cortice arborum, radicibus, herbis. Noctu pascit. Inermis timidusque auditu et visu excellit atque cursu valet, imprimis montem ascensurus, currit gyros sensim breuiore, retro deuiat exiliendo. Capitur a canibus, felibus, accipitribus, strigibus; proiecto sub venatu in altum pileo sese occultat sub proximo frutice metu accipitris. Mordet truncum, transcendendum. Dalectatur tympano. Ceruice fragili. Immenus parturitione per totam aestatem. Coit primum februario et martio mense. Parit tres ad quatuor. Vterum fert 30 - 31 diebus. Adolefcit anno primo. Superfoetatio haud rara hoc in genere. Nascitur oculis apertis. Mas crudelis in propriam faeuit prolem. Vrina foetida non in cubile mittenda. Pulicibus obnoxius. Aetas octo annorum.

alpinus. n. Varietas alpina alba, minor, auriculis breuioribus apice nigris, cruribus gracilioribus.

Lepores candidi *Plin. hist. nat. VIII c. 55 (c. 81 Hard.)*.

Lepores albi *Aldrov. digit. p. 349.*

J. L. Catani (Florenz 2^o St Antonien in Graubünden) *Lepus*
longicauda. in *den Bünden Woschsch der Sammler*. 5^{te} Jg
 1783. p. 179 - 92. u. a. p. 219 ff

- Lepus candidus *Ioust. quadrup. p. 160.*
 Lepores *Scheff. Lapon. p. 346.*
 Lepus albus *Wagn. Heluct. p. 177.*
 An Hare almost all over white *Morr. Norrbampr. p. 445.*
 Lièvres *Egede Groenl. p. 45.*
 Haase *Szrablenb. Af. p. 361.*
 Lepus albissimus *Klein. quadrup. p. 51.*
 Le Lièvre blanc; Lepus (albus) caudatus plane candidus *Briff. regn. an. p. 139 n. 2.*
 Lièvre blanc *Dictionn. anim. II p. 651.*
 Hasen *Crauz Groenl. I p. 95.*
 Hasen *Rytzschk. Orenb. I p. 230.*
 Lepus timidus *Forster: Philos. transact. LVII p. 343.*
 The alpine Hare *Penn. syn. quadr. p. 249 n. 185 tab. 23 fig. 1.*
 Die Schweitzerischen Berghasen *Mart. Buff. vierf. III p. 166.*
 Alpine Hare *Forster: Philos. transact. LXII p. 375.*
 Ukalek *Groenlandis.*

Habitat in alpinis, nec non frigidis regionibus.

Num forte propria species? Putat Pennantus, numquamque coire cum vulgari in Scotia certe affirmat. Minus celer. Latet in fissuris rupium. Facile mansuescit. In frigidissimis perpetuo albus est, in temperationibus colorem mutat septembri mense atque aprili.

niger. β. *Varietas nigra.*

- Lepus plane niger *Mus. Worm. p. 321.*
 Lepus niger *Klein. quadrup. p. 52.*
 Le Lièvre noir: Lepus (niger) caudatus plane niger *Briff. regn. an. p. 139 n. 3.*

Lièvre noir *Dictionn. anim.* II p. 651.

Schwarzer Hase *Mart. Buff. vierf.* III p. 167.

Rarissimus in Sibiria, alibique.

cornutus. γ *Lepus cornutus*, si non hybridus (sed ex quonam?)
certe fabulosus.

Lepus cornutus *Ionst. quadrup. tab.* 65.

Lepores cornuti *Mus. Worm.* p. 321.

Ein frembde Art der Hasen mit Hörnern *Gesn. Thierb.* p. 173 *cum fig.*

Cornua leporina *Iacob. mus. reg. tab.* 3 *fig.* 6, 7, 8.

Zwey gehörnte Hasen *Meyer Thiere II tab.* 33.

Lepores cornuti *Klein. quadrup. p.* 52 *tab.* 3.

Lièvre cornu *Dictionn. anim.* p. 652.

Gehörnte Hasen *Mart. Buff. vierf.* III p. 178 *tab.* 51.

Distinguunt porro venatores nostrates *die Berghaafen, Bruch- vel Sumpfhafen, Feld- vel Grundhafen, Holz- hafen* etc. Has autem varietates non curamus, levisimis notis distinctas, praecipueque loco natali.

america- 2. *L. cauda abbreviata, pedibus posticis corpore*
nus. dimidio longioribus, auricularum caudaeque
apicibus griseis.

Die Hasen *Kalm. Amer.* III p. 349.

Hudson's Bay quadruped *Barrington: Philos. transact.* LXII p. 11.

American Hare *Forster: Philos. transact.* LXII p. 376.

Magnitudine medius inter *L. Cuniculum* et timidum alpinum. Auricularum et caudae apices perpetuo grisei. Pedes postici longiores quam in *L. timido*

et

et Cuniculo. Color griseo fuscus, hieme in frigidioribus albus.

Habitat in America boreali, ad fretum Hudsonis copiosissimus. Nocturnus. Non fodit. Degit sub arborum radicibus inque cauis arboribus. Parit bis vel semel in anno pullos quinque ad septem. Caro bona, colore L. timidi.

Cuniculus. 3. L. cauda abbreviata, pedibus posticis corpore dimidio brevioribus.

Δουρους *Arist. hist. an.* II c. 9 n. 50. V c. 2 n. 12, 13. VI c. 33 n. 407. 412.

Cuniculus *Plin. hist. nat.* VIII c. 29 (c. 43 *Hard.*). c. 55 (c. 81 *Hard.*) c. 58 (c. 83 *Hard.*).

Dasyus *Plin. hist. nat.* VIII c. 55 (c. 81 *Hard.*) X c. 63 (c. 83 *Hard.*) XI c. 39 (c. 94 *Hard.*).

Cuniculus *Agric. an. subz.* p. 16.

Cuniculus *Gesn. quadr.* p. 394 cum fig.

Cuniculus *Schwenckf. thierotr.* p. 86.

Cuniculus *Aldrov. digit.* p. 382.

Cuniculus cinereus *Aldrov. digit.* p. 385 fig. bona.

Cuniculus *Ionst. quadrup.* p. 161.

Kaninich: Kaniglein *Ionst. quadrup. tab.* 65 fig. bona.

Küniglein *Gesn. Thierb.* p. 174 cum fig. bona.

Cuniculus *Charlet. exerc.* p. 23.

Cuniculus *Sibb. Scot. an.* p. 11.

Cuniculus *Rai. syn. quadr.* p. 205.

Cuniculi *Rzacz. Polon.* p. 240.

Lepus cauda abrupta, pupillis rubris *Linn. syst. nat.* 2 p. 46.

Lepus cauda brevissima, pupillis rubris *Linn. fn. suec.* 1 p. 8 n. 20.

Das Caninichen *Meyer Thiere I tab.* 83.

Lepus cauda abrupta, pupillis rubris *Linn. syst. nat.* 6 p. 9 n. 3.

Lepusculus; Cuniculus; terram fodiens *Klein. quadrup. p. 52.*

Lepus cauda breuissima, pupillis rubris. The red-eyed Lepus, with a very short tail: the Rabbit
Hill anim. p. 525 tab. 25 fig. bon.

Lepus (Cuniculus) cauda breuissima, pupillis rubris
Linn. mus. Ad. Frid. I p. 9.

Le Lapin *Buff. hist. nat. VI p. 303.*

Le Lapin sauvage *Buff. hist. nat. VI tab. 50.*

Le Lapin domestique *Buff. hist. nat. VI tab. 51.*

Le Lapin de notre pays: Lepus (Cuniculus nostras) caudatus obscure cinereus *Briff. regn. an. p. 140 n. 4.*

Lepus cauda abrupta, pupillis rubris: the Rabbit
Brown. Iam. p. 484?

Lepus cauda abrupta, pupillis rubris *Kram. Austr. p. 315.*

Das Kaninchen *Hall. vierf. p. 413.*

Lepus (Cuniculus) cauda abbreviata, auriculis nudatis *Linn. syst. nat. 10, I p. 58 n. 2.*

Lapin *Dictioun. anim. II p. 599.*

Konyn: Haas met een korte Staart, de Ooren kaal
Houtt. nat. hist. II p. 391.

Lepus (Cuniculus) cauda abbreviata, auriculis nudatis *Linn. fn. succ. 2 p. 10 n. 26.*

The Rabbet *Penn. brit. zool. p. 43.*

Caniner *Pontopp. Dan. I p. 606.*

Lapin *Bom. dictioun. II p. 642.*

Lepus (Cuniculus) cauda abbreviata, auriculis nudatis *Linn. syst. nat. 12, I p. 77 n. 2.*

The Rabbet *Penn. syn. quadr. p. 251 n. 186.*

Coniglio selvatico *Aless. quadrup. I tab. 47 fig. Buff.*

Coniglio domestico *Aless. quadrup. I tab. 48 fig. Buff.*

Das Kaninchen *Müll. Naturf. I p. 322.*

Das Kaninchen *Mart. Buff. vierf. III p. 184.*

Das wilde Kaninchen *Mart. Buff. vierf. III p. 206 tab. 52.*

Das zahme Kaninchen *Mart. Buff. vierf. III p. 207 tab. 53.*

Lepus (Cuniculus) cauda abbreviata, auriculis nudatis *Müll. Dan. prodr. p. 4 n. 24.*

Conejo (*mas*); Coneja (*femina*); Conejuelo, Conejillo, Conejito (*pullus*) *Hispanis.*

Coelho *Lusitanis.*

Coniglio *Italica.*

Lapin (*mas*); Lapine (*femina*); Lapreau (*pullus*); Lapin de Garenne (*ferus*); Lapin de clapiers (*domesticus*) *Gallis.*

Cwningen *Cambrensis.*

Kaninchen, Caninchen, Karnickel *Germanis*; olim Kunigle, Kunlein.

Küniglhase *Austriacis.*

Konyn *Belgis*; Lampreelen *pulli.*

Rabbet, Cony *Anglis.*

Kanin, Müne *Danis.*

Kanin *Suecis.*

Krolik *Polonis.*

Кролик (Krolik) *Ruffis.*

Species facilius dignoscitur quam differentia specifica determinatur. Pupillae certe non semper rubrae, nec auriculae semper denudatae. Barringtonius recte attendit ad brevitatem crurum posteriorum ut et anteriorum. *Philos. transact. LXII p. 4.*

Minor Lepore timido: longitudine corporis $1\frac{1}{2}$ ped. *Ferus* corpore ex fusco cinereo, cauda supra nigra subtus alba. *Domesticus* fero maior variat colore nigro, variegato, albo; huic autem oculi pulchre rubri.

Habitat in temperatis et calidioribus Europae, inque calidioribus Asiae et Africae. Exoticus cultus in frigidis; in borealibus non nisi in domibus.

Cuni-

Cuniculos agit in arenosis locis; later interdium, nocte exit. Capitur a Falconibus, Mele, Putorio. Parit septies per annum quatuor ad octo, grauida 30-31 diebus. Adolescit mense sexto. Pellis bona. Caro passim esculenta, candida. Aetas octo vel nouem annorum.

angorensis. a. Varietas angorensis, pilis longioribus; undulatis, fericeis.

Le Lapin d'Angora *Buff. hist. nat. VI tab. 53.*

Le Lapin d'Angora en muë *Buff. hist. nat. VI tab. 54.*

Le Lapin d'Angora: *Lepus (Cuniculus Angorensis) caudatus pilis tenuissimis et longissimis toto corpore vestitus Briss. regn. an p. 141 n. 6.*

Lapin d'Angora *Dictionn. anim. II p. 600.*

The Angora Rabbet *Penn. syn. quadr. p. 252 n. 186 p.*

Coniglio d'Angora *Aless. quadrup. I tab. 50 fig. Buff.*

Das Angorische Kaninchen *Mart. Buff. vierf. III p. 209 tab. 55.*

Das angorische Kaninchen in der Maufe *Mart. Buff. vierf. III tab. 56.*

Habitat circa Angoram.

argenteus. β. Varietas pilis ex argenteo griseis, pedibus fuscis.

Le Riche *Buff. hist. nat. VI tab. 52.*

Le Riche: *Lepus caudatus, dilute cinereus Briss. regn. an. p. 191 n. 5.*

The silver-haired Rabbet *Penn. syn. quadr. in indice.*

Coniglio grigio *Aless. quadrup. I tab. 49 fig. Buff.*

Das reiche Kaninchen *Mart. Buff. vierf. III p. 208 tab. 54.*

rufus.

russus. γ. *Varietas* singularis, pelle duplici quasi sacco in dorso, intra quam retrahit caput, saccoque altero infra gulam pro pedibus anticis. Foramina parva in cute dorsali pro admittenda luce. Color corporis cinereus, capite auriculisque fuscis.

The Russian Rabbet *Penn. syn. quadr. p. 252 tab. 23 fig. 2* ab Edwardsio communicata.

capensis. 4. L. cauda longitudine capitis, pedibus rubris. Lepus (*capensis*) cauda longitudine capitis, pedibus rubris *Linn. syst. nat. 10, I p. 58 n. 3.*

Haas, met de Staart zo lang als de Kop en roode Footen *Houtt. nat. hist. II p. 407.*

Lepus (*capensis*) cauda longitudine capitis, pedibus rubris *Linn. syst. nat. 12, I p. 78 n. 3.*

The Cape Hare *Penn. syn. quadr. p. 253 n. 189.*

Der Capfche Hase *Müll. Naturf. I p. 324.*

Der Kapifche Hase *Mart. Buff. vierf. III p. 215.*

Habitat ad caput bonae spei. Fodiens.

dauricus. 5. L. cauda elongata, gula nigra.

Lepus cauda elongata *Linn. syst. nat. 2 p. 46? forte Iaculus.*

Lepus cauda elongata *Linn. syst. nat. 6 p. 9 n. 4?*

Lepus cauda elongata. The long-tailed Lepus: the Siberian Rabbit *Hill anim. p. 525?*

Cuniculus insigniter caudatus coloris leporini I. G. *Gmelin: Nou. comment. petrop. V p. 357 tab. 11 fig. 2.*

Le Tolai *Buff. hist. nat. XV p. 138.*

The Baikal Hare *Penn. syn. quadr. p. 253 n. 188.*

Das langgeschwänzte Kaninichen *Mart. Buff. vierf. III p. 219.*

Толан (Tolai), Талаи (Talai) *Ruffis.*

Paullo maior L. Cuniculo. Color timidi, at rufus circa collum et pedes; subtus albus, gula nigra. Cauda longa, supra nigra subtus alba. Mammae duae.

Habitat vulgaris trans lacum Baikal. Cuniculo simili figura corporis, incessu, carne, moribus: fodit subterraneus.

Vtique specie differre videtur a Cuniculo.

brasiliensis. 6. L. cauda nulla, auriculis elongatis, corpore ex rufo fusco.

Citli seu lepus *Fernand. anim. p. 2.*

Tapeti Brasiliensibus *Maregr. Brasil. p. 223 fig. p. 224* bona, nisi quod caudata sit.

Cavia Cobaya Cunic. Brasil. spec. *Inst. quadrup. tab. 63 fig. Maregr.*

Tapeti *Pis. Ind. p. 102 cum fig. Maregr.*

Cavia Cobaya. Die zweyte Art aufs Brasilien *Gesn. Thierb. p. 177 fig. Maregr.*

Cuniculus Brasiliensis Tapeti dictus *Rai. syn. quadr. p. 205.*

Lapin *Waser voy. p. 224.*

Lepus cauda nulla *Linn. syst. nat. 2 p. 46.*

Lepus cauda nulla *Linn. syst. nat. 6 p. 9 n. 1.*

Lepus cauda nulla. The Lepus, without any tail: the Tapeti *Hill anim. p. 526.*

Le Lièvre du Brésil: Lepus (Brasiliensis) ecaudatus *Briss. regn. an. p. 141 n. 7.*

Lepus (brasiliensis) cauda nulla *Linn. syst. nat. 10, I p. 58 n. 4.*

Lièvre du Brésil *Dictionn. anim. II p. 651.*

Haas zonder Staart *Houtt. nat. hist. II p. 407.*

Tapiti *Bom. dictionn. IV p. 297.*

Lepus (brasiliensis) cauda nulla *Linn. syst. nat. 12, I p. 78 n. 4.*

Le Tapeti *Buff. hist. nat. XV p. 162.*

The Brasilian Hare *Penn. syn. quadr. p. 252 n. 187.*

Das ungeschwänzte Kaninchen *Müll. Naturf. I p. 325.*

Das ungeschwänzte Brasiliſche Kaninchen. Der Ta-
peti der Brasilianer *Mart. Buff. vierf. III p. 216.*

Magnitudo Leporis timidi, facies Cuniculi. Auricu-
lae elongatae. Oculi nigri. Color L. timidi ob-
ſcurior, ventre albicante, annulo ut plurimum albo
circa collum, facie ruſa, mento albo.

Habitat in Braſiliae et Mexici ſiluis. Mores Leporis
timidi; non fodit. Valde proliſer. Caro proba.

The Rabbet *Catesb. Carol. app. p. XXVIII* an idem?
an Lepus americanus?

Similis Cuniculo fero, colore, figura, ſapore et
colore carnis.

Vulgaris in America boreali ſub Leporis nomine.
Non fodit; fugit in cauas arbores.

alpinus. 7. L. cauda nulla, auriculis elongatis, corpore
luteſcente.

~~Iebraſchken oder kleine Marmelthiere *Stell. Kamſch.*
p. 126. v. *Citellus p. 366.*~~

Eine Art von Steinhaafen *Pallas Reiſ. II p. 569.*

Lepus alpinus *Pallas Reiſ. II p. 701 tab. A.*

Der Berghaafe *Müll. Naturf. Suppl. p. 37.*

Пищуха (Piſczucha), Сѣноſтавецъ (Sjenoftawetz)
Ruſſis.

Ochodona *Mungalis.*

Pika *Tunguſis.*

Magnitudo *Caviae Porcelli*; facies totaque ſtructura
Leporis puilli. Caput oblongum, ore leporino.
Dentes primores ſuperiores ſulco profundo exarati,

acie incisa, communi tridentata, denticuli palatini truncati. Auriculae magnae, suborbiculatae, intus bilamellatae, margine anteriore infundibuliformi-tubuloso. Corpus ventricosum, artusque breues vt in L. pusillo. Palmae pentadactylae, pollice breui, plantae tetradactylae: volae omnium lana densissima atra vestitae. Cauda nulla, sed tuberculum pinguedinosum mole nucis. Color lutescens, supra fusco mixtus. Areola parotica velleris vtrinque quasi detrita, pilis breuibus vestita. Pondus circiter vnciarum quindecim. Mammae duae inguinales, quatuor pectorales. Costarum paria octodecim. Structura intestinorum mira, vt in L. pusillo. Infestatur laruis Oestri subcutaneis.

Habitat in Alpiniis rupestribus Sibiriae; Augusto mense foenifecans, herbasque siccas inter rupes congestans. Vox fistulata simplex.

pusillus. ♂. L. cauda nulla, auriculis breuibus rotundatis. Lepus (pusillus) cauda nulla, auriculis rotundatis *Linnaeum mant. II p. 522.*

Eine Art Zwerghaasen *Pallas Reif. I p. 155.*

Lepus pusillus *Pallas: Nou. comment. petrop. XIII p. 531 tab. 14 fig. 1.*

Der Zwerghaase *Müll. Naturf. Suppl. p. 37.*

Каменный Заяцъ (Kamennii Zajatz') *Ruffis.*

Sulgan, Kir-sickan *Tataris.*

Minutissimus Leporum, magnitudine Ratti. Caput longius quam in L. timido, vellere largiter vestitum. Mystaces longae, albae. Verruca supra ocularis tripilis, parotica unipilis. Oculi medio-cres, obscuri. Auriculae breues, rotundatae, laerae, vellere semilatentes, intus griseo-villosae, versus marginem fuscescentes, ipsoque limbo tennerrime

nerrime pilosae, albiae. Truncus gracilis, abdomine subuentricoso. Cauda nulla. Artus postici breues. Palmae pentadactylae pollice remoto breui. Plantae tetradactylae, digito extremo brevior. Vellae ut in Lepore timido pilosae. Vellus largum prolixumque. Lanugo ubique densa, tenerrima, fusca. Pili erecti, praelongi, praesertim in dorso subpollicares, extremitate griseo nigroque varii. Ambitus oris, gula et pectus albi, reliquum corpus subtus et pedes supra e griseo-lutescente albicant. Claviculae arcuatae, magnae. Costae vtrinque septendecim.

Habitat in campis apertis desertis circa Wolgam et ultra Iaicum, solitarius, cuniculis subterraneis latens, noctu praesertim exiens. Edit aestate herbas succulentas, hieme excrementa animalium phytiphagorum maiorum, imprimis Equi et Ovis. Vox acuta. Parit fine Maii mensis pullos quinque vel sex coecos nudosque.

Species obscura.

* Alia species Cuniculorum, quam vocant Vizcacha

Laet Amer. p. 407.

Viscacha *Nieremb. hist. nat. p. 161 cum fig. Villon. noticias*

Viscachas *Cieza Peru p. 236.*

Les Viscachos *Feuill. obs. III p. 32.*

Viscachos ou Vizchaca *Bon. dictionn. IV p. 615.*

Magnitudo et figura Leporis timidi, cauda longa vulpina. Pili molles, fericei, coloris murini.

Habitat in Peruanis regni frigidioribus. Sub Yncarum imperio villos horum animalium ducebant in fila, quibus pannos nobiles intertexebant elegantiae gratia.

33. HYSTRIX.

Dentes Primores vtrinque II oblique sciffi.

Laniarii nulli.

Molares IV vtrinque supra et infra.

Corpus spinis tectum.

cristata. I. H. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, capite cristato, cauda abbreviata.

Ἵστρίξ *Arist. hist. anim. I c. 7 n. 62. VIII c. 22 n. 181.*

Hystrices *Plin. hist. nat. VIII c. 35 (c. 53 Hard.).*

Ἵστρίξ *Aelian. anim. I c. 31.*

Ἵστρίξ *Oppian. cyueg. III, 391.*

Hystrix *Gesn. quadrup. p. 631 fig. p. 632 bon.*

Hystrix *Aldrov. digir. p. 471 fig. p. 474 mediocr.*

Hystrix *Ionst. quadrup. p. 173.*

Hystrix. Dornschwein. Stachelschwein *Ionst. quadrup. tab. 68 fig. mediocr.*

Hystrix *Mus. Wormian. p. 335.*

Dornschwein *Gesn. Thierb. p. 67 cum fig. mediocr.*

Le Porc - Epic *Perr. anim. II p. 31 tab. 41 fig. bon.*

Porc - épys *Tavern. voy. I p. 344.*

Hystrix *Charlez. exerc. p. 19.*

Hystrix. The Porcupine *Rai. syn. quadr. p. 206.*

Queen - ja *Barbot Guin. p. 114.*

Stachelschweine *Kolbe Vorgeb. p. 166 tab. 6 fig. 6 mediocr.*

Hystrix orientalis cristata *Seb. thes. I p. 79 tab. 50 fig. 1 bona.*

The Porcupine *Shaw trav. p. 249.*

Hystrix manibus tetradactylis, plantis tridactylis, capite cristato *Linn. syst. nat. 2 p. 46.*

Hystrix manibus tetradactylis, plantis pentadactylis, capite cristato *Linn. syst. nat. 6 p. 9 n. 1.*

Hystrix manibus tetradactylis, plantis pentadactylis, capite cristato. The crested Hystrix, with four toes on the fore-feet, and five on the hinder: the Porcupine *Hill anim. p. 528 tab 25 fig. bona.*

Le Porc-épic: Hystrix (. . . .) capite cristato *Briff. regn. an. p. 125 n. 1.*

Hystrix manibus tetradactylis, plantis pentadactylis, capite cristato *Kram. Austr. p. 314.*

Hystrix subcinereus nitens, aculeis longissimis: the Porcupine *Brown. Jam. p. 487.*

Das Stachelchwein mit dem Busche am Kopfe *Hall. vierf. p. 465.*

Hystrix (cristata) palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, capite cristato, cauda abbreviata *Linn. syst. nat. 10, I p. 57 n. 1.*

Porc-épic *Dictiounn. anim. III p. 540 cum congener.*

Gekuisd Stekelvarken: Stekelvarken met de Voorpooten vier-de Agterpooten vyf- Vingerig, een Kuif op den Kop, de Staart kort *Houtt. nat. hist. II p. 354.*

Le Porc-épic *Buff. hist. nat. XII p. 402 tab. 51.*

Autre Porc-épic *Buff. hist. nat. XII tab. 52.*

Porc-épic *Bom. dictiounn. III p. 627 cum congener.*

Hystrix (cristata) palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, capite cristato, cauda abbreviata *Linn. syst. nat. 12, I p. 76 n. 1.*

Stachelchwein mit dem Kopfbusch aus Africa *Knorr delic. II tab. K, 2 fig. 2 mala.*

The crested Porcupine *Penn. syn. quadr. p. 262 n. 193.*

Spinoso *Aless. quadrup. II tab. 87. 88 figg. Buff.*

Das gehaubte Stachelchwein *S. G. Gmelin Reis. III p. 107 tab. 21.*

Das africanische Stachelchwein *Müll. Naturf. I p. 312.*

Spinoso, Porco spinoso, Istrice *Italys.*

Espin, Puerco-espino *Hispanis.*

Porco- espinho *Lusitanis.*

Porc- epic *Gallis.*

Stachelschwein *Germanis.*

Stekelvarken *Belgis.*

Porcupine *Anglis.*

Дикобраз (*Dikobraz*) *Ruffis.*

Tzur-ban *Arabibus.*

Queen-ja *in Guinea australi.*

Longitudo corporis 2 ped. caudae 4 poll. Caput mystacibus longis. Labium superius fissum. Auriculae rotundatae. Nucha aculeis fetisue rigidis tenuissimis, flexilibus, longissimis. Spinae corporis postice ad 9 poll. longae, valde acutae, albo nigroque variegatae, intermixtis pilis rarioribus.

intermediae Crura brevia. Pedes 4-5. Cauda brevis spinis
pinac caudales) albae, obrecta. Testiculi intra corpus latentes.
breves, mucicae, ca-
vae, crassitie pennae asperinae.

Habitat in omni Africa, India, Persia, Palaestina; in Italia atque Hispania exoticae originis.

Mitis, edit fructus, radices, vegetabilia. Die dormit gregaria in cuniculis subterraneis, nocturna. Irata spinas erigit cum murmure, non vero eiaculat in hostes. In globum contracta ne Leonem quidem metuit. Vox Porci grunniens. Parit verno tempore gemellos ad quatuor.

prehensilis. 2. H. pedibus tetradaetylis, cauda elongata prehensili femivada.

Hoitzlacuatzin seu Tlacuatzin spinosus. Hystrix novae Hispaniae *Hernand. Mex. p. 322 cum fig. mediocr.*

Hoitzlaquatzin *Nicemb. hist. nat. p. 154 cum fig. Hernand.*

The Iron Pig *Nicub. Bras. p. 17 fig. p. 18 mediocr.*

Cuandu

Cuandu Brasiliensibus, Lusitanis Ourico cachiero
Marcgr. Brasil. p. 233 cum fig.

Cuandu s. Ourico cachiero. Eyfern Verken *Ionst. quadrup. tab. 60.*

Cuandú. *Pis. Ind. p. 99 cum fig. Marcgr.*

Cuandú maior *Pis. Ind. p. 325 cum fig.*

Hystrix *Bont. Ind. or. p. 54? cum fig. Pison.*

Indianisches Dornschwein *Gesn. Thierb. p. 70 cum figg. Hernand. et Marcgr.*

Hystrix Americanus, Cuanda Brasiliensibus *Marcgr. Rai. syn. quadr. p. 208.*

Cuandu, Chat epineux *Des March. voy. III p. 288.*

Hystrix pedibus tetradactylis, cauda exserta prehensili feminuda *Linn. syst. nat. 6 p. 9 n. 2.*

Hystrix longius caudatus, breuioribus aculeis Porc-épic *Barr. Fr. équ. p. 153.*

Hystrix minor leucophaeus, Gouandu *Barr. Fr. équ. p. 153.*

Hystrix pedibus tetradactylis, cauda exserta feminuda,
 The Hystrix, with four toes on the hinder feet,
 and an exerted, almost naked tail *Hill anim. p. 529.*

Le Porc-épic de la nouvelle Espagne: Hystrix (nouae Hispaniae) aculeis apparentibus, cauda breui et crassa *Briff. regn. an. p. 127 n. 2.*

Le Porc-épic d'Amerique: Hystrix (americanus) cauda longissima, tenui, medietate extrema aculeorum experte *Briff. regn. an. p. 129 n. 4.*

Le grand Porc-épic d'Amerique: Hystrix (americanus maior) cauda longissima, tenui, medietate extrema aculeorum experte *Briff. regn. an. p. 130 n. 5.*

Hystrix (prehensilis) pedibus tetradactylis, cauda elongata prehensili feminuda *Linn. syst. nat. 10, I p. 57 n. 2.*

Stekelarken van Nieuw-Spanje: Stekelvarken met vier-Vingerige Pooten, de Staart lang en aan-

vatbaar, ten halve kaal *Houtt. nat. hist. II p. 359.*

Le Coendou *Buff. hist. nat. XII p. 418 tab. 54.*

Coendou *Bom. dictioun. I p. 619.*

Hystrix (prehenfilis) pedibus tetradactylis, cauda elongata prehenfili feminuda *Linn. syst. nat. 12, I p. 76 n. 2.*

Hystrix longus caudatus, breuioribus aculeis *Fermin Surin. II p. 81.*

The Brasilian Porcupine *Penn. syn. quadr. p. 264 n. 195 tab. 24 fig. 1.*

Cuandu *Aless. quadrup. III tab. 139 fig. Buff.*

Das geschwänzte Stachelschwein *Müll. Naturf. I p. 314.*

Cuandu *Brasilienfibus.*

Longitudo corporis 18 poll. Nasus breuis, obtusus. Labium superius non fissum. Mystaces longae, albae. Infra nasum spinae breues. Auriculae paruae. Oculi fulgidi. Caput supra, dorsum, latera corporis atque basis caudae spinis recta, in dorso postico atque cauda longissimis ad 3 poll. acutissimis, albis, prope apicem nigro annulatis. Pili nulli inter has spinas. Versus ventrem breuiores mollioresque sunt spinae, in pectore autem, ventre atque crurum interiore latere setae ex nigricante fuscae. Pedes 4-4 vnguibus longis: pollicis loco protuberantia. Cauda 18 poll. longa, apice attenuato, longitudine decem pollicum nuda cum pilis rarioribus, prehenfiliis, fortis.

Habitat in Mexico, Brasilia; non in India orientali. Dedit in siluis, fructibus victitans atque auiculis, nocturna. Arbores lente ascendit, descensura cauda ramos circumuoluit, ne labatur. Vox Suis. Mansuescit. Caro alba bona.

dorsata. 3. H. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda mediocri, dorso solo spinoso.

Hystrix pilosus americanus. The Porcupine of North-America *Catesb. Carol. app. p. XXX.*

The Porcupine from Hudson's bay *Edw. birds, I tab.*

52.

Das Stachelschwein welches man by Hudsons Meerbusen antrifft *Ellis Hudf. p. 39 tab. 4 fig. mala.*

Cavia Hudsonis *Klein. quadrup. p. 51.*

Le Porc-epic de la Baye de Hudson: Hystrix (Hudsonis). aculeis sub pilis occultis, cauda breui et crassa *Briff. regn. an. p. 128 n. 3.*

Mus maximus pullus, cauda oblonga pilosa, dorso subsetoso: the large brown Indian Coney *Brown. Lam. p. 484?*

Das verlarvte Stachelschwein von der Hudsons bucht *Hall. vierf. p. 406.*

Hystrix (dorsata) palmis, tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda elongata, dorso solo spinoso *Linn. syst. nat. 10, I p. 57 n. 3.*

Cavia de la baye d'Hudson *Dictionn. anim. I p. 450.*

Stekelvarken van de Hudsons-Baay: Stekelvarken met vier-Vingerige Voor- en vyf-Vingerige Agterpooten, de Staart lang en de Rug alleen Stekelig *Houtt. nat. hist. II p. 360 tab. 19 fig. 1.*

L'Urson *Buff. hist. nat. XII p. 426 tab. 55.*

Urson *Bom. dictionn. IV p. 631.*

Hystrix (dorsata) palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda mediocri, dorso solo spinoso *Linn. syst. nat. 12, I p. 76 n. 3.*

The Canada Porcupine *Penn. syn. quadr. p. 266 n. 196.*

Ursone *Aless. quadrup. III tab. 140 fig. Buff.*

Canada Porcupine *Forster: Philos. transact. LXII p. 374.*

Der Stachelrücken *Müll. Naturf. I p. 315 tab 19 fig.*

I *Houtt.*

Magnitudine Castoris, cui similis figura. Auriculæ breues, pilis occultatae. Caput totumque corpus, vt et crura et cauda supra pilis mollibus, longis, obscure fuscis tecta. Aculei inter pilos in capite supra, dorso et cauda supra, fortes, acuti, longissimi ad tres pollices in dorso. Setae intermixtae, tres pollices longae, apice fordide albae. Cauda subtus alba. Pedes 4-5 unguibus longis, subtus excauatis.

Habitat in omni America boreali vsque ad fretum Hudsonis, vbi copiosissima. Edit fructus corticesque arborum, imprimis Iuniperi et Pini, aestate gemmas ramulososque Salicis. Arborea adscendit. Nidum parat sub radicibus arborum maiorum. Coit Septembri mense, parit initio Aprilis pullum vnicum. Caro bona sapore porcellinae. Aquam horret, bibit tamen; hieme niuem deglutit. Ossa hieme ex viridi flauescunt.

macroura. 4. H. pedibus pentadactylis, cauda longissima: aculeis clauatis.

Hystrix *Bont. Ind. or. p. 54* (Figura autem ad H. prehensilem pertinet).

Porcus aculeatus siluestris seu hystrix orientalis singularis *Seb. thes. I p. 84 tab. 52 fig. 1.*

Hystrix pedibus pentadactylis, cauda exserta *Linn. syst. nat. 2 p. 46.*

Hystrix pedibus pentadactylis, cauda exserta *Linn. syst. nat. 6 p. 9 n. 3.*

Acanthion cauda praelonga, acutis pilis horrida, in exitu quasi paniculata *Klein. quadr. p. 67.*

Hystrix pedibus pentadactylis, cauda exserta. The five-toed Hystrix, with an exerted tail: the East Indian Porcupine *Hill anim. p. 529.*

Le Porc-epic des Indes orientales: Hystrix (orientalis) cauda longissima, aculeis vndique obsita, in extremo paniculata *Briff. regn. an. p. 131 n. 6.*

Das langschwänzige Stachelschwein *Hall. vierf. p. 469.*

Hystrix (macroura) pedibus pentadactylis, cauda elongata: aculeis clauatis *Linn. syst. nat. 10, I p. 57, n. 4.*

Orienteelsch Stekelvarcken: Stekelvarcken met vyfvingerige Pooten, een lange Staart, de Stekels knodswyze *Houtt. nat. hist. II p. 365.*

Hystrix (macroura) pedibus pentadactylis, cauda longissima: aculeis clauatis *Linn. syst. nat. 12, I p. 77 n. 4.*

The long-tailed Porcupine *Penn. syn. quadr. p. 263 n. 194.*

Langschwanz *Müll. Naturf. I p. 316.*

Mystaces longae. Labium superius fissum. Auriculae breues nudaе. Oculi magni, fulgidi. Corpus crassum, pilis acutissimis luce variabilibus colore. Digniti 5-5, pollice retrorsum verso? Cauda longitudine corporis, apice gracillimo, penicillo quasi instructo. Aculei clauati, medio crassiores, coloris argentei.

Habitat in Indiae orientalis siluis.

Miram, quod antecedentis speciei esse putet Buffonius.

34. CAVIA.

Dentes Primores supra et infra II.

Laniarii nulli.

Pedes digitati: digitis 4-3. (At Pacae 5-5.)

Cauda nulla, aut brevis.

Aperea. 1. *C. ecaudata*, corpore ex cinereo rufo.

Cuniculus Indicus, foemina *Aldrov. digit. p. 393 fig. mala.*

Aperea Brasiliensibus, Belgis *Veldratte* vel *Boschratte* *Marcgr. Brasil. p. 223 cum fig. mediocr.*

Aperea Cuniculi species Veldratte *Ionst. quadrup. tab. 63 fig. Marcgr.*

Aperea Pis. Ind. p. 103 cum fig. Marcgr.

Aperea, Cuniculi species, ein Feldratte *Gesn. Thierb. p. 177 fig. Marcgr.*

Cuniculus Brasiliensis Aperea dictus *Marcgr. Rai. syn. quadr. p. 206.*

Cavia, Aperea Klein. quadrup. p. 50.

Lepus auribus breuioribus obtusis. The *Lepus*, with short and obtuse ears: the *Aperea* *Hill anim. p. 526.*

Le Lapin du Brésil: Cuniculus (brasiliensis) ecaudatus, auritus, ex cinereo rufus *Briff. regn. an. p. 149 n. 8.*

Die brasilianische Buschratte *Hall. vierf. p. 404.*

Aperea Dictionn. anim. I p. 144.

Cavia

CAVIAE (rectius **CAVIAE**) barbaro nomine primo vsus Kleinus, post hunc Pallasius. Affines hae *Hystri*. Claviculae nullae, quae adsunt in cognatis reliquis. Capite crasso, breui, retuso. Crebro pariunt, prole numerosa, maxima, perfecta. Victu vegetabili vtuntur. Omnes fere in America degunt.

Cavia Aparea *Dictionn. anim.* I p. 450.

Lapin du Bresil *Dictionn. anim.* II p. 603.

L'Aperea *Buff. hist. nat.* XV p. 160.

The indian Coney, Puccarara *Bancr. Guian.* p. 141.

The rock Cavy *Penn. syn. quadr.* p. 244 n. 177.

Aperea, die brasilianische Buschratte, das brasilianische Kaninchen *Mart. Naturlex.* III p. 4 *cum fig.*

Die brasilianische Maus: Mus Aperea *Müll. Naturf. Suppl.* p. 40.

Longitudo corporis pedis vnus. Caput paullo acutius leporino. Auriculae breues, rotundatae. Labium superius diuisum. Color corporis supra leporinus, in ventre albus. Cauda nulla.

Habitat in Brasiliae speluncis fissurisque rupium. Incessus Leporis; mores Cuniculi, nec tamen fodit terram. Caro proba ob quam capitur cuniculis. Facile mansuescit.

Porcellus. 2. C. ecaudata, corpore variegato.

Porcellus Indicus *Schwenckf. theriotr.* p. 119.

Cuniculus indicus, fortasse Cuitlatepolli *Nieremb. hist. nat.* p. 160 *fig. mala.*

Expressior effigies Cuniculi Indici *Nieremb. hist. nat.* p. 160 *fig. mala.*

Cuniculus indicus *Aldrov. digit.* p. 390.

Porcellus indicus *Aldrov. digit.* p. 391 *fig. mala.*

Cuniculus indicus *Aldrov. digit.* p. 392 *fig. mala.*

Cavia Cobaya Brasiliensibus *Marcgr. Bras.* p. 224 *cum fig. mala.*

Porcellus indicus *Ionst. quadrup.* p. 162.

Cuniculi Indus Gesneri *Ionst. quadrup. tab.* 63 *fig. mala.*

Cuniculus porcellus Indicus *Ionst. quadrup. tab.* 65 *fig. mala.*

Cavia Çobáya *Pis. Ind.* p. 102 *cum fig.* *Marcgr.*

India.

Indianifch Küniglein *Gefn. Thierb. p. 176 cum fig. mediocr.*

Porcellus Indicus fiue Guinenfis *Charlez. exerc. p. 24.*

Mus feu Cuniculus Americanus et Guineenfis, Porcelli pilis et voce, Cavia Cobaya Brafilienfibus dictus *Marcgr. Rai. fyn. quadr. p. 223.*

Porcellus indicus *Rzacz. auct. p. 333.*

Meerfchweinchen *Linn. Westgoth. p. 244.*

Das Meerfchweinlein *Meyer Thiere I tab. 82.*

Mus cauda abrupta, palmis tetradactylis, plantis tridactylis *Linn. fyft. nat. 6 p. 10 n. 1.*

Cavia Cobaya Brafil. quibusdam Mus Pharaonis. Tatu pilofus, Porcellus, Mus indicus *Klein. quadrup. p. 49.*

Mus corpore variegato, cauda nulla. The Mus, with a variegated body, and without a tail: the Guinea-Pig *Hill anim. p. 520 tab. 25 fig. mediocr.*

Mus Porcellus *Linn. amoen. acad. IV p. 190 tab. 2.*

Mus (brafilienfis) cauda abrupta, palmis tetradactylis, plantis tridactylis *Linn. mus. Ad. Frid. Ip. 9.*

Le Lapin des Indes: Cuniculus (Indicus) ecaudatus, auritus, albus aut rufus, aut ex utroque variegatus *Briff. regn. an. p. 147 n. 7.*

Lepus cauda nulla *Kram. austr. p. 315.*

Mus maior albo fuluoque varia, cauda nulla: the Guinea Pig *Brown. Jam. p. 484.*

Das Meerfchweinchen *Hall. vierf. p. 402 tab. 19.*

Mus (Porcellus) cauda nulla, palmis tetradactylis, plantis tridactylis *Linn. fyft. nat. 10, I p. 59 n. 1.*

Cavia Cobaya *Dictioun. anim. I p. 449.*

Lapin des Indes *Dictioun. anim. II p. 602.*

Le Cochon d'Inde *Buff. hift. nat. VIII p. 1 tab. 1.*

Guineefch Biggetje: Muis zonder Staart, de Voorpooten vier - de Agterpooten drie - Vingerig *Houtt. nat. hift. II p. 439.*

The Guiney - Pig *Edw. glean. II tab. 294.*

Cuniculus ecaudatus, auritus, albus aut rufus aut ex utroque variegatus *Gronov. zooph. I p. 4 n. 16.*

Cochon d'Inde *Bon. dictionn. I p. 613.*

Mus (Porcellus) cauda nulla, palmis tetradactylis, plantis tridactylis *Linn. syst. nat. 12, I p. 79 n. 1.*

The restless Cavy *Penn. syn. quadr. p. 243 n. 176.*

Porcellino d'India *Aless. quadrup. II tab. 84 fig. Buff.*

Das Meerſchweinchen *Müll. Naturf. I p. 334.*

Porcellino d'India *Italis.*

Cochino de India, Cochino de Guinea *Hispanis.*

Cochon d'Inde, Cochon de Guinée *Gallis.*

Meerſchweinchen *Germanis.*

Guineefch Biggetje *Belgis.*

Guiny pig *Anglis.*

Swinka Zamorska *Polonis.*

Cuniculo minor: longitudine corporis 10-11 poll.

Caput ovatum, crassiusculum: rostro obtuso, rotundato. Labium superius semifissum, inferius brevius.

Vibrissae plurimae, capite breviores, ad rostrum

Setae circiter tres supra canthum oculi anteriorem, et totidem pone aut fere infra canthum oculi posterioriorem. Nares minimae, curvatae, transversae.

Oculi fusci, prominentes. Palpebrae margine nudo. Auriculae breves, latae, rotundatae, tenues, glabrae. Collum breue. Pili corporis erecti, molles. Color albus aut aurantio nigroque variegatus.

Pedes breves. Cauda plane nulla. Femina mammis duabus inguinalibus. Genitalia externe vix distinguunt sexum.

Habitat in Brasilia, non vero in Guinea; domestica colitur in Europa.

Animal irrequietum, cursitans, loquax, grunniens, sequax, calcitrans; edit panem, frumentum, olera;

vix bibit, Parit 4-12 quouis bimestri, pullos per-

perfectissimos, grauida 3 hebdom. Adolefcit mense fecundo. Mox coit a partu. Mas pullis infestus. Frigoris impatiens. Pellit Rattos. Caro mediocris, esculenta tamen nonnullis.

capensis. 3. *C. ecaudata*, dentibus primoribus infra quatuor.

Dachs *Kolbe Vorgeb. p. 145?*

Murmelthier *Kolbe Vorgeb. p. 159?*

Cauia capensis Pallas miscell. p. 34 tab. 3.

Cauia capensis Pallas spicil. II p. 16 tab. 2.

Cauia (capensis) Linn. syst. nat. 12, III p. 223.

The Cape Cavy *Penn. syn. quadr. p. 247 n. 182.*

Die caapsche Savia *Müll. Naturf. Suppl. p. 48 tab. 3 fig. 1 Pallas.*

Longitudo corporis 10 policum. Caput breue: rostro subconico, compressiusculo, breuissimo, obtuso. Buccae inflatae. Labium superius fetis tribus maioribus nigris, totidemque minoribus; labium inferius vtrinque pilis albidis, parallelis, deorsum versus subciliatum. Gula fasciculo fetarum crassarum, breuium, nigricantium. Dentes primores supra duo distantes, infra quatuor contigui, bis crenati. Molares vtrinque quatuor. Auriculae ouales, patulae, vellere semiabsconditae. Pedes 4-3: digitis connatis plantarumque duobus exterioribus muticis. Abdomen ventricosissimum. Cauda nulla. Vellus rariusculum, tenue lanugineum, intus canescens, extus griseum, in dorso longitudinaliter fuscescens. Setae longiores interspersae, maxime in dorso et ceruice. Cystis fellea nulla. Costae vtrinque 21.

Habitat ad caput bonae spei, vulgaris in locis rupestribus, fodiens. Incessus congenerum. Vox acuta. Caro sapida.

Aguti.

- Aguti. 4. *C. caudata*, corpore ex rufo fusco, abdomine
 flavescente.
Acuti siue Agouti Laet. Amer. p. 551.
Aguti vel Acuti Brasiliensibus Marcgr. Brasil. p. 224
cum fig.
Aguti vel Acuti Cunic. Br. spec. Ionst. quadrup. tab.
63 fig. Marcgr.
Aguti Pij. Ind. p. 102 cum fig. Marcgr.
L'Agouty Rochef. Ant. p. 139.
Aguti vel Acuti. Eine Art Küniglein aus Brasilien
Gesn. Thierb. p. 177 fig. Marcgr.
Mus Siluestris Americanus Cuniculi magnitudine, Por-
celli pilis et voce Rai. syn. quadr. p. 226.
Cuniculus americanus Seb. thes. I p. 67 tab. 41 fig. 2.
Cuniculus omnium vulgatissimus Aguti vulgo Barr.
Fr. équ. p. 153.
Cavia, Aguti vel Acuti Klein. quadrup. p. 50.
Cavia Surinamensis Klein. quadrup. p. 50.
Mus pilis rigidis, cauda breui. The Mus, with rigid
hairs, and a short tail: the Aguti Hill anim. p.
521 tab. 25 fig. Marcgr.
L'Agouty: Cuniculus caudatus, auritus, pilis ex rufo
et fusco mixtus, rigidis vestitus Briss. regn. an. p.
143 n. 2.
Le Lapin d'Amérique: Cuniculus (americanus) cau-
datus auritus, pilis rufis rigidis vestitus Briss. regn.
an. p. 144 n. 3.
Mus maior fusco-cinerefcens cauda truncata: the
small Indian Coney Brown. Lam. p. 484.
Das braune brasilianische Ferkelkaninchen mit kur-
zem Schwanze Hall. vierf. p. 403.
Das surinamische Kaninchen Hall. vierf. p. 405.
Agouti Dictionn. anim. I p. 56.
Cavia Aguti Dictionn. anim. I p. 449.
Lapin d'Amérique Dictionn. anim. II p. 601.
L'Agouti Buff. hist. nat. VIII p. 375 tab. 50.

Cuniculus caudatus, auritus, pilis ex rufo et fusco mixtis, rigidis vestitus *Gronov. zooph. I p. 4. n. 14.*

Agouty *Bom. dictionn. I p. 68.*

Mus (Aguti) cauda abbreviata, palmis tetradactylis, plantis tridactylis, abdomine flavescente *Linn. syst. nat. 12, I p. 80 n. 2.*

Ein brasilisches Thier Aguti *Linné: Act. holmief. 1768 p. 27.*

Aguti *Fermin Surin. II p. 93.*

The longnosed Cavy *Penn. syn. quadr. p. 145 n. 179.*

Aguti *Aless. quadrup. III tab. 113 fig. Buff.*

Das Ferkelkaninchen *Müll. Naturf. I p. 337.*

Aguti *Marz. Naturlex. I p. 653.*

Aguti, Acuti, Cotia *Brasiliensibus.*

Magnitudo Cuniculi. Nasus elongatior quam in C. Porcello. Labium superius diuisum. Auriculae breues, rotundatae. Oculi nigri. Corpus pilis rigidis, rufo-fuscescentibus, abdomine flavescente. Crura fere nuda, gracilia, nigra. Cauda breuis, nuda.

Habitat in Brasilia et Guania.

Erecta sedet cibumque palmis ori admouet; quae non edit abscondit. Vorax. Vox Porcelli. Incessus saliens. Latet in cauis arboribus. Parit duo bis vel ter in anno. Irata iubam erigit, pedibusque calcitrat. Mordax, mansuescit tamen. Caro esculenta.

Acouchy. 5. C. caudata, corpore oliuaceo.

Agouchi *Des March. voy. III p. 287.*

Cuniculus minor caudatus oliuaceus, Akouchy *Barr. Fr. équ. p. 153.*

L' Akouchi *Buff. hist. nat. XV p. 158.*

The olive Cavy *Penn. syn. quadr. p. 246 n. 180.*

Paullo

Paullo minor antecedente, colore oliuaceo.

Habitat vulgaris in Guiana reliquaue America australi. Caro melior praeceidentis carne.

Leporina. 6. *C. caudata*, corpore supra rufo, subtus albo.

The Iava hare *Catesb. Carol. app. tab.* 18.

Cavia lauentis *Klein. quadrup. p.* 50.

Le Lapin de Iava: Cuniculus (lauentis) caudatus, auritus, rufescens, fulco admixto *Briff. regn. an. p.*

142 n. 1.

Der Iavanische Halbhasse *Hall. vierf. p.* 405.

Mus (leporinus) cauda abbreviata, palmis tetradactylis, plantis tridactylis *Linn. syst. nat.* 10, 1 p.

59 n. 2.

Cavia de Iava *Dictioun. anim. I p.* 450.

Lapin de Iava *Dictioun. anim. II p.* 601.

Ronyn van Iava: Muis met een kort Staartje, de Voorpooten vier - de Agterpooten drie - Vingerig *Houtt. nat. hist. II p.* 446.

Mus (leporinus) cauda abbreviata, palmis tetradactylis, plantis tridactylis, abdomine albo *Linn. syst.*

nat. 12, I p. 80 n. 3.

The Iavan Cavy *Penn. syn. quadr. p.* 246 n. 181.

Die Hasenmaus *Müll. Naturf. I p.* 338.

Magnitudo Leporis timidi. Caput paruum, tenue. Oculi magni, prominentes. Auriculae nudae, retundatae. Corpus supra rufum, pectore et ventre albis. Cauda abbreviata.

Habitat in Iava et Sumatra. Mitis. Edit vegetabilia more congenerum.

Forte haud differre a *C. Aguti* *Linné act. holmiensf.*

- Paca. 7. *C. caudata*, pedibus pentadactylis, lateribus
 flavescenti-lineatis.
 Pacae, Pag aut Pague *Laet Amer. p. 551.*
 Pac *Laet Amer. p. 618.*
 Paca *Marcgr. Brasil. p. 224 cum fig. mediocr.*
 Paca. Cunic. *Bras. sp. Ionst. quadrup. tab. 63 fig.*
 Marcgr.
 Paca *Pis. Ind. p. 101 cum fig. Marcgr.*
 Paca. Die dritte Art aufs Brasilien *Gesn. Tbierb. p.*
177 fig. Marcgr.
 Mus Brasiliensis magnus, Porcelli pilis et voce, Paca
 dictus *Rai. syn. quadr. p. 226.*
 Cuniculus maior palustris fasciis albis notatus Pak
Barr. Fr. équ. p. 152.
 Cauia, Paca *Klein. quadrup. p. 50.*
 Mus fuscus cinereo maculatus ventre albente. The
 brown Mus, spotted with grey, and with a white
 belly: the Pica *Hill anim. p. 521 tab. 25 fig.*
 Marcgr.
 Le Pak: Cuniculus (Paca) caudatus, auritus, pilis
 obscure fulvis rigidis, lineis ex albo flavescenti-
 bus ad latera distinctis *Briss. regn. an. p. 144 n. 4.*
 Die grosse brasilianische Maus *Hall. vierf. p. 404.*
 Cavia Paca *Dictioun. anim. I p. 449.*
 Paca *Dictioun. anim. III p. 313.*
 Cuniculus caudatus, auritus, pilis obscure fulvis, ri-
 gidis, lineis ex albo flavescentibus ad latera distin-
 ctis *Gronov. zooph. I p. 4 n. 15.*
 Le Paca *Buff. hist. nat. X p. 269 tab. 43.*
 Paca *Bom. dictioun. III p. 331.*
 Mus (Paca) cauda abbreviata, pedibus pentadacty-
 lis, lateribus flavescenti-lineatis *Lin. syst. nat. 12,*
I p. 81 n. 6.
 Der Paka *Fermin Surin. II p. 108.*
 The spotted Cavy *Penn. syn. quadr. p. 244 n. 178.*
 Paca *Aless. quadrup. III tab. 126 fig. Buff.*

Die brasilianische Kaninchenmaus *Müll. Naturf. I p.*
341.

Pak, Paka *Brasiliensibus.*

Pakiri, Ourana *Guianensibus.*

Corpus longitudine pedis vnius. Maxilla superior longior inferiore. Nares magnae. Mystaces longae. Auriculae breues, ouatae, nudaе. Veruca superciliarum, temporum, gulae. Collum crassum. Corpus pilis breuibus, rudibus, supra fuscum, maculis alboflauescentibus in tres lineas longitudinales dispositis. Venter albus. Cauda abbreviata. Pedes 5 - 5. Mammae duae inguinales duaeque minores pectorales.

Habitat in Brasilia et Guania in locis vliginosis. Fodit subterranea. Non sedet erecta, vti saepe congeneres. Vox Porcelli. Mordax. Capitur canniculis ob carnem delicatulam, valde pinguem.

Varietas niuea iuxta ripas fluminis S. Francisci.

Species obscura.

* Rat musqué *Rochef. Anz. p. 140 cum fig.*

Le Pilori ou rat musqué des Antilles *Buff. hist. nat. X p. 2.*

Pilori *Bom. dictionn. III p. 488.*

The musk Cavy *Penn. syn. quadr. p. 247 n. 183.*

Cauda breuis cylindrica. Magnitudo dupla vel tripla Ratti. Corpus supra nigricans, subtus album.

Habitat in Antillis, fodiens intra terram. Moschum spirat. Differre vtique videtur a Castore zibethico.

35. GLIS.

Dentes Primores vtrinque II.

Laniarii nulli.

Auriculae abbreviatae.

Pedes digitati: digitis 4-5.

Cauda brevis vel mediocris, pilosa.

Marmota. I. G. corpore supra fusco - cinereo, subtus cinereo - flavescente.

Mures alpini *Plin. hist. nat. X c. 65 (c. 85 Hard.)*.

Mures alpini *Agric. an. subt. p. 28.*

Mus alpinus *Gesn. quadr. p. 840 fig. p. 841 bon.*

Mus alpinus siue Marmota *Aldrov. digit. p. 445 cum fig. mediocri.*

Mus alpinus *Ionst. quadrup. p. 168.*

Mus alpinus. Marmota. Murmelthier *Ionst. quadrup. tab. 67. fig. mediocr.*

Marmelthier, Murmentle. Mistbellerle *Gesn. Thierb. p. 267 fig. p. 268 mediocr.*

La Marmotte *Perr. anim. III p. 31 tab. 7 fig. bon.*

Mus alpinus, Marmota *Charlet. exerc. p. 19.*

Mus Alpinus, Mus montanus, Marmota *Wagn. Helvet. p. 179.*

Mus Alpinus *Plin. Marmota Italis Rai. syn. quadr. p. 221.*

Mus alpinus *Rzacz. Polon. p. 233 auct. p. 327.*

Mus alpinus plinii *Linn. syst. nat. 2 p. 47.*

Das Murmelthier *Meyer Thiere I tab. 81.*

Mus cauda elongata nuda, corpore rufo *Linn. syst. nat. 6 p. 10 n. II.*

Mus alpinus *Klein. prodr. av. p. 230.*

Glis Marmota, Italis *Klein. quadr. p. 56.*

Eigentliche Murmelthiere I. G. *Gmel. Sibir. II p. 445.*

Mus

Joh. Stumpfen's Beschreibung der Gnomiden. Zürich 1548. fol. I. II. p. 284

J. G. Altmann's Beschreibung der seltsamen Fische. Zürich 1791. 8. p. 198

Mus cauda elongata nuda, corpore rufo. The Mus, with a long naked tail, and tawny body: the Marmotte *Hill anim. p. 520 tab. 25 fig. bona.*

La Marmotte de Pologne: Glis (*Marmota polonica*) flauicans, capite rufescente *Briff. regn. an. p. 165 n. 6.*

La Marmotte des Alpes: Glis (*Marmota alpina*) pilis e fusco et flauicante mixtis vestitus *Briff. regn. an. p. 165 n. 7.*

Mus cauda elongata nuda, corpore rufo *Kram. Austr. p. 317.*

Das Murmelthier *Hall. vierf. p. 421.*

Mus (*Marmota*) cauda abbreviata subnuda, auriculis rotundatis, buccis gibbis *Linn. syst. nat. 10, I p. 60 n. 4.*

Bobaque *Dictioun. anim. I p. 302.*

Boubak *Dictioun. anim. I p. 322.*

Marmotte de Pologne *Dictioun. anim. III p. 28.*

Marmotte des Alpes *Dictioun. anim. III p. 29.*

La Marmotte *Buff. hist. nat. VIII p. 219 tab. 28.*

Marmeldier: Muis, met een korte byna kaale Staart, rondagtige Ooren en dikke Wangen *Houtt. nat. hist. II p. 455.*

Animals called marmots *Bell trav. I p. 311.*

Bobaque *Bom. dictioun. I p. 307.*

Boubach *Bom. dictioun. I p. 331.*

Marmotte *Bom. dictioun. III p. 33.*

Le Bobak *Buff. hist. nat. XIII p. 136 tab. 18.*

Mus (*Marmota*) cauda abbreviata subpilosa, auriculis rotundatis, buccis gibbis *Linn. syst. nat. 12, I p. 81 n. 7.*

Mus Marmotta *Forster: Philos. transact. LVII p. 343.*

Marmelthiere *S. G. Gmelin Reis. I p. 30.*

The alpine Marmot *Penn. syn. quadr. p. 268 n. 597.*

Marmotta *Aless. quadrup. II tab. 80 fig. Buff.*

Marmotta di Polonia *Aleff. quadrup. IV tab. 157*
fig. Buff.

Die Murmelthiere *Pallas Reif. I p. 96.*

Die ruffifchen Murmelthiere *Pallas Reif. I p. 129.*

Das Murmelthier *Müll. Naturf. I p. 341.*

Die polnifche Maus: Mus Bobak *Müll. Naturf. Suppl.*
p. 40.

Das Murmelthier *Marr. Buff. vierf. IV p. 297 tab.*
80.

Marmota, Marmontana, Varoza *Italis.*

Marmota *Hispanis.*

Marmotte *Gallis.*

Murmelthier *Germanis.*

Marmeldier *Belgis.*

Marmot *Anglis.*

Bobak, Swifzcz *Polonis.*

Сурокъ (Surok), Бабакъ (Babak) *Ruffis.*

Urika *Tungufis.*

Longitudo corporis 16 - 18 poll. caudae 6 poll. Den-
tes primores inferiores apice diuergentes. Mysta-
ces utrinque serie sextuplici. Auriculae paruae,
rotundatae, vestitae, pilis occultatae. Bucca utrin-
que admodum gibba. Verruca supra oculis setis
sex, sub oculis setis septem. Corpus crassum. Pe-
des 4 - 5. Cauda valde pilosa. Caput et dorsum
ex fusco cinereum; corpus subtus et pedes cine-
reo - flavescentia. Sutura a gula ad anum. Cauda
nigra. Variat autem colore, et in Russia atque
Polonia magis rufescit, pedibus 4½ - 5.

Habitat in alpihus Helueticis, Tridentinis, in Polo-
nia, Ukrania, et Tataria sinensi.

Vicitat insectis, radicibus, vegetabilibus. Vigiliis
agit vna, dum reliquae edunt; hisque sono acuto
periculum instans annunciat. Valde pinguescit.

Prc-

Profunde et celerrime fodit; cuniculis camera triplici forma Y cum duplici introitu. Quiescit super muscis. Hibernant 5-12 simul portis densissime clausis ab Octobri mense vsque in Aprilem, alto somno, vt vix excitentur vel in frustra dissectae. Palmis cibum ori admouet. Saepe erecta incedit. Vox acutissima; laeta murmurat. Mansuescit, ludibunda, at mordax. Rebus cibariis, domesticis, vestimentis nocet. Delectatur valde lacte. Parit tres vel quatuor semel in anno. Aetas nouem aut decem annorum. Caro nonnullis esculenta. Canem odit. In Tataria Rhei propagatrix.

Non vere differre videtur Bobak. *de quo v. Anderson in memoirs of the Zoological Society of London T. II. p. 618*

Monax. 2. G. corpore fusco, lateribus ventreque pallidioribus.

The Bahama Coney *Catesb. Carol. II p. 79 tab. 79.*

The Monax *Catesb. Carol. app. p. XXVIII.*

The Monax or Marmotte of America *Edw. birds II tab. 104.*

Cauia Bahamensis *Klein. quadr. p. 50.*

Glis Marmota, Americanus *Klein. quadr. p. 56.*

La Marmote de Bahama: Glis (Marmota Bahamensis) fuscus *Briss. regn. an. p. 163 n. 4.*

La Marmote d' Amerique: Glis (Marmota Americana) fuscus, rostro e cinereo caerulecente *Briss. regn. an. p. 164 n. 5.*

Das langschwänzige amerikanische Ferkelkaninchen *Hall. vierf. p. 405.*

Das amerik. Murmelthier *Hall. vierf. p. 426.*

Mus (Monax) cauda mediocri pilosa, corpore griseo, auriculis subrotundis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Lin. syst. nat. 10, I p. 60 n. 5.*

Cayia de Baham *Dictioun. anim. I p. 450.*

Lapin de Bahama *Dictioun. anim. II p. 603.*

Marmotte de Bahama *Dictioun. anim. III p. 28.*

Marmotte de l'Amerique *Dictioun. anim. III p. 28.*

Muis met de Staart middelmaatig van langte, Hairig, het Lighaam vaal, de Ooren rondagtig, de Voorpooten vier-, de Agterpooten vyf - Vingerig
Hourt. nat. hist. II p. 463.

Le Monax ou Marmotte de Canada *Buff. hist. nat. XIII p. 136.*

Mus (Monax) cauda mediocri pilosa, corpore cinereo, auriculis subrotundis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. syst. nat. 12, I p. 81 n. 8.*

The Maryland Marmot *Penn. syn. quadr. p. 270 n. 198.*

Das amerikanische Murmelthier *Müll. Naturf. I p. 343.*

Magnitudo Cuniculi, vel paullo maior. Rostrum acutius quam in G. Marmota. Nasus cum buccis e caeruleo cinereus. Oculi prominentes, nigri. Auriculae breues, rotundatae. Dorsum profunde fuscum; latera atque venter pallidiora. Cauda longitudine dimidia corporis, pilis longis nigricantibus, subtus nuda. Palmae tetradactylae cum rudimento digiti quinti mutici. Plantae pentadactylae, digito postico breuiore. Pedes nigri.

Habitat in Virginia, Marilandia. Pensiluania, inque insulis bahamensibus.

Vicitat fructibus aliisque vegetabilibus. Hibernat sub cauarum arborum radicibus. Caro sapida, fere Porcelli.

canaden- 3. G. corpore griseo, ventre cruribusque auran-
fis. tiis.

The Quebec Marmot *Penn. syn. quadr. p. 27 n. 199*
tab. 24 fig. 2.

Quebec Marmot *Forster: Philos. transact. LXII p.*
378.

Cuniculo maior (minor Forstero, sed forsan iunio-
rem habuit). Rostrum obtusum. Auriculae bre-
ves, rotundatae. Facies nigricans: naso nigro,
genis griseis. Pili in dorso basi grisei, medio ni-
gri, apice albicantes. Venter et crura aurantia.
Palmae subpentadactylae, plantae pentadactylae.
Digiti nigri, nudi. Cauda brevis, nigricans (api-
ce Forstero).

Habitat in Canada et ad fretum Hudsonis. Man-
fuescit.

Cricetus. 4. G. corpore subtus nigro, lateribus rufescen-
tibus maculis vtrinque tribus albis.

Hamster, quem quidam Cricetum nominant *Agric.*
an. subt. p. 40.

Vormela *Agric. an. subt. p. 42?*

Cricetus *Gesn. quadrup. p. 836 cum fig. mala.*

Porcellus frumentarius *Schwenckf. zberiotr. p. 118.*

Hamster. Kornfärklein *Gesn. Thierb. p. 267 cum*
fig. mala.

Cricetus der Hamster *Clauder: Ephem. nat. curios.*
dec. II ann. 5 p. 376 cum fig. mediocr.

Cricetus *Gesn. Rai. syn. quadr. p. 221.*

Cricetus *Rzac. Polon. p. 232 aut. p. 326.*

Mus Cricetus gesneri *Linn. syst. nat. 2 p. 47.*

Der Hamster *Meyer Thiere II tab. 81, 82.*

Mus cauda elongata, corpore cinereo rutilo nigroque
longitudinaliter vario *Linn. syst. nat. 6 p. 10 n. 10.*

Glis

Glis *Cricetus Klein. quadrup. p. 56.*

Mus dorso rutilo, ventre nigricante. The Mus, with a reddish brown back, and black belly: the *Cricetus Hill anim. p. 519.*

La Marmotte de Strasbourg: Glis (*Marmota Argenteratensis*) ex cinereo rufus in dorso, in ventre niger, maculis tribus ad latera albis *Briss. regn. an. p. 166 n. 8.*

Mus cauda elongata, corpore cinereo rutilo nigroque longitudinaliter vario *Kram. Austr. p. 317.*

Der Hamster *Hall. vierf. p. 424 tab. 23.*

Mus (*Cricetus*) cauda subabbreviata, auriculis rotundatis, corpore subtus nigro, lateribus rufescentibus *Linn. syst. nat. 10, I p. 60 n. 6.*

Hamster *Dictionn. anim. II p. 385.*

Marmotte de Strasbourg *Dictionn. anim. III p. 30.*

Hamster: Muis met een kortagtige Staart, de Ooren gerond, het Lighaam van onderen zwart, aan de Zyden rosagtig *Houtt. nat. hist. II p. 464.*

Hamster *Bom. dictionn. II p. 416.*

Le Hamster *Buff. hist. nat. XIII p. 117 tab. 14.*

Mus (*Cricetus*) cauda mediocri, auriculis rotundatis, corpore subtus nigro, lateribus rufescentibus maculis tribus albis *Linn. syst. nat. 12, I p. 82 n. 9. et addend. Tom. II.*

Der Hamster *S. G. Gmelin Reis. I p. 33 tab. 6 fig. mediocr.*

Hamster *Pallas Reis. I p. 128.*

The German Marmot *Penn. syn. quadr. p. 271 n. 200.*

Criceto Aless. quadrup. IV tab. 156 fig. Buff.

Der Hamster *Müll. Naturf. I p. 344.*

Der Hamster *Sulzer monogr. cum fig. bon.*

Hamster *Germanis.*

Krietsch *Austriacis.*

Skrzéczek, Chomik, Mysz wielka ziemna *Polonis.*

Хомяк (Chomãk) *Ruffis.*

Раконь, Urge Hungaris.

Karbusch

Karbulch circa Simbirsk.

Longitudo corporis 9-10 pollicum, caudae 2 poll. Bucca vtrinque faccata. Mystaces nigrae. Auriculae magnae, rotundatae. Oculi nigri. Color capitis et dorsi ex rufo fuscus. Genae albae. Infra vtramque aurem macula alba, aliaque in quovis humero, et tertia prope crura posteriora. Ad latera dorsi vtrinque macula depilis setosa. Pectus cum cruribus anterioribus supra, et ventre nigrum. Cauda brevis, subnuda. Pedes breves. Palmae digitis quatuor cum ungue pollicari, plantae digitis quinque. Cystis fellea nulla.

Varietas nigra, pedibus, ore et auricularum margine albis, fig. in titulo monographiae Sulzerianae. Est quoque vulgaris in desertis australioribus regni Ruffici.

Habitat in Germania, Polonia, Vkrania, in locis arenosis.

Cavernas fodit, senior profundiores, sub terra, plurimis concamerationibus, duplici foramine, altero obliquo aditu, altero perpendiculari. Colligit frumentum, pisa, fabas, fructus, in distinctis cameris seruanda distincta atque singula; adportat ea nocturno tempore in bucca. Raro potat. Parit bis vel ter in anno super stramine sex ad duodecim pullos coecos, itidem in propria camera nutriendos, uti etiam sterquilinum in distincta. Iracundus et mordax. Latrat. Hibernat subterraneus somno profundo.

Capitur ob carnes, pelles, frumentum collectum; occiditur puluere Veratri farina et melle in panes cocti.

tſcherkeſ-

tscherkef- 5. *G. corpore castaneo.*

ficus. Thierchen die die Einwohner zu den Feldmäusen rechnen *Schober: Müll. Samml. VII. p. 124.*

The Circassian Marmot *Penn. syn. quadr. p. 278 n. 205.*

Magnitudo Criceti. Auriculae murinae. Oculi rubri splendentes. Dentes acuti. Corpus longum, crassitie aequalis, pilis castaneis, longis, praecipue in dorso, vestitum. Ungues acuti. Cauda sat longa, pilosa. Pedes antici breuiores posticis.

Habitat ad fluuium Terek. Fodit subterraneus. Celerime ascendit montem, tarde descendit.

Citellus. 6. *G. auriculis nullis.*

Mus Noricus quem Citellum appellant Agric. an. subr. p. 33.

Mus noricus vel Citellus Gesn. quadrup. p. 835.

Citellus Schwencckf. zheriotr. p. 86.

Citellus Aldrov. digit. p. 436.

Bilchmaufz Gesn. Thierb. p. 266 cum fig. mala.

Mus Noricus vel Citillus Gesn. Rai. syn. quadr. p. 220.

Mus noricus Rzacz. Polon. p. 235 auct. p. 327.

Mus noricus vel Citrellus Linn. syst. nat. 2 p. 47.

Mus cauda breui, capite inauri Linn. syst. nat. 6 p. 10 n. 3.

Mus Noricus vel Citillus Gesneri Klein. quadrup. p. 56.

Ievraschka I. G. Gmelin Sibir. II p. 443.

Mus corpore longiore, cauda breui. The Mus, with a long body, and short tail: the Citille Hill anim. p. 519 tab. 25 fig. mala.

Le Lapin d'Allemagne: Cuniculus (germanicus) caudatus, auriculis nullis, cinereus Briss. regn. an. p. 147 n. 6.

Alina M. ... Steller Kamtsch. Die

Die langgestreckte, schwächige Zieselratte *Hall. vierf.*

p. 424.

Lapin d'Allemagne *Dictionn. anim. II p. 602.*

L'animal de Sibérie, que les Russes appellent Ievraschka *Buff. hist. nat. XIII p. 137.*

Mus (Citellus) cauda abbreviata, oorpore cinereo, auriculis nullis *Linn. syst. nat. 12, I p. 80 n. 4.*

Le Ziesel *Buff. hist. nat. XV p. 139.*

Le Souslik *Buff. hist. nat. XV p. 144, 195; 205. Supplem. T. III.*

Mus Suslica *Güldenstädt: Nov. comm. petrop. XIV p.*

389 tab. 7.?

Mus Citillus *Pallas: Nov. comm. petrop. XIV p. 549*

tab. 21 fig. 1, 2.

Orientalischer Hamster *S. G. Gmelin Reis. I p. 30*

tab. 5?

The Casan Marmot *Penn. syn. quadr. p. 273 n. 201*

tab. 25 fig. 1.

The earless Marmot *Renn. syn. quadr. p. 276 n. 203.*

Mus (Citellus?) cauda mediocri pilosa, pedibus pentadactylis, auriculis obsoletis *Linn. mant. II p.*

523?

Zieselmaus *Pallas Reis. I p. 51, 129.*

Polnische Maus *Müll. Naturf. I p. 339.*

Die Zieselratze *Müll. Naturf. Suppl. p. 39.*

Sifel *Bobemis.*

Gözü Hungaris

Sufel *Polonis.*

Сусликъ (Suslik) *Ruffis.*

Степная кошка (Stepnija koschki) *in prouincia*

Isetenfi.

Iemuranka, Avraschka, Ievraschka *in Sibiria.*

Szymron *Tataris.*

Simral, Imral *Morduanis.*

Zurrma *Calmyccis.*

Sumura *Barütis.*

Corpus magnitudine Sciuri, longitudine decem pollicum, caudae circiter trium pollicum. Femina

paulo

paullo minor. Caput minus depressum quam in Marmota; rostrum magis conicum, parotides minus gibbae et collum tenuius. Nasus nigricans, conexus, pubescens; nudus tantum circa nares lunulatas, septo canaliculato diremtas. Labium superius vsque ad nasum bipartitum. Buccae subsinuatae, auellanae maxime in femina capaces. Dentes primores superiores conuexi, parum lutescentes (vix in feminis), truncati; inferiores albi, apice attenuato-rotundati. Molares supra vtrinque quinque, infra quatuor (Güldenst. et S. G. Gmelin). Mystaces nigrae, capite breuiores, minus ordinatae, quinque fere ordinibus, per latera rostri conuexa sparsae. Supra oculum anterius setae nigrae quatuor, serie transuersa; setae paroticae itidem transuerso ordine quatuor, vt in Marmota. Sub gula verrucula fetis tribus tenellis albis. Seta longa solitaria in medio antibrachii exterius. Oculi magni, prominuli: irides brunneo-fuscae; pupilla maiuscula, etiam ad lucem longitudinaliter ovalis. Periophthalmii loco caruncula canthi vnguiformis, fusca. Auriculae nullae: meatus auditorii nudi, anfractuosi, posterius margine crasso, piloso cincti, quale refectae auriculae cicatrice obductum vestigium in canibus fricatoribus esse solet. Corpus reptabundum, depressum, minus ventricosum quam Marmotae, flexile et per angusta spatia facile penetrans. Pellis tenuis, laxa, praesertim ad armos atque femora. Artus tenuiores quam in Marmota. Palmae tetradactylae cum vnguiculo pollicari conico, insigniter prominulo, magis quam in Marmota ruthena. Plantae pentadactylae, digitis tribus mediis subaequalibus. Ungues nigri, compressi, acuti, in palmis longiores. Cauda artubus posticis breuior, linearis subannulata (vti Muribus), sed pilosissima villisque longis in latum sparsis sciureae aemula,
maxime

maxime cum expandat illam iracundum animal. Vellus breue, laxum, satis molle: vertex pilis fuscis, extus albicantibus canescit; sed nasus, latera rostri, tractus supraciliares et oculorum cum genis, auriumque ambitus ex luteo ferruginei; intensiusque nasus, supercilia et macula sub oculo utroque. Corpus supra totum pilis extremo albidis, annulo fusco notatis, imo griseis mixtipile canescens aliqua flauedine. Corpus subtus e flauescente album, vellere rudiori vestitum, sed collum ante arcos, et pedes quatuor latea. Caudae villi corpori concolores, vnde ex luteo extus albicat, fusco immixto. Feminae dorsum paullo magis lutescens, cauda villosior. Papillae a sinu axillari ad inguina utrinque octo aequidistantes, praeter inguinales viciniores. Glandulae distinctae lactiferae ad singulam papillam. Scrotum masculis nudiusculum, fuscum. Anus ut in Marmota compresso ventre papillis tribus conicis extrorsum riget, quae in statu contractionis totidem sinus sebaceos intra ipsum marginem orificii constituant. Cystis fellea masculula. Penis officulo incuruo fultus. Testes maximi. Clitoris feminis papillaris, terminata officulo vnguiformi denticulato minutissimo.

Habitat in campestribus elatis, apricis, aridiusculis, Russiae et Sibiriae australioris copiosus; copiosissimus in desertis trans Wolgam. Est quoque in Bohemia, Austria, Hungaria, Polonia,

Vicitat tenerioribus plantulis et succulentioribus vegetabilibus insipidis. Caro Calmyccis in deliciis est. Autumno pinguescit. Putorii et Ermineae praeda. Antra fodit unico introitu cum camera oblonga, subpedalis diametri, culmis graminis ficcis comminutis molliter strata. Ereptus circum

spicit, viso hoste. sono fistulante intra cuniculum ruit. Facillime manfuefcit. Currit saltabundus. Caput lauat palmis linguâ humefactis. Iracundus grunnit. Parit 25 - 30 a coitu die initio Maii mensis nudos pullos coecosque informes tres, quatuor, sex, celerrime adolefcetes. Bibit lambendo et parciffime vt Felis aquam, vrinamque propriam. Lacticia perdite amat. Hibernat claufo antro, ab initio Septembris mensis pinguiiffimus pigerrimusque in initium Aprilis, vbi macilentiffimus.

Varietas duplex: altera a gradu 56 vel 57 latitudinis borealis in defertis ad Wolgam vsque ad Tannain ad gradum 53, minor, longitudine corporis 9 poll. caudae lin. 14; vellere magis grifeo, pulcherrime maculofo fine guttrato; ambitu oculorum albefcentè, nâfo pallide luteo, litura infrâ oculum lunata intente ferruginea; cauda breuiore tereti pilofiffima, pilis breuibus ftrictis: altera fupra defcripta, trans Wolgam ad austrum degens, maior vellere ftrictico e cano fufcoque mixto fubflaufcens, cauda paulo longiore villisque longioribus cristata.

The Cafan Marmot Pennanti non videtur differre.

Zemni. 7. G. corpore profunde grifeo.

Dierte Zits-Ian Bruin. Reiz. p. 430 fig. p. 431.

Caniculus fubterraneus Rzacz. auct. p. 325.

Le Zemni Buff. hift. nat. XV p. 142.

The Podolian Marmot Penn. fyn. quadr. p. 277 n. 204.

Piefok ziemny Polonis.

Sczeniuk zemny Ruffis.

Magnitudo Sciuri. Caput magnum, rostro breuiore. Dentos primores inferiores dimidio breuiores superioribus. Oculi minuti, pilis occultati. Auriculae breues, rotundatae. Corpus gracile. Pili corporis molles, coloris murini. Pedes breues. Palmae digitis quatuor cum ungue pollicari, plantae digitis quinque. Cauda breuis.

Habitat in Podolia, Vkrania, Volhinia, Persia. Granaria colligit pro hieme; victitat frumento, fructibus, oleribus. Hieme subterraneus latet. Mordax.

Lemmus. 8. G. corpore fuluo nigroque vario.

Leem vel Lemmer *Gesn. quadrup.* p. 828.

Lemmar vel Lemmus *Ol. Magn. sept.* p. 617.

Murium multitudo de nubibus demissa *Ol. Magn. sept.* p. 726.

Bestiola Leem dicta *Aldrov. digit.* p. 436.

Bestiola Olao Leem dicta *Ionst. quadrup.* p. 168.

Mus Noruagicus *Mus. Worm.* p. 321 *fig.* p. 325
bona.

Wormii monogr.

Norwegische Maus *Gesn. Thierb.* p. 275.

Bestiae minutae Lemmus dictae *Scheff. Lapp.* p. 344.

Ein sonderlich rauch Thierlein *Olear. Gott. Kunstk.*
p. 20 *tab.* 12 *fig.* 6 bona.

Mus Noruagicus *Charlet. exerc.* p. 25.

Mus Noruagicus vulgo Leming *Rai. syn. quadr.* p.
227.

Mus noruagicus Leming vel Lemend dictus *Iacob. mus. reg.* p. 6.

Thiere von denen in Norwegen gesagt wird, das sie aus den Wolken kommen *Linné: Act. holmiens.*
1740 p. 75 *tab.* 6 *fig.* 4, 5 Worm.

Mus noruegicus vulgo Lemming *Linn. syst. nat.* 2
p. 47.

Mus cauda brevis, corpore fulvo nigroque variegato
Linn. fn. succ. I p. 10 n. 26.

Mus cauda abrupta, corpore fulvo nigroque vario
Linn. syst. nat. 6 p. 10 n. 2.

Mus Lemingus, Noruagicus *Klein. quadrup. p. 58.*

Mus cauda brevis, corpore fulvo nigroque variegato.
The short-tailed Mus, with a body variegated
with black and tawny: the Leming Hill anim.
p. 515.

Le Lapin de Norwege: Cuniculus (Noruegicus) cau-
datus, auritus, ex flavo, rufo et nigro variegatus
Briff. regn. an. p. 145 n. 5.

Die Norwegische Maus Leming *Hall. vierf. p. 436.*

Norwegische Bergmaus. Leming *Hall. vierf. p. 603.*

Mus (Lemmus) cauda abbreviata, pedibus pentada-
ctylis *Linn. syst. nat. 10, I p. 59 n. 3.*

Lemmar ou Leming *Dictionn. anim. II p. 609.*

Lapin de Norwege *Diction. anim. II p. 601.*

Lemming: Muis met een kort Staartje, de Pooten
vyf-Vingerig *Houtt. nat. hist. II p. 446 tab. 20*
fig. 1. Wormij.

Mus (Lemmus) cauda abbreviata, pedibus pentada-
ctylis, corpore fulvo nigroque variegato *Linn. fn.*
succ. 2 p. 11 n. 29.

Leming ou Lemmar *Bon. dictionn. II p. 657.*

Le Leming *Buff. hist. nat. XIII p. 314. —*

Mus (Lemmus) cauda abbreviata, pedibus pentada-
ctylis, corpore fulvo nigro-vario *Linn. syst. nat.*
12, I p. 80 n. 5.

The Lapland Marmot *Penn syn. quadr. p. 274 n.*
202 tab. 25 fig. 2.

Der Lemming *Müll. Naturf. I p. 339 tab. 20 fig.*
1 Worm.

Mus (Lemmus) cauda abbreviata, pedibus pentada-
ctylis, corpore fulvo nigro-vario *Müll. Dan. prodr.*
p. 4 n. 26.

Lemœn, Leming *Noruegis.*

Godde Sapan *Lapponibus danicis.*

Fiällmus, Sabelmus *Succis.*

Lummick *Lapponibus suecicis.*

Longitudo corporis quinque pollicum, caudae pollicis dimidii. Caput antice acuminatum. Dentes primores vtrinque duo valde longi. Mystaces longae, pilis sex longioribus et fortioribus reliquis vtrinque. Oculi minuti, nigri. Os paruum. Labium superius diuisum. Auriculae paruae, obtusae, retrorsum versae. Crura antica breuissima. Palmae digitis quatuor gracilibus pilosis curauingue pollicari; plantae digitis quinque. Cutis tenuissima. Pili molles. Caput et corpus nigro fuluoque irregulariter maculatum. Venter subflauescens albus. Maminae octo.

Habitat in Lapponiae et Noruegiae alpibus, sub tuberibus terrae.

Gregatim fugiunt innumeri periodis incertis ex alpi-
bus, recta via per ipsa flumina lacusque iter insti-
tuentes omnesque obuias herbas deuoraturi. Edunt
Lichenem rangiferinum, amenta Betulae nanae;
non carnes. Dicunt mori pecora, quae gramen
edunt tactum a Lemmo. Mordax animal, latrans,
cursu celer; Voratur a Canibus Lagopodibus, Lyn-
ce, Erminea, nunquam in patriam rediturum,
olim ex nubibus depluere creditum. Parit quinque
vel sex.

migrato- 9. G. corpore supra cinereo, subtus candido;
rius. Mus migratorius *Pallas Reis. II p. 703.*

Die Zugmaus *Müll. Naturf. Suppl. p. 43.*

Magnitudo supra Murem terrestrem, habitus diuer-
sissimus. Rostrum crassum, carnosum, obtusum;

facci buccarum vsque ad humeros protensi vt in Criceto. Dentes primores minusculi, lutescentes. Mystaces exiles. Auriculae reclinatae, nudiusculae, ouatae, apice rotundato posteriusque finu obsoletissimo exciso. Corpus breue, crassum. Palmae tetradactylae cum vestigio pollicis obsoletissimo, inermi. Cauda breuissima, cylindrica, subpilosa. Color supra griseo - cinereus, vniformis, subtus candidus; rostri quoque extremum circa nares, pedesque extremi albi. Longitudo animalculi fere quatuor pollicum, caudae vix octo linearum.

Habitat in graminosis ad Iaicum, diciturque certis annis copiosissime e desertis aduentare, insequente insigni Vulpium copia, quorum iis annis felicior venatio.

baraben- 10. G. corpore griseo - lutescente subtus albido, fis. stria dorsali nigra.

Mus barabensis *Pallas Reis. II p. 704.*

Die Obymaus *Müll. Naturf. Suppl. p. 44.*

G. arenario toto habitu maxime similis, vixque maior. Rostrum subacutum. Dentes primores fulvescentes, Sacci buccarum amplissimi. Auriculae maiusculae, fuscae, limbo albido. Palmae tetradactylae, pollicis rudimento vix vilo. Cauda paullo longior quam in G. arenario, tenuis, subattenuata, supra fusca, subtus albida. Color corporis supra lateribus griseo - lutescens, pilis murinis mixtus; taeniola nigra spinali a vertice fere vsque ad caudam. Subtus fordide albet. Annuli lati fusci circa tarsos pedum. Longitudo corporis 3 poll. 10 lin. cauda pollicis vnus.

Habitat in arenosis ad Ob fluium. Interdiu vagatur. arena-

arenarius. 11. G. corpore supra cano, subtus podibusque caudaque albis.

Mus arenarius *Pallas Reis. II p. 704 tab. B fig. superior.*

Die Sandmaus *Müll. Naturf. Suppl. p. 44.*

G. oeconomico paullo maior, agilior, elegantior; rostro argutiore, cauda longiore magisque attenuata. Auriculae maiores, ouales, pubescentes. Dentes primores lutescentes. Nasus acutus. Buccae faccis amplissimis, per colli latera dilatatis, Palmae subpentadactylae, rudimento pollicis minutissime unguiculato. Cauda tenuis, recta, nudiuscula, attenuata. Color supra et in lateribus uniformis canus, pilis fuscis immixtis; subtus candidissimus. Cauda tota et pedes alba. Longitudo animalculi 3 poll. 8 lin. caudae 10 lin.

Habitat ad Irtim in australibus; in collibus arena fluctuante congestis, ubi profundo cuniculo biforisque nidulatur. Victum quaerit ex Astragalis variis, praesertim Astragali physodis feminibus, quae leguminibus arrosis dexterrime haurit, facculisque buccarum in nidum congerit. Parit G. oeconomico maturius, paucioresque pullos. Nocte tantum vagatur. Vox irato Criceti.

Lagurus. 12. G. auriculis vellere brevioribus, corpore supra cinereo subtus albo, stria dorsali nigra.

Mus Lagurus *Pallas Reis. II p. 704.*

Der Rauhschwanz *Müll. Naturf. Suppl. p. 45.*

Magnitudo fere Muris terrestris, quo brevior omnibus partibus. Rostrum obtusissimum, hirsutiae tumidulis labiis. Mystaces exiles. Auriculae multo minores quam in Mure terrestri, vellere plane non

exsertae, rotundatae nudiusculae. Corpus ventricosum. Artus exiles, tenues. Palmae subpentadactylae, verruca cornea loco pollicis. Cauda brevissima omnium congenerum, vix vellere exserta, hirsuta, truncata. Color supra dilutus murino-cinereus, striga nigra inter oculos incipiens, per dorsum ad caudam vsque ducta. Subtus corpus, itemque artus sordide et e cinerascens alben. Longitudo animalculi 3 poll. 8 lin. caudae 2½ lin.

Habitat rarius ad Iaicum australiorem, copiosissimus in campis arenosis herbidis ad Irtim, inque deserto tatarico, cuniculis simplicibus aut biforibus latitans. Imbelle animalculum, attamen mordacissimum. Pluries anno parit, primo iam vere pullificans. Herbas varias depascitur, feminaque.

oeconomicus. 13. G. corpore cinereo lateribus variegatis, striga dorsali nigra.

Mus sungorus *Pallas Reisf. II p. 703 tab. B fig. 2.*

Die Hamstermaus *Müll. Naturf. Suppl. p. 43.*

Kutuguna *Tungusis*

Kutgun *Burätis.*

Forma tota Criceto simillimus, sed magnitudine infra Muræm terrestrem. Caput breviculum, buccatum. Mystaces copiosissimae. Dentes primores lutescentes. Buccae sacco vtrinque maximo, ad humeros vsque dilatato. Auriculae ovales, nudiusculae. Palmae tetradactylae, rudimento pollicis mutico. Corpus et artus brevicula. Cauda brevissima, teretiuscula. Color in dorso et vertice cinereus, striga nigra a nucha ad caudam fere ducta, spinali. Latera versicoloria, areis subintranibus albis, liturisque fuscis interiectos angulos ad dorsum occupantibus, quarum prior ab auribus ad scapulas flexuosa,

sa, altera triangularis ante femora, vitima per clunes descendens, inter quam et angulum cinereum versus caudam excurrentem itidem aegolae intercedunt albae. Subtus omnia, pedes quoque et apex caudae albescent. Longitudo animaculi trium pollicum, caudae $4\frac{1}{2}$ lin.

Habitat in campis elatis, aridis, australioribus ad Irinim. Canicali multiloculares, canali longo, prope superficiem terrae decurrente: Masculis simplicior. Parit Junio feros vel septenos pullos cito adolentes. Vagatur interdum.

36. SPALAX.

Dentes Primores vtrinq̄ II, cuneiformes, plani.

Laniarii nulli.

Oculi minuti.

Auriculae nullae.

Pedes pentadactyli.

Cauda nulla s. breuissima.

maior. I. S. rostro elongato attenuato.

Spalax microphthalmus *Güldenstädt: Nou. comment. petrop. XIV p. 411 tab. 9.*

Mus oculis minutissimis, auriculis caudaque nullis, corpore rufo cinereo *Lepechin: Nou. comment. petrop. XIV p. 504 tab. 15 fig. 1.*

Eine besondere Mausart *S. G. Gmelin Reis. I p. 131 tab. 22 fig. mala.*

Слепецъ (Slepetz), Слепышокъ (Slepyfchok.) *Ruffis.*

Longitudo corporis 8 - 8½ pollicum. Caput productum, quasi pyramidale, antice attenuatum in rostrum cartilagineum. A naribus vsque ad meatum auditorium lateribus vtrinque linea prominens, durior, pilis rigidis setaceis obsita, quae musculus rostrum expandens. Mystaces sparsae supra et infra hanc lineam plurimae, inferius longiores. Apex nasi sat latus, durior, nudus. Nares rotundae, angustae. Rictus oris paruus, quasi perpendicularis. Labium superius oblique versus inferiora atque posteriora descendens. Labium inferius multo breuius, dentes non tegens. Lingua carnosa, crassa, plana, obtusa, laeuis. Dentes primores vtrinque duo, cuneiformes, inferioribus longioribus. Laniarii nulli. Molares remoti, vtrinque tres, truncati, subcylindrici, minimi, vix e gingiuis prominentes. Oculi minutissimi vix granum papaueris aequantes, nigri, non nisi cute detracta detegendi. Auriculae nullae, meatu auditorio pilis tecto, angusto. Frons decliuus. Collum breue, vix distinctum. Truncus sat crassus, elongatus, cylindricus. Dorsum subgibbum. Cauda nulla, eiusque loco tuberculum paruum. Pedes breues pentadactyli: palmae digitis fissis, plantae semipalmatis. Ungues rectiusculi, obtusi, in plantis longiores. Pili totius corporis molles, basi ex nigro cinerei, apice rufescentes. Nasus cute nigra tectus, apice albicante. Taenia supra nasum per frontem ad 6 lin. excurrente. Macula magna alba in iugulo atque ante pedes posteriores in abdomine cruciformis alba, trabe transuersa vsque ad lumbos excurrente. Vibrissae albae. Mammae duae inguinales, in mare non apparentes secundum *Göldenstädtium*.

Talpam fibricam versicolore[m] Sebae (Talpam asiatricam, *vid. pag. 120*) esse putat *godissi*. *Güldenstädtius*: vix tamen videtur.

Habitat ad Wolgam a Sysran vsque ad Zaryzyn: in campis apricis vastissimis desertis Tanaicensibus ac in vicis hortisque vicinis frequentissimus. Proxime sub terrae superficie fodit canales rostri ope Talpae instar, in medio nidum relinquens, in quo lectum ex graminibus conficit. Hieme profundius latet intra terram. Incessus tradissimus. Vicinat gramine, radicibus, praesertim aromaticis umbelliferarum. Vox pipiens. Coit aestate. Parit pullos duo ad quatuor. Pulicibus obnoxius, non pediculis.

minor. 2. S. rostro abbreviato.

Mus talpinus *Pallas: Nou. comment. petrop. XIV p. 568 tab. 21 fig. 3.*

Slepuschtschonka (id est: coecus), Semljaroika (id est: fossor terrae) *Ruffis*.

Magnitudine Muris amphibii: longitudine corporis $3\frac{3}{4}$ poll. caudae 4 linearum; ponderis drachmarum decem. Similis nonnihil Muris amphibii. Caput grande, subrotundum. Rostrum brevissimum, crassum, retusum, lateribus hirsutissimum. Nasus planus, non productus, truncatus, didymus, fuscus, nudus. Nares connuentes, distantes. Labium superius vsque ad nares late bipartitum, hians, dentesque superiores vsque ad basin detegens, ab utroque latere tumidulum, pubescens, intraque os connuens et coiens, palato pone dentes primores deficiente. Labium inferius, crassum, dentes vaginans. Dentes primores superiores denudati, quasi extra os porrecti, magni, interius

terius plani, lataque acie terminali rotundata. Mystaces nigrae, breues, deorsum vergentes, per hirsuta latera rostri sparsae quinque fere ordinum. Pandum supraoculare tripile, paroticum et gulare unipilia; pili sparsi per inferioris labii ambitum. Oculi vertici et naso propiores, minutissimi, vellere ferme latentes, nigri. Aurium apertura mediocris, vellere obumbrata, posteriori margine prominulo cincta. Corpus breue, ventricosum. Artus breues, robustissimi. Pedes nudiusculi, albidii, omnes pentadactyli, digitis subquamatis. Palmae maiores, latae, fossoriae, digitis interioribus sensim longioribus praeter pollicem breviorum. Palmae plantaeque exterius ad digitum usque pilis rigidis, deflexis, crebris, ciliatae. Cauda breuissima, teres, truncata, vix alto vellere clunium eminens. Vellus murinum, tenerum, molle, circa clunes et caput densissimum sub armis et in ventre rariusculum aestate, hieme vero ubique largum. Color capitis, praesertim circa rostrum, subater, mento albedo; reliqui corporis supra fusco griseoque mixtus murinus; versus latera, magisque subtus et in artubus canescens. Interdum totum animal atrum. Genitalia exilia.

Habitat in regionibus australioribus Russiae ad occidentem Wolgae sitis, sub terra continuis cuniculis incedens et magnos cumulos agens. Etiam Germaniae nonnullis regionibus inquilinum (sub nomine *Reitmaus*), teste doctissimo Pallas.

Delectatur Phlomidis tuberosae et Lathyri tuberosi radicibus, aliisque victitans radicibus. Noctu praesertim fodit. Parat nidum subterraneum e gramine molli verno tempore pro pullis. Hieme latet sub foeni aceruis vel in profundioribus cuniculis intra terram. Vox nulla.

37. M V S.

Dentes Primores vtrinque II; inferiores subulati.

Laniarii nulli.

Pedes digitati: digitis 4-5.

Cauda gracilis, subnuda.

noruegi- i. M. cauda elongata, palmis tetradactylis cum
cus. vnguiculo pollicari, corpore rufo.

manus. Pouchi Rufforum Rzacz. auct. p. 329?

Mus ex Norwegia cinereo fuscus *Seb. thes. II p. 64*
tab. 63 fig. 5.

Glis Noruagicus *Klein. quadrup. p. 56.*

Le Rat de bois: Mus (filaestris) cauda longissima,
supra dilute fuluus, infra albicans *Briff. regn. an.*
p. 170 n. 3.

Le Rat de Norvége: Mus (noruegicus) cauda lon-
ga, ex dilute cinereo fuscus *Briff. regn. an. p.*
173 n. 8.

Die grauschwärzliche Norwegische Ratte *Hall. vierf.*
p. 424.

Rat de bois *Dictionn. anim. III p. 661.*

Rat de Norwege *Dictionn. anim. III p. 662* (con-
fundit hanc cum Glire Lemmo).

Le Surmulet *Buff. hist. nat. VIII p. 206 t. 27.*

The Norway Rat *Penn. brit. zool. p. 47 cum fig. bona.*

Rat des bois *Bom. dictionn. III p. 716.*

Surmulet *Bom. dictionn. IV p. 279.*

Le Pouc *Buff. hist. nat. XV p. 143?*

The brown Rat *Penn. syn. quadr. p. 300 n. 227.*

Die

Caudam elongatam in hoc genere dico, quae est longitudine cor-
poris vel ultra; *mediocrem*, quae breuior est.

Die große Waldratte. Sürmülot *Mart. Buff. vierf.*
IV p. 291 tab. 79.

Paullo maior Ratto, cui similis; longitudine corporis
9 pollicum, cauda longitudinis eiusdem. Caput,
dorsum et latera pallide ex rufo-fusca, pectus et
venter fordide alba. Pedes nudi, coloris fordide
carnei. Palmae digitis quatuor cum ungue polli-
cari, plantae digitis quinque. Auriculae Ratti.
Oculi magni, nigri. Nasi apex fordide albus.
Caudae basis dorso concolor, reliqua cauda squa-
mosa intermixtis pilis rarioribus. Mammae sex
ventrales totidemque pectorales.

Habitat hodie fere in omni Europa, a seculo nostro
inde, borealis originis. In Anglia ignotus ante
annum 1730, in Gallia ante 1750. Degit prae-
cipue ad aquas, beneque natat et vrinatur. Fodit
subterraneus, et reperitur quoque in domibus.
Vicitat frumento, fructibus, cuniculis, gallinulis,
vrensilibus variis. Maxime pinguescit. Audacis-
simum animal inter congeneres atque Ratto fero-
cius, morfu periculoso: deleuit fere passim Rattum.
Parit ter in anno 12-18. Mas feminam magni-
tudine antecellit.

Rattus. 2. M. cauda elongata, palmis tetradactylis cum
unguiculo pollicari, corpore griseo.

Mus domesticus maior, quem vulgo Rattum vocant

Gesn. quadrup. p. 829 cum fig. bona.

Mus domesticus maior *Schwenckf. theriotr. p. 115.*

Rattus *Aldrov. digit. p. 415.*

Glires Ratten *Ionst. quadrup. tab. 66 fig. mediocr.*

Die Ratte *Gesn. Thierb. p. 263 cum fig. bon.*

Sorex domesticus *Charlet. exerc. p. 25.*

Mus domesticus maior seu Sorex *Sibb. Scor. an. p. 12.*

Mus domesticus maior, siue Rattus Rai. *syn. quadr.*
p. 217.

Mus domesticus maior, siue Rattus Sloan. *Iam. II* p.
330.

The House Rat *Brick. North-Car.* p. 130.

Mus domesticus maior *Linn. syst. nat. 2* p. 47.

Mus cauda longa subnuda, corpore fusco-cinerascen-
te *Linn. fn. suec. I* p. 10 n. 28.

Die Ratte *Meyer Thiere II* tab. 83.

Mus cauda longa subnuda, corpore fusco-cinerascente
Linn. syst. nat. 6 p. 10 n. 6.

Mus, Rattus; Mus cristinarius *Klein. quadrup.* p. 57.

Mus cauda longa subnuda, corpore fusco cinerescente.

The brownish-grey Mus, with a long and almost
naked tail: the Ratt *Hill anim. p. 517* tab. 25
fig. mediocr.

Ratzen *Kalm. Amer. III* p. 14.

Le Rat: Mus (Rattus) cauda longissima, obscure ci-
nereus *Briff. regn. an. p. 168* n. 1.

Mus cauda longa subnuda, corpore fusco-cinera-
scente *Kram. Austr. p. 316*.

Die grosse Hausmaus (Ratte) *Hall. vierf. p. 427*.

Mus (Rattus) cauda elongata subnuda, palmis tetra-
dactylis cum unguiculo pollicari, plantis pentada-
ctylis *Linn. syst. nat. 10, I* p. 61 n. 9.

Rat domestique *Dictionn. anim. III* p. 661.

Le Rat *Buff. hist. nat. VII* p. 278 tab. 36.

Huis-Rot: Muis met een lange byna kaale Staart, de
Voorpooten vier-Vingerig met een Nageltje in
plaats van Duim, de Agterpooten vyf-Vingerig
Houtt. nat. hist. II p. 471.

Mus (Rattus) cauda elongata subnuda, palmis tetra-
dactylis cum unguiculo pollicari, plantis pentada-
ctylis *Linn. fn. suec. 2* p. 12 n. 33.

Mus cauda longissima, obscure cinereus *Gronov. zooph.*
I p. 4 n. 18.

The common Rat *Penn. brit. zool. p. 46* cum fig. bon.
Rotter

Rotter *Pontopp. Dan. I p. 611.*

Rat domestique *Bom. dictionn. III p. 714.*

Mus (Rattus) cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis cum unguiculo pollicari, plantis pentadactylis *Linn. syst. nat. 12, I p. 83 n. 12.*

Mus Rattus *Forster: Philos. Tansact. LVII p. 343.*

The black Rat *Penn. syn. quadr. p. 299 n. 226.*

Sorcio *Aless. quadrup. II tab. 78 fig. Buff.*

Hausratze *Müll. Naturf. I p. 347.*

Mus (Rattus) cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis cum unguiculo pollicari, plantis pentadactylis *Müll. Dan. prodr. p. 5 n. 31.*

Die Ratte *Marz. Buff. vierf. IV p. 221 tab. 69.*

Sorcio, Ratto *Italis.*

Raton, Rata *Hispanis.*

Rato *Lusitanis.*

Rat *Gallis.*

Llygoden ffrengig *Cambrensis.*

Ratze, Ratte *Germanis.*

Rot, Rotte *Belgis.*

Rat *Anglis.*

Rotte *Danis.*

Rotta *Succis.*

Крыса (Krysa) *Ruffis.*

Ulu Tſkan *Tataris.*

Schönkſcha *Tſcheremiſſis.*

As i-ſchüſchì *Tſchuwaſchis.*

Budſchim-ſchir *Woziakis.*

Kriſſa *Morduſanis.*

Wurdis, Burdüſch *Sirjänice.*

Corpus septem pollices longum, e nigro griseum, subtus album vel cinereum. Rostrum acuminatum. Auriculae subouatae, pilis breuibus tectae. Verruca supraocularis pilis duobus longioribus. Mystaces albae, longitudine capitis. Pedes 4-5, cum unguiculo pollicari in palmis, fissi; supra pilis albis

albis breuissimis testis, subtus papilloso- verrucosi. Digniti compressi. Ungues laterales breuiores. Cauda longitudine circiter corporis ad 8 poll., subnuda, squamosa, pilis breuissimis scabra. Calculo urinario maxime obnoxium animal.

Variat colore fusco, griseo, albo.

Habitat fere vbique in Europa et in calidioribus, passim fere deletus a M. noruegico. Exul Lapponiae. Americanus europaeae originis; allatus est in novum orbem circa annum 1544.

Edit frumenta, vtenfilia varia, gallinulas, columbas, cuniculos: animal domibus pessimum cautumque. Nidum parat in loco calidiore ex lana, pannis, stramine. Lasciuus valde. Parit pluries in anno ad sex vel septem. Saeuit in propriam speciem. Retro coit, facileque sub coitu caudae permiscetur; inde fabula de rege Rattorum. Mustela Ratto maxime infesta.

Eiusdem forte speciei est:

Mus americanus *Seb. thes. II p. 30 tab. 29 fig. 2.*

Le Rat d'Amérique: Mus (Rattus Americanus) cauda longissima, supra ex rufo flauescens, infra albicans, auriculis retrorsum sitis *Briss. regn. an. p. 172 n. 6.*

Rat d'Amérique *Dictionn. anim. III p. 662.*

Rat d'Amérique *Bom. dictionn. III p. 717.*

Dorsum ex rufo flauescens. Venter albescit. Auriculæ longae, albicantes. Cauda albida, corpore longior, hispida.

amphibi- 3. *M. cauda mediocri, palmis tetradactylis cum*
us. *unguiculo pollicari, corpore nigricante.*

Mus aquatilis Agric. an. subst. p. 58.

Mus aquaticus Gesn. quadrup. p. 830.

Mus aquaticus Bellon. aquar. p. 35 fig. p. 36 mala.

Mus aquaticus Schwenckf. riberiort. p. 115.

Mus aquatilis Aldrov. digit. p. 447.

Mus aquaticus Jonst. quadrup. p. 169.

Mus aquaticus Charis. exerc. p. 25.

Sorex aquaticus Charis. exerc. p. 25.

Mus aquaticus Sibb. Scot. an. p. 12.

Mus maior aquaticus, siue Rattus aquaticus Rai. syn
quadr. p. 217.

The Water-Rat Latzf. Carol. p. 122.

Mus agrestis virginianus albus Seb. thes. I p. 76 tab.
47 fig. 4?

The Water-Rat Brick. North-Car. p. 130.

Castor cauda lineari tereti Linn. syst. nat. 2 p. 47.

Castor cauda lineari tereti Linn. fn. succ. I p. 10
n. 25.

Die Wasserratte Meyer Tiere II tab. 84.

Castor cauda lineari tereti Linn. syst. nat. 6 p. 10
n. 3.

Mus aquatilis Klein. quadrup. p. 57.

Mus agrestis Virginianus albus Klein. quadrup. p. 57?

Mus cauda abrupta, digitis connexis. The abrupt-
tailed Mus, with connected toes: the Water-Rat
Hill anim. p. 518.

Le Rat d'eau: Mus (aquaticus) cauda longa, pilis
supra ex nigro et flavescente mixtis, infra cine-
reis vestitus Briss. regn. an. p. 175 n. 11.

Le Rat blanc de Virginie: Mus (albus virginianus)
cauda longa, albus, mystace nigricante Briss. regn.
an. p. 173 n. 7?

Die Wasserratte Hall. vierf. p. 430.

Mus (amphibius) cauda elongata pilosa, plantis
palmatis Linn. syst. nat. 10, I p. 61 n. 8.

Le Rat d'eau *Buff. hist. nat. VII p. 348 tab. 43.*

Rat d'eau *Dictioun. anim. III p. 665.*

Rat blanc *Dictioun. anim. III p. 662?*

Water-Rot: Muis met een lange Hairige Staart, de Agterpooten tusschen de Vingeren gevlied *Houtt. nat. hist. II p. 470.*

Mus (amphibius) cauda elongata pilosa, plantis palmatis *Linn. fn. succ. 2 p. 12 n. 32.*

The Water Rat *Penn. brit. zool. p. 48 cum fig. bon.*

Vand-Rotte *Pontopp. Dan. I p. 612.*

Rat d'eau *Bom. dictioun. III p. 717.*

Rat blanc *Bom. dictioun. III p. 717?*

Mus (amphibius) cauda elongata pilosa, plantis palmatis *Linn. syst. nat. 12, I p. 82 n. 11.*

Le Rat d'eau blanc *Buff. hist. nat. XV p. 146?*

The Water Rat *Penn. syn. quadr. p. 301 n. 228.*

Sorcio morgange *Aless. quadrup. IV tab. 165 fig. 1 Buff.*

Die Wasserratze *Müll. Naturf. I p. 346.*

Mus (amphibius) cauda elongata pilosa, plantis palmatis *Müll. Dan. prodr. p. 5 n. 30.*

Die Wassermaus. Wasserratte *Marz. Buff. vierf. IV p. 251 tab. 72.*

Sorcio morgange *Italis.*

Raton de agua *Hispanis.*

Rato de agoa *Lusitanis.*

Rat d'eau *Gallis.*

Llygoden y dwfr *Cambrensis.*

Wasserratze *Germanis.*

it. Erdwolf -

Water-Rot *Belgis.*

Water Rat *Anglis.*

Vand-Rotte *Danis.*

Vasmuus, Vandfkiær *Noruegis.*

Wattn Rotta *Suedis.*

Водяной Кротъ (Wodjanoi Krot) *Ruffis.*

Mataga *Tungusis.*

Longitudo corporis 7 pollicum, caudae $4\frac{1}{2}$ poll. Corpus crassius quam in Ratto. Nasus crassus, obtusus. Auriculae parvae, pilis occultatae. Oculi minuti. Dentes aurantii. Palmae digitis $4\frac{1}{2}$, plantae 5 non palmatis, vti Raio et Linneo, aliisque auctoribus. Caput et corpus pilis longis nigris, admixtis paucioribus ferrugineis. Venter ex ferrugineo griseus. Cauda pilis breuibus, nigris, apice albicantibus. Mammae quatuor pectorales totidemque ventrales.

Variat colore albo.

Habitat in Europa et America boreli, ad aquas, fodiens.

Vicitat pisciculis eorumque ouis, ranis, insectis, radicibus. Bene natat atque vrinatur. Coit sine hiemis, parit Aprili mense sex vel septem. Sapor carnis piscinus.

filuaticus. 4. M. cauda mediocri, corpore cano pilis nigris, pectore flauescente, abdomine albido.

Mus agrestis maior *Gesn. quadrup. p. 830 fig. p. 1104.*

Mus filuaticus *Gesn. quadrup. p. 833?*

Mus filuaticus *Schwenckf. theriotr. p. 116.*

Mus agrestis maior *Aldrov. digit. p. 436.*

Mus filuaticus *Sibb. Scot. an. p. 12.*

Mus domesticus medius *Rai. syn. quadr. p. 218.*

Mus agrestis maior macrouros *Gesn. Rai. syn. quadr. p. 219.*

Sorices *Rzac. Polon. p. 261 auct. p. 328?*

Mus domesticus medius *Linn. syst. nat. 2 p. 47.*

Mus cauda longa, corpore nigro-flauescente, abdomine albo *Linn. fn. suec. 1 p. 11 n. 30.*

Die Feldmaus *Meyer's Tbierre I tab. 1?*

Mus cauda longa, corpore nigro-flauescente, abdomine albo *Linn. syst. nat. 6 p. 10 n. 7.*

Mus cauda longa corpore nigro flauescente. The yellowish-black Mus, with a long tail *Hill anim. p. 517.*

Le grand Rat des champs; Mus (campestris maior) cauda longissima, fuscus, ad latera rufus *Briff. regn. an. p. 171 n. 4.*

Le Mulot: Mus cauda-longa, supra e fusco flauescens, infra ex albo cinerascens *Briff. regn. an. p. 174 n. 9.*

Mus cauda longa corpore nigro-flauescente, abdomine albo *Kram. Austr. p. 316.*

Mus (siluaticus) cauda longa, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore griseo pilis nigris, abdomine albido *Linn. syst. nat. 10, I p. 62 n. 12.*

Le Mulot *Buff. hist. nat. VII p. 325 tab. 41.*

Mulot *Dictioun. anim. III p. 195.*

Grand Rat des champs *Dictioun. anim. III p. 662.*

Bosch-Muis: Muis met een lange Staart, de Voorpooten vier-, de Agterpooten vyf-Vingerig, het Lyf grys met zwarte Haightjes, de Buik witagtig *Houtt. nat. hist. II p. 486.*

Mus (siluaticus) cauda elongata, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore griseo pilis nigris, abdomine albido *Linn. fn. suec. 2 p. 12 n. 36.*

The long-tailed Field-Mouse *Penn. brit. zool. p. 49 cum. fig. bona.*

Skov-Muus *Pontopp. Dan. I p. 612.*

Mulot *Bon. dictioun. III p. 164.*

Mus (siluaticus) cauda mediocri, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore griseo pilis nigris, abdomine albido *Linn. syst. nat. 12, I p. 84 n. 17.*

- The field Rat *Penn. syn. quadr. p. 302 n. 230.*
 Topo di Campagna *Aless. quadrup. II tab. 79 fig.*
 Buff.
 Field Mouse *Forster: Philos. transact. LXII p. 380.*
 Die Waldmaus *Müll. Naturf. I p. 352.*
 Mus (silvaticus) cauda mediocri, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore griseo pilis nigris, abdomine albido *Müll. Dan. prodr. p. 5 n. 29.*
 Die große Feldmaus *Mart. Buff. vierf. IV p. 243 tab. 71.*
 Topo di campagna *Italis.*
 Rat sautérelle, Souris de terre, Mulot *Gallis.*
 Ratte à la grande queue *in Burgundia.*
 Llygöden ganolig, Llygöden y maes *Cambrensisibus.*
 Feldmaus *Germanis.*
 Bofch-Muis *Belgis.*
 Field-mouse *Anglis.*
 Beanmouse *passim in Anglia.*
 Skov-muus *Danis.*
 Myfzy polne *Polonis?*

Longitudo corporis $4\frac{1}{2}$ poll. caudae 4 poll. Oculi magni, prominentes, nigri. Auriculae e vellere prominentes. Caput, dorsum et latera flavicantifusca, intermixtis pilis nigricantibus; pectus ochraceum; venter albus. Cauda leuiter pilosa. Mammae quatuor ventrales, duae pectorales.

Habitat in Europae campis, siluis et hortis ficcioribus. Est quoque ad fretum Hudsonis. Edit nunces varias atque frumentum. Nidus prope terrae superficiem; parit septem ad decem pullos. Cibum in hiemem colligit.

Varietatem Nøueboracensem Pennantus habet, mysticibus valde longis, aliis albis, aliis nigris; auriculis

culis magnis, nudis, apertis; stria per medium dorsum a capite ad caudam lata ferruginea; buccis spatioque inter auriculas, nec non lateribus vsque ad caudam aurantiis; corpore subtus a naso ad caudam vsque albissimo; pedibus, albis. Crura postica huic longiora ac europaeo. Cauda supra nigricans, infra albicans.

- Muscu- 5. M. cauda elongata, palmis tetradactylis absque
lus. vnguiculo pollicari, corpore griseo.
- Mus *Arist. hist. anim. I c. 2 n. 15.*
Mus *Plin. hist. nat. VIII c. 56 (c. 82 Hard.). X c. 65 (c. 85 Hard.) c. 73 (c. 94 Hard.).*
Mus *Gesn. quadrup. p. 808 fig. bona.*
Mus domesticus minor *Schwenckf. theriotr. p. 113.*
Mus albus *Schwenckf. theriotr. p. 114.*
Mus rubeus *Schwenckf. theriotr. p. 114.*
Mus muscatus *Schwenckf. theriotr. p. 114?*
Mus domesticus minor *Aldrov. digit. p. 417 cum fig. mediocr.*
Mus domesticus minor albus *Suidae Aldrov. digit. p. 417.*
Mus domesticus *Ionst. quadrup. p. 165.*
Mures Meuse *Ionst. quadrup. tab. 66 fig. mediocr.*
Eine Maus *Gesn. Thierb. p. 260 cum fig. mala.*
Mus domesticus minor *Sibb. Scot. anim. p. 12.*
Mus domesticus vulgaris seu minor *Rai. syn. quadr. p. 218.*
Mus albus domesticus *Rzacz. auct. p. 328.*
Mus domesticus vulgaris seu minor *Sloan. Iam. II p. 330.*
The House-mouse *Brick. North-Car. p. 131.*
Mus domesticus vulgaris *Linn. syst. nat. 2 p. 47.*
Mus cauda longiuscula, corpore cinereo-fusco, abdomine subalbescente *Linn. fn. succ. I p. 11. n. 31.*
Eine Maus *Meyer Thiere I tab. I.*

Mus cauda nudiuscula, corpore cinereo-fusco, abdomine subalbescente *Linn. syst. nat. 6 p. 10 n. 8.*

Mus minor, Musculus vulgaris, domesticus *Klein. quadrup. p. 57.*

Mus cauda longa nudiuscula, ventre subalbido. The Mus, with a long and almost naked tail, and a white belly: the Mouse *Hill anim. p. 517.*

Mus cauda longa nudiuscula, corpore cinereo-fusco, abdomine subalbescente *Linn. mus. Ad. Frid. I p. 9.*

La Souris: Mus (Sorex) cauda longissima, obscure cinereus, ventre subalbescente *Briff. regn. an. p. 169 n. 2.*

Mus cauda nudiuscula, corpore cinereo-fusco, abdomine subalbescente *Kram. Austr. p. 316.*

Mus domesticus minor, cauda longa subnuda, corpore fusco-cinereus, abdomine albicante: the Mouse *Brown. Jam. p. 484.*

Die kleine Hausmaus *Hall. vierf. p. 431.*

Mus (Musculus) cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. syst. nat. 10, I p. 62 n. 10.*

La Souris *Buff. hist. nat. VII p. 309 tab. 39.*

Souris *Dictionn. anim. IV p. 226.*

Huis-Muis: Muis met een lange byna kaale Staart; de Voorpooten vier- de Agterpooten vyf- Vingerig *Houtt. nat. hist. II p. 478.*

Mus (Musculus) cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, pollice mutico *Linn. fn. succ. 2 p. 12 n. 34.*

Mus cauda longissima, obscure cinereus, ventre albescente *Gronov. zooph. I p. 4 n. 19.*

The common Mouse *Penn. brit. zool. p. 302 n. 229.*

Lille-Muus *Pontopp. Dan. I p. 612.*

Souris *Bom. Dictionn. IV p. 253.*

Mus (Musculus) cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis: pollice mutico
Linn. syst. nat. 12, I p. 83 n. 13.

Mus Musculus *Forster: Philos. transact. LVII p. 343.*

The Mouse *Penn. syn. quadrup. p. 302 n. 229.*

Topo *Aless. quadrup. II tab. 77 fig. Buff.*

Die Hausmaus *Müll. Naturf. I p. 349.*

Mus domesticus *Forsk. fn. orient. p. IV.*

Mus (Musculus) cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis: pollice mutico
Müll. Dan. prodr. p. 5 n. 28.

Die Maus *Mart. Buff. vierf. IV p. 239 tab. 70.*

Topo, Sorice *Italis.*

Raton (*mas*); Rata (*femina*) *Hispanis.*

Ratinho *Lusitanis.*

Souris *Gallis.*

Ilygoden *Cambrensisibus.*

Maus, Hausmaus *Germanis.*

Muis, Huis - muis *Belgis.*

Mouse *Anglis.*

Lille - Muus *Danis.*

Huus - Muus *Noruegis.*

Mus *Suecis.*

МЫШЬ (Myfch'), Домашняя Мышь (Domafchnaja Myfch') *Ruffis.*

Tfkan *Tataris.*

Kolja *Tfcheremiffis.*

Schüfchì *Tfchuwaschis.*

Schir *Wotiakis.*

Tfchar *Morduanis.*

Schir *Permice.*

Schür *Sirjänice.*

Far *Aegyptiis.*

Minor Ratto, longitudine corporis trium pollicum, in reliquis isti similis figura et colore, nisi quod hic pallidior sit, et quod unguis palmarum pollicaris

caris defit. Cauda longitudine corporis pilofufcula.

Varietas alba, oculis aurantiis.

Habitat vbique in domibus et filuis glandiferis, polyphagus: noxium animalculum rebus efculentis, cautumque et timidum, agileque. Parit fex vel feptem pleries in anno. Delectatur mufica. Praeda Felis, Mustelae, Erinacei, Strigis; in horreis pellitur Ebulo.

Eiusdem fpeciei videtur:

Mus americanus mafculus, pilis dilute fpadiceis veftitus *Seb. zhes. I p. 177 tab. III fig. 6.*

La Souris d'Amerique: Mus (Sorex Americanus) cauda longiffima, dilute fpadiceus *Briff. regn. an. p. 172 n. 5.*

La Souris de l'Amerique *Dictioun. anim. IV p. 227.*

Die Orakelmaus *Hall. vierf. p. 432* quid?

paludo- 6. M. cauda elongata, auriculis vellere breuio-
fus. bus, corpore nigro.

Mus (paludofus) cauda mediocri pilofa, palmis fubtetradactylis, plantis pentadactylis, auriculis velle-
re breuioribus; ater *Linn. mant. II p. 522.*

Die Sumpfmaus *Müll. Naturf. Suppl. p. 39.*

Corpus magnitudine, ftatura, facie Muris terreftres, fed totum atrum. Auriculae vellere breuiores, pilofae (nec vt in M. terreftri nudifculae). Pedes toti (digitis M. terreftri conformibus, etiam pollicis palmarum vngue minuto obfoletiore) pilis albis tecti, omnes fifsi. Cauda tota pilis tecta
(qua

(qua differt a *M. terrestri*) longitudine corporis absque capite.

Habitat ad Sueciae fossas, introitu sub ipsa aqua.
Num forte *M. amphibius*.

terrestris. 7. *M. cauda mediocri*, auriculis vellere brevioribus, corpore supra ferrugineo, subtus cinereo.

Mus agrestis *Schwenckf. theriotr. p. 116.*

Mus agrestis minor *Aldrov. digit. p. 436.*

Nül oder Wühlmaus *Gesn. Thierb. p. 264 cum fig. mala.*

Mus agrestis capite grandi, brachyuros *Rai. syn. quadr. p. 218.*

Mus agrestis, capite grandi, brachyurus *Linn. syst. nat. 2 p. 47.*

Mus cauda breui, corpore nigro-fusco, abdomine cinerascete *Linn. fn. suec. I p. 10 n. 27.*

Mus cauda longa pilosa; auribus subrotundis vellere brevioribus *Linn. fn. suec. I p. 10 n. 29.*

Mus cauda breui, corpore nigro-fusco, abdomine cinerascete *Linn. syst. nat. 6 p. 10 n. 4.*

Mus cauda longa pilosa, auribus subrotundis vellere brevioribus *Linn. syst. nat. 6 p. 10 n. 5.*

Mus agrestis capite grandi *Klein. quadrup. p. 57.*

Mus cauda breui, dorso nigro-fusco, ventre albo.
The short-tailed Mus, with a brownish-black back, and white belly *Hill anim. p. 516.*

Mus cauda longa villosa, auribus brevibus. The short-eared Mus, with a short hairy tail: the Ground-rat *Hill anim. p. 517 tab. 25 fig. mala.*

Le petit Rat des champs: *Mus (campestris minor)* cauda breui, pilis e nigricante et sordide luteo mixtis in dorso, et saturate cinereis in ventre vestitus *Briff. regn. an. p. 176 n. 12.*

Mus cauda breui, corpore nigro-fusco, abdomine cinerascēte *Kram. Austr. p. 316.*

Mus cauda longa pilosa, auribus subrotundis vellere breuioribus *Kram. Austr. p. 316.*

Die Feldmaus *Hall. vierf. p. 431?*

Die Scharmaus *Hall. vierf. p. 431.*

Mus (terrestris) cauda mediocri subpilosa, palmis subtetradactylis, plantis pentadactylis, auriculis vellere breuioribus *Linn. syst. nat. 10, I p. 61 n. 7.*

Le Canipagnol *Buff. hist. nat. VII p. 369 tab. 47.*

Petit rat des champs *Dictionn. anim. III p. 666.*

Veldmuis: Muis met een Staart van middelbare langte, dun gehaird; de Voorpooten omtrent vierde Agterpooten vyf-Vingerig; de Ooren korter dan het Hair van de Vagt *Houtt. nat. hist. II p. 469.*

Mus (agrestis) cauda abbreviata, corpore nigro-fusco, abdomine cinerascēte *Linn. fn. succ. 2 p. 11 n. 30.*

Mus (terrestris) cauda mediocri subpilosa, palmis subtetradactylis, plantis pentadactylis, auriculis vellere breuioribus *Linn. fn. succ. 2 p. 11 n. 31.*

The short-tailed Fieldmouse *Penn. brit. zool. p. 50 cum fig. bona.*

Märk-Muus *Pontopp. Dan. I p. 612.*

Campagnol *Bom. dictionn. I p. 389.*

Mus (terrestris) cauda mediocri subpilosa, palmis subtetradactylis, plantis pentadactylis, auriculis vellere breuioribus *Linn. syst. nat. 12, I p. 82 n. 10.*

Die eine Mausart *S. G. Gmelin Reis. I p. 151 tab. 29 fig. 1. (num forte paludosus?)*

The short-tailed Rat *Penn. syn quadr. p. 305 n. 233.*

Campagnolo *Aless. quadrup. IV tab. 165 fig. 2 Buff.*

Short-tailed Mouse *Förster: Philos. transact. LXII p. 380.*

Die Feldmaus *Müll. Naturf. I p. 345.*

Mus (terrestris) cauda mediocri subpilosa, palmis subtetradactylis, plantis pentadactylis, auriculis vellere breuioribus *Müll. Dan. prodr. p. 4 n. 27.*

Die kleine Feldmaus. Der Kampagnol *Mart. Buff. vierf. IV p. 256 tab. 73.*

Campagnolo *Italis.*

Petit rat des champs, Campagnol *Gallis.*

Ratte couette in *Burgundia.*

Llygoden gwttar maes *Cambrensisibus.*

Kleine Feldmaus *Germanis.*

Erdzeit *Austriacis.*

Veldmuis *Belgis.*

Short-tailed Fieldmouse *Anglis.*

Mark-Muus *Danis.*

Molle *Suecis.*

Песцовая Мышь (Pestzowaja Mysch') *Ruffis.*

Corpus longitudine trium pollicum, cauda vnus. Caput magnum. Nasus obtusus. Auriculae breues, pilis occultatae. Oculi prominentes. Cauda subpilosa, apice leuiter floccosa. Color capitis et corporis supra e fusco ferrugineus, admixto nigro; venter profunde cinereus.

Habitat aestate in Europae campis et hortis, hieme in siluis: reperitur quoque in America boreali. Subterraneum animal. Nidum parat in pratis humidis. Parit ad octo pullos. Edit nuces arborum et frumenta.

Idem videtur:

Mus (gregarius) cauda corpore triplo breuiore subpilosa, corpore griseo subtus pedibusque albis *Linn. Syst. nat. 12, I p. 84 n. 16.*

The gregarious Rat *Penn. syn. quadr. p. 305 n. 234.*
 Mus socialis *Pallas Reis. II p. 705* qui vtiq̄ue idem
 videtur.

Die Erdmaus *Müll. Naturf. I p. 351.*

Die gefellige Maus *Müll. Naturf. Suppl. p. 45.*

Niri Katschan *Tungusis.*

Corpus M. Musculo paullo maius, supra griseum: pilis basi atris, medio ferrugineis, apice nigris. Gula, abdomen et pectus albicantia. Caput ovatum, rostro obtuso, rictu paruo. Mystaces nigrae. Auriculae nudaе, subrotundae, ex vellere prominentes. Cauda albido-pilosa, apice nigro-cinerea. Pedes 4-5, digitis omnibus vnguiculatis.

Habitat in Germania, Suecia, nec non ad Iaicum.
 Fodit et sub terra degit; sedens edit.

agrarius. 8. M. cauda mediocri, corpore supra luteo, subtus canescenti albo, linea dorsali nigra.

Mus agrarius *Pallas Reis. I p. 454.*

Die Ackermaus *Müll. Naturf. Suppl. p. 41.*

Paullo minor et tenerior M. Musculo, rostroque acutiore. Mystaces parciore. Caput oblongius. Auriculae minores, intus villosae. Corpus luteum, subtus artubusque canescenti-album. Linea ab occipite ad caudam fere vsque spinalis atra, constantissima. Artus gracillimi: palmae vnguiculo pollicari minutissimo, obtuso. Cauda longitudine corporis dimidia circiter, tenuior quam in M. Musculo et pilosior paullo, filiformis, annulis circiter 90 notata, supra nigricans, subtus albescens. Ponderus drachm. 3 - 4.

Habitat

Habitat ad Wolgam et in vicinis locis copiosissime sub frumenti aceruis.

Idem videtur:

The harvest Rat *Penn. syn. quadr. p. 303 n. 231.*

Corpus longitudine $2\frac{1}{2}$ poll. caudae 2 poll. Oculi minus prominentes quam in *M. siluatico*. Auriculae e vellere prominulae. Color corporis supra ferrugineus, subtus albus, linea recta in lateribus utrumque colorem distinguente. Cauda subpilosa.

Habitat in Hampshire Angliae, copiosissimus apparens durante messe, numquam domus intrans. Hieme subterraneus. Fodit valde profunde. Lectum parat e gramine sicco. Parit ad octo.

Porro huc referendus videtur:

Die zwote Gattung *S. G. Gmelin Reis. I p. 151.*

Eine andere Art Mäuse *S. G. Gmelin Reis. I tab. 29 fig. 2* mediocr.

Corpus supra ex rufo flauum. Stria dorsalis nigra longitudinalis, medio latissima. Corpus subtus cinereum. Auriculae mediocres, intus et extus pilosae, capiti concolores. Corpus ad tres pollices longum, cauda $2\frac{1}{2}$ poll. cinerea, subpilosa. Pedes 4-5.

Habitat in desertis ad Tanain, sodiens subterraneus.

barbarus. 9. *M.* cauda elongata, corpore fusco striis decem pallidis.

Rats d'Inde *Boullaye voy. p. 256?*

Sweet mice *Barböt Guin. p. 214?*

Mus (barbarus) cauda mediocri, corpore fusco striis decem pallidis, palmis tridactylis, plantis pentadactylis *Linn. syst. nat. 12, II addend.*

Die wilde Maus *Müll. Naturf. Suppl. p. 47.*

Corpus M. Musculo minus, supra fuscum. Abdomen pallidum. Dorsum striis decem pallidis, et saepe lineola vix manifesta inter strias laterales. Pedes antici digitis tribus unguiculatis; praeterea pollice obsoleto; sub planta ipsa rudimentum quinti digiti. Cauda nudiuscula, subuercillata, longitudine corporis.

Habitat in Barbaria.

striatus. 10. M. cauda elongata, corpore griseo striis punctatis albis.

Mus orientalis *Seb. thes. II p. 22 tab. 21 fig. 2.*

Mus Orientalis *Klein. quadrup. p. 57.*

Mus (striatus) cauda longa, striis, corporis longitudinalibus ex punctis albis *Linn. mus. Ad. Frid.*

I p. 10.

Le Rat oriental: Mus (orientalis) cauda longa, rufus, lineis in dorso albicantibus, margaritarum aemulis *Briff. regn. an. p. 175 n. 10.*

Die rothe orientalische Maus *Hall. vierf. p. 432.*

Mus (striatus) cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore striis punctatis *Linn. syst. nat. 10, I p. 62 n. 13.*

Rat oriental *Dictionn. anim. III p. 665.*

Muis met een lange byna kaale Staart, de Voorpooten vier-, de Agterpooten vyf- Vingerig, gestippelde Streepen over 't Lyf *Houtt. nat. hist. II p. 487.*

Rat oriental *Bom. dictionn. III p. 717.*

Mus (striatus) cauda mediocri subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corporis striis punctatis *Linn. syst. nat.* 12, I p. 84 n. 18.

The oriental Rat *Penn. syn. quadr.* p. 304 n. 232.

Die ostindische gestreifte Ratze *Müll. Naturf.* I p. 352.

Dimidio minor M. Musculo. Color griseus striis duodecim a capite ad postrema diductis, albis, expunctis in series digestis; subtus pallidus. Auriculæ rotundatae, nec elongatae, nudaæ. Pedes flavescentes. Palmae tetradactylae, plantae pentadactylae. Cauda subnuda, longitudine corporis.

Habitat in India.

minutus. II. M. cauda elongata, corpore griseo-lutescente subtus fordide albo.

Mus minutus *Pallas Reis.* I p. 454.

Die Zwergmaus *Müll. Naturf. Suppl.* p. 41.

Totius generis minimus, vix dimidia mole M. Musculi. Caput et praesertim nasus hirsutior quam in agrario. Mystaces teneriores. Auriculæ minores et vellere semilatentes, orbiculatae, intus subuillofae. Corpus griseo-lutescens, in dorso fuscescente mixtum, subtus cano-album. Pedum palmae utrinque cano-ciliatae, palmarum unguiculus pollicaris obtusissimus. Cauda maior quam in M. agrario, tenuior tamen et breuior quam M. Musculi, subfiliformis, pilosa tota, circulisque fere 130 annulata. Pondus plerumque sesquidrachmale, raro duarum drachmarum. Interaneis aequè ac M. agrarius cum M. amphibio et siluatico conuenit. Cystis fellea in utroque pariter nulla.

Habitat ad Wolgam et in vicinis locis copiosissime
sub frumenti aceruis.

subtilis. 12. M. cauda elongata, corpore cinereo - cane-
scente, fasciola dorsali nigra.

Eine Art kleiner grauer Schlafmäuse *Pallas Reis. II*
p. 408.

Mus subtilis *Pallas Reis. II* p. 705.

Der Zärtling *Müll. Naturf. Suppl.* p. 46.

Minutissima (praeter M. minutum) species. Habitus
M. minuti, sed auriculae maiores et cauda multo
longior, minusque pilosa. Dentes primores latei.
Auriculae magnae, ouales, nudae, plicatiles. Pal-
mae subpentadactylae, verruca insigni callosa loco
pollicis. Cauda corpore multo longior, attenuata,
subvolubilis, nudiuscula, minus tamen quam in
M. Musculo, circulis circiter 170 eidentissime
annulata. Color supra cinereo - canescens fusco
mixtus; fasciola latiuscula a scapulis vel ima cer-
vice incipiens, vsque ad caudam, nigra. Pondus
paullo ultra drachmam. Longitudo animalculi 2
poll. 1 lin. caudae 2 poll. 10 lin.

Varietas colore fulvescenti - luteo, fasciola spinali simi-
li, cauda longiore. Pondus granorum 80, longi-
tudo 2 poll. 2½ lin. caudae 3 poll. 2½ lin.

Habitat rariuscule ad Iaicum, abundat vero in orien-
tali parte deserti tatarici inter Iaicum, Irin et Ob
fluuios, apricis pariter atque Betula obsitis in cam-
pis, cuniculis exiguis vel cauis arborum in truncis
nidificans. Visitat feminibus variis, plantasque
per caules adscendit victum quaerens. Frigore
torpescit conglobatus, imo aere ad 60 grad. Fah-
renh. calente vix animatur; adeoque breuissima
vita huic in rigidissimo Sibiriae climate.

astra-

astracha- 13. *M. cauda mediocri*, corpore supra flauo sub-
nensis. tus cinereo.

Eine Mäuse-Gattung *S. G. Gmelin Reif. II p. 173*
tab. II fig. mediocr.

Figura M. Musculi et color, at cauda abbreviata magisque pilosa. Corpus supra pilis nigris apice flavis, ut fere totum flauum videatur, subtus cinereum. Auriculae fere nudaе. Pedes et cauda cinerea. Longitudo corporis 4 pollicum, caudae pollicis vnus cum aliquot lineis. Pedes 4-5.

Habitat circa Astrachan intra terram, perpendiculariter fodiens satis profunde.

micruros. 14. *M. cauda abbreviata*, corpore supra cinereo-canefcente subtus fordide albido.

Mus micruros S. G. Gmelin Reif. III p. 500 tab. 57
fig. 2 maia.

Longitudo corporis 3 poll. 3 lin. caudae 6 lin. Corpus supra ex cinereo canescens, subtus ex griseo albidum. Caput breue, rostro obtuso. Nares minimae, rotundae. Mystaces griseo-albae. Irides nigrae. Auriculae magnae, oblongae, rotundatae, pilosae. Pedes 4-5 unguibus acutis.

Habitat in prouincia Masanderan Persiae.

38. IACVLVS.

Dentes Primores vtrinque II.
Laniarii nulli.

Pedes antici breuissimi; *postici* elongati.
Cauda elongata, apice floccosa.

orientalis. 1. I. palmis tetradactylis cum unguiculo pollicari, plantis tridactylis.

Aegyptii mures *Plin. hist. nat. X c. 65 (c. 85 Hard.)*.

Aegyptii mures alii *Gesn. quadrup. p. 837*.

Agnus filiorum Israel *Alpin. Aeg. p. 232*.

Cuniculus seu Lepus indicus Vtius dictus *Aldrov. digit. p. 395 fig. bona*.

Seltzane Art Feldmäuse Ierhuab *Olear. Reis. p. 740*.

Des rats de montagne *Moncon. voy. I p. 285*.

Fliegende Hasen *Strahlenb. Af. p. 361*.

The Ierbôa or Yerbôa *Shaw trav. p. 248*.

The Daman Israel *Shaw trav. p. 376*.

Mus (aegyptius) pedibus posticis longissimis, cauda corpore longiore, extremo villosa *Hasselquist: Act. upsäl. 1750 p. 17*.

Die aegyptische Bergratte *Hasselquist: Act. holmiens. 1752 p. 129 tab. 4 fig. 1*.

Mus (Iaculus) pedibus posticis longissimis, cauda extremo villosa *Hasselqu. Palaest. p. 277*.

Egyptische Bergratte *Hall. vierf. p. 595*.

Mus (Iaculus) cauda elongata floccosa, palmis pentadactylis, plantis tridactylis, femoribus longissimis, brachiis breuissimis *Linn. syst. nat. 10, I p. 63 n. 15*.

The

IACVLI bipedes incedunt super pedum plantis, vel potius saliant, opitulante cauda elongata rigida.

The Gerbua *Edw. Glean. I tab. 219.*

Springer: Muis met een lange Staart, die aan 't end een Kwast heeft, de Voorpooten vyf-, de Agterpooten drie-Vingerig, de agterste Beenen zeer lang, de voorste Beenen zeer kort *Houtr. nat. hist. II p. 488 tab. 20 fig. 2* Hasselqu.

Zits-jam Schober: *Müll. Samml. VII p. 124.*

Cuniculus pumilio faliens, cauda longissima S. G. *Gmelin: Nov. comment. petrop. V p. 351 tab. II fig. 1.*

Mus (Iaculus) cauda elongata floccosa, palmis subpentadactylis, plantis tridactylis, femoribus longissimis, brachiis breuissimis *Linn. mus. Ad. Frid. II p. 9.*

Gerboise *Bom. dictionn. II p. 307.*

Le Gerbo ou Gerboise *Buff. hist. nat. XIII p. 141.*

L'Alagtaga *Buff. hist. nat. XIII p. 141.*

Mus (Iaculus) cauda elongata floccosa, palmis subpentadactylis, femoribus longissimis, brachiis brevissimis *Linn. syst. nat. 12, I p. 85 n. 20.*

Der Erdhaase S. G. *Gmelin Reis. I p. 26 tab. 2.*

The Aegyptian Ierboa *Penn. syn. quadr. p. 295 n. 222 tab. 25 fig. 3.*

The Siberian Ierboa *Penn. syn. quadr. p. 296 n. 223.*

Die egyptische Bergratte *Berl. Samml. IV p. 542 cum fig.*

Der Springer *Müll. Naturf. I p. 352 tab. 20 fig. 2* Hasselqu.

Mus Iaculus *Forsk. fn. orient. p. IV.*

Iaculus asiaticus *Pallas.*

Земляной заяцъ (Zemljanoi Zaetz), Бабукъ (Babuk) *Ruffis.*

Alagtaga *Mangalis.*

يربوع (Ierboa) *Arabibus.*

Djarbua *Aegyptiis.*

Magnitudo Musculi maioris: longitudine corporis $7\frac{1}{2}$ pollicum, caudae 10 poll. Caput oblongum, vertice subconvexum, lateribus parum protuberans. Corpus obouatum, versus caudam augustius, declivae. Rostrum breuiusculum, apice truncatum, crassum, cylindricum. Apertura oris subtus rostro tecta, minima. Maxilla superior maxima, totum rostrum constituens; inferior tenuis, brevissima, obtusa, sub superiore abscondita, nec nisi sub gula visibilis. Dentes primores duo utrinque, hinc convexi, apice acuminati. Nares in apice rostri, margini eius superiori quam inferiori propiores, ampliusculae, rotundae, approximatae. Tuberculum paruum, subrotundum, parum elevatum supra nares, terminatum inferius processibus duobus lineari-longitudinalibus. Sinus longitudinalis linearis in medio horum tuberculorum, parum profundus, inferius amplior. Myrtaces copiosissimae, seriebus tribus, quarum prima circa marginem rostri ad latera eius inferiora constat radiis numerosissimis, breuiusculis, mollibus, albidis; secunda proxime supra nares ad latera superiora rostri, constructa radiis rigidis, longioribus, paucioribus, nigris; tertia inter has media, inferius versus basin capitis, composita radiis paucis (decem circiter utrinque) longissimis, rigidissimis, quorum vnus omnium longissimus corpus longitudine superat, ex albis et nigris mixta. Oculi ad latera capitis, vertici quam gulae, basi capitis quam apici rostri propiores: respectu corporis magni, protuberantes, toti atri. Auriculae ad basin capitis, iuxta verticem erectae, oblongo-ouatae, apice obtusae, margine anteriore inflexo perpendiculari, posteriore convexo, plano; amplae, ratione capitis magnae, nudae pellucidae, arteriis, distinctissimis perreptatae. Pedes anteriores proxime infra collum, breuissimi, subteretes,

tes, subnudi, terram non attingentes, sub collo reconditi, vix conspiciendi. Digniti quatuor cum pollice oblitterato mutico, fissi, tenues, fere aequales: unguis arcuati, infra medium attenuati. Pedes posteriores anterioribus triplo longiores, corpore vero femoribus simul sumtis duplo longiores, compressi, nudi. Femora nuda, pedibus continua, iisque similia ut in Grallis. Planta longiuscula, crassa, pone lanuginosa, digitis tribus fissis, compressis, mediis parum longioribus. Ungues recti, breues, compressi, acuti. Cauda obsolete quadrangularis, aequalis, corpore triplo longior, pilis brevissimis rigidiusculis tecta, extremitate spatio trium digitorum pilis longis molliusculis distinctis instructa. Pili longiusculi, molles, densi, in capite et corpore usque ad media latera pallide fusci; laterum reliqua parte et abdomine candidi. Pili candidi in circulum paruum dispositi corpus proxime supra caudam terminant. Cauda pallide fusca, corpore paullo lucidior. Pars lanuginosa caudae anterieus nigra, extremo apice candida. Auriculae et pedes coloris carnei. Mammae octo remotissimae.

Habitat in Aegypto, in monticulis Aegyptum ab Arabia diuidentibus; in Circassia, Sibiriae campis Tschikoiensibus, Argunensibus et Ononensibus: hic enim Iaculus quibus differat ab Aegypto non video. An pollice retro verso plantarum? (sed num certe sic?) S. G. Gmelinus autem sibirico quinque digitos tribuit. Distinguit Buffonius atque Pennantus.

Solis plantis pedum incedit saliendo ad trium vel quatuor pedum distantiam. Quiescens pedes posteriores abdomini adplicat et supra genua inflexa sedet, anteriores vero gulae admouet, qui tunc

minime conspiciuntur. Vescitur radicibus, gramine, Tritico, Sefamo. Terram fodit subterraneus. Cibum palmis ori admouet. Aquam palmis digitis incuruatis haurit. Die integro dormit, nocte semper vigil. Hominem non valde metuit, neque tamen perfecte cicur euadit. In Sibiria foenum ante hiemem fecat siccatumque in aceros rotandiusculos coactum cuniculis importat. Caro Arabibus et Calmyccis esculenta.

Ab hoc rursus distinguit doctissimus Pallas aliam speciem:

Mus Sagitta *Pallas Reis. II p. 706.*

Die Pfeilmaus *Müll. Naturf. Suppl. p. 46.*

Тарбаганчикъ (Tarbaganczik) *Russis in Sibiria.*

Ierboah *Arabibus (secundum Pallas.)*

deque ea haec addit:

„ Mure Iaculo maiore longe inferior, sed maior eiusdem varietate pygmea, et constantioris staturae. Mole circiter Rattum domesticum aequat. Colore, structura interna, pedibus posticis cum cauda maximis Iaculo perquam similis. Diuersus capite globosiore, auriculis capite multo breuioribus ovalibus, dentibus primoribus supra luteis, striga profunde exaratis (quod non in Iaculo); artubus posticis caudaque proportionem breuioribus, minori quoque flocco caudam terminante. Maxime distinguitur plantis tridactylis et digitorum lateralium defectu plenario; digiti tres subtus longis pilis hirsutissimi, vngue medii digiti minore. Postica pars corporis, femoraque minus crassa et carnosissima, vropygium quoque haud adeo longe productum quam in Iaculo. Longitudo animalculi 5 poll. I I lin. caudae 6 poll. 5 lin. Longitudo artuum posteriorum circiter

circiter 6 lin. At in Iaculo maiore corpus 7 poll. cauda 9 poll. artus, postici 7 poll. 6 lin. aequant. "

„Minor haec species, vt in Arabia, ita et ad Irin cuniculatur in arena mobili, campisque arenosis aridissimis, quum contra Iaculus solum firmum et campos quaerat herbidos. Cuniculi caeterum simillimi, oblique descendentes ad nidum, vnde denuo canalis ascendit, in superficiem terrae non omnino peruius, per quem adpropinquante periculo, pertusa arena aufugit animal.“

Ego quidem plures vna specie hic subesse bene intelligo, quotnam autem sint, quibusque notis differant, determinare nescio.

giganteus. 2. I. cauda attenuata longitudine corporis.

Känguruh *Hawkesw. Seereis. III p. 174 cum fig.*

Das Känguruh: Mus Canguru *Müll. Naturf. Suppl. p. 62 tab. 3 fig. 3 Hawkesw.*

Magnitudine Ovis. Cauda fere longitudine corporis versus apicem attenuata; in reliquis similis I. orientali. Pedes Color profunde murinus, at in capite et auriculis leporinus.

Habitat in noua Hollandia. Salit plantis insistens. Caro bona, esculenta.

torrida- 3. I. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis,
rum. Mus (longipes) cauda longa vestita, pedibus posticis longitudine corporis flauis *Linn. mus. Ad. Frid. I p. 9.*

Mus (longipes) cauda longa vestita, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, femoribus longissimis *Linn. syst. nat. 10, I p. 62 n. 14.*

Muis met een lange ruige Staart, de Voorpooten vier-, de Agterpooten vyf-Vingerig en zeer lang
Houtt. nat. hist. II p. 488.

Mus (longipes) cauda longa vestita, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, femoribus longissimis
Linn. syst. nat. 12, I p. 84 n. 19.

The torrid Herboa *Penn. syn. quadr. p. 297 n. 224.*

Der Langfufs *Müll. Naturf. I p. 352.*

Magnitudine M. Musculi, vel paullo minor. Color flauus, subtus albicans. Caput quasi absque collo villo. Mystaces longae. Auriculae nudae, ovaetae. Cauda longitudine corporis, flaua, subpilosa. Pedes antici breues vt in Musculo, vnguibus quatuor. Pedes postici longitudine totius corporis, crassi, robusti, subnudi, vnguibus siue digitis quinque.

Habitat in torridis regionibus. Animal obscurum

Eiusdem forte speciei est:

Mus meridianus *Pallas Reis. II p. 702.*

Der Langfufs *Müll. Naturf. Suppl. p. 42.*

Magnitudo paullo supra Murem siluaticum; caput oblongius, rostro productiore. Nasus gibbus, fossorius, pubescens. Mystaces longissimae. Dentes primores lutei; superiores sulco exarati crenaque incisi. Auriculae insignes, ouales, pubescentes. Corpus postice incrassatum, femoribus crassissimis saltatoriis. Pedes posteriores elongati, magni, pentadactyli. Palmae subpentadactylae, pollice vix vnguiculato. Volae omnium pedum villosissimae. Cauda longitudine fere corporis, crassa, teres, largiter pilosa, apice floccosa, tota corpori concolor. Vropygium sub cauda cum scroto prominentissimum.

tissimum. Color supra pallide fulvus, interdum subgriseus, subtus lacteus. Sutura longitudinalis abdominis fusca. Os pedesque alba. Longitudo corporis $4\frac{3}{4}$ poll. caudae paululum supra 3 pollices.

Habitat in deserto arenoso versus mare Caspium, Iaicum et Wolgam interiacente, ubi vix quicquam crescit praeter Pterococcum aphyllum Pallasii, cuius forte nucleis vescitur; et Astragali aliqui. Cuniculi in arena vlnari circiter profunditate, trifores.

39. SCIVRVS.

Dentes Primores utrinque II; superiores cuneati; inferiores compressi.

Laniarii nulli.

Pedes digitati, digitis 4-5: palmis saepe unguiculus pollicaris.

Cauda longa, pilis longioribus.

vulgaris. I. S. auriculis apice barbatis, cauda dorso concolori.

Sciurus *Plin. hist. nat. VIII c. 38 (c. 58 Hard.) XI c. 43 (c. 99 Hard.)*

Σκίουρος *Oppian. cyneg. II, 586.*

Sciurus *Gesn. quadrup. p. 955 fig. p. 956 mediocr.*

Sciurus *Schwenckf. theriort. p. 121.*

Sciurus *Alarou. digit. p. 396 fig. p. 398 mediocr.*

Sciurus *Ionst. quadrup. p. 163.*

Sciurus *Eichhorn Ionst. quadrup. tab. 66 fig. modioc.*

Aychhorn *Gesn. Thierb. p. 22 fig. mediocr.*

Sciurus *Charlet. exerc. p. 24.*

Sciurus *Sibb. Scot. an. p. 11.*

Sciurus vulgaris *Rai. syn. quadr. p. 214.*

- Sciurus *Rzacz. Polon. p. 224 auct. p. 320.*
 Sciurus folis palmis faliens *Linn. syst. nat. 2 p. 46.*
 Eichhörnlein *Riding. jagdb. Th. tab. 20.*
 Die Eichhörner *Linn. Gotbl. p. 222.*
 Sciurus palmis folis faliens *Linn. fn. suec. I p. 8 n. 21.*
 Das Eichhorn *Meyer Thiere I tab. 97.*
 Sciurus palmis folis faliens *Linn. syst. nat. 6 p. 9 n. 1.*
 Sciurus vulgaris, rubicundus *Klein. quadrup. p. 53.*
 Sciurus fusco-fubrubens ventre albido. The reddish-brown Sciurus, with a white belly: the common Squirrel *Hill anim. p. 523.*
 Sciurus (vulgaris) palmis folis faliens *Linn. mus. Ad. Frid. I p. 8.*
 L'Ecureuil: Sciurus (vulgaris) rufus, quandoque griseo admixto *Briff. regn. an. p. 150 n. 1.*
 Sciurus palmis folis faliens *Kram. Austr. p. 314.*
 Das Eichhörnchen *Hall. vierf. p. 415.*
 Sciurus (vulgaris) auriculis apice barbatis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. syst. nat. 10, I p. 63 n. 1.*
 L'Ecureuil *Buff. hist. nat. VII p. 253 tab. 32.*
 Ecureuil *Dictionn. anim. II p. 73 cum congener.*
 Inkhorn, met de Oeren aan de tippen gebaard, de Voorpooten vier-, de Agterpooten vyf- Vingerig *Houtt. nat. hist. II p. 494.*
 Sciurus (vulgaris) auriculis apice barbatis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. fn. suec. 2 p. 13 n. 37.*
 Sciurus auriculis apice barbatis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Gronov. zooph. I p. 4 n. 17.*
 The Squirrel *Penn. brit. zool. p. 44 cum fig. bona.*
 Egerne *Pontopp. Dan. I p. 611.*
 Ecureuil vulgaire *Bom. dictionn. II p. 80.*
 Sciurus (vulgaris) auriculis apice barbatis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. syst. nat. 12, I p. 86 n. 1.*

- Das gemeine Eichhörnchen *Berl. Samml. II p. 591.*
 Das Eichhörnchen *S. G. Gmelin Reif. I p. 35 tab. 7.*
 Das Eichhörnchen von weißlicher Farbe *S. G. Gmelin Reif. I tab. 8.*
 The common Squirrel *Penn. syn. quadr. p. 279 n. 206.*
 Scoiattolo *Aless. quadr. II tab. 75.*
 Common Squirrel *Forster: Philos. transact. LXII p. 378.*
 Das gemeine Eichhorn *Müll. Naturf. I p. 355.*
 Sciurus (vulgaris) auriculis apice barbatis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Müll. Dan. prodr. p. 5 n. 32.*
 Das Eichhörnchen *Mart. Buff. vierf. IV p. 208 tab. 68.*
 Scoiattolo, Schiarro, Schiratto, Schiriuolo, Chiriuolo, Schiratolo *Italis.*
 Harda, Arda, Hardilla, Ardilla, Esquilo *Hispanis.*
 Ciuro *Lusitanis.*
 Ecuireuil *Gallis.*
 Gwiwair *Cambrensis.*
 Eichhorn, Eichhörnchen *Germanis.*
 Eichkatzl *Austriacis.*
 Inkhoorn, Eekhoorn, Eikhoorn *Belgis.*
 Squirrel *Anglis.*
 Egern *Danis.*
 Ikorn *Noruegis.*
 Ikorn *Suecis.*
 Gråfkin *Ostrobothniensis.*
 Orre *Lapponibus.*
 Wiéwiorka *Polonis.*
 Бѣлка (Bjelka), Вѣкша (Wjekfscha) *Ruffis.*
 Uluk *Tungusis.*
 Kermang *Burätis.*
 Tien *Tataris.*
 Ur *Tscheremissis.*
 Bakscha *Tschuwafschis.*

Koni *Wotiakis*.

Uru *Morduanis*.

Ur *permice*.

Oculi magni, splendentes, nigri. Auriculae longius barbatae. Caput, corpus, crura atque cauda ex splendenti rufo fusca. Pectus et venter alba. Pedes 4-5 cum ungue pollicari in palmis. Cauda pilis longioribus disticha, in dorsum reflexa pro umbraculo. Mammae sex ventrales, duae pectorales. Penis ingens, glande officulo paruo fulta. Longitudo corporis $8\frac{1}{2}$ poll. cauda longitudine corporis vel paullo longior.

Habitat in Europa, America boreali Asiaque boreali et temperata, vsque adeo in Ceylonam.

Degit in siluis. *Vicitat* aestate gemmis ramulisque arborum, praecipueque amat abietem eiusque strobilos iuniores; pro hieme colligit nuces varias intra terram desodiendas. Edit erectus sedens, palmis utens quasi manibus. Agillimus salit ex arbore in arborem. Nidus globosus e muscis foliisque ficis, in arborum ramis, obturatis qua spiratarus est ventus cauernis ex alia parte aperit fores. Coit verno tempore, Martio et Aprili mense, post quatuor hebdom. parit 3-5 coecos. Cortice interdum nauigat. Docilis facileque mansuescens.

Varietates haud paucae; praecipuae hae quidem videntur cum suis synonymis:

a. Sciurus hieme caerulefcenti-cinereus, aestate ruber abdomine albo.

Ponticus seu venetus mus, quem vulgo varium vocant *Gesu. quadr. p. 839. cum fig.* mediocr.

Sciurus

Sciurus varius, Varus vulgo dictus *Aldrov. digit.*
p. 403.

Mus ponticus Varus vulgo dictus Popieliza, siue
Sciurus cinereus *Aldrov. digit.* p. 405 *fig. me-*
diocr.

Sciari, qui Mures Pontici et a colore varii dicun-
tur *Ioust. quadrup.* p. 163.

Veeh, Mus Ponticus siue Venetus *Gesn. Thierb.*
p. 24.

Sciuri *Scheff. Lappon.* p. 342.

Sciurus, siue Mus Ponticus *Charlet. exerc.* p. 24.

Mus ponticus seu venetus *Rzacz. aust.* p. 318.

L'Ecureuil varié: Sciurus (varius) ex candido
cinereus *Briff. regn. an.* p. 152 n. 4.

Eichhörner oder Grauwerk *Müll. Samml.* III p.
517.

Das weisgraue Eichhörnchen *Berl. Samml.* II p.
603.

Popielica *Polonis.*

Primo colorem mutat in dorso, tunc in ventre,
porro in pedibus, dein in capite.

Habitat in borealibus Europae et Asiae.

Optimi circa Kasim fluuium in districtu Beresowi-
ensi; nec non circa Ob fluuium; magnitudine
dupla, colore argenteo, Teleuzkaja belka di-
ci. Circa Ieniseiam et Angaram obscuriores
colore, sed pilis minus densis. Nigriores circa
Baikal lacum, nigerimi circa Baryusinskoi
Ostrog, ad Werchnajam Angaram, ad fontes
Witim flumini inque districtu Nertschinskiensi, qui
omnium optimi.

Sciurus niger, rarius visus in borealibus, distin-
guendus ab Americano.

2. Sciurus totus albus, oculis rubris.
 Sciurus albus *Wagn. Helvet. p. 185.*
 Das weiße Eichhorn *Linn. Westgoth. p. 8.*
 L'Ecureuil blanc de Siberie: Sciurus albus sibe-
 ricus *Briff. regn. an. p. 151 n. 2.*
 Das weiße seltn^e, siberische Eichhörnchen *Berl.*
Samml. II p. 600.

Habitat in borealibus et alpinis, rarissimus.

3. Sciurus cauda lacteo - alba; interdum et hypo-
 chondriis pedibusque albis.

Reperitur passim in Anglia et Westrobothnia.

4. Sciurus hudsonicus.

The Hudson's bay Squirrel *Penn. syn. quadr. n.*
206 a tab. 26 fig. 1.

Minor europaeo. In medio dorso linea ferrugi-
 nea a capite ad caudam vsque. Latera palli-
 diora. Venter pallide cinereus nigro variega-
 tus. Cauda brevior, minus pilosa, ferruginea
 nigro annulata, versusque apicem fascia latiore
 nigra.

Habitat ad fretum Hudsonis.

5. Sciurus ceylonicus.

The white-legged Squirrel *Penn. syn. quadr. n.*
206 p.

Caput, corpus supra, latera et digiti rufo - fusca.
 Facies, nasus, collum subtus, venter, crura
 anteriora, auriculae intus et femora intus alba.
 Auriculae leuiter nigro - barbatae. Cauda longa
 nigri-

nigricans, pilis multo brevioribus quam in vulgari.

Habitat in Ceylona.

7. Sciurus perficus.

Eine Abänderung der Eichhörner in Persien *S. G.*
Gmelin Reif. III p. 379 tab. 43.

Corpore supra obscure cinereo; orbitis nigris; auriculis intus denudatis, extus nigricantibus; gula, pectore, abdomine flavis, lateribus albis; cauda ex nigricante grisea, subtus fascia alba; pedibus totis extus dorso, intus abdomini concoloribus; palmis plantisque profunde rubris.

Habitat in Persiae prouincia Gilan.

Non in omnes varietates haece quadrat character specificus, quem dedi: meliorem tamen ignoro.

- niger. 2. S. niger auriculis imberbibus.
- Quauhtechalotl thilitic. Sciurus mexicanus *Hernand.*
Mex. p. 582 cum fig.
- Quauhtechallotl *Fernand. anim. p. 8.*
- Prior Quauhtechallotl *Species Ionst. quadrup. p. 163.*
- The black Squirrel *Catesb. Carol. II p. 73.*
- Sciurus niger *Klein. quadrup. p. 53.*
- Das schwarze indianische Eichhörnchen *Hall. vierf. p. 417.*
- L'Ecureuil noir: Sciurus niger *Briff. regn. an. p. 151 n. 3.*
- Sciurus (niger) niger *Linn. syst. nat. 10, I p. 64 n. 2.*
- Zwarte Inkhoorn *Houtt. nat. bist. II p. 497.*

Sciurus (niger) niger *Linn. syst. nat. 12, I p. 86*

tab. 2.

Das schwarze Eichhörnchen *Berl. Samml. II p. 598.*

The black Squirrel *Penn. syn. quadr. p. 284 n. 210*

tab. 26 fig. 2.

Das schwarze Eichhorn *Müll. Naturf. I p. 356.*

Paullo maior vulgari. Auriculæ imberbes. Totus niger, interdum autem nasus albus collumque tor- que albo notatum, nec non caudæ apex albus. cauda breuior ac in cinereo.

Habitat in America boreali, neq̄ non in mexicano regno.

Distinguendus probe a Sciuri vulgaris varietate nigra, cui auriculæ barbatae.

cinereus. 3. S. cinereus ventre albo, auriculis imberbibus.

Sciurus Virginianus cinereus maior *Rai. syn. quadr.*

p. 215.

The Fox-Squirrel *Lawson Carol. p. 124.*

The Gray Fox Squirrel *Catesb. Carol. II p. 74 tab.*

74.

The Fox-Squirrel *Brick. North-Carol. p. 127.*

Sciurus Virginianus cinereus maior *Klein. quadrup.*

p. 53.

Sciurus griseus cauda minore. The grey Sciurus, with a smaller tail: the American grey Squirrel

Hill anim. p. 523.

Die grauen Eichhörner *Kalm Amer. II p. 352/450.*

L'Ecureuil de Virginie: Sciurus (Virginianus) cine- reus, auriculis ex albo flauicantibus *Briff. regn.*

an. p. 153 n. 6.

Sciurus maior griseus, cauda extrema comosa, pilis diffusis; the grey Squirrel *Brown. Jam. p. 483.*

Sciurus

Sciurus (cinereus) virginianus cinereus maior *Linn. syst. nat.* 10, I p. 64 n. 3.

Groote Afchgrauwe Virginifche Inkhorn *Houtt. nat. hift.* II p. 498.

Le Petit-Gris *Buff. hift. nat.* X p. 116 tab. 25.

Petit gris *Bom. hift. nat.* III p. 430.

Sciurus (cinereus) virginianus cinereus maior *Linn. syst. nat.* 12, I p. 86 n. 3.

Das groſſe graue virginianifche Eichhorn *Berl. Samml.* II p. 600.

The grey Squirrel *Penn. syn. quadr.* p. 282 n. 209 tab. 26 fig. 3.

Scoiattolo del Canada *Aleſſ. quadrup.* III tab. 117, fig. Buff.

Das afchgraue Eichhorn *Müll. Naturf.* I p. 356.

Magnitudo tripla Sciuri vulgaris. Auriculæ imberbes, intus nudæ, extus pilis ex albo flauicantibus veſtitæ. Pili obſcure grifei, nigro mixti, ſæpe admixto fordide flauo. Venter cum interiore crurum latere albus. Cauda reflexa, longa, piloſiſſima, grifea, nigro ſtriata. Pedes 4-5 (Kleinio male 5-4).

Habitat in America ſeptentrionali, vbi Zeam imprimis deſtruit, ideoque cum præmio (3 pence) occidendus. Mores Sciuri vulgaris. Facile manueſcit. Caro valde delicata.

Sciurus cinereus aſiaticus, ex quo pelles *Grauwerk, petit gris* dictæ, omnino diſert atque ad Sciurum vulgarem pertinet.

Huc refero:

The Squirrel with plain ears *Penn. syn. quadr.* n. 210 p.

Pili corporis fordide albo et nigro mixti. Gula et crura cum femoribus intus nigra. Cauda brevior quam in reliquis Sciuris, obscure flava admixto nigro.

Habitat in Virginia.

- macrou- 4. S. cauda corpore duplo longiore grisea.
rus. Sciurus zeylanicus pilis in dorso nigricantibus, Ruk-
kaia dictus Rai. *syn. quadr. p. 215.*
Sciurus cauda maxima griseo nigrescens. The blackist
Sciurus, with a very large tail: the Ceylon Squir-
rel Hill *anim. p. 523.*
Das gelbbauchige Indian. Eichhörnchen Hall. *vierf*
p. 417.
Sciurus macrourus: the longtailed Squirrel Penn. *Ind*
zool. p. I tab. I.
Das gelbbäuchige indianische Eichhörnchen *Eerl*
Samml. II p. 612.
The Ceylon Squirrel Penn. *syn. quadr. p. 281 n. 207.*
Dandulana *Ceylonensibus.*

Magnitudo tripla Sciuri vulgaris. Auriculæ nigro barbatae. Nasus coloris carnei. Buccae, crura et venter pallide flava. Macula flava auriculis interiecta. Frons, dorsum, latera femoraque nigra. Buccae linea bifurca nigra. Corpus subtus rubrum. Cauda corpore duplo longior, pallide grisea, valde pilosa, disticha, nisi quod prope basin pili totam caudam circumdent.

Habitat in Ceylona et Malabarico regno.

- indicus. 5. S. cauda longitudine corporis, apice aurantio.
The Bombay Squirrel Penn. *syn. quadr. p. 281 n. 208.*

Longi-

Longitudo corporis 16 pollicum, caudae 17 poll.
Auriculae apice barbatae. Caput, dorsum, latera,
crura superius, femora et cauda obscure purpurea.
Crura et femora inferius cum ventre flaua.
Cauda apice aurantia.

Habitat in India orientali.

variegatus. 6. S. corpore supra nigro, albo et fusco variegato.

Quauhcallotlquapachtli aut Coztiocotequallin *Fernand. anim. p. 8.*

Coquallin *Bom. dictionn. I p. 653.*

Le Coquallin *Buff. hist. nat. XIII p. 109 tab. 13.*

The varied Squirrel *Penn. syn. quadr. p. 285 n. 211.*

Coquallin *Aless. quadrup. III tab. 147.*

Magnitudine dupla S. vulgaris. Auriculae imberbes.
Corpus supra nigro, albo et fusco variegatum, ventre
flauescente. Cauda supra corpus reflexa.

Habitat in Mexico. Subterraneus parit, cibumque colligit pro hieme. Edit Zeam. Non mansuescit.

aestuans. 7. S. griseus, subtus flauescens.

Sciurus brasiliensis *Marcgr. Brasfl. p. 230.*

L'Ecureuil du Bresil: Sciurus (brasiliensis) coloris ex flauo et fusco mixti, taeniis in lateribus albis *Briss. regn. an. p. 154 n. 7.*

Sciurus (aestuans) griseus, subtus flauescens *Linn. syst. nat. 12, I p. 88 n. 9.*

The Squirrel of Guiana. *Bancr. Guian. p. 143?*

Das gelb- und braunbunte Eichhörnchen aus Brasilien, mit weißen Streifen an den Seiten *Berl. Samml. II p. 610.*

Das surinamische Eichhörnchen *Berl. Samml. II p.*
612.

The Brazilian Squirrel *Penn. Syn. quadr. p. 286 n.*
213.

Das surinamische Eichhorn *Müll. Naturf. I p. 359.*

Longitudo corporis $8\frac{1}{4}$ poll. caudae 10 poll. Auriculae subrotundae, imberbes. Caput, dorsum et latera pilis mollibus griseis, apicibus flavis. Cauda rotundata, pilis nigro et flauo annulatis. Gula cinerea. Crura intus et venter flaua. Venter longitudinaliter linea alba diuisus a pectore inde vsque in ipsam caudam, medio tamen interrupta. Pedes 4-5 cum ungue in palmis pollicari.

Habitat in Brasilia, Guiana, Surinamo.

Num eiusdem speciei:

Sciurus americanus *Seb. thes. I p. 78 tab. 48 fig. 5.*

Sciurus genitalibus maximis *Linn. syst. nat. 2 p. 46.*

Sciurus Americanus *Sebae Klein. quadrup. p. 54.*

Sciurus cauda teretiuscula, auribus latis nudis. The round-tailed *Sciurus*, with short, broad ears: the brown American Squirrel *Hill anim. p. 524.*

L'Ecureuil d'Amerique: *Sciurus (americanus) obscurus cinereus* *Briss. regn. an. p. 152 n. 5.*

Das ungestreifte Amer. Eichhörnchen *Hall. vierf. p.*

417.

Das dunkelgraue americanische Eichhörnchen *Berl. Samml. II p. 599.*

flauus. 8. *S. auriculis subrotundis, corpore luteo.*

Sciurus cauda teretiuscula, auribus subrotundis nudis *Linn. syst. nat. 6 p. 9 n. 3.*

Sciurus cauda tereti: pilis breuibus, auribus subrotundis *Linn. amoen. acad. I p. 561.*

Sciurus (flauus) auriculis subrotundis, pedibus pentadactylis *Linn. syst. nat. 10, I p. 164 n. 4.*

Les quatrièmes Ecureuils *Du Pratz Louif. II p. 99.*

Inkhoorn met rondagtige Ooren, de Pooten vyfvingerig *Houtt. nat. hist. II p. 499.*

Sciurus (flauus) auriculis subrotundis, pedibus pentadactylis, corpore luteo *Linn. syst. nat. 12, I p. 86 n. 4.*

Das gelbe Eichhörnchen von Karthagena *Berl. Samml. II p. 611.*

The fair Squirrel *Penn. syn. quadr. p. 285 n. 212.*

Das gelbe Eichhorn *Müll. Naturf. p. 357.*

Facies S. vulgaris, sed dimidio minor. Auriculæ nudiusculæ, subrotundæ, humanis quodammodo similes, nec pilis longis terminatæ. Setae plures ad latera rostri in labio superiore, et nonnullæ etiam in genis. Cauda pilosa, teres, nec pilis longiusculis bifariam pectinata, vt in nostratibus. Palmae digitis quatuor cum pollice brevissimo et fere nullo, vngue etiam breuiore armato. Plantae pentadactylae, pollice et longiore et vngue magis acuto, quam in palmis. Color luteus, apicibus pilorum albicantibus.

Habitat in America australi, Pennanto in India orientali.

palmarum. 9. S. subgriseus, striis tribus flauicantibus, cauda albo nigroque lineata.

Γαλη Λιβυκή, Mustela africana *Cluf. exot. p. 112 cum fig. mala.*

Mustela libyca *Nieremb. hist. nat. p. 172.*

Mustela africana *Nieremb. hist. nat. p. 172 fig. Cluf.*

- Africana mustela *Ionst. quadrup. p. 153.*
 Mustela Africana Ciusii *Rai. syn. quadr. p. 216.*
 Mus indicus arboreus striatus in Palmis cocciferis de-
 gens *Rai. syn. quadr. p. 230?*
 Mus corpore breui, lateribus striatis, The short-
 bodied Mus, with striated sides *Hill anim. p. 522.*
 L' Ecureuil palmiste, vulgairement Rat palmiste:
 Sciurus (palmarum, Mus palmarum vulgo) coloris
 ex rufo et nigro mixti, taeniis in dorso flauicanti-
 bus *Briff. regn. an. p. 156 n. 10.*
 Nierembergs Zwergeichhörnchen *Hall. vierf. p. 418.*
 Le Palmiste *Buff. hist. nat. X p. 126 tab. 26.*
 Rat palmiste *Bon. dictionn. III p. 721.*
 Sciurus (palmarum) subgriseus striis tribus flauican-
 tibus, caudaque albo nigroque lineata *Linn. syst.*
nat. 12, I p. 86 n. 5.
 Der Palmist, die Palmenratze, das Palmeichhörnchen
Berl. Samml. II p. 603.
 Ein sogenanntes Zwergeichhörnchen *Berl. Samml. II*
p. 614.
 The Palm Squirrel *Penn. syn. quadr. p. 287 n. 215.*
 Scoiattollo delle Palme *Aless. quadrup. III tab. 118*
fig. Buff.
 Das Wieseleichhörnchen *Müll. Naturf. I p. 357.*

Magnitudo Ratti vel Sciuri parui: corpus longitudine
 5 poll. cauda 6 poll. Auriculae rotundatae. Co-
 lor capitis, dorfi et laterum ex rufo et griseo mi-
 xtus cum striis tribus (interdum 5 uti Pennanto)
 pallide flauis in dorso et lateribus. Venter pallide
 flauus est. Cauda disticha, erecta, non obum-
 brans, albo nigroque lineata. Pedes 4-5.

Habitat in Asia et Africa, num et in America? sic
 certe Linné putat. In arboribus, praecipue Pal-
 mis degit.

getulus.

getulus. 10. S. fuscus, striis quatuor albidis longitudinalibus.

Sciurus getulus *Aldrov. digit. p. 405 fig. p. 406.*

Sciurus getulus *Ionst. quadrup. p. 163 tab. 67 fig. mala.*

Africanisches Aychhorn Scyurus Getulus genannt
Gesn. Thierb. p. 24 cum fig. mala.

Sciurus, siue Mus Getulus *Charlet. exerc. p. 24.*

Sciurus Getulus Cail apud Gesnerum *Rai. syn. quadr. p. 216.*

Sciurus getulus ex noua Hispania foemina *Seb. ibes. I p. 76 tab. 47 fig. 3.*

Sciurus genitalibus maximis *Linn. syst. nat. 2 p. 46.*

Sciurus Getulus Cail apud Gesnerum *Klein. quadrup. p. 54.*

Sciurus ex cinere rubicundus; lateribus striatis, auribus breuioribus *Klein. quadrup. p. 55.*

The Barbarian Squirrel *Edw. birds IV tab. 198.*

Sciurus rufo-nigrescens lateribus variegatis. The darkercoloured Sciurus, with variegated sides: the Barbary Squirrel *Hill anim. p. 524.*

L'Ecureuil de Barbarie: Sciurus (Getulus) coloris ex rufo et nigro mixti, taeniis in lateribus alternatim albis et fuscis aut nigris *Briss. regn. an. p. 157 n. II.*

Das africanische Lievereieichhörnchen *Hall. vierf. p. 418.*

Das Amer. gestreifte fleg. Eichhorn *Hall. vierf. p. 421 (Non est americanus, non volat).*

Sciurus (getulus) fuscus, striis quatuor albidis longitudinalibus *Linn. syst. nat. 10, I p. 64 n. 5.*

Bruine Inkhoom, met vier witagtige Streepen, langs heen, over 't Lyf *Houtt. nat. bist. II p. 500 tab. 21 fig. I.*

Le Barbarefque *Buff. bist. nat. X p. 126.*

L'Ecureuil Barbarefque *Buff. bist. nat. X tab. 27.*

Sciurus (getulus) fuscus, striis quatuor albidis longitudinalibus *Linna. syst. nat. 12, I p. 87 n. 6.*

Das Eichhörnchen von der Küste der Barbarey *Berl. Samml. II p. 605.*

Das africanische Liebereyeichhörnchen *Berl. Samml. II p. 610.*

The Barbary Squirrel *Penn. syn. quadr. p. 287 n. 215* β varietatem putat Sc. palmarum.

Scoiattolo di Barbaria *Aless. quadrup. III tab. 119 fig. 1* Buff.

Das africanische Eichhorn *Müll. Naturf. I p. 357 tab. 21 fig. 1* Houtt.

Magnitudo Sciuri vulgaris minoris. Oculi nigri. Auriculæ maiores quam præcedentis, minores quamvis ac vulgaris. Orbitæ albae. Caput, corpus, pedes et cauda cinereo-rufescentia, crura pallidiora. Latera corporis striis vtrinque duabus longitudinalibus albis. Venter albus. Cauda nigro variegata, pilosior quam in antecedente, corpus obumbrans.

Habitat cum præcedente, cuius varietatem putat Pennantus, non ego. Mores Sciuri vulgaris.

striatus. 11. S. flavus striis quinque fuscis longitudinalibus.

Techallotl *Fernand. anim. p. 9?*

Sciurus a Cla. D. Lyfter obseruatus *Rai. syn. quadr. p. 216.*

The Ground Squirrel *Lawf. Carol. p. 124.*

Born-doeskie *Bruin. Reiz. p. 467, tab. 254 fig. bon.*

The Ground Squirrel *Catesb. Carol. II p. 75 tab. 75.*

The Ground Squirrel *Brick. North Carol. p. 129.*

L'Écureuil fuiffe *Charlev. nouv. Fr. III p. 134.*

Sciurus striatus *Klein. quadrup. p. 53.*

The ground Squirrel *Edw. birds IV tab. 181.*

Die Erdeichhörner *Kalm Amer. II p. 462.*

Sciurus (striatus) pallidus striis quatuor fasciis longitudinalibus *Linn. mus. Ad. Frid. I p. 8.*

Sciurus minor virgatus. Furunculus Sciuroides Mesferschm. *I. G. Gmelin: Nov. comment. petrop. V p. 344 tab. 9 fig. bon.*

L'Ecureuil de la Caroline: Sciurus (Carolinensis) rufus, taeniis in dorso nigris, taeniis ex albo flavicantibus intermixtis *Buff. regn. an. p. 155 n. 9.*

Das gestreifte Virgin. Eichhörnchen *Hall. vierf. p. 416.*

Sciurus (striatus) flavus striis quatuor fasciis longitudinalibus *Linn. syst. nat. 10, I p. 65 n. 6.*

Les Ecureuils Suisses *Du Pratz Louis. II p. 98.*

Geele Inkhooorn, met sietien bruine Streepen, langs heen, over 't Lyf *Houtt. nat. hist. II p. 501 tab. 21 fig. 2.*

Le Suisse *Buff. hist. nat. X p. 126.*

L'Ecureuil suisse *Buff. hist. nat. X tab. 28.*

Sciurus (striatus) flavus striis quinque fasciis longitudinalibus *Linn. syst. nat. 12, I p. 87 n. 7.*

Der Schweitzer; das schweizerische Eichhörnchen *Berl. Samml. II p. 605.*

Das gelbe fiberische Erdeichhörnchen mit 5 braunen Streifen. *Berl. Samml. II p. 608.*

The ground Squirrel *Penn. syn. quadr. p. 288 n. 216.*

Scoiattolo Urone *Aless. quadrup. III tab. 119 fig. 2 Buff.*

Das gestreifte Eichhorn *Müll. Naturf. I p. 358 tab. 21 fig. 2 Houtt.*

Die gestreiften Eichhörnchen *Pallas Reis. II p. 665; Бурундук (Burunduk) Russis.*

Marawki *Tungusis.*

Girchi *Buratis.*

Ohioin *Huronibus.*

Rösselwiffel *Succis in Philadelphia.*

Magnitudo circiter dimidia Sc. vulgaris: longitudine corporis $5\frac{1}{2}$ poll. caudae 5 poll. Oculi prominentes nigri. Auriculae rotundatae. Dorsum stria longitudinali nigra vel fusca. Latera corporis pallide flava cum lineis duabus nigris longitudinalibus utrinque. Caput et reliquum corpus supra cum cauda rufo-fusca, haec autem profundior. Frons lutescens, pilis raris obscure fuscis intermixtis. Linea fusca supra et infra oculos. Palpebrae albentes. Malae lutescentes. Pectus cum ventre album. Nasus et pedes pallide rubri. Pedes $4\frac{1}{2}$ -5. Cauda pilis nigris et flavescentibus brevioribus quam in praecedentibus tecta, apice albo.

Habitat in America septentrionali, nec non in Asia boreali copiosus, sub terra, canali longo bifori cum concamerationibus lateralibus pluribus distinctis pro singula messe (*Kalm Amer. II tab. 2 fig. 8*). Edit semina, nuces, similiaque. Ferus et vix domandus, vehementer mordet. Rarissime arbores ascendit.

mexicanus. 12. S. cinereo-fuscus striis quinque ad septem albidis longitudinalibus.

Tlamototli *Fernand. anim. p. 9.*

Sciurus rarissimus ex noua Hispania, taeniis albis, mas

Seb. thes. I p. 76 tab. 47 fig. 2.

Sciurus rarissimus, ex noua Hispania, taeniis albis

Klein. quadrup. p. 53.

L'Ecureuil de la nouvelle Espagne: Sciurus (nouae Hispaniae) obscure cinereus, taeniis in dorso albicantibus *Brissl. regn. an. p. 154 n. 8.*

Das schönste Am. Lievereieichhörnchen *Hall. vierf. p. 416. tab. 21.*

Das schönste americanische Liebereyehörnchen,
das weißgestreifte Eichhörnchen aus Neuspanien
Berl. Samml. II p. 609.

The Mexican Squirrel *Penn. syn. quadr. p. 286 n.*
214.

Longitudo corporis $5\frac{1}{2}$ poll. cauda paullo longiore.
Auricularum margo depilis. Color murinus.
Dorsum striis septem albis in mare, quinque in fe-
mina, per caudam decurrentibus.

Habitat in noua Hispania? nisi forte ad getulum per-
tineat.

Glis. 13. S. canus, subtus albidus.

Ελειος *Arist. hist. anim. VIII c. 22 n. 183.*

Glires *Plin. hist. nat. VIII c. 58 (c. 83, Hard.) XVI*
c. 6 (c. 7 Hard.) XXXVI c. 1 (c. 2 Hard.).

Μνοξος *Oppian. cyneg. II, 574.*

Glis *Gesn. quadrup. p. 619 cum fig. mediocri.*

Glis *Aldrov. digit. p. 407 fig. p. 409 mediocr.*

Glis *Ionst. quadrup. p. 164.*

Glis *Aldr. Ionst. quadrup. tab. 67 fig. mala.*

Rellmaus. Grevl. Rell. Rell- oder Schrotmaus Gesn.
Thierb. p. 272 cum fig. mal.

Le Loir *Perr. anim. III p. 31 tab. 3 fig. mediocr.*

Glis *Charler. exerc. p. 25.*

Glis *Gesneri et aliorum Rai. syn. quadr. p. 229.*

Sciurus *Epilepticus; cinereus Prussicus Klein. quadrup.*
p. 54.

Glis vulgaris *Aldrov. Klein. quadrup. p. 56.*

Mus cauda longa pilosa, ventre albo. The white-
bellied Mus, with a long hairy tail: the Italian
Dormouse *Hill anim. p. 518?*

Mus dorso fusco-nigricante, ventre albo, corpore
oblongo. The white-bellied Mus, with a blackish
back,

back, and long body: the Rell-mouse *Hill anim.*
p. 521.

Le Loir: Glis (. . . , .) supra obscure cinereus,
infra ex albo cinerascens *Briff. regn. an.* p. 160
n. 1.

Der preussische graue Tageschläfer *Hall. vierf.* p. 418.

Die Schlafratte *Hall. vierf.* p. 422.

Loir *Dictionn. anim.* II p. 700.

Le Loir *Buff. hist. nat.* VIII p. 158 tab. 24.

Loir *Bom. dictionn.* II p. 711.

Sciurus (Glis) canus, subtus albidus *Linn. syst. nat.*
12, I p. 87 n. 8.

Der preussische graue Tageschläfer *Berl. Samml.* II p.
612.

The fat Squirrel *Penn. syn. quadr.* p. 289 n. 217.

Ghiro *Aless. quadrup.* III tab. 105 fig. 2.

Die Schlafratte *Pallas Reif.* I p. 154.

Das Mausweichhörnchen *Müll. Naturf.* I p. 358.

Der Siebenschläfer *Mart. Buff. vierf.* IV p. 271 tab.
76.

Ghiro, Gliero, Galero *Ital.*

Liron *Hispan.*

Arganaz *Lusitan.*

Loir *Gallis.*

Ratz *passim German.*

Rell, Rellmüß *Helvet.*

Dormouse, Rellmouse *Anglis.*

Семланая Бѣлка (Semlanaja Bjelka) *circa Samarum.*

Longitudo corporis 6 poll. caudae 5. Corpus crassius
quam in Sciuro vulgari. Auriculae tenues, nudaе.
Genae albæ. Mystaces ipso capite longiores. Pili
corporis molles supra cani, ventris albidii. Cauda
valde hirsuta, cana. Pedes 4-5. Mammæ sex
ventrales, quatuor pectorales.

Habitat in Europa australi in filuis. Vicinat glandibus, nūcibus, feminibus pomorum. Nidificat in cauis arborum, pullis 9-12. Interdiu latet. Autumno pinguescit. Octobri mense gregatim migrat in latebras subterraneas, ibique hibernat in finem Maii vsque. Caro Romanis olim maxime expetita, qui in Glirariis nutriebant animal. Mordax.

Tota mihi dormitur hiems, et pinguior illo
Tempore sum, quo me nil nisi somnus alit.
(*falso.*) *Martial.*

tamarisci- 14. S. griseo-lutescens, subtus albus, cauda fusco
nus. obsoletè variegata.

Mus tamariscinus *Pallas Reis. II p. 702.*

Die Tamariskenmaus *Müll. Naturf. Suppl. p. 42.*

Magnitudo ultra Murem Rattum; habitus fere Sciuri quercini. Dentēs primores sulci, superi sulco exarati. Mystaces longissimæ. Oculi masculi. Auriculæ magnæ, ovales, nudiusculæ. Palmae subpentadactylæ, verruca pollicari insigni, incrustata; plantæ pentadactylæ. Cauda longitudine circiter corporis, pilis vestita, apice subfloccosa, annulis latis fuscescentibus obsoletè variegata. Color supra griseo-lutescens, subtus albus; supercilia areaque oculorum albent; plantæ subtus longitudinaliter fuscae, areaque fusca triangula supra metacarpum. Animal elegantissimum, longitudine $6\frac{1}{2}$ pollicum, cauda 5 poll. 1 lin.

Habitat in salsis versus mare caspium, Tamaricè præsertim et Nitraria fruticosis, quorum sub radicibus cuniculos fodit profundissimos, bifores. Pascitur forte fructibus Tamaricis vel Nitrariae, plantisque salsis succulentis.

quer-

quercinus. 15. S. canus, subtus albidus: macula nigra sub oculis.

Mus auellanarum, Sorex Plinii *Gesn. quadrup. p. 833 cum fig. bona.*

Mus auellanarum maior *Aldrov. digit. p. 439.*

Mus auellanarum maior *Ionst. quadrup. p. 168.*

Mus auellanarius *Hafelmaus Ionst. quadrup. tab. 66 fig. medioctis.*

Mus auellanarius *Charlet. exerc. p. 25.*

Mus Auellanarum maior *Rai. syn. quadr. p. 219.*

Mus auellanarum *Rzacz Polon. auct. p. 315.*

Mus auellanarum maior *Linn. syst. nat. 2 p. 47.*

Mus auellanarum maior *Raii Klein. quadrup. p. 56.*

Mus cauda hirsuta, pedibus rubentibus. The hairy-tailed Mus, with red feet: the great Sleeper *Hill anim. p. 519.*

Le Lérot: Glis supra obscure cinereus, infra ex albo cinerascens, macula ad oculos nigra *Briff. regn. ar. p. 161 n. 2.*

Lérot *Dictionn. anim. II p. 619.*

Le Lérot *Buff. hist. nat. VIII p. 181 tab. 25.*

Mus (quercinus) cauda elongata pilosa, macula nigra sub oculis *Linn. syst. nat. 12, I p. 84 n. 15.*

The garden Squirrel *Penn. syn. quadr. p. 290 n. 218.*

Ghiro piccolo *Aless. quadrup. III tab. 106 fig. 1.*

Die Eichelmaus *Müll. Naturf. I p. 351.*

Die große Haselmaus *Mart. Buff. vterf. IV p. 283 tab. 77.*

Loir, Lérot, Rat blanc *Gallis.*

Voisieu, Vonfieu *in Burgundia.*

Mysz orzechowa, Kofzalka *Polonis.*

Longitudo corporis $4\frac{1}{2}$ - 5 poll. caudae 4 poll. Oculi maiusculi nigri. Auriculae subrotundae. Corpus supra obscure, subtus pallide cinereum. Macula nigra circa oculos utrinque, et alia infra auriculas.

las Pedes 4-5. Cauda praecipue versus apicem longius pilosa.

Habitat in Europa australi, in hortis destruens fructus omnis generis: praecipue autem amat perficas drupas. Nidificat in rimis murorum et cauis arboribus. Coit vere; parit aestate 5-6. Hibernat. Odorem Ratti fortem spirat.

auellanarius. 16. S. corpore rufo, gula albicante, pollicibus posticis muticis.

Mus auellanarum minor *Aldrov. digit. p. 439.*

Mus auellanarum vulgo Moscardino *Aldrov. digit. fig. p. 440 bona.*

Mus auellanarum minor *Ionst. quadrup. p. 168.*

Hafelmaus *Gesn. Thierb. p. 265 cum fig. mala.*

Mus Auellanarum Minor *Rai. syn. quadr. p. 220.*

Mus auellanarum minor *Linn. syst. nat. 2 p. 47.*

Mus cauda longa pilosa; corpore rufo, gula albicante.

Linn. fa. succ. 1 p. 11 n. 32.

Mus cauda pilosa elongata, corpore rufo, gula albicante *Linn. syst. nat. 6 p. 10 n. 9.*

Mus cauda longa pilosa, gula albicante. The Mus, with a long hairy tail, and a white throat: the Dormouse *Hill anim. p. 518.*

Le Croque-noix: Glis supra rufus, infra albicans *Briff. regn. an. p. 162 n. 3.*

Mus cauda pilosa elongata, corpore rufo, gula albicante *Kram. Austr. p. 316.*

Kleine Hafelmaus *Hall. vierf. p. 443.*

Mus (auellanarius) cauda elongata pilosa, corpore rufo, gula albicante *Linn. syst. nat. 10, 1 p. 62 n. 11.*

Le Muscardin *Buff. hist. nat. VIII p. 193 tab. 26.*

Hazelmuis: Muis met een lange Hairige Staart, het Lighaam ros, de Keel witagtig *Houtr. nat. hist. II p. 485.*

Erxl. Mammal.

Ee

Mus

Georg. Hoefnagelii Studia p. Fasc. 11. tab. 7.

Mus (auellanarius) cauda elongata pilosa, corpore rufo, gula albicante *Linn. fn. succ. 2 p. 12 n. 35.*

The Dormouse *Edw. Glean. II tab. 266.*

The lesser Dormouse *Penn. brit. zool. p. 45 cum fig.*

Mus (auellanarius) cauda elongata pilosa, corpore rufo, gula albicante, pollicibus posticis muticis
Linn. syst. nat. 12, I p. 83 n. 14.

The Dormouse *Penn. syn. quadr. p. 291 n. 219.*

Muscardino *Aless. quadrup. III tab. 106 fig. 2.*

Die Haselmaus *Müll. Naturf. I p. 350.*

Die kleine Haselmaus *Berl. Samml. VI p. 318 cum fig. Edw.*

Die kleine Haselmaus *Mart. Buff. vierf. IV p. 287 tab. 78.*

Muscardino *Italis.*

Rat d'or, Muscardin, Croque-noix *Gallis.*

Ratdort *in Burgundia.*

Pathew *Cambrensisibus.*

Haselmaus *Germanis.*

Hazelmuis *Belgis.*

Dormouse, Sleeper *Anglis.*

Skogsmus *Suecis.*

Magnitudo Muris Musculi, corpore $2\frac{2}{3}$ poll. longo; at minus gracilis, rostroque obtusiore. Oculi magni, prominentes, nigri. Auriculæ breues, rotundatæ, nudæ, tenues. Corpus supra rufum, gula et ventre ex flauo albicante. Cauda longitudinè corporis vel paullo longior, imprimis versus apicem longius pilosa. Pedes 4-5, pollice plantarum mutico.

Habitat in Europæ sepibus densis et siluis, vix in hortis. Nidum parat in caua arbore minus alta, vel in frutice prope terram e gramine, ruscis, foliis. Parit 3-4. Edit erectus nuces fructusque. Hibernat; diebus serenioribus hiemis expergitur.

volans.

volans. 17. *S. hypochondriis prolaxis volitans, cauda rotundata.*

Quimichpatlan seu Mus volans *Fernand. anim. p. 9.*

Affapanick *Laet Amer. p. 82.*

Quimichpatlan seu mus volans *Ionst. quadrup. p. 164.*

Mus Ponticus aut Scythicus volans, das fliegende

Veeh *Gesn. Thierb. p. 24 fig. p. 25* mediocr.

The flying Squirrel *Grew mus reg. soc. p. 20.*

Sciurus Americanus volans *Rai. syn. quadr. p. 215.*

Flying-Squirrel *Lawson Carolin. p. 124.*

Mus ponticus, scythicus, volans *Rzac. Polon. auct. p. 315.*

Sciurus volans *Rzac. Polon. auct. p. 316.*

The flying Squirrel *Catesb. Carol. II p. 76 tab. 76;*
in volatu *tab. 77.*

Quadrupes volatile Russiae *Duvernoi: Comment. pe-*
trop. V p. 218.

Sciurus volans siue Mus ponticus aut Scythicus *Gesneri*

Klein: Philos. transact. Inum. 427 p. 32 cum fig. | *vol. 38*

Sciurus volans, mas *Seb. zhes. I p. 67 tab. 41 fig. 3.*

The flying Squirrel *Brick. North-Carol. p. 129.*

Sciurus hypochondriis prolaxis volitans *Linn. syst. nat.*
2 p. 46.

Sciurus hypochondriis prolaxis volitans *Linn. fn. suec.*
I p. 9 n. 22.

Das fliegende Eichhorn das Männlein *Meyer Thiere*
III tab. 14 fig. Sebae.

Sciurus hypochondriis prolaxis volitans *Linn. syst. nat.*
6 p. 9 n. 2.

Sciurus petaurista, volans *Klein. quadrup. p. 54.*

The flying Squirrel *Edw. birds IV tab. 191.*

Sciurus hypochondriis prolaxis volitans. The Sciurus,
with the sides extended: the flying Squirrel *Hill*
anim. p. 524.

Fliegende Eichhörner *Kalm Amer. II p. 460.*

Sciurus (volans) hypochondriis prolaxis volitans *Linn.*
mus. Ad. Frid. I p. 8.

L'Eureuil volant: Sciurus (volans) obscure cinereus aut rufescens, cute ab anticis cruribus ad postica membranæ in modum extensa, volans *Briss. regn. an. p. 157 n. 12.*

L'Eureuil volant de Sibirie: Sciurus (ibericus volans) dilute cinereus, cute ab anticis cruribus ad postica membranæ in modum extensa, volans *Briss. regn. an. p. 159 n. 13.*

Sciurus hypochondriis prolaxis volitans *Kram. Austr. p. 315.*

Sciurus minimus, hypochondriis prolaxis volans, ventre albido: the Flying-Squirrel *Brown. Jam. p. 483.*

Das graue fliegende Eichhörnchen aus Rusland *Hall. vierf. p. 418.*

Sciurus (volans) hypochondriis prolaxis volitans *Linn. syst. nat. 10, I p. 64 n. 7.*

Ecureuils volans *Du Pratz Louis. II p. 98 cum fig. mediocr.*

Fliegende Eichhörner *Müll. Samml. III p. 524.*

Inkhoorn met uitgebreide Buikzyden vliegende *Houtt. nat. hist. II p. 503 tab. 21 fig. 3.*

Sciurus (volans) hypochondriis prolaxis volitans *Linn. fn. suec. 2 p. 13 n. 38.*

Das europäische fliegende Eichhorn *Mus. baruth. p. 6, 14 tab. 4 fig. bona.*

Le Polatouche *Buff. hist. nat. X p. 95 tab. 21; fig. volantis tab. 22, 23.*

Ecureuil volant *Bom. dictionn. II p. 79.*

Sciurus (volans) hypochondriis prolaxis volitans, cauda rotundata *Linn. syst. nat. 12, I p. 88 n. 10.*

The flying Squirrel *Penn. syn. quadr. p. 293 n. 221.*

Polatucha *Aless. quadrup. III tab. 116 fig. Buff.*

Der Polatuche oder das fliegende Eichhorn *Berl. Samml. III p. 432 cum fig.*

Greater flying Squirrel *Forster; Philos. transact. LXII p. 379.*

Das

J. D. Fischer *Verf. v. d. Nat. v. d. Livland. ed. 2. hönig*
1791. 8. p. 158. tab. 3. bona

Das fliegende Eichhorn *Pallas Reis. II. p. 439.*

Das fliegende Eichhörnchen *Müll. Naturf. I. p. 359*
tab. 21 fig. 3 Houtt.

Sciurus (volans) hypochondriis prolixis volitans, cauda rotundata *Müll. Dan. prodr. p. 5 n. 33.*

Grauerkskönige in *Borussia.*

Flyve-Ekorn *Noruegis.*

Wiewiorka lataiaca *Polonis.*

Лѣшара (Ljetaga), Лѣшаръ (Ljetag'), Лѣшары
(Ljetag) *Ruffis.*

Umak *Tungusis.*

Chilob *Burätis.*

Affapanick *Virginianis.*

Sahouesquanta *Canadensibus.*

Magnitudo Sciuri striati, corpore et capite breuiore: corpore 5 poll. longo (magnitudo Sc. vulgaris *Forster*). Auriculae rotundatae, nudaе. Oculi magni, nigri, prominentes. Palpebra superior alba. Nasus breuis albicans. Corpus pilis mollissimis, colore supra fusco-cinereo, subtus flauo-albo. Membrana lateralis a pedibus anticis expansa ad posticos, margine nigro. Pedes 4½-5. Cauda longitudine corporis, pilis longis disticha, medio longioribus.

Habitat in borealibus Americae, Asiae, Europae; rarior in Finlandia, Lapponia, Polonia. Degit in arboribus, amatque praecipue Alnum, cuius amenta edit et fructus cum amentis Pini. Gregarius later interdium in arboribus cauis et dormit, noctu egreditur. Extensa cute inter brachia et femora volitat, non sursum nec horizontaliter, sed oblique deorsum. Mansuescit. Parit 2, 3, 4 nudos coecosque pullos. Pellis minus bona, pilis nimis raris.

Petaurista. 18. S. membrana a capite ad caudam per pedes
expansa volitans.

Sciurus virginianus volans *Seb. thes. I p. 72 tab. 44*
fig. 3.

Sciurus cute a capite ad caudam relaxata volans *Linn.*
syst. nat. 2 p. 46.

Das virginische fliegende Eichhorn *Meyer Thiere III*
tab. 15 fig. Sebae.

Sciurus Virginianus, petaurista *Klein. quadrup. p. 55.*

L'Ecureuil volant de Virginie: Sciurus (virginianus
volans) cute a capite ad anum membranae in mo-
dum lateraliter extensa, volans *Briss. regn. an. p.*
159 n. 14.

Das Virginische fliegende Eichhörchen *Hall. vierf.*
p. 420 tab. 22.

Mus (volans) cauda elongata villosa, palmis tetra-
dactylis, plantis pentadactylis, lateribus extensis
volitans *Linn. syst. nat. 10, I p. 63 n. 16.*

Vliegende Muis: Muis met een lange Donshairige
Staart, de Voorpooten vier, de Agterpooten vyf-
vingerig, vliegende met uitge spannen Zyden
Houtt. nat. hist. II p. 492 tab. 20 fig. 3.

Mus (volans) cauda elongata villosa, palmis tetra-
dactylis, plantis pentadactylis, hypochondriis vo-
litans *Linn. mus. Ad. Frid. II p. 10.*

Mus (volans) cauda elongata villosa, palmis tetra-
dactylis, plantis pentadactylis, hypochondriis exten-
sis volitans *Linn. syst. nat. 12, I p. 85. n. 21.*

The hooded flying-Squirrel *Penn. syn. quadr. p. 294*
n. 221 β. Varietatem antecedentis putat cum Buf-
fonio.

Der Flieger *Müll. Naturf. I p. 354 tab. 20 fig. 3*
Houtt.

Os rotundatum labio superiore bifido, albido. Vi-
brissae quinque ordinum, longae. Verruca fetis
tribus supra canthum oculi anteriorem. Dentes
primo-

primores superiores duo conuergentes, inferiores duo paralleli. Auriculæ ouatæ, paruæ, pilis breuibus tectæ. Pedes anteriores digitis quatuor, calcaneis incedentes, unguibus compressis, arcuatis, acutis. Pedes posteriores digitis quinque, talis incedentes. Corpus griseo-fuscum; Sciuro vulgari minus. Cutis a latere utroque extensa ab aure ad palmas, a palmis ad genua femorum, a genu postico femorum ad caudæ basin, margine undique plicato-rugoso, obtuso. Cauda longitudine corporis, teres, tecta ut corpus pilis, non vero longioribus.

Habitat in Virginia, Mexico. Sub die quiescit mordacissimus.

Sagitta. 19. *S. hypochondriis prolixis volitans, cauda plano-pinnata lanceolata.*

Flying Cat *Nieub. Eastind. p. 354 cum fig. mala, aliaque in titulo libri.*

Sciurus (Sagitta.) hypochondriis prolixis volitans, cauda plano-pinnata lanceolata *Linn. syst. nat. 12, I p. 88 n. 11.*

Sciurus petaurista *Pallas miscell. p. 54 tab. 6.*

The sailing Squirrel *Penn. syn. quadr. p. 292. n. 270 tab. 27.*

Der Pfeilschwanz *Müll. Naturf. I p. 360.*

es edificantes Lec. XVI. p. 29. et Pulo-Condor s. inf. aurelianus. prope Cambogiam

Tota statura Sciuri vulgaris; 18 poll. longus præter caudam longitudine 15 pollicum. Supra ferrugineo-fuscus, subtus ferrugineo-pallidus. Caput paruum ouatum. Auriculæ minutæ, ouatæ, obtusæ, vestitæ (nudiusculæ, acutæ *Pallas.*). Mystaces longitudine capitis. Seta vna in mala. Labium superius fissum; inferius breue. Dentes fufci, obtusiusculi. Collum breue. Pedes 4-5. Palmarum calcar setaceum, cartilagineum, lon-

gitudine ipsius vlnae intra cutem. Cutis extensa a capite ad carpum; a carpo ad genu in membranam testam, concolorem, ciliatam. Femora postice ciliata pilis. Pedes subtestacei: digiti omnes ultimo geniculo supra prominuli. Ungues compressi. Scrotum ouatum, magnum, vestitum. Praeputium elongatum, vestitum. Cauda fere longitudine corporis (corpore longior *Pall.*), valde depressa, et pilis lanceolata, obtusa. Mammae sex.

Habitat in Iaua, aliisque insulis indicis, rarus.

40. C A S T O R.

Dentes Primores vtrinque II: *Superiores* truncati, angulo transuerso excauati; *inferiores* apice transuersi.

Laniarii nulli.

Pedes digitati: digitis 5-5.

Cauda plana, nec teres, squamosa.

Fiber. 1. C. cauda depressa ouata.

Fiber *Plin. hist. nat. VIII c. 30 (c. 47 Hard.)*.

Fibri quos castores vocant *Plin. hist. nat. XXXII c. 3 (c. 13 Hard.)*.

Κασος *Aelian. anim. VI c. 34*.

Fiber *Agric. an. subr. p. 20*.

Castor *Gesn. quadrup. p. 336 cum fig. bona*.

Castor *Rondel. aquat. p. 236 cum fig. pessima*.

Fiber *Bellon. aquat. p. 28 fig. p. 30 mediocr.*

Castor *Ol. Magn. Sept. p. 604*.

Castor *Gesn. aquat. p. 219 fig. p. 220 Rondel.*

Fiber *Schwenckf. iberiort. p. 94*.

Fiber siue castor *Schoneu. ichth. p. 34*.

Castor

Castor *Aldrov. digir. p. 276 fig. p. 279* mediocr.

Castor *Ionst. quadrup. p. 147.*

Castor. Fiber. Biber *Ionst. quadrup. tab. 68 fig. Aldrov.*

Castor *Mus. Worm. p. 320.*

Biber *Gesn. Thierb. p. 39 cum fig. mediocri.*

Le Castor *Perr. anim. I p. 136 tab. 19 fig. bon.*

Castores *Scheff. Lappon. p. 339.*

Castor *Charlet. exerc. p. 18.*

Castor, Fiber *Wagn. Helvet. p. 172.*

Castor *Mar. monogr.*

Castor sine Fiber *Rai. syn. quadr. p. 209.*

Beveren *Ysbr. Reis. p. 21.*

Le Castor *Sagrafin: Mém. de l'acad. 1704 p. 48.*

Bevers *Lawson Carolin. p. 120.*

Castor, Fiber *Rzacc. Polon. p. 215 aut. p. 306.*

The Beaver *Catesb. Carol. App. p. XXIX.*

The Beaver *Brick. North-Corol. p. 121.*

Castor cauda ouata plana *Linn. syst. nat. 2 p. 47.*

Biber *Riding. jagdb. Th. tab. 15.*

Le Castor *Charlev. nouv. Fr. III p. 94.*

Beavers *Dobbs Hudf. p. 36.*

Castor cauda ouata plana *Linn. fu. suec. I p. 9 n. 23.*

Castor cauda ouata plana *Linn. syst. nat. 6. p. 10 n. 1.*

Castor. Biber *Klein. quadrup. p. 91.*

Castor cauda ouata plana. The Castor, with a flat oval tail: the Beaver *Hill anim. p. 526 tab. 25 fig. mediocr.*

Bieber *Kalm Amer. III p. 28, 606.*

Castor (communis) cauda ouata plana *Linn. mus. Ad. Frid. I p. 9.*

Le Castor, ou le Bièvre: Castor (s. Fiber) castanei coloris, cauda horizontaliter plana *Briff. regn. an. p. 133 n. 1.*

Mortimer. in Philos. Transact. vol. 38. N. 430.

Le Castor blanc: Castor (albus) albus cauda horizontaliter plana *Briss. regn. an. p. 135 n. 2.*

Bieber *Gisler: Act. bohmens. 1756 p. 196.*

Castor cauda ouata plana *Kram. Austr. p. 315.*

Biber *Hall. vierf. p. 573.*

Castor (Fiber) cauda ouata plana *Linn. syst. nat. 10, I p. 58 n. 1.*

Castor *Dictionn. anim. I p. 444.*

Le Castor *Buff. hist. nat. VIII p. 282 tab. 36.*

Bever met een Ovale platte Staart *Houtt. nat. hist. II p. 410.*

Castor (Fiber) cauda ouata plana *Linn. fn. suec. 2 p. 10 n. 27.*

Bever *Pontopp. Dan. I p. 610.*

Castor *Bom. dictionn. I p. 438.*

Castor (Fiber) cauda ouata plana *Linn. syst. nat. 12, I p. 78 n. 1.*

The Castor *Penn. syn. quadr. p. 255 n. 190.*

Castore *Aless. quadrup. II tab. 62 fig. Buff.*

Beaver *Forster: Philos. transact. LXII p. 375.*

Der Castor *Müll. Naturf. I p. 326 tab. 30 fig. 2.*

Castor (Fiber) cauda ouata plana *Müll. Dan. prodr. p. 4 n. 25.*

Bivaro, Bevero, Castore *Italis.*

Bivaro, Bivaro, Castor *Hispanis.*

Castor *Lusitanis.*

Castor, Bièvre *Gallis.*

Biber, Bieber *Germanis.*

Bever *Belgis.*

Beaver, Castor *Anglis.*

Bever *Danis.*

Bæver *Noruegis.*

Bäfwær *Suecis.*

Biur *Smolandis.*

Majeg *Lapponibus.*

Bobr Polonis.

Бобръ (Bobr') (*adultus*); Кошлoкн (Kofchlöki)
(*pulli*); Ярзы (Iartzy) (*annui*) Russis.

Chaly Barütis.

Longitudo corporis trium pedum, caudae longitudo
II poll, latitudo 5 poll. Caput breue, compres-
sum, rostro rotundato. Dentes primores
fortes. Auriculae minutae, breues, rotundatae,
pilis fere latentes. Oculi parui, subnigri. Col-
lum breue, crassum. Color profunde castaneus.
Crura breuia. Pedes anteriori minores, fissi, vngu-
ibus obtusis; posteriori maiores, palmati, vnguibus
latis, 5 - 5. Cauda lata, depressa, fere oualis,
squamosa. Mammae quatuor pectorales.

Habitat in Europa frigida et temperata, hodie An-
gliae exul, non olim; praecipue autem viuit in
borealibus imprimis Asiae, maxime Americae, ad
ripas fluviorum lacuumque, victitans corticibus Sor-
bi, Salicis, potissimum Populi, vnde Castoreum
praestantius. Vix Pisces edit. Ventriculo supe-
rius innatum est corpus crassum cauernosum hu-
more foetido turgens. Grauida 4 mens. parit
Martio mense 2 - 3. Mansuescit. Aetas 15 - 20
annorum?

Castoreum e folliculis putoriis vtriusque sexus, cellu-
losis, praestantius europaeum quam canadense; in
superiore cauitate liquidum vt axungia.

Architectura in construendo domos ad ripas ante hie-
nem superat omnium animalium. Non autem
aedificat varietas terrestris solitaria (*Terrier Gallis*),
quae praecipue in Europa occurrit.

Pellis proha; aestimatur maxime nigra; alba autem rarissima est. Optimae rufficae circa Petschoram et ad Tas fluuios, pulchrae etiam ad Ob et ad Ieniseiam.

zibethicus. 2. C. cauda longa compresso-lanceolata, pedibus fissis.

Musk-Rat *Lafeson Carol.* p. 120.

Le Rat musqué *Sarrazin: Mém. de l'acad. 1725 p. 323 tab. II fig. 1, 2* mediocr.

The Musk-rat *Bridg: North-Car.* p. 129.

Rat Musqué *Charlea. nouv. Fr. III p. 107.*

Castor cauda longa, lanceolata plana. The Castor, with a long, flat, lanceolated tail: the flat-tailed small Beaver *Hill anim. p. 327* nisi forte *Sorex moschatus* sit.

Die Biesemratzen *Kalm Amer. III p. 25.*

Le Rat musqué du Canada: Castor (Mus moschiferus Canadensis), cauda verticaliter plana, digitis omnibus a se inuicem separatis *Briff. regn. an. p. 136 n. 4.*

Rat musqué du Canada *Dictioun. anim. III p. 668.*

L'Ondatra *Buff. hist. nat. X p. 1 tab. I.*

Rat musqué *Bom. dictioun. III p. 718.*

Castor (zibethicus) cauda longa compresso-lanceolata, pedibus fissis *Lin. syst. nat. 12, I p. 79 n. 3.*

The Musk Beaver *Penn. syn. quadr. p. 259 n. 191.*

Ondatra *Aless. quadrup. III tab. 114 fig. 1* Buff.

Musk Beaver *Forster: Philos. transact. LXII p. 375.*

Die Zibethratze *Müll. Naturf. I p. 333.*

Ondatra *Canadensibus.*

Longitudo corporis pedis vnus, caudae 9 pollicum.

Figura Fibri. Nasus crassus, obtusus. Auriculae

breues pilis fere latentes. Oculi magni. Pedes

digitis 5-5 fissis; posticis setis ciliatis. Cauda

com-

compressa marginibus acutis, squamis minutis tecta, admixtis pilis paucioribus. Color supra rufofuscus, subtus ex cano cinereus. Pili molles. Meit ex foramine infra vuluam.

Habitat in America boreali ad aquas. Edit lignum, radices, caules, folia, fructus Vegetabilium. Maxime amat Acorum.

Per aestatem mas et femina cohabitant; hieme autem plures familiae coeunt in vnum habitaculum rotundum ex herbis iuncisque constructum ope argillae cum pluribus portis, quorannis denuo fruentum. Hibernant alii solitarii in cauis arboribus. Cibum non colligit in hiemen vt Fiber. Pariter vel quater in anno (semel *Buffon*.) 4-7. Pellis bona, mollis. Caro esculenta. Mansuescit. Moschi odorem aestate spirat, non hieme.

41. L V T R A.

Dentes Primores Superiores VI, erecti, acutiores, distincti.

Inferiores VI, obtusiores, conferti: duo interiores.

Pedes pentadactyli palmati.

marina. 1. L. plantis pilosis, cauda corpore quadruplo breuiore.

Iiya quae et Carigueibeiu appellatur a Brasiliensibus *Marcgr. Brasil. p. 234 cum fig. mala.*

Carygueibeiu alias Iiya, *Inst. quadrup. p. 150.*

Iiya siue Carigueibeiu Lutra Indica *Inst. quadrup. tab. 66 fig. Marcgr.*

Saricovieme et Carygueibeju *Charlet. exerc. p. 19.*

Lutra

Lutra brasiliensis Rai. *syn. quadr.* p. 189.

Loutre que les Indiens appellent Carigurbeju Des
March. voy. III p. 290.

Lutra pollice digitis breuiore *Linn. syst. nat.* 2 p.
44.

Lutra pollice digitis breuiore *Linn. syst. nat.* 6 p. 5
n. 2.

Lutra nigricans cauda depressa et glabra *Barr. Fr.*
équa. p. 155.

Lutra marina *Steller: Nov. comment. petrop.* II p.
367 tab. 26 fig. bona.

Lutra Brasiliensis *Klein. quadrup.* p. 91.

Lutra pollice digitis breuiore. The Lutra, with the
inner toe shorter than the other: the Brazilian
Otter *Hill anim.* p. 551.

Meerotter *Steller: Hamb. Mag.* XI p. 460 cum fig. bon.

La Loutre du Bresil: Lutra (Brasiliensis) atrii coloris,
macula sub gutture flava *Briss. regn. an.* p. 278
n. 2.

Die Seeotter *Hall. vierf.* p. 567.

Seebiber *Müll. Samml.* III p. 244.

Kamtschätische Bieber *Müll. Samml.* III p. 529.

Mustela (Lutris) plantis palmatis pilosis, cauda cor-
pore quadruplo breuiore *Linn. syst. nat.* 10, I p.
45 n. 1.

Carigueibeju *Dictionn. anim.* I p. 434.

Brasiliaanische Otter: Wezel met de Voetsoolen, die
gevlied zyn, Hairig, de Staart viermaal korter
dan het Lighaam *Hott. nat. hist.* II p. 168.

La Saricovienne *Buff. hist. nat.* XIII p. 319.

Mustela (Lutris) plantis palmatis pilosis, cauda cor-
pore quadruplo breuiore *Linn. syst. nat.* 12, I p.
66 n. 1.

The Sea Otter *Penn. syn. quadr.* p. 241 n. 175.

Die Meerotter *Müll. Naturf.* I p. 259.

Der Seebiber oder vielmehr der Seeotter *Stell.*
Kamtsch. p. 97.

Mustela

Mustela Lutris Schreb. Säugth. III^{p. 465,} tab. 128 fig. Stell.

Камчатской бобръ (Kamczatskoi bobr') *Ruffis.*

Каланъ (Kalan) *Kamtschadalis.*

Каико *Itelmanis.*

Carigueibeju *Brasiliensibus.*

Longitudo corporis 4 ped. 2 poll. caudae 13 poll. Caput depressum. Auriculæ minimae, erectae, villosae, subrotundae. Nasus niger. Os obtusissimum. Maxilla superior longior latiorque inferiore. Mystaces copiosae, rigidulae: supra supercilia; pone oculos; pone finum oris; ad latera labii inferioris; sub gula. Dentes primores superiores sex aequales, inferiores sex: duobus alternis interioribus et duobus bilobis lateralibus. Pedes 5-5, palmati omnes, postici maiores, fere Phocae. Crura crassa et breuia. Cauda depressa. Mammae duae abdominales. Cutis crassa, pilis densis longisque fuscis aut atris splendentibus cum lanugine molliore.

Variat colore argenteo.

Habitat in Asia septentrionali atque America, in litoribus marinis maioribusque fluminibus. Americana maculam flauam habet infra mentum; num specie diuersa ab asiatica?

Animal mite timidumque, prolem mire amans, ut moerore adeo extinguatur pullo spoliatum. Natus in dorsum proiectum, pullum palmis tenens. Cursu celer. Ludibundum. Vicinat Piscibus, Sepiis, Cancris, Testaceis. Parit monogama unicum semel in anno post grauiditatem octo vel novem mensium. Coit omni tempore, femina resapinata. Visus debilis, at olfactus fortis. Pellis proba Sinensibus imprimis

imprimis aestimata. Iuniorum caro delicata, agninae fere sapore. Occiditur facile istu capitis. Eulatus infantis similis.

vulgaris. 2. L. plantis nudis, cauda corpore dimidio brevior.

Evdgic Arist. hist. anim. I c. 2 n. 8. VIII c. 9 n. 105.

Λαταξ Arist. hist. anim VIII c. 9 n. 105?

Lutra Agric. an. subt. p. 18.

Lutra Gesn. quadrup. p. 775 fig. p. 776 mediocr.

Latax Gesn. quadrup. p. 777.

Lutra Bellon. aquat. p. 31 fig. p. 32 mediocr.

Lutra Gesn. aquat. p. 608 cum fig. mediocr.

Lutra Schwenckf. theriotr. p. 107.

Lutra Schonev. ichtbyol. p. 46.

Lutra Aldrov. digit. p. 292 fig. p. 295 mala.

Lutra Ionst. quadrup. p. 150 tab. 68 fig. mediocr.

Der Otter Gesn. Thierb. p. 302 fig. p. 303 mala.

La Loutre Peyr. anim. I p. 150 tab. 21 fig. bona.

Lutra Charlet. exerc. p. 18.

Lutra, Enydris Wagn. Heluc. p. 178.

Lutra Sibb. Scot. an. p. 10.

Lutra Rai. syn. quadr. p. 187.

Lutra Rzacz. Polon. p. 221 auct. p. 313.

The Otter Brick. North-Carol. p. 122.

Lutra digitis aequalibus Linn. syst. nat. 2 p. 44.

Fischotter Kiding. jagdb. Tb. tab. 16.

Lutra digitis omnibus aequalibus Linn. fn. suec. 1 p. 4 n. 10.

Lutra digitis aequalibus Linn. syst. nat. 6 p. 5 n. 1.

Lutra Klein. quadrup. p. 91.

Lutra digitis omnibus aequalibus. The Lutra, with all the toes of equal length: the Otter Hill anim. p. 550 tab. 27 fig. mediocr.

La Loutre: Lutra (. . .) castanei coloris Briss. regn. an. p. 277 n. 1.

Lutra digitis aequalibus Kram. Austr. p. 312.

Die Flusotter *Hall. vierf. p. 564.*

Fischotter *Hall. vierf. p. 599.*

Mustela (Lutra) plantis palmatis nudis, cauda corpore dimidio breuiore *Linn. syst. nat. 10, I p. 45 n. 2.*

Otter, Flussotter oder Fischotter *Müll. Samml. III p. 531.*

La Loutre *Buff. hist. nat. VII p. 134 tab. 11.*

Loutre *Diçionn. anim. II p. 717.*

Otter: Wezel met de Voetzoolen, die gevlied zyn, kaal, de Staart half zo lang als 't Lighaam *Houtt. nat. bist. II p. 179. tab. 14 fig. 1.*

Viuerra (Lutra) plantis palmatis nudis, cauda corpore dimidio breuiore *Linn. fn. suæ. 2 p. 5 n. 12.*

Lutra digitis omnibus aequalibus *Gronov. zooph. I p. 8 n. 31.*

The Otter *Penn. brit. zool. p. 32 cum fig. bona.*

Odder *Pontopp. Dan. I p. 610.*

Loutre *Bom. diçionn. II p. 725.*

Mustela (Lutra) plantis palmatis nudis, cauda corpore dimidio breuiore *Linn. syst. nat. 12, I p. 66 n. 2.*

Mustela Lutra *Forster: Philos. zransact. LVII p. 342.*

Lutra *Fermin Surin. II p. 82.*

The greater Otter *Penn. syn. quadr. p. 238 n. 173.*

Lontra *Aless. quadrup. tab. 63 fig. Buff.*

Lontra del Canada *Aless. quadrup. tab. 64.*

Flussotter *Müll. Naturf. I p. 262 tab. 14 fig. 1 Houtt.*

Fischotter *Stell. Kamtsch. p. 128.*

Die Fischotter *S. G. Gmel. Reif. III p. 285, 373.*

Mustela Lutra *Schreb. Säugth. III tab. 126 A fig. propr.*

Mustela Lutra canadensis *Schreb. Säugth. III tab. 126 B fig. propr.*

Mustela (Lutra) plantis palmatis nudis, cauda corpore dimidio breuiore *Müll. Dan. prodr. p. 2 n. 10.*

Der Fischotter *Mart. Buff. vierf. IV p. 137 tab. 60.*

- Nutria *Hispanis*.
 Lodra, Lodria, Lontra *Italis*.
 Loutre *Gallis*.
 Dyfrgi *Cambrensis*.
 Otter, Fischotter *Germanis*.
 Otter *Belgis*.
 Otter *Anglis*.
 Odder *Danis*.
 Otter, Slenter *Noruegis*.
 Zhièvres *Lapponibus*.
 Utter *Suecis*.
 Wydra *Polonis*.
 Выдра (*Wydra*) *Ruffis*.
 Irgendir *Tungusis*.
 Chaleu *Burätis*.
 Schank *Persis*.
 Sagif *Turcis et Armeniis*.
 Tovus *Surinamensis*.

Longitudo corporis 23 - 26 poll. caudae 16 - 18 poll.

Caput latum planumque, naso obtuso, crasso, naribus lunatis. Oculi parui, naso approximati. Auriculæ breuissimæ rotundatæ. Labia crassa. Mystaces magnæ. Dentēs primores superiores sex, conferti, acuti: exterioribus duobus maioribus; inferiores minores, obtusiores: interioribus et exterioribus lobatis. Laniarii solitarii magni, arcuati. Molares supra vtrinque quinque: posterioribus duobus lobatis; infra vtrinque sex. Collum abbreviatum, crassitie capitis. Corpus elongatum. Crura breuia atque crassa. Digiti quinque palmati in omnibus. Cauda basi lata, depressa vsque ad apicem. Mammae quatuor minutæ, ventrales. Color corporis profunde fuscus. Maculae duæ paruae albæ ad nasum vtrinque, aliæque infra mentum. Guttur, pectus et venter ex cinereo albicantia. Foramen ouale clausum.

Habitas

Habitat in Europae atque Asiae Americaeque borealis aquis dulcibus, fluviis, stagnis, piscinis, non in mari. Est quoque in Persia. Visitat Piscibus, Ranis, Cancris, hisque deficientibus herbis corticibusque arborum. Piscinas deuastat. Celerime natat atque urinatur. Nidus sub terra supra aquae superficiem, aditu sub aqua, atque spiraculo paruo in terrae superficie. Coit februario mense, aduocata femina sono lento susurrando. Parit martio et aprili pullos tres vel quinque. Ferox, mordet vehementer, sed mansuescit. Caro saporis piscini.

minor. 3. L. plantis hirsutis, digitis aequalibus, ore albo.

Noerza *Agric. an. subt. p. 39.*

Nörtz - Wieselein, Noertz, Nertz oder Nörtz *Gesn. Thierb. p. 347.*

The Minx *Lafson Carol. p. 121.*

Latax; Germ. Nurtz; nobis Nurek *Racz. Polon. p. 218.*

The Minx *Brick. North-Carol. p. 118.*

Vierra (Lutreola) ore albo, plantis palmatis hirsutis, digitis subaequalibus *Linn. fn. suec. 2 p. 5 n. 13.*

Mustela (Lutreola) plantis palmatis hirsutis, digitis aequalibus, ore albo *Linn. syst. nat. 12, 1 p. 66 n. 3.*

Norka *Rytzschk. Orcub. 1 p. 237.*

The lesser Otter *Penn. syn. quadr. p. 239 n. 174 tab. 21 fig. 2 bona.*

Eine kleine Art von Ottern *Pallas Reis. 1 p. 96.*

Lesser Otter *Forster: Philos. transact. LXII p. 371.*

Die Sumpftotter *Müll. Naturf. 1 p. 264.*

Mustela Lutreola *Schreb. Säugth. III tab. 127. fig. Pennanti.*

Steinhund *circa Goettingam.*

Mænk *Suecis.*

Tichuri *Fennis.*

Nurek *Polonis.*

Норка (*Norka*) *Ruffis.*

Iackah *ad fretum Hudſonis.*

Statura Lutrae vulgaris, ſed triplo minor. Corpus fulvo-fuſcum: pilis brevioribus ſpaeſcentibus; longioribus nigris. Auricalae ſubrotandae. Os album. Lingua teſta papillis mollibus. Dentes lanarii ſupra duo approximati vtrinque, poſtico graciliore. Molares ſupra tres, poſtico tranſverſo. Vertex caneſcens pilis albis inmixtis. Pedes palmati pentadaſtyli. Ungues non retractiles. Cauda in acumen attenuata, veſita pilis paullo longioribus.

Habitat in Europa paſſim, in Sibiria Americaque boreali; amat praecipue loca aquoſa. Viſcitatur piſcibus, ranis, inſectis aquaticis, carne. Foetet. **Mores** Lutrae vulgaris. Pellis bona.

42. MUSTELA.

Dentes Primores Superiores VI, erecti, acutiores, diſtincti.

Inferiores VI, obtuſiores, conferti: duo interiores.

Lingua laevis.

Pedes fiſſi, pentadaſtyli.

barbara. 1. *M. atra*, collo ſubtus macula alba triloba.

Mustela maxima atra moſchum redolens. Tayra. groſſe Belette *Barr. Fr. équ. p. 155.*

Mustela (Barbara) pedibus fiſſis, atra, collo ſubtus macula alba triloba *Linn. ſyſt. nat. 10, I p. 46*

et. 4.

Zwarte

Zwarte Wezel, onder aan den Hals met eene witte drielobbige Vlak *Houtt. nat. hist. II. p. 193.*

Mustela (Barbara) pedibus fissis, atra, collo subtus macula alba triloba *Linn. syst. nat. 12; I p. 67 n. 4.*

The Guiana Weefel *Penn. syn. quadr. p. 225 n. 161.*

Der schwarze Wiesel *Müll. Naturf. I. p. 265.*

Corpus statura Martis, nigrum, pilis rigidioribus. Auriculæ rotundæ, villosæ. Area cinerascens ante oculos. Macula sub medio collo, non sub gula, albida. Mammæ quatuor pone umbilicum.

Habitat in Brasilia et Guiania. Adfricat arboribus materiam vinctuosam odore Moschi.

Galera. 2. M. tota fusca.

Vondfira *Flacourt Madag. p. 154.*

Koekeboe *Bossm. Guin. p. 299.*

Galera subfusca, cauda elongata, oculis nigris, auribus subnudis appressis *Brown. Jam. p. 485 tab. 29 fig. 1 bona.*

Vond-fira *Bom. dictionn. IV. p. 629.*

Le Vanfire *Buff. hist. nat. XIII p. 167 tab. 21.*

Le Tayra ou le Galera *Buff. hist. nat. XV p. 155.*

The Madagascar Weefel *Penn. syn. quadr. p. 224 n. 158.*

The Guinea Weefel *Penn. syn. quadr. p. 225 n. 160.*

Vanfiro *Aless. quadrup. IV tab. 159 fig. 2 Buff.*

Mustela Galera *Schreb. Säugth. III tab. 135 fig. Buff.*

Voang-Shira in Madagascar.

-Ff 3

Lon-

MVSTELAE genus corpore elongato pedibusque breuibis est, currit trunco incurvato, scandit arbores, salit ex arbore in arborem. Intestina habet maxime breuvia et simplicia.

Longitudo corporis 13 poll. caudae fere 10 poll. Rostrum productum, subacutum, barbatum, maxilla inferiore longe breuiore. Dentes primores superiores sex, subcompressi, acuti, exteriores paullo maiores. Inferiores totidem consimiles subcompressi et subobtusii, lanariis approximati. Lanarii superiores conici. Lingua retrorsum aculeis scabra. Caput oblongum. Oculi oblongo-rotundati, medio inter aures et apicem rostri locati. Auriculae breues, compressae, semiellipticae, reniformes, humanis fere similes. Pedes lacertosi, validi, fossorii, antici breuiiores, metatarsis oblongis, digitis 5-5. Cauda conico-cylindracea producta, attenuata, recta, declinata. Mammae duae inguinales. Pili totius corporis basi fusci, supra nigro et ferrugineo annulati. Cauda corpori concolor.

Habitat in Guinea et Madagascar; fodit subterranea.

Idem animal putat Buffonius:

De Iavaansche Wezel *Valent. Amb. III p. 279.*

Mustela Iauanica *Seb. thes. I p. 77 tab. 48 fig. 4.*

Mustela Iauanica, Koger Angan dicta *Klein. quadrup. p. 64.*

Le Furet de Iava: Mustela (Vierra Iauanica) supra rufa, infra dilute flava, caudae apice nigricante

Briss. regn. an. p. 245 n. 5.

Die Iavanische Wiesel *Hall. vierf. p. 460.*

Furet de Iava *Dictioun. anim. II p. 230.*

Kager Angan *Iauanensibus.*

Magnitudo Furonis. Caput obscure spadiceum. Dorsum rufum. Venter pallide flauus. Caudae apex niger.

Habitat

Habitat in Iäua. Fodit terram talparum more. Praedatur Mures, Columbas.

canaden- 3. *M. corpore fuluo-nigricante, pectore macula*
fis. alba.

Le Pitoi *Charlev. nouv. Fr. III p. 134?*

Les Pekans *Charlev. nouv. Fr. III p. 134.*

Le Vifon: *Mustela (Vifon) pilis coloris saturate castanei in toto corpore vestita Briff. regn. an. p. 246 n. 6.*

Vifon *Dictioun. anim. IV p. 557.*

Pekan *Bom. dictioun. III p. 401.*

Vifon *Bom. dictioun. IV p. 615.*

Le Pekan *Buff. hist. nat. XIII p. 304 tab. 42.*

Le Vifon *Buff. hist. nat. XIII p. 304 tab. 43.*

The Pekan *Penn. syn. quadr. p. 234 n. 159.*

Pekano *Aless. quadrup. IV tab. 155 fig. 1 Buff.*

Vifone *Aless. quadrup. IV tab. 155 fig. 2 Buff.*

Mustela canadensis Schreb. Säugth. III tab. 134 fig. propr.

Paullo minor Marte, cui similis, longitudine corporis 17 poll. caudae 7 poll. Caput mystacibus longis. Auriculae subacutae. Totum corpus pilis splendentibus saturate castaneis, basi cinereis. Macula alba inter crura antica. Digni tecti pilis densis supra et infra. Ungues acuti. Cauda colore profundiore ac corpus.

Habitat in America boreali. Forte varietas est Martis et Foinae in vnicam speciem contrahendae cum *M. barbara.*

Martes. 4. *M. corpore fuluo-nigricante, gula flaua.*
Martes in arboribus Agric. an. subt. p. 38.

- Martes siluestres *Gesn. quadrup. p. 865 cum fig. mediocr.*
- Martes arborea *Schwenckf. therioz. p. 110.*
- Martes *Aldrov. digit. p. 331.*
- Martes siluestris *Ionst. quadrup. p. 156.*
- Martes *Ionst. quadrup. tab. 64 fig. mal.*
- Martes. Marter *Ionst. quadrup. tab. 64 fig. mediocr.*
- Ein Marder *Gesn. Thierb. p. 345 cum fig. mala.*
- Mardures *Scheff. Lappon. p. 341.*
- Martes *Charlet. exerc. p. 20.*
- Martes *Wagn. Helvet. p. 181.*
- Martes *Sibb. Scot. an. p. 11.*
- Martes abietum *Rai. syn. quadr. p. 200.*
- Martes *Rzac. Polon. p. 222 auct. p. 314.*
- Martes *Linn. syst. nat. 2 p. 44.*
- Marder *Riding. jagdb. Tb. tab. 19.*
- Les Martres *Charlev. nouv. Fr. III p. 134.*
- Mustela fuluo-nigricans, gula pallida *Linn. fn. succ. I p. 3 n. 7.*
- Der Feldmarder oder Baummarder *Meyer's Thiere II tab. 5.*
- Mustela fuluo-nigricans, gula pallida *Linn. syst. nat. 6 p. 5 n. 2.*
- Mustela Martes abietum, Baum-Marter *Klein. quadrup. p. 64.*
- Mustela fuluo-nigricans gula pallida! The blackish brown Mustela, with a pale throat: the Martin *Hill anim. p. 546 tab. 27 fig. mediocr.*
- La Marte: Mustela (Martes) pilis in exortu e cinereo albidis, castaneo colore terminatis, vestita, gutture flavo *Briss. regn. an. p. 247 n. 8.*
- Mustela fuluo-nigricans, gula pallida *Kram. Austr. p. 311.*
- Baumnarder *Hall. vierf. p. 457.*
- Mustela (Martes) plantis fissis, corpore fuluo-nigricante, gula pallida *Linn. syst. nat. 10, I p. 46 n. 5.*

v. Wiltungen Taxfubling a. 1800. *fig.* Marder

- Marder *Müll. Samml. III p. 515.*
 La Marte *Buff. hist. nat. VII p. 186 tab. 22.*
 Marte *Dictioun. anim III p. 37.*
 Marter: Weezel met gespleeten Voetzóolen, geelagtig bruin over 't Lyf, aan de Keel bleek *Houtt. nat. hist. II p. 193.*
 Mustela (Martes) pedibus fissis, corpore fuluo-nigricante, gula pallida *Linn. fn. suet. 2 p. 6 n. 15.*
 The yellow breasted Martin *Penn. brit. zool. p. 39.*
 Maar *Pouzopp. Dan. I p. 610.*
 Marte *Bom. Dictioun. III p. 40.*
 Mustela (Martes) pedibus fissis, corpore fuluo-nigricante, gula pallida *Linn. syst. nat. 12, I p. 67 n. 6.*
 Mustela Martes *Forster: Philos. transact. LVII p. 342.*
 The pine Martin *Penn. syn. quadr. p. 216 n. 155.*
 Martora *Aless. quadrup. II tab. 69 fig. Buff.*
 Pine Martin *Forster: Philos. transact. LXII p. 372.*
 Der Marder *Müll. Naturf. I p. 267.*
 Mustela Martes *Schreb. Säugth. III tab. 130 fig. propr.*
 Mustela (Martes) pedibus fissis, corpore fuluo-nigricante, gula pallida *Müll. Dan. prodr. p. 3 n. 12.*
 Der Feldmarder *Mart. Buff. vierf. IV p. 156.*
 Das Mart. Hausmarder *Mart. Buff. vierf. IV tab. 61.*
 Marta *Hispanis.*
 Marta *Lusitanis.*
 Marta, Martura, Martora, Martorello *Italis.*
 Marte *Gallis.*
 Belagoed *Cambrensibus.*
 Feldmarder, Wildmarder, Baumarder *Germanis.*
 Edlmarder *Austriacis.*
 Marter *Belgis.*
 Martin, Martlet *Anglis.*
 Maar *Danis.*
 Mård *Suecis.*
 Nätte *Laponibus.*

Kuna *Polouis.*

Кунница (Kunitza) *Ruffis.*

Sufar *Tataris.*

Lui *Tfcheremiffis.*

Süwfar *Tfchuwaschis.*

Tfchinäma *Morduanis.*

Tulän *Sirjänice.*

Longitudo corporis 18-19 poll. caudae 10 poll. Auriculae breues, rotundatae. Oculi fulgidi. Nasus prominens. Maxilla superior obtusa. Dentes superiores primores sex paralleli, parui, obtuso-acuti; laniarii solitarii, maximi, spatio remoti; molares quinque: tribus anterioribus simplicibus minoribus, reliquis duobus spatio remotis. Inferiores primores sex: duobus mediis retusis, minimis, obtusis; laniarii solitarii, maximi, cum primoribus paralleli; molares uti superiores. Lingua longa, laevis, tecta papillis acutis, mollibus, retro spectantibus. Pedes pentadactyli digitis subaequalibus, undique villosi, semipalmati, pollice paullo brevior. Cauda pilosa. Totum corpus pilis profunde castaneis, pulchris, splendentibus, gula pectoreque flavis.

Habitat in borealibus Europae, Asiae, Americaeque, rarior in Anglia atque Gallia. Degit in silvis antiquis, praecipue pinetis, nunquam ad domos. Edit auiculas, sciuros, mures, talpas. Nidum parat in summis abietibus, occupat quoque nidum Sciuri. Parit duo vel tres. Excrementa odore moschi.

Foina. 5. M. corpore fulvo-nigricante, gula alba.

Martes in faxis *Agric. an. subt. p. 38.*

Martes domesticae *Gesn. quadrup. p. 865 cum fig. mediocr.*

Martes

Martes faxatilis *Schwenckf. zberiotz.* p. 110.

Martes domestica *Aldrov. digit.* p. 332.

Martes domestica *Ionst. quadrup.* p. 156.

Martes Fagorum, *Gallis Foynae Rai. syn. quadr.* p. 200.

Martes Rzacz. Polon. p. 222 *auct.* p. 314.

Der Steinmarder oder Buchmarder *Meyer Thiere. II*
tab. 4.

Martes saxorum non fagorum seu domesticus, Stein-
marder *Klein. quadrup.* p. 64.

La Fouine: *Mustela* (*Foyna*) pilis in exortu albidis,
castaneo colore terminatis, vestita, gutture albo
Briss. regn. av. p. 246 n. 7.

Der Steinmarder *Hall. vierf.* p. 459.

La Fouine *Buff. hist. nat. VII* p. 161 *tab. 18.*

Fouine *Dictionn. anim. II* p. 200.

The Martin *Penn. brit. zool.* p. 38 *cum fig. bon.*

Fouine *Bom. dictionn. II* p. 232.

The Martin *Penn. syn. quadr.* p. 215 n. 154.

Foina *Aless. quadrup. II* *tab. 68* *fig. Buff.*

Der Marder *S. G. Gmelin Reis. III* p. 370.

Mustela Foina *Schreb. Säugth. III* *tab. 129* *fig. propr.*

Der Hausmarder *Mart. Buff. vierf.* p. 147 *tab. 61 a.*

Fuina Hispanis.

Foina, Fouina Italis.

Fouine Gallis.

Bela graig Cambrensis.

Hausmarder, Steinmarder, Marder Germanis.

Marter Belgis.

Martin Anglis.

Paullo minor praecedente longitudine corporis 16 $\frac{1}{2}$
poll. caudae 8-9 poll. Valde similis Martis, vt
adeo eius varietatem credant plerique auctores.
Differt capite paullo longiore, pedibus breuiori-
bus; gula pectoréque albis, pelle minus pulchra.

Habitat

Habitat in Europa inque Persia, in silvis et circa domos. Vulgaris in Gallia et Anglia, Scotiae exul rariorque in borealibus. Edit gallinas aliaque animalia minora. Parit in cauis arboribus inque rudetis pullos quatuor vel sex. Mansuescit.

sarmatica. 6. M. fusco luteoque varia.

Animal idiomate ruffico Perewiaſka *Rzac. Polon.* p. 222.

Mustela praecincta *Rzac. Polon.* p. 328.

Peregusna, noua Mustelae species *Güldenstädt: Nou. comm. petrop. XIV* p. 441 tab. 10.

Mustela sarmatica *Pallas Reif. I* p. 453.

Tiger-Iltis *Pallas Reif. I* p. 175.

Mustela Sarmatica *Schreb. Säugth. III* tab. 132 fig. *Güldenst.*

Der Sarmatier *Müll. Naturf. Suppl.* p. 33.

Przewiaſka *Polonis.*

Перегузня (Pereguzna) *Ruffis.*

M. Putorio aliquantum minor, cui similis. Longitudo corporis $13\frac{1}{2}$ poll. caudae $6\frac{1}{2}$ poll. Caput triangulare, depressum. Rostrum ultra labium prominens, acuminatum, nudum, nigrum, medio carinatum. Nares amplae, recuruae. Oris apertura sat ampla, triangularis, infra oculos vsque extensa. Labium superius integrum, laxum, crassum, pilosum, pendulum, dentes non tegens. Lingua lata, vix ex ore producenda, carnosa, apice rotundato, submembranaceo, superne papillis retrorsum acuminatis confertissime obsita et albicans; inferne rubra, glabra, frenulo laxissimo musculoſo. Dentes primores superiores sex paralleli, teretes, acuminati, approximati, extimo vtrinque crassiore et tantillo longiore; inferiores sex breuissimi, quatuor maioribus obtusis, subtuberculosis, intermediis duobus tantillum interius sitis; duoque minimi granula referentes

rentes ante interstitium dentium duorum maiorum intermediorum fiti. Laniarii superiores solitarii, a primoribus parum remoti molaribusque appropinquati; primoribus quadruplo maiores, conici, leuissime incurui, exterius obsolete striati. Laniarii inferiores solitarii, vix a primoribus remoti, figura et magnitudine superiorum. Molares supra vtrinque quatuor: primo minimo vix extra gingivas prominente, obtuso; secundo paullulum maiore, exterius acuminato; tertio omnium maximo, longitudinaliter extenso, bicuspidato; quarto transversaliter extenso, breui, rugoso. Molares infra vtrinque quinque, laniariis approximati: primo obtuso; secundo et tertio maiore acuminato; quarto omnium maximo tricuspido, denticulo intermedio productiore; quinto primo simili. Mustaces quinque ordinum in labio superiore: ordinis superioris setis a reliquis remotioribus in eadem cum oculis linea, sursum spectantibus, brevibus; reliquis deorsum flexis, inaequalibus, longissimis aures attingentibus. Setae supra oculum ad canthum anteriorem fere decem: duabus longioribus. Infra oculum pone canthum posteriorem setae duae: superiore longiore. Pone sinum oris setae duae, longae, deorsum declinatae; in mento plures detritae. Oculi in medio lineae a naribus ad aures ductae positi, laterales, parvi, profundi, elliptici; cantho anteriore acutissimo. Palpebrarum margo nudus. Membrana nictitans ad canthum anteriorem obsoleta, albicans. Irides et pupillae nigrae. Auriculae laterales, erectae, rotundae, amplae, breues, pilosae. Collum breue, vix capite angustius. Truncus elongatus, cylindricus, vix collo crassior. Pedes trunco fere triplo breuiores, subaequales, posterioribus aliquantulum longioribus, omnes calcaneis incedentes. Palmae plantaeque pentadactylae pilosae, subtus verrucis quatuor nudis.

dis. Dígiti fissi, palmarum longiores, pollice reliquis inter se fere aequalibus dimidio breuiore, digito quinto itidem breuiore. Ungues compressi, vncinati, acuminati, flauicantes, in palmis longiores; sed unguis primi plantarum latior, obtusior, breuior reliquis. Cauda teres, attenuato-acuminata, pilosa, pilis basin versus longioribus. Pili corporis confertissimi, decumbentes, absque futuris et lanugine, rigidiusculi, vix semipollice longiores; in capite breuiores, in cauda longiores. Caput nigrum: omni oris circumferentia, fascia frontali infra aures extensa, auricularumque ambitu et vertice medio albis. Truncus supra et ad latera brunneo luteoque varius, regione interscapulari fere tota brunnea. Maculae lutescentes hieme pallidiores euadunt et albescunt. Truncus subtus et pedes toti aterrimi. Caudae pili elongati basi cinerascens, medio nigri, apice albidí; pili breuiores apicis caudae basi cinerei, apice nigri. Pili omnes nitentes. Umbilicus nullus. Mammae duodecim abdominales et inguinales, papillis minimis vix conspicuis. Testiculi extus non apparentes. Glans penis officulo fulta. Odor empyreumaticus. Vesica fellea magna. Clauiculae nullae. Costae vtrinque septemdecim.

Habitat in campis Tanaicensibus, passim et in Polonia et Volhynia, vicatans imprimis gliribus et muribus voracissima. Noctu praesertim vagatur, interdum latitans in cauernis ab aliis animalibus effossis, quamuis et ipsa fodiat. Arborea vix scandit. Agilissima, iracunda, irata acute fremitans, alias vix sonum edens, caudam sursum et dorsum versus pilis erectis flectens, magis ac antea foetens, caputque erigens. Vix mansuescit. Coit verno tempore,

pore, parit post menses duo catulos quatuor ad octo, validos et oculos.

Putorius. 7. M. flauo-nigricans, ore auricularumque apicibus albis.

Siluestris mustela *urtic Agric. an. subt. p. 37.*

Putorius *Gesn. quadrup. p. 868 cum fig. mala.*

Putorius *Schwenckf. iberiogr. p. 120.*

Putorius *Aldrov. digit. p. 329 fig. p. 330 mala.*

Putorius *Ionst. quadrup. p. 154.*

Putorius *Iltis Ionst. quadrup. tab. 64 fig. mala.*

Ein *Iltis Gesn. Thierb. p. 346 cum fig. mala.*

Putorius *Charlet. exerc. p. 20.*

Putorius, *Vinerra Wagn. Helvet. p. 182.*

Putorius *Sibb. Scot. an. p. 11.*

Putorius *Rai. syn. quadr. p. 199.*

Putorius *Rzacz. Polon. p. 236 auct. p. 329.*

Putorius *Linn. syst. nat. 2 p. 44.*

Der *Iltis Riding. jagdb. Th. tab. 20.*

Mustela flavescente nigricans, ore albo, collari flavescente *Linn. fn. suec. 1 p. 3 n. 8.*

Der *Iltis Meyer Thiere II tab. 6 fig. bona.*

Mustela flavescente nigricans, ore albo, collari flavescente *Linn. syst. nat. 6 p. 5 n. 3.*

Mustela foetida. Putorius. *Iltis. Teufelskind Klein. quadrup. p. 63.*

Mustela flavescente-nigricans ore albo, collari flavo. The yellowish-black Mustela, with a white mouth, and a yellow collar: the Pole-cat *Hill anim. p. 347.*

Le Putois: Mustela (Putorius) pilis in exortu ex cinereo albidis, colore nigricante terminatis, vestita, oris circumferentia alba *Briss. regn. an. p. 249 n. 10.*

Mustela flavescente nigricans, ore albo collari flavescente *Kram. Austr. p. 312.*

Der Iltis, Stinkthier *Hall. vierf. p. 436.*

Mustela (Putorius) pedibus fissis; corpore flauo nigricante; ore auriculisque albis *Linn. syst. nat. 10, I p. 46 n. 6.*

Le Putois *Buff. hist. nat. VII p. 199 tab. 23.*

Putois *Dictioun. anim. III p. 626.*

Bontsem: Wezel met gespleeten Voetzoolen, het Lyf zwartagtig geel, de Bek en Oorlapjes witt *Houtt. nat. hist. II p. 200.*

Mustela (Putorius) pedibus fissis, corpore flauo nigricante, ore auriculisque albis *Linn. fn. succ. 2 p. 6 n. 16.*

The Polecat *Penn. brit. zool. p. 37 cum fig. bona.*

Ilder *Pontopp. Dan. I p. 611.*

Putois *Bom. dictioun. III p. 674.*

Mustela (Putorius) pedibus fissis, corpore flauo nigricante, ore auriculisque albis *Linn. syst. nat. 12, I p. 67 n. 7.*

Mustela Putorius *Forster: Philos. transact. LVII p. 342.*

The Polecat *Penn. syn. quadr. p. 213 n. 152.*

Puzzolente *Aless. quadrup. II tab. 72 fig. Buff.*

Der Iltis *Müll. Naturf. I p. 269.*

Mustela Putorius *Schreb. Säugth. III tab. 131 fig. propr.*

Mustela (Putorius) pedibus fissis, corpore flauo nigricante, ore auriculisque albis *Müll. Dan. prodr. p. 3 n. 13.*

Der Iltis *Mart. Buff. vierf. IV p. 169 tab. 63.*

Putero *Hispanis.*

Foetta, Puzolo, Puzzolente *Italis.*

Putois *Gallis.*

Ffwlbarð *Cambrensis.*

Iltis, Ulk, Bentling *Germanis.*

Bontsem *Belgis.*

Polecat, Fitchet, Fummer *Anglis.*

Ilder *Danis.*

Iller *Scanis.*

Boaaid, Boitta; Goa-aige (*mas*) Gaa-fe (*femina*)
Lapponibus.

Tchorz *Polonis.*

Ласица (*Lasitza*), Ласочка (*Lafoczka*) *Ruffis.*

Longitudo corporis 17 pollicum, caudae 6 poll. Auriculae breues, latae, subrotundae. Nasus acutus. Crura breuia. Totum corpus ex flauo nigricans, circumferentia oris et apice aurium albis. Cauda nigra, valde pilosa.

Habitat inter Europae temperatae, non frigidae, rupes et lapidum acervos circa domos. Noctu praedatur Cuniculos, Gallinas, Auiculas, Oua. Anohalitu foetidissima. Cursu celer. Coit vere paritque quinque ad sex.

Furo. 8. M. corpore pallide flauo.

Ixtis Arist. hist. anim. IX c. 9 n. 108.

Vierra *Plin. hist. nat. VIII c. 55 (c. 81 Hard.).*

Mustela filuestris *Plin. hist. nat. XXIX c. 4 (c. 16 Hard.).*

Vierra *Agric. an. subt. p. 40.*

Mustela filuestris *Gesn. quadrup. p. 862.*

Vierra vel mustela rustica, Ictis *Gesn. quadrup. p. 862.*

Furo *Gesn. quadrup. p. 863 fig. p. 862.*

Ictis *Gesn. quadrup. p. 864.*

Mustela filuestris *Aldrov. digit. p. 325 fig. p. 327 mediocr.*

Mustela filuestris *Ionst. quadrup. p. 154.*

Frett, Frettel oder Furettel *Gesn. Thierb. p. 344 cum fig. mediocr.*

Vierra *Charlet. exerc. p. 20.*

Vierra *Sibb. Scot. an. p. 11.*

Mustela filuestris Vierra dicta *Rai. syn. quadr. p. 198.*

- Mustela filuestris Rzacz. Polon. p. 235.
 The Ferret Shaw trav. p. 249.
 Vierra Linn. syst. nat. 2 p. 44.
 Das Frettel Meyer Thiere II tab. 22.
 Mustela filuestris Vierra dicta Linn. syst. nat. 6 p. 5
 n. 4.
 Mustela Vierra dicta Klein. quadrup. p. 63.
 Mustela albido-flavescentis capite depresso: The yellowish-white Mustela, with a flattened head: the Ferret Hill anim. p. 548.
 Le Furet: Mustela (Vierra mas) pilis subflavis, longioribus castaneo colore terminatis vestita. (Vierra foemina) pilis ex albo subflavis Briss. regn. an. p. 244 n. 3.
 Das Fret oder der Kaninchenjäger, Kaninchenwiesel Hall. vierf. p. 456.
 Mustela (Furo) plantis fissis, oculis rubicundis Linn. syst. nat. 10, I p. 46 n. 7.
 Le Furet Buff. hist. nat. VII p. 209 tab. 26.
 Le Furet Putois Buff. hist. nat. VII tab. 25.
 Furet Dictionn. anim. II p. 229.
 Fret: Wezel met gespleeten Voetzoolen, de Oogen roodagtig Houz. nat. hist. II p. 203.
 Fritter Pontopp. Dan. I p. 612.
 Mustela (Furo) pedibus fissis, oculis rubicundis Linn. syst. nat. 12, I p. 68 n. 8.
 The Ferret Penn. syn. quadr. p. 214 n. 153.
 Furetto Aless. quadrup. II tab. 71 fig. Buff.
 Furetto puzzolente Aless. quadrup. II tab. 73 fig. Buff.
 Der Kaninchenwiesel Müll. Naturf. I p. 271.
 Mustela Furo Schreb. Sängtb. III tab. 133 fig. propr.
 Das wilde Wiesel Mart. Buff. vierf. IV p. 177 tab. 64.
 Das gelbe Wiesel Mart. Buff. vierf. IV tab. 65.
 Hiron Hispanis.
 Forã o, Foram Lusitanis.
 Furetto, Donnola Italis.

Furet *Gallis.*

Frett, Frettel. *Germanis.*

Fret *Belgis.*

Ferret *Anglis.*

Fritt *Danis.*

Laská, Laśica lésna *Polonis.*

Nimse *in Barbaria.*

Putorio minor, corpore 14 poll. longo, cauda $5\frac{1}{2}$ poll. Nasus acutissimus. Auriculae rotundatae, arrectae, patulae, breues. Oculi rubicundi. Color corporis pallidissime flauus, in mare obscurior. Femina minor est.

Habitat in Africa, olim in Hispaniam translata ad destruendos Cuniculos, nunc et in reliqua Europa, passimque domestica pro cuniculi venatione. Victitat cuniculis, quorum sanguinem potat, raro carnem dilacerat. Agilis. Vterum fert 6 hebdom. paritque 5-9. Mansuescit. Foetet vt Putorius.

Coit cum Putorio, negante id quidem Buffonio; atque ex hoc parit pullos obscurioris coloris; num forte huius varietas?

Zibellina. 9. M: corpore obscure fuluo, fronte exalbida, gutture cinereo.

Zobela *Agric. an. subt. p. 39.*

Mustela Sobella *Gesn. quadrup. p. 869.*

Mustela Zibellina dicta *Aldrov. digit. p. 335.*

Mustela Zibellina *Ioust. quadrup. p. 156.*

Mustela Zobela, Zobelwieselein, Zobel *Gesn. Thierb. p. 347.*

Sebellinae *Scheff. Lappon. p. 343.*

Mustela Zibellina, Aristoteli Satherius, Nipho Cebalus, Alciato Mus Sarmaticus et Scythicus *Charles. exerc. p. 20.*

Mustela Zibellina *Rai. syn. quadr. p. 201.*

Mustela Sobella *Rzac. Polon. auct. p. 317.*

Zobeln oder Sobeln *Strahlenb. Af. p. 430.*

Mustela Zibellina *Linn. syst. nat. 2 p. 44.*

Mustela Zibellina *Linn. syst. nat. 6 p. 5 n. 7.*

Mustela Zibellina *Klein. quadrup. p. 64.*

Kankaragaische Zobel *I. G. Gmelin Sibir. I p. 253?*

Zobel *I. G. Gmelin Sibir. I p. 391.*

Mustela fulva auribus cinerascens. The brown

Mustela, with grey ears: the Sable *Hill anim. p. 548.*

Mustela Zibellina *I. G. Gmelin: Nov. comment. petrop.*

V p. 338 tab. 6.

La Marte Zibelline: Mustela (Martes Zibellina) obscure fulva, gutture cinereo *Briff. regn. an. p. 248 n. 9.*

Der Zobel *Hall. vierf. p. 459.*

Mustela (Zibellina) plantis fissis, corpore obscure fulvo, fronte exalbida, gutture cinereo *Linn. syst. nat. 10, I p. 46 n. 8.*

Der Zobel *Müll. Samml. III p. 495.*

Zibeline *Dictioun. anim. IV p. 589.*

Sabeldier: Wezel met de Voetzoolen gespleeten, het Lyf donker vaal, voor op den Kop witagtig, aan de Keel Afchgrauw *Houtt. nat. hist. II p. 204.*

Zibeline *Bom. dictioun. IV p. 650.*

La Zibeline *Buff. hist. nat. XIII p. 309.*

Mustela (Zibellina) pedibus fissis, corpore obscure fulvo, fronte exalbida, gutture cinereo *Linn. syst. nat. 12, I p. 68 n. 9.*

The Sable *Penn. syn. quadr. p. 217 n. 156.*

Der Zobel *Müll. Naturf. I p. 272.*

Zobel *Stell. Kamtsch. p. 119.*

Marta Cebellina, Marta Cevellina *Hispanis.*

Fórão de Scythia *Lusitanis.*

Zibellino *Italis.*

Marte Zibelline *Gallis.*

Zobel, Zobelthier *Germanis.*

Sabeldier *Belgis.*

Sable *Anglis.*

Sabbel *Suecis.*

Sobol *Polonis.*

Собо́ль (Sobol') *Ruffis.*

Недосо́бо́ль (Nedofobol') animal aëstatè vel autumnò captum pelle viliore *Ruffis.*

Kaltan *in Krasnojarsk.*

Kyſch *Bulgaris.*

Bulgan *Calmyccis.*

Bula *Burätis.*

Kymich Chym, Chymchymka *Kamtschadalis.*

Kuifch *Tataris.*

Lumufch *Tſcheremiſſis.*

Stör *Woziakis.*

Sobol *Morduanis.*

Niſch *Sirjänice.*

Longitudo corporis 18 poll. caudae 12 poll. femina paulo minore. Color fulvo - obscurus gutture cinereo, anteriore capitis parte et auriculis rotundatis ex albedo cinereis. Vibriffae ad supercilia, nares, os, longissimae: Cauda longius pilosa. Ungues albi.

Variat rarissime colore albo aut flavicante.

Habitat in Asia septentrionali, Tataria, Sibiria vsque in Kamtschatkam, vbi hodie rarior. Raro quoque in Lapponia occurrit. Degit in silvis antiquis desertis. Latet in terrae caueis aut sub arborum radicibus; interdum nidum parat in arboribus vti Martes. Salt egregie ex arbore in arborem. Agillima, praecipue noctu, die dormit. Pugnat cum ipso Cato. Vicinat aëstatè Ermineis, Sciuris,

Leporibus; autumnò bacis; hieme auiculis. Excrementa pessime olent. Parit fine Martii et initio Aprilis mensis catulos tres ad quinque, quos lactat per quatuor aut quinque hebdomades.

Ob pellem pretiosissimam capitur a Nouembri mense in Februarium vsque. Maxime aestimatur nigra, pilosissima. Optimae capiuntur circa Nertschinsk et Iakuzk. Laqueum quo capitur animal describit depingitque *Pallas Reis. II p. 227 tab. 7.*

Pennanti. 10. M. corpore nigro, lateribus fuscis.

The Fischer Weefel *Penn. syn. quadr. p. 223 n. 157.*

Longitudo corporis 28 pollicum, caudae 17 poll. Auriculæ latae, rotundatae, nigricantes, albo marginatae. Nasus niger. Vibrissæ magnae, fetosae. Facies collique latera pallide fusca siue cinerea nigro admixto. Dorsum, venter, crura et cauda nigra, basi fuscescente. Latera fusca. Pedes latissimi, vsque ad volas pilosi. Digniti postice saepe quatuor. Ungues acuti, fortes, curuati, albi. Crura anteriora posticis breuiora. Cauda pilis longis.

Habitat in America boreali, vulgaris, victitans quadrupedibus minoribus. Pennanto eiusdem cum *Zibellina* speciei esse videtur.

sibirica. 11. M. fulua palmis plantisque hirsutissimis.

Eine noch nicht beschriebene Wieselart *Pallas Reis. II p. 570.*

Mustela sibirica Pallas Reis. II p. 701.

Die sibirische Wiesel *Müll. Naturf. Suppl. p. 34.*

Кулоннокъ (Kulonnok), Хорокъ (Chorok) *Russis.*
Kulon Tataris.

Nonno *Tunguss.*
Scholongo *Burätis.*

Magnitudo fere Putorii, sed forma potius Ermineae; longiores tamen pedes sunt et cauda. Rostrum ad oculos usque nigrum, sed circa nares album, guttatum versus oculos. In reliquo toto corpore color intense fulvus, subuniformis, tamen subtus et versus caput paullo dilutior. Gula saepe guttis albis adspersa. Palmae plantaeque subtus hirsutissimae, cano-argentatae. Cauda dimidia animalis longitudine, villosissima, intensiore quam dorsum colore. Vellus ubique laxius longiusque quam in Putorio vel Furone. Longitudo corporis 12 pollicum, caudae 6 poll. sed dantur minores.

Habitat in Sibiriae montanis silvis densissimis, omnivora, ad pagos hieme non raro accedens.

- vulgaris. 12. M. corpore ex rufo fusco subtus albo.
Mustela quae in domibus nostris oberrat *Plin. hist. nat. XXIX c. 4 (c. 16 Hard.)*.
Fazl Aelian. anim. IV c. 14 XII c. 5.
Mustela domestica, visela *Agric. an. subst. p. 36*.
Mustela proprie sic dicta *Gesn. quadrup. p. 851 cum fig. mediocr.*
Mustela Schwenckf. theriotr. p. 116.
Mustela vulgaris Aldrov. digit. p. 307.
Mustela vulgaris Jonst. quadrup. p. 152.
Mustela. Wiesel Jonst. quadrup. tab. 64 fig. bona.
Ein Wieselein oder Wiesel: etliche nennen es Hermelein, andere Häermlein *Gesn. Thierb. p. 342 cum fig. mal.*
Mustela Charlet. exerc. p. 20.
Mustela vulgaris Sibb. Scot. an. p. 11.

Lavellan Animal in Cathanesta frequens *Sibb. Scor. an. p. 11?*

Mustela vulgaris *Rai. syn. quadr. p. 195.*

Mustela *Rzac. Polon. p. 235.*

Mustela alba vulgaris *Rzac. Polon. p. 235.*

The Weefel *Brick. North-Carol. p. 129.*

The Weefel *Shaw trav. p. 249.*

Mustela vulgaris *Linn. syst. nat. 2 p. 44.*

Wiesel *Riding. jagdb. Th. tab. 19.*

— L'Hermine *Charlev. nouv. Fr. III p. 134.*

— Mustela caudae apice atro *Linn. fn. succ. 1 p. 3 n. 9.*

Das weisse Wiesel *Meyer Thiere II tab. 23.*

Das rothbraune Wiesel *Meyer Thiere II tab. 24.*

— Mustela caudae apice atro *Linn. syst. nat. 6 p. 5 n. 5.*

Mustela vulgaris *Klein. quadrup. p. 62.*

— Mustela caudae apice atro. The Mustela, with the tip of the tail black: the Weasel *Hill anim. p. 547.*

— Mustela (erminea) caudae apice atro *Linn. mus. Ad. Frid. I p. 5.*

La Belette: Mustela (vulgaris) supra rutila, infra alba *Briff. regn. an. p. 242 n. 1.*

— Mustela caudae apice atro *Kram. Austr. p. 312.*

Die gemeine Speicherwiesel *Hall. vierf. p. 454.*

— Mustela (Erminea) plantis fissis, caudae apice atro *Linn. syst. nat. 10, 1 p. 46 n. 9.*

Ein besonderes Geschlecht von Hermelinen *Müll. Samml. III p. 517.*

La Belette *Buff. hist. nat. VII p. 225 tab. 7 fig. 1.*

Belette *Dictioun. anim. I p. 269.*

— Hermyn-Wezel: Wezel met gespleeten Voetzoolen, de Staart aan 't end zwart *Houtt. nat. hist. II p. 206 tab. 14 fig. 5.*

— Mustela (Erminea) pedibus fissis, caudae apice atro *Linn. fn. succ. 2 p. 6 n. 17.*

The Weefel *Penn. brit. zool. p. 39 cum fig. bon.*

Lækatten eller Væfelen *Pontopp. Dan. I p. 611.*

Belette *Bom. dictioun. I p. 262.*

Mustela (Erminea) pedibus fissis; caudae apice atro
Linn. syst. nat. 12, I p. 68 n. 10.

The common Weasel *Penn. syn. quadr. p. 212 n. 151.*

Donnola *Aless. quadrup. II tab. 70 fig. Buff.*

Die gemeine Wiesel *Pallas Reis. I p. 129.*

Common Weasel *Forster: Philos. transact. LXII p. 373.*

Der Hermelin *Müll. Naturf. I p. 274 tab. 14 fig. 5 Houtt.*

Mustela Erminea *Schreb. Säugth. III tab. 137 A fig. propr.*

Mustela (Erminea) pedibus fissis, caudae apice atro
Müll. Dan. prodr. p. 3 n. 14.

Das gemeine Wiesel *Marr. Buff. vierf. IV p. 186 tab. 66.*

Comadreia *Hispanis.*

Doninha *Lusitanis.*

Donnola, Ballottula, Benula *Italica.*

Belette *Gallis.*

Bronwen *Cambrensis.*

Wiesel *Germanis.*

Wezel *Belgis.*

Weasel, Weasel *Anglis.*

Foumart, Fitchet *Eboracensis.*

Whitred *Scotis.*

Læ-kat, Væfel *Danis.*

Rös-kat *Noruegis.*

Wesla *Smolandis.*

Laská, Lasczka *Polonis.*

Ласмицки (Lasmitzki) *Russis.*

Fert el Heile *in Barbaria.*

Longitudo corporis 6-7 pollicum, caudae 2½ poll.

Oculi parui, nigri. Auriculæ paruae, rotundatae. Caput et corpus supra ex rufo fusca, subtus alba. Macula fusca infra angulos oris.

Habitat in temperatis Europae et in Africa boreali, rarior in Europa boreali, corpore toto albo. Est quoque in America boreali, nisi forte haec vera Erminea sit. Degit in filuis et ad domos. Edit gallinulas, oua, cuniculos iuniores, pisces, carnes, mures, fungos, non plantas. Auarissima portat praedam in suas latebras, neque edit animalcula, ubi ea occidit. Foetida, immunda, siticulosa, noctu praedatur, muribus pessima, quos totos relictiis solis dentibus consumit; eorum adeo foramina intrat. A Fele non facile occiditur. Recurrens accurrensque continuo prospicit; terrefacta epilepsia conuellitur. Parit quatuor ad sex coecos. Pellis et excrementa valde foetent.

Erminea. 13. *M. auricularum* marginibus albis, caudae apice nigro.

Mus Ponticus, quem hodie vocant *Hermelam Agric.*
an. subr. p. 33.

Armellini Gesu. quadrup. p. 852.

Mustela candida Schwenckf. zheriotr. p. 118.

Mustela candida in extrema cauda nigricans *Aldrov.*
digit. p. 310 fig. mediocr.

Hermellani Ionst. quadrup. p. 153.

Hermelini Scheff. Lappon. p. 343.

Hermellanus Charlet. exerc. p. 20.

Mustela alpina candida Wagn. Helvet. p. 180.

Mustela candida s. animal Ermineum recentiorum
Rai. syn. quadr. p. 198.

Mustela alba, Turniebio *Hermelinus Rzacz. Polon. p.*
235 auct. p. 328.

Mustela candida s. Ermineum *Linn. syst. nat. 6 p. 5*
n. 6.

Mustela Armellina Klein. quadrup. p. 63.

Mustela niuea auribus angustis, caudae apice nigro.

The white *Mustela*, with narrow ears, and the tip of the tail black: the Ermin *Hill anim. p. 548.*

L'Her-

L'Hermine: *Mustela hieme alba*, aestate supra rutila infra alba; caudae apice nigro *Briff. regn. an. p. 243 n. 2.*

Das Hermelin *Hall. vierf. p. 455.*

Hermelinen *Müll. Samml. III p. 516.*

L'Hermine ou le Roselet *Buff. hist. nat. VII p. 240 tab. 7 fig. 2.*

Hermine *Dictionn. anim. II p. 430.*

When brown, the Stoat; when white, the Ermine *Penn. brit. zool. p. 40 cum fig. bon.*

Ermellino *Aless. quadrup. II tab. 74 fig. Buff.*

Hermeline *Pallas Reis. I p. 129.*

Der Hermelin *S. G. Gmelin Reis. II p. 192, III p. 370.*

Mustela ermineum maius *S. G. Gmelin Reis. II tab. 23.*

Stoat and Ermine *Forster: Philos. transact. LXII p. 373.*

Hermelins *Stell. Kamtsch. p. 125.*

Mustela Erminea β *Schreb. Säugth. III tab. 137 B. fig. propr.*

Das Hermelin *Mart. Buff. vierf. IV p. 196 tab. 67. Arminiño, Armelina Hispanis.*

Arminho *Lusitanis.*

Armellino, Ermellino *Italis.*

Roselet (*fusca*), Hermine (*alba*) *Gallis.*

Carlwm *Cambrensisibus.*

Hermelin *Germanis.*

Hermyn *Belgis.*

Stoat (*fusca*), Ermine (*alba*) *Anglis.*

Hermelin *Noruegis.*

Hermelin, Lekatt *Suocis.*

Gronostay *Polonis.*

Горноста́й (*Gornostai*) *Ruffis.*

Ielek *Tungusis.*

Ujing *Burätis.*

Sic-cuse-sue *in America boreali.*

Differre omnino videtur a praecedente, quacum eam confundit. perill. Linneus aliique.

Maior M. vulgari, longitudine corporis 10 poll. caudae $5\frac{1}{2}$ poll. Corpus supra pallide fuscum, marginibus auricularum apicibusque digitorum ex flavicante albis. Gula, pectus, venter, alba. Caudae apex perpetuo niger.

Habitat in Europa Asiaque boreali in silvis rarioribus betulinis et locis vliginosis. Hieme tota alba excepto caudae apice; redeunte verno tempore colore rufo-fusco. Pellis pretiosa. Optimae sunt ex provincia Isetenfi; pessimae circa Irkuzk capiuntur.

Das verkehrte Hermelin *Hall. vierf. p. 462* corpore nigro, cauda alba, quid?

niualis. 14. M. corpore albo, caudae apice vix pilis vllis nigris.

Mustela (niualis) caudae apice vix pilis vllis nigris
Linn. fn. suec. 2 p. 7 n. 18.

Mustela (niualis) pedibus fissis, corpore albo, caudae apice vix pilis vllis nigris *Linn. syst. nat. 12, I p. 69 n. 11.*

Der Schneewiesel *Müll. Naturf. I p. 276.*

Mustela niualis *Schreb. Säugth. III tab. 138.*

Mustela (niualis) pedibus fissis corpore albo, caudae apice vix pilis nigris *Müll. Dan. prodr. p. 3 n. 15.*

Snee - Muus *Danis.*

Snömus *Suecis.*

Seibbfh *Lapponibus.*

Ласка (Ласка) *Ruffis.*

Unagin *Burätis.*

Simillima Ermineo, sed dimidio minor; niuea caudae apice pilo vix vno alteroue nigro.

Habitat in Westrobothnia.

Videant autoptae, num forte fit varietas alba Mustelae vulgaris, vti putat Pennantus forteque doctiss. Schreberus; quam Linneus quidem confundit cum *M. Erminea*, quae maior.

Gulo. 15. *M. corpore rufo-fusco, medio dorsi nigro.*

Gulo Gesn. quadrup. p. 623 cum fig. mala.

Gulo Ol. Magn. sept. p. 605.

Rossmaka Nieremb. hist. nat. p. 188.

Gulo Aldrov. digit. p. 178.

Gulo Ionst. quadrup. p. 131.

Gulo. Vieltraes Ionst. quadrup. tab. 57 fig. mala.

Ein ander Vieltraez Gesn. Thierb. p. 358.

Gulones Scheff. Lappon. p. 339.

Gulo Charlet. exerc. p. 15.

Veelvraaten Ysbr. Reis. p. 21.

Gulo Rzacz. Polon. p. 218 anct. p. 311.

Gulo Linn. syst. nat. 2 p. 44.

Mustela rufo-fusca; medio dorsi nigro Linn. fn. suet.

I p. 2 n. 6.

Mustela rufo-fusca: medio dorsi nigro Linn. syst. nar.

6 p. 5 n. 1.

Gulo. Vieltraes Klein. quadrup. p. 83 tab. 5 fig. mala.

Confundit praeterea animal nostrum cum Cane

Hyaena.

Vieltraes I. G. Gmelin. Sibir. III p. 492.

Mustela rufo-fusca medio dorsi nigro. The reddish-

brown Mustela, with the middle of the back black:

the Gulo Hill anim. p. 546 tab. 27 fig. mala.

L'Hyène: Hyæna Briff. regn. an. p. 233 n. 1. confusa

cum Cane Hyæna.

- Mustela rufo-fusca: medio dorsi nigro *Kram. Austr.*
p. 311.
- Der Vielfras *Hall. vierf. p. 548.*
- Mustela (Gulo) plantis fissis, corpore rufo-fusco medio dorsi nigro *Linn. syst. nat. 10, I p. 45 n. 3.*
- Vielfrasse *Müll. Samml. III p. 549.*
- Goulu *Dictionn. anim. II p. 283.*
- Veelvraat: Weezel met de Voetzoolen gespleeten, het Lyf bruin ros, op 't midden van de Rug Zwart *Houtt. nat. hist. II p. 189. tab. 14 fig. 4 mala.*
- Mustela (Gulo) pedibus fissis, corpore rufo-fusco: medio dorsi nigro *Linn. fn. suec. 2 p. 5 n. 14.*
- Rosomack *Bell trav. I p. 221.*
- Glouton *Bom. dictionn. II p. 333.*
- Goulu *Bom. dictionn. II p. 343.*
- Le Glouton *Buff. hist. nat. XIII p. 278 confundit cum*
Urso lusco.
- Mustela (Gulo) pedibus fissis, corpore rufo-fusco, medio dorsi nigro *Linn. syst. nat. 12, I p. 67 n. 5.*
- Rosomach, Vielfras *Rytzschk. Orenb. I p. 237.*
- Mustela Gulo Linnaei oder Iaerven *Gannerus: AÆ. nidros. III p. 121 tab. 3 fig. 5.*
- The Glutton *Penn. syn. quadr. p. 196 confundit cum*
Urso lusco.
- Der Vielfras *Müll. Naturf. I p. 265 tab. 14 fig. 4*
Houtt.
- Rosomaken oder Vielfrasse, Timuch genannt *Stell. Kamtsch. p. 118.*
- Urso Gulo *Schreb. Säugth. III tab. 144 fig. act. hol-*
mienf. 1773.
- Mustela (Gulo) pedibus fissis, corpore rufo-fusco, medio dorsi nigro *Müll. Dan. prodr. p. 3 n. 11.*
- Vielfras *Germanis.*
- Ierf, Ierv, Filfras *Noruegis.*
- Iärf, Filfras *Suecis.*
- Gieddk *Laponibus.*

Rosomak *Polonis*.

Росамака (Rosamaka) *Ruffis*.

Tschatak *Tungufis*.

Dentes Primores superiores sex: intermediis quatuor aequalibus utroque latere quasi lobatis; extremis longioribus altero latere lobatis. Inferiores sex, obrutissimi: horum duo alterni interiores. Laniarii superiores solitarii, antice remoti, extus rugosi; inferiores solitarii utrinque approximati. Molares superiores quinque; inferiores sex: omnes lobati primo ultimoque minuto.

Mihi obscurum adhucdum animal, nondum enim legi, quae habent de eo acta holmiensia anni 1773. Ex Vrsi genere esse audio. Confusum a variis auctoribus tam cum Cane Hyaena, quam cum Vrsulo lusco, animalibus diuersissimis.

Habitat in Lapponiae, Russiae, Sibiriae siluis vastissimis. Visitat Leporibus, Auibus, Rangiferis, Ceruis, cadaueribus. Voracissima bestia deiicit se ex arboribus in animalia praetereuntia. Lenta in cessu. Ludibundam dicit Stellerus.

Coit Ianuario mense, parit Maio pullos duo vel tres. Admittit vulpem (*Linnaeus*). Pellis praestantissima, olim pretiosissima, non hodie. Foetor horrendus, ob quem vix excoriandum animal.

43. VIVERRA.

Dentes Primores utrinque VI: intermediis brevioribus.

Molares plures quam tres.

Lingua retrorsum saepe aculeata.

Vngues exserti.

Ichneumon. I. V. cauda e basi incrassata sensim attenuata, pollicibus remotiusculis.

Ichneumon Arist. hist. anim. VI c. 35 n. 422.

Ichneumon Plin. hist. nat. VIII c. 24, 25 (c. 35-37 Hard.) X c. 63 (c. 83 Hard.).

Ichneumon Aelian. anim. III c. 22. X c. 47.

Ichneumon Oppian. cyneg. III, 407.

Quil vel Quirpele Garc. arom. p. 214.

Ichneumon Gesn. quadrup. p. 635 cum fig. mala.

Ichneumon Bellon. aquat. p. 44 fig. p. 45 mediocr.

Ichneumon Bellon. obs. p. 96 cum fig. mediocr.

Muris genus siluetre, quod indigenae Marem Pharaonis appellant Alp. Aeg. I. p. 234 tab. 14 fig. 3 Bellon.

Ichneumon Aldrov. digit. p. 298 fig. p. 301 mediocr.

Ichneumon Ionst. quadrup. p. 151.

Ichneumon s. lutra Aegypti Ionst. quadrup. tab. 67 fig. Bellon.

Mus Indicus Ionst. quadrup. tab. 67 fig. mala.

Indianische Maus. Ichneumon Gesn. Thierb. p. 273 cum fig. Bellon.

Ichneumon Charlet. exerc. p. 19.

Viverra Indica Quil el Quirpele dicta Rai. syn. quadr. p. 197.

Viverra Indica ex griseo rufescens Rai. syn. quadr. p. 198.

Ichneumon Rai. syn. quadr. p. 202.

Der Maushund Kolbe Vorgeb. p. 159.

Vierra Mungo *Kämpf. amoen. exot.* p. 574 fig. p. 567 mediocr.

De Mongkos *Valenz. Amboin.* III p. 293 cum fig. bona.

Ichneumon seu vulpecula ceylonica *Seb. thes.* I p. 66 tab. 41 fig. I.

L'Ichneumon, ou Rat de Pharaon *Maillet Aeg.* II p. 33.

The Ichneumon *Shaw trav* p. 249 cum fig. mediocr.

Der kleine ceylanische Fuchs *Meyer Thiere* III tab. 16 fig. 16.

Mustela glauca *Linn. syst. nat.* 6 p. 5 n. 9.

Meles vnguibus vniformibus, leucophaea *Linn. syst. nat.* 6 p. 6 n. 2.

Mustela quaedam Mungo dicta *Linn. amoen. acad.* II p. 97.

Mustela aegyptiaca *Klein. quadrup.* p. 64.

Mustela ceylonica *Klein. quadrup.* p. 65.

The Indian Ichneumon *Edw. birds* IV tab. 199.

Mustela griseo et albido variegata. The grey and white variegated *Mustela*: the tabbied Mungo *Hill anim.* p. 549.

Mustela ferruginea cruribus longioribus. The ferrugineous *Mustela*, with longer legs: the brown Mungo *Hill anim.* p. 550.

Meles vnguibus vniformibus leucophaea. The bluish Meles, with uniform claws: the Ichneumon *Hill anim.* p. 557.

Serpenticida seu Moncus *Rumph. herb. amb. auct.* p. 69 tab. 28 fig. 2, 3.

Le Furet des Indes: *Mustela* (*Vierra indica*) ex griseo rufescens *Briss. regn. an.* p. 245 n. 4.

L'Ichneumon ou la Mangouste, vulgairement le Rat de Pharaon: *Mustela* (*Ichneumon, mus Pharaonis vulgo*) pilis ex albido et nigricante variegatis vestita *Briss. regn. an.* p. 250 n. 12.

Meles (Ichneumon) digitis mediis longioribus, lateralibus aequalibus, unguibus subuniformibus *Hafselqu. Palaeft. p. 271.*

Die Pharaonsmaus. Ichneumon *Hall. vierf. p. 460.*

Das Ceilonifche Füchsgen *Hall. vierf. p. 461 tab. 29.*

Vierra (Ichneumon) cauda e basi incrassata sensim attenuata *Linn. syst. nat. 10, 1 p. 43 n. 1.*

Furet des Indes *Dictioun. anim. II p. 230.*

Ichneumon *Dictioun. anim. II p. 528.*

Rat d'Aegypte *Dictioun. anim. III p. 669.*

Fret, welker Staart van den Wortel af verdient Zyn-
de, allengs weder dun wordt *Houtt. nat. hist. II p. 248 tab. 13 fig. 1* Sebae.

Ichneumon ou Mangouste *Bon. dictioun. II p. 571.*

La Mangouste *Buff. hist. nat. XIII p. 150 tab. 19.*

Vierra (Ichneumon) cauda e basi incrassata sensim attenuata, pollicibus remotiusculis *Linn. syst. nat. 12, 1 p. 63 n. 1.*

The Ichneumon *Penn. syn. quadr. p. 226 n. 162.*

Mangouste *Aless. quadrup. IV tab. 158 fig. Buff.*

Die indianische Maus oder der Ichneumon *Berl. Samml. IV p. 370 cum fig.*

Pharaoratze *Müll. Naturf. I p. 244 tab. 13 fig. 1* Sebae.

Vierra Ichneumon *Forsk. fn. orient. p. III.*

Vierra Ichneumon *Schreb. Säugth. III tab. 116 fig. Buff.*

Vierra Ichneumon β *Schreb. Säugth. III tab. 116 B fig. Vosmaerii.*

Tezer-dea *in Africa boreali.*

Nemus *Aegyptiis.*

Magnitudo Cati, vel paullo maior, longitudine corporis 20 pollicum, caudae 18 poll. Caput prominens, oblongum. Latera capitis iuxta aures compressa, infra oculos longitudinaliter parum protuberantia. Vertex subconvexus. Frons valde declinis, feu

feu perpendiculariter fere a vertice pergens, fere plana, fenfim verſus oculos vsque ad roſtrum anguſtata. Roſtrum longiuſculum, dorſo conuexum, deorſum valde anguſtatum, inde ad latera verſus marginem maxillae ſuperioris decliue, planiuſculum, verſus oculos valde depreſſum et quaſi excauatum, nudiuſculum, apice nudum, obtuſiuſculum, ſubcalloſum, iutegerrimum. Maxilla ſuperior, quae totum roſtrum conſtituit, inferiore multo longior; ſubtus integra ſulco paruo in medio notata. Inferior triangularis, apice obtuſa. Nares ſemilunares, ad apicem roſtri iuxta latera eius. Margo ſuperior narium valde conuexus vel gibboſus, gibbere ex dorſo apicis roſtri prodeunte. Oculorum orbita ablouga, ad vtrumque canthum anguſtata, anterius et ad latera excauata. Oculi proxime ſupra roſtrum, ad latera capitis, perpendiculariter ſub auriculis, parui, extra orbitam non exſtantes. Pupilla elliptica, atra. Iris grifea. Auriculae iuxta baſin capitis, ad latera eius, rotundatae, breues, erectae, lanuſinoſae, ambitu amplae ratione corporis. Apertura aurium ampla. Lobi duo erecti, lanuſinoſi, lati, paralleli, apice ciliati, lineares in anthelice. Pili rigidiuſculi, copioſi, erecti ad tempora, qui aurium aperturam tegunt. Labia latiuſcula, reflexilia, dentes vtrinque tegunt, quorum inferius antice immobile. Myſtaces breues, ſparſi, parum rigidi, ſimplici ſerie longitudinali in vtriuſque labii margine diſponuntur in vtraque maxilla. Dentes primores ſupra et infra ſex, breuiuſculi, apice obtuſi, exterius conuexi, interius planiuſculi, ſulco paruo longitudinali in medio interioris ſuperfici notati, aequales. Laniarii ſolitarii: ſuperiores longiuſculi, compreſſi, extus conuexi, intus parum incuruati; inferiores erecti, craſſiuſculi, reſti, extus plani, ſulcati, obtuſi. Molares ſupra vtrinque duo lobati: lobis tribus.

oris mediocris. Apertura oris subtus. Lingua plana, apice obtusa, superficie superiore scabra, aculeis breuibus retrorsum spectantibus. Collum brevissimum, cylindricum, capiti et corpori parallelum, hoc paullo angustius. Corpus cylindricum, supra caudam param declivae. Abdomen planivisculum. Lumbi compressi, anteriores posterioribus breviores. Postici anterieus crassiores. Crura anterieus conuexa, pilosa, pone planiuscula nuda; anteriora posticis breviora. Digi ytrinque quinque: pollice brevissimo, a reliquis remotissimo; ex reliquis digitis medii lateralibus longiores, aequales. Omnes subtus lobati, basi membrana connexi. Ungues antici compressi, acuminati, parum arcuati, subtus longitudinaliter excauati, terminales, aequales. Postici fere recti, compressi, dorso conuexi, apice obtusi, subtus longitudinaliter excauati; terminales, aequales, anticis paullo breviores et crassiores. Cauda conica, basi crassior vsque ad apicem attenuata, pilosa, longitudine fere corporis. Folliculus ante anum circularis, amplus, ex marginibus ani reflexibilibus constructus. Mammae inguinales approxinatae. Pili totius corporis stricti, breues, subrigidi, supra longiusculi, albido et griseo nigrescentes annulati; rostro et pedibus griseo-nigrescentibus.

Habitat in India atque in Aegypto in campis et ad ripas Nili, inundationis tempore in hortis et iuxta pagos. Calcaneis incedit insidiosè et cum fileatio, saepeque rependo. Vescitur herbis, amphibis, serpentibus, lacertis, muribus, ouis atque gallinis nocturna. Effodit editque oua Crocodili. Facile mansuescit. Vox murmurans, iratae ciulans.

Serpentum hostis, morsu a serpente Ophiorrhizam assumere creditur.

Varietas

Varietas indica minor glauca, an specie diuersa? ✓

- Nafua. 2. *V. rufa, cauda albido annulata.*
Taxus fuillus Aldrov. digit. p. 267? cum fig. mediocri.
Vix.
 Le Coati Mondi *Perr. anim. II p. 15 tab. 37 fig. bona.*
 Coati Mondi *Maregrav. Rai. syn. quadr. p. 180.*
Vulpes minor, rostro superiore longiusculo, cauda
annulatim ex nigro et rufo variegata. Quachy
Barr. Fr. équ. p. 167.
 Coati Mondi, *Maregr. Klein. quadrup. p. 72.*
 Le Coati-Mondi à queue annelée: *Vrfus naso pro-*
ducto et mobili, cauda annulatim variegata Briff.
regn. an. p. 263 n. 6.
 Das Koatimondi *Hall. vierf. p. 505.*
Vrfus naso producto et mobili, cauda annulatim va-
riegata Dictionn. anim. I p. 660.
 Le Coati *Buff. hist. nat. VIII p. 358.*
 Le Coati *Buff. hist. nat. VIII tab. 48.*
 De Coati-monde *Houtt. nat. hist. II p. 238 tab. 15*
fig. 2 Perr.
 Coati *Bom. dictionn. I p. 608.*
 Viuerra (Nafua) *rufa, cauda albo annulata Linn.*
syft. nat. 12, I p. 64. n. 2.
 The Badger of Guiana *Bancr. Guian. p. 141.*
 The Brazilian Weefel *Penn. syn. quadr. p. 229 & 164*
tab. 22 fig. 1.
 Coati grigio *Aless. quadrup. III tab. 112 fig. 2 Buff.*
 Das Nafenfrett *Müll. Naturf. I p. 247 tab. 15 fig. 2*
Perr.
 Viuerra Nafua *Schreb. Säugth. III tab. 118 fig. Buff.*
- Corpus magnitudine Cati, longitudine 18 pollicum,
 cauda 13 poll. longa, statura Vrfi Lotoris, rufam
 vt Vulpis, pilis in dorso rigidulis. Macula albida
 supra, infra, poneque oculum. Auriculæ rotun-
 datae, paruae, supra nigrae. Oculi minuti. Ver-
 ruca

ruca supra palpebram superiorem, sub oculo, in bucca, sub gula. Gula flavescentes. Nasus eductus in proboscidem nigram, longissimam, vndique mobilem, apice introrsum truncatam, absque lacuna subtus. Dentes primores superiores sex distincti: lateralibus maioribus. Inferiores sex: mediis conuergentibus. Laniarii solitarii. Molares plures. Lingua fissuris lobata vt querci folium (non vidit hoc Daubentonius). Cauda erecta, corpore longior, fusca, annulis decem pallidis, pilis patulis depressa, apice compressa. Pedes calcaneis incedentes tardo gressu, etiam scandentes. Digni singulis quinque, pollice non remoto. Ungues acuti, compressi. Calcanea cristata perill. Linnæus non vidit, neque oculatissimus Daubentonius. Mammæ ventrales sex.

Habitat in America: in Brasilia et Guiana. Egrege fodit quaesitura Lumbricos; victitat etiam ouis, auiculis, muribus, pomis, pane; dum irascitur pessime foetet. Mitis facileque mansuescit. Vox debilis.

Narica. 3. V. subfusca cauda concolore.

Coati-Mondi *Marcgr. Brasil. p. 228.*

Le Coati-Mondi: Vrsus (Coatimondi) naso producto et mobili, cauda unicolore *Briff. regn. an. p. 262 n. 5.*

Vrsus naso producto et mobili cauda unicolore *Dictionn. anim. I p. 660.*

Le Coati noiratre *Buff. hist. nat. VIII tab. 47.*

Vierra (Narica) subfusca cauda concolore *Linn. syst. nat. 12, I p. 64 n. 3.*

Das Thier Narica *Linné: Act. holmiens. 1768 p. 152 cum fig.*

The dusky Brazilian Weasel *Penn. syn. quadr. p. 230 n. 164.*

Coati

Jo. Dan. Majoris de nummis Rehdigerianis desiderium (Kil. 1681) 4. pag 60. non mediocr.

J. J. Walbaum in 1^o B. der neuen Scher. der Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin 1795.

Coati nero *Aless. quadrup. III tab. 112. fig. 1* Buff.
 Ein seltenes Thier Narica genannt *Linné: Berl. Samml. III p. 199 cum fig. Linn.*
 Der Frettbär *Müll. Naturf. I p. 250.*
 Vierra Narica *Schreb. Säugth. III tab. 119 fig. Buff.*

Cato paullo maior, maiorque antecedente. Corpus supra griseum, subtus album, inter crura postica flavicans. Pili supra basi fasci, medio nigri, apice ferruginei. Collum breue. Rostrum et auriculæ vt in præcedente. Labium vtrumque album. Macula alba supra et infra oculus vtrumque. Stria alba a superciliis vsque ad labium superius vtrinque. Nares lunatae. Vibrissæ longæ, nigrae, in naso labioque vtroque. Verruca supra palpebram superiorem, sub oculo, in bucca, pone angulum oris, sub gula, pone palmas. Dentes Primores superiores sex, parui, subobtusî, paululum distantes, recti. Inferiores sex, paralleli, approximati. Laniarii solitarii reliquis longiores; superioribus rectis a primoribus, inferioribus curuatis a molaribus remotis. Molares supra et infra vtrinque sex. Sutura pone angulos oris, aliaque in pedibus anticis extus. Pedes calcaneis incedentes, pilis nigris. Volæ nudæ. Digni 5-5: pollice brevior. Ungues incuruati, nigri, compressi, longitudine digitorum, in posticis paullo breuiores. Cauda corpore fere longior, tères, crassa, villosa, corpori concolor, recta. Scrotum mari nullum.

Hanc meram præcedentis varietatem putant Buffonius atque Pennantus.

Habitat in America australi. Fodit naso terram profunde, vt sola cauda promineat. Edit lumbricos, panem, fructus, radices. Aquam quoque intrat, ascenditque arbores.

Suricatta, 4. V. pedibus tetradactylis.

Die Ratelmaus *Kolbe Vorgeb. p. 158?*

Le Surikate *Buff. hist nat. XIII p. 72 tab. 8.*

Surikate *Bon. dictionn. IV p. 278.*

The fourtoed Weefel *Penn. syn. quadr. p. 228 n.*

163.

Surikate *Aless. quadrup. III tab. 144 fig. Buff.*

Vierra *Suricatta Schreb. Säugth. III tab. 117 fig.*

Buff.

Longitudo corporis pedis vnus, caudae sex pollicum.

Rostrum elongatum: maxilla superiore longiore

maxime mobili. Auriculae rotundatae. Pili cor-

poris longi, rudes, erecti, nigro alboque variega-

ti, apicibus nigris. Pedes 4-4. Cauda gracilis,

attenuata.

Habitat in India orientali, num etiam ad caput bo-
nae spei? Agilis, ladibunda, mitis; erecta sedet,
cruribus anticis pectori admotis. Vicitat anima-
libus minoribus. Bibit vrinam suam.

Buffonius Surinamo indigenum dicit animal.

**Putorius, 5. V. nigricans lineis quinque dorsalibus paral-
lelis albis.**

Conepatl seu vulpecula puerilis *Hernand. Mex. p. 332.*

Conepatl seu vulpecula puerilis *Ioust. quadrup. p. 134.*

Polcats or Skunks *Lawson. Carol. p. 119.*

The Pol-cat *Catesb. Carol. II p. 62 tab. 62.*

The Pol-cat *Brick. North-Carol. p. 118.*

Mustela Americana foetida *Klein. quadrup. p. 64.*

Ein gewisses vierfüßiges Thier *Kalm. Amer. II p. 412.*

Le Putois rayé: *Mustela* (*Putorius striatus*) nigra, taeniis in dorso albis *Briff. regn. an. p. 250 n. 11.*

Der Amerikanische Lixiviltis *Hall. vierf. p. 460.*

Vierra (*Putorius*) fusca lineis quatuor albidis dorsalibus parallelis *Linn. syst. nat. 10, I p. 44 n. 3.*

Bête puante *Dictionn. anim. I p. 280.*

Putois rayé *Dictionn. anim. III p. 626.*

Amerikaansche Bontsem: Fret met vier witagtige Streepen, die evenwydig loopen, op de Rug *Houtt. nat. hist. II p. 156.*

Le Conepate *Buff. hist. nat. XIII p. 288 tab. 40.*

Putois rayé *Bom. dictionn. III p. 675.*

Vierra (*Putorius*) fusca lineis quatuor dorsalibus parallelis albidis *Linn. syst. nat. 12, I p. 64 n. 4.*

The striated Weasel *Penn. syn. quadr. p. 232 n. 166.*

Conepato *Aless. quadrup. IV tab. 154 fig. 2 Buff.*

Das Stinkthier *Müll. Naturf. I p. 251 Suppl. p. 31.*

Vierra *Putorius* *Schreb. Säugth. III tab. 122 fig. Catesb.*

Pol-cat *Anglis in America.*

Fiskatte *Suecis in Pensilvania.*

Skunk *Noueboracensibus.*

Pekan *nonnullis in America boreali.*

Magnitudo *Mustelae Putorii*, sed dorsum magis arcuatum. Auriculae rotundatae. Caput, collum, venter, crura et cauda nigricantia. Striae quinque parallelae albae in dorso et lateribus longitudinales, secunda vtrinque in caudam prolongata. Cauda longa, pilis longioribus versus apicem.

Habitat in America septentrionali. Irritata haec et sequentes 6, 7, 8, 9, halitum suffocantem fere *Geranii robertiani* fortissimum expuldit, quo nihil foetidius; simulque corpus in globum componit, vimamque eiaculat ad 18 pedum distantiam, foetidissimam, oculos excecantem. Incessu tarda,

nec hominem nec feras metuens. Vestes foetore huius animalis inquinatae purgantur sepe-
liendo eas per diem intra terram. Vicitat animalibus, insectis et fructibus. Canes non nisi assueti haec animalia adoriuntur, saepeque interim nasum terrae immittunt. Caro bona, modo mox cutis detrahatur animali, vesicaque urinaria remoueat. Parit in cauis arboribus vel sub terra inque rupium fissuris. Bene ascendit arbores.

Vulpecu- 6. V. castanea subtus flauescens.

la. Yzquiepatl seu Vulpecula, quae Maitzium torrefactum aemulatur colore *Hernand. Mex. p. 332 cum fig. mediocr.*

Vulpes Indica Izquiepatl *Ionst. quadrup. p. 134?*

Izquiepotl *Ionst. quadrup. p. 134.*

Yzquiepatl. Ein Indianischer Fuchs *Gesn. Thierb. p. 126 cum fig. mala.*

Yzquiepatl, seu Vulpecula quae Maizium torrefactum colore aemulatur *Hernandez Rai. syn. quadr. p. 181.*

Tamandua, mexicana, Yzquiepatl, seu Vulpecula dicta *Seb. thes. I p. 66 tab. 40 fig. 2.*

Ichneumon de Yzquiepatl seu Vulpecula americana, quae colore Maizium torrefactum aemulatur *Seb. thes. I p. 68 tab. 42 fig. 1.*

Der mexicanische Ameisenfresser *Meyer Thiere III tab. 11 fig. Sebae.*

Coati, Hernandezii *Klein. quadrup. p. 72.*

Le Blaireau de Surinam: Meles (surinamensis) ex saturate spadiceo nigricans, cauda fusca, annulis flauicantibus quasi cincta *Briff. regn. an. p. 255 n. 3.*

Das Izquiepotl. Stinkthier *Hall. vierf. p. 509.*

Viuerra (Memphitis) cauda fusca luteo-annulata, corpore spadiceo subtus flauescente *Linn. syst. nat. 10, I p. 44 n. 2.*

Blaireau de Surinam *Dictionn. avim.* I p. 298.

Izquepolt *Dictionn. anim.* II p. 253.

Stinkdier: Fret met een bruine Staart, die geel geringd is, het Lyf Kastanje-bruin; van onderen geelagrig *Houtt. nat. hist.* II p. 154 tab. 13 fig. 2 Sebae.

Usquepatli *Bom. dictionn.* IV p. 633.

Le Coase *Buff. hist. nat.* XIII p. 288, 299 tab. 38.

The stifling Weesel *Penn. syn. quadr.* p. 230 n. 165.

Coaso *Aless. quadrup.* IV tab. 154 fig. 1 Buff.

Müll. *Natursf.* I tab. 13 fig. 2 Sebae.

Vierra *Vulpecula Sebreb. Säugth.* III tab. 120 fig. Buff.

Das Braunfrett: *Vierra fusca Müll. Natursf. Suppl.* p. 32.

Longitudo corporis 18 pollicum. Nasus brevis, gracilis. Auriculae parvae. Crura brevia. Ungues nigri. Corpus castaneum, valde pilosum. Cauda longa nigra et alba. Palmas tetradactylas dicit Buffonius.

Habitat in Mexico. *Mores* praecedentis.

Mephitis. 7. V. dorso albo linea longitudinali nigra.

Un animal appellé Chinche *Feuill. Journ.* I p. 272.

Une sorte de Fouine, qu'on a nommée *Enfant du Diable*, ou *Bête Puante Charlev. nouv. Fr.* III p. 133.

Le Clinche *Buff. hist. nat.* XIII p. 288, 300 tab. 39.

The Skunk *Penn. syn. quadr.* p. 233 n. 167.

Vierra *Putorius Linn. mant.* II p. 522.

Chinco *Aless. quadrup.* IV tab. 153 fig. 2.

Der Chinchi *Berl. Samml.* IV p. 298.

Skunk *Forster: Philos. transact.* LXII p. 374.

Vierra Mephitis Schreb. Säugth. III tab. 121 fig.
Buff. *ovis*

Der Chunk: Vierra Cinche Müll. Naturf. Suppl.
p. 32.

Chinche in America Australi.

Vierra Putorio minor. Auriculae breues, rotundatae. Caput nigrum: linea alba a naso inter aures ad verticem ducta. Collum supra cum dorso toto album cum linea nigra a cauda per dorsi partem extensa. Venter et crura nigra. Cauda pilis densis, longis, rudibus, ut plurimum nigris, interdum apicibus albis: Buffoniö tora alba. Ungues valde longi, ut in Melis palmis.

Habitat in Peruano regno et America boreali vsque ad Canadam. Mores et foetor affinium. Mansuescit.

Zorilla. §. V. albo nigroque variegata.

Stinking fox Cieza Peru p. 235.

Mapurito, Masutiliqui Gum. Orin. II p. 312.

Bête Puante Du Pratz Louis. II p. 97? cum fig. mala.

Le Zorille Buff. hist. nat. XIII p. 289, 302 tab. 41.

The Zorilla Penn. syn. quadr. p. 233. n. 168.

Zorilla Aleff. quadrup. IV tab. 153 fig. 1.

Vierra Zorilla Schreb. Säugth. III tab. 123 fig. propr.

Der Mapurit: Vierra Mapurita Müll. Naturf. Suppl.
p. 32.

Minor praecedente. Dorsum et latera striis breuibus nigris et albis subflavis. Cauda longa pilosa albo nigroque mixta. Crura et venter nigra.

Habitat in America australi. Pessime foetet.

- capensis*. 9. V. nigra dorso griseo albo marginato.
 Stinckbincksem *Kolbe Vorgeb. p. 167.*
 Bléreau puant *De la Caille voy. p. 182.*
 Mustela subfusca, linea longitudinali alba per utrum-
 que latus ducta: the Guinea Weasel *Brewn. Jam.*
p. 486.
 Blaireau puant *Dictionn. anim. I p. 298:*
 Blaireau puant du cap de bonne esperance *Bom. di-*
ctionn. I p. 292.
 The Fizzler Weasel *Penn. syn. quadr. p. 234 n. 169.*
 Vierra *capensis* *Schreb. Säugth. III. tab. 125 fig.*
 propr.

Longitudo corporis 2 ped. caudae 8 pol. Rostrum
 breue, subacuminatum. Auriculae nullae, forami-
 na tamen auditoria. Dorsum medio fusco-gri-
 seum. Ab oculis ad medianam caudam usque in utro-
 que latere striae albae. Venter, crura atque apex cau-
 dae nigra. Ungues palmarum pollicem longi, plan-
 tarum vngues breues.

Habitat ad caput bonae spei. Focidissimum animal.

- Zibetha*. 10. V. cauda annulata, dorso cinereo nigroque
 undatim striato.

Zibethicum animal americanum *Hernand. Mex. p. 538*
cum fig. mediocr.

Animalis *Zibethici* Maris Icon D. Fabii Columnae
Lync. Hernand. Mex. p. 580 fig. mediocr.

Animalis *Zibethici* Foeminae Icon D. Fabii Columnae
Lync. Hernand. Mex. p. 580 fig. mediocr.

Felis zibethi *Gesf. quadrup. p. 948 cum fig. mediocr.*

Hyaena veteribus nuncupata, nunc apertem *Civeta*
Bellon obs. p. 94 cum fig. mediocr.

Thierlein so den *Zibeth* tragen. *Rauwolf. Reif. II p.*
133.

Chats musquez *Della Valle voy. I p. 275.*

Hyaena

Clusii curae posteriores. p. 109. icon accurata

Hyaena odorifera Castelli monogr. cum figg. recusa
quoque in *Ionst. quadrup.*

Animal Zibethi *Aldrov. digit. p. 340.*

Felis zibethi Aldrov. digit. p. 342 fig. mediocr.

Animal zibethi, vel hyena veterum Bellonii *Aldrov.*

digit. p. 343 fig. mediocr.

Animal zibethi *Ionst. quadrup. p. 157.*

Felis zibetti Zibet Katz Ionst. quadrup. tab. 72 fig.
mediocr.

Falanouc *Flacourt Madag. p. 154.*

Felis Zibethi. Zibeth-Katz Gesn. Thierb. p. 244 cum
fig. mediocr.

La Civette *Perr. anim. I p. 157 tab. 23 fig. bona.*

Zibethkatze *Olear. Gott. Kunstk. p. 7 tab. 6 fig. 3*
mediocr.

Animal Zibethi *Charlet. exerc. p. 20.*

Animal zibethicum *Rai. syn. quadr. p. 178.*

The civet-cat *Barbot Guin. p. 114, 210.*

Zibethkatzen *Bossm. Guin. p. 298.*

De Civet-Kat *Valent. Amb. III p. 270.*

Un animal connu sous le nom de Musc: *Dela Pey-*
ronnie Mém. de l'acad. 1731 p. 443 tab. 1 fig
mediocr.

Meles unguibus uniformibus Linn. syst. nat. 2 p. 45.

Die Zibethkatze *Meyer Thiere III tab. 32 fig. Perr.*

Meles unguibus uniformibus, cinerea Linn. syst. nat.
6 p. 6 n. 2.

Coati Civetta vulgo *Klein. quadrup. p. 73.*

Meles cinerea unguibus uniformibus. The grey
Meles, with uniform claws: the Civet-Cat Hill
anim. p. 556 tab. 27 fig. mediocr.

La Civette: *Meles (Civetta) fasciis et maculis albis,*
nigris et rufescentibus variegata Briss. regn. an. p.
256 n. 4.

Die Zibethkatze. Zibethier *Hall. vierf. p. 510.*

Viúerra (Zibetha) cauda annulata, dorso cinereo nigro-
que undatim striato *Linn. syst. nat. 10, I p. 44 n. 4.*

Chat

Chat civette *Dictionn. anim.* I p. 504.

Civette *Dictionn. anim.* p. 602.

Sivet - Kat: Fret met een gebandeerde Staart; de Rug zwart en wit, golswyze gestreept *Houcr. nat. hist.* II p. 159 tab. 13 fig. 3.

Le Zibet *Buff. hist. nat.* IX p. 299 tab. 31.

La Civette *Buff. hist. nat.* IX p. 299 tab. 34.

Civette *Bom. dictionn.* I p. 602.

Viueria (Zibetha) cauda annulata, dorso cinereo nigroque vndatim striato *Linn. syst. nat.* 12, I p. 65 n. 5.

The Civet *Penn. syn. quadr.* p. 234 n. 170.

Zibetto *Aless. quadrup.* I tab. 31 fig. Buff.

Zibetto della Guinea *Aless. quadrup.* I tab. 33 fig. Buff.

Das Zibethier *Müll. Naturf.* I p. 253 tab. 13 fig. 3.

Viueria Zibetha *Forsk. fu. orient.* p. III.

Viueria Civetta *Schreb. Säugth.* III tab. 111 fig. Buff.

Viueria Zibetha *Schreb. Säugth.* III tab. 112 fig. Buff.

قوت الباري (Qott el barr) *Aegyptiis.*

Can-Can *Aethiopicus.*

Falanouc *in Madagascar.*

Longitudo corporis 2 ped. 3 poll. caudae 14 poll.

Corpus oblongum. Rostrum subobtusum, apice nigrum. Oculi caerulei. Orbitae nigrae. Dentes primores superiores sex paralleli: intermedii paulo minores; inferiores sex paralleli medii paulo breuiores, alternis interioribus. Laniarii solitarii, vtrinque distantes. Molares acuti, denticulati. Auriculae breues, rotundatae, rectae. Corporis pili secundam dorsum longiores cinereo nigroque vndati, rigidiusculi. Pedes subtus nudi. Ungues 5-5 canini. Cauda Felis annulata. Guttur, Pedes,

des, Venter, nigra. Latera nigro-maculata. Folliculus zibethi inter anum et genitalia in utroque sexu, unicus, propria apertura donatus distincta ab ano et vulva, prominente, ambrosiaca.

Habitat in India, Sinesi regno, Philippinis insulis, Guinea, Aethiopia, Madagascari. Zibethi (f. relictus Zabad) cingit drachmam dynam dat omnitriduo, spatha ferrea extrahendam. Ex mare plus obtinetur. Visitat auriculis; nutritur in Belgio ob Zibethum carne, iunior pulte miliacea. Animal ferum, indomitum; natum pilos dorfi erigit.

Varietates duas distinxit primus perill. Buffonius: la Civette (the Civet Penn.) et le Zibet (the Zibet Penn.). Haec in India orientali, Arabia, dentibus molaribus utrinque quinque, mammis quatuor pectoralibus et duabus abdominalibus, auriculis magis eleuatis et lauis, cauda annulata distinctiusque annulata, pilis breuioribus ac mollioribus, iuba nulla: ista in Africa dentibus molaribus utrinque sex, mammis duabus pectoralibus totidemque abdominalibus, rostro crassiore, breuiore, subconuexo.

Genetta. II. V. cauda annulata, corpore fuluo-nigricante maculato.

Genetta *Gesn. quadrup.* p. 619 fig. *pellis* p. 1102.

Genette *Bellon: obs.* p. 76 *cum fig.* mediocr.

Genetta *Aldrov. digit.* p. 337.

Genetta *Bellonii, Felis species* *Aldrov. digit.* p. 339 *fig.* *Bellon.*

Genetta *Ionst. quadrup.* p. 157.

Genetta *Geneth* *Katz Ionst. quadrup. tab.* 72 *fig.* *Bellon.*

Genetha. Eine *Geneth* - *Katz Gesn. Thierb.* p. 243 *cum fig.* *pellis.*

Genetta *Charlet. exerc. p. 20.*

Genetta vel Ginetta *Rai. syn. quadr. p. 201.*

The Shibeardou or Spanish Ginetta *Shaw trav. p. 246.*

Mustela cauda annulis nigris albidisque cincta Linn. syst. nat. 6 p. 5 n. 8.

Coati Ginetta *Klein. quadrup. p. 73.*

Mustela cauda annulis nigris albidisque cincta. The *Mustela*, with the tail annulated with white and black: the Genet *Hill anim. p. 549.*

La Genette: *Mustela* (Genetta) cauda ex annulis alternatim albidis et nigris variegata *Brieff. regn. an. p. 252 n. 13.*

Die Genettkatze *Hall. vierf. p. 509.*

Vierra (Genetta) cauda annulata, corpore fulvo-nigricante maculato *Linn. syst. nat. 10, I p. 45 n. 5.*

Genette *Dictionn. anim. II p. 259.*

Genet-Kat: Fret met een gebandeerde Staart, het Lyf Goudgeelagtig zwart, gevlaekt *Hout. nat. hist. II p. 165.*

La Genette *Buff. hist. nat. IX p. 343 tab. 36.*

Genette *Bom. dictionn. I p. 605.*

Vierra (Genetta) cauda annulata, corpore fulvo-nigricante maculato *Linn. syst. nat. 12, I p. 65 n. 6.*

The Genet *Penn. syn. quadr. p. 236 n. 171.*

Fuina di Constantinopoli *Aless. quadrup. I tab. 32.*

Die Genettkatze *Müll. Naturf. I p. 256 tab. 31 fig. 4.*

Vierra Genetta *Schreb. Säugth. III tab. 113 fig. Buff.*

Magnitudo Felis. Corpus croceo-nigricans, linea dorsali nigra maculisque nigris in lineas longitudinales dispositis, excepto capite et pedibus. Rostrum acutissimum, Auriculae subacuminatae. Cauda

annulis octo nigris, totidemque albicantibus. Mammæ ventrales quatuor.

Habitat in Oriente iuxta riuos, atque in Hispania. Mansuescit vt Felis. Odorem debilem moschi spirat ex orificio inter anum et genitalia.

Fossa. 12. V. cauda annulata, corpore cinereo nigro maculato.

Fossa *Flacourt Madag.* p. 152.

Biesamkatze *Kolbe Vorgeb.* p. 154?

Ziebet *Kolbe Vorgeb. tab. 6 fig. 3?*

Fossane *Bom. dictionn.* II p. 226.

La Fossane *Buff. hist. nat. XIII p. 163 tab. 20.*

The Fossane *Penn. syn. quadr. p. 237 n. 172 tab. 22 fig. 2.*

Fossana *Aless. quadrup. IV tab. 159 fig. I.*

Das melirte Frett: Vierra Fossana *Müll. Naturf. Suppl. p. 32.*

Die Biesamkatze *Müll. Naturf. Suppl. p. 30?*

Vierra Fossa *Schreb. Säugth. III tab. 114 fig. Buff.*

Berbe - *Guincensibus.*

Fossa in *Madagascar.*

Habitus V. Genettae; at minor. Auriculae rotundatae. Oculi nigri. Corpus et crura cinerea admixto rufo. Faciei latera nigra. Ab occipite ad dorsum et humeros lineae quatuor nigrae. Humeri, latera et crura postica nigra. Cauda nigro annulata.

Habitat in Madagascar, Guinea, Cochinchina, Philippinis insulis. Fera vixque domanda. Vicitat gallinulis et fructibus. Iuniorum caro esculenta.

Odor

Odor nullus, nisi mari oestri tempore. Folliculus nullus.

* * *

Duas huius generis species praeterea depictas habet celeb. Schreberus ex Vosmaerii et Allamandii figuris, quarum descriptionem adhuc expectamus in pulcherrimo opere:

Vierra tigrina Schreb. *Säugeth. III tab. 115 fig.* Vosmaerii.

Vierra vittata Schreb. *Säugeth. III tab. 124 fig.* Allamandii.

* * *

Felis capite acuminato ex noua Hispania Seb. *ibid. I p. 76 tab. 48 fig. 1* videtur huius generis.

Nasus simus. Auriculae planae, rotundatae. Cauda longa, acuminata. Ex rufo flavescit, ventre dilutiore.

Habitat in desertis nouae Hispaniae; altissimis insidens arboribus, capit auiculas. Mansuescit.

44. F E L I S.

Dentes Primores VI acutiusculi: exterioribus maioribus.

Laniarii solitarii, supra a primoribus, infra a molaribus remoti.

Molares terni.

Lingua retrorsum aculeata.

Pedes digitati: digiris 5-4: vnguibus retractilibus.

Leo. 1. F. cauda elongata, corpore heluolo.

Λεων, Λεωνια *Arist. hist. anim. II c. 1 n. 2. c. 5 n. 23. c. 7 n. 29. c. 8 n. 41. c. 9 n. 50. III c. 7 n. 102. c. 15 n. 233. VI c. 31 n. 393-400. VIII c. 9 n. 104. IX c. 69 n. 460-472.*

Leo, Leana *Plin. hist. nat. VII c. 1 (c. 1 Hard.). VIII c. 15, 16 (c. 17-21 Hard.). X c. 45 (c. 62 Hard.). c. 63 (c. 73 Hard.). XI c. 37 (c. 65, 67, 86 Hard.). c. 39, 40 (c. 94, 95 Hard.). c. 43 (c. 99 Hard.). c. 45 (c. 105 Hard.). c. 53 (c. 115 Hard.).*

Λεων *Aelian. anim. III c. 1, 27. IV c. 3, 34, 46. V c. 39. VII c. 23. IX c. 1, 30. XII c. 7. XVII c. 26.*

Λεων *Oppian. cyneg. III, 7.*

Leo *Gesn. quadrup. p. 642 fig. bona.*

Leo

FELIS genus sobrium, cursu celere, scandit facile arbores, noctu potissimum speculatur, casu delabitur in pedes contulioni vix obnoxium; glans penis ipsi muricata retrorsum; retractis vnguibus acutissimis incedit iisque saevit, inhiando sanguinem haurit; vita praeda caudam movet; capite rotundato gaudet. Specierum characteres et synonyma difficiliter eruuntur.

- Léo *Schwenckf. theriotr. p. 101.*
 Leo *Aldrov. digit. p. 2 fig. p. 6* *Leaenae mediocris.*
 Leo *Ionst. quadrup. p. 111.*
 Leo Löw *Ionst. quadrup. tab. 50 figg. maris bonae.*
 Leaena, Leo *Ionst. quadrup. tab. 51 figg. bonae ma-*
ris ac feminae.
 Leo minor *Ionst. quadrup. tab. 52? fig. mala.*
 Leo *Mus. Worm. p. 317.*
 Leones *Bont. Ind. or. p. 55.*
 Le Lion *Marmol Afr. I p. 54.*
 Ein Löw *Gesn. Thierb. p. 246 fig. p. 247 mal.*
 Le Lion *Perr. anim. I p. 1 tab. 1 fig. bon.*
 La Lionne *Perr. anim. I p. 19 tab. 3 fig. bon.*
 Leo *Charlet. exerc. p. 14.*
 Leo *Rai. syn. quadr. p. 162.*
 Der Löwe *Kolbe Vorgeb. p. 154 tab. 5 fig. 3 maris*
et feminae mediocr.
 The Lyon *Shaw trav. p. 244.*
 Leo *Lin. syst. nat. 2 p. 43.*
 Löwe *Riding. jagdb. Tb. tab. 1.*
 Felis cauda elongata floccosa, thorace iubato *Lin.*
syst. nat. 6 p. 4 n. 1.
 Leo *Klein. quadrup. p. 81.*
 Felis cauda elongata floccosa, collo piliato. The Fe-
 lis, with an elongated floccose, tail, and a mane
 on the neck: the Lion *Hill anim. p. 542 tab. 26*
figg. maris et feminae mediocr.
 Le Lion: Felis (Leo) cauda in floccum desinente
Briss. regn. an. p. 265 n. 5.
 Felis cauda elongata floccosa, thorace iubato *Kram.*
Austr. p. 310.
 Der Löwe. Die Löwinn *Hall. vierf. p. 534.*
 Felis (Leo) cauda elongata, corpore heluolo *Lin.*
syst. nat. 10, I p. 41 n. 1.
 Lion *Dictionn. anim. II p. 686.*

Leeuw: Kat met een zeer lange Staart, die een Kwast aan 't end heeft, het Lyf rös van kleur *Houtr. nat. hist. II p. 96.*

Le Lion *Buff. hist. nat. IX p. 1 tab. 1.*

La Lionne *Buff. hist. nat. IX tab. 2.*

Lion *Bon. dictionn. II p. 697.*

Felis (Leo) cauda elongata, corpore heluolo *Linn. syst. nat. 12, I p. 60 n. 1.*

The Lion *Penn. syn. quadr. p. 164 n. 120.*

Lione *Aless. quadrup. I tab. 1 Buff.*

Lionessa *Aless. quadrup. I tab. 2 Buff.*

Der Löwe *Müll. Naturf. I p. 230 tab. 29 fig. 4.*

Der Löwe: Felis Leo *Mas Schreb. Säugtb. III p. 376 tab. 97 A fig. Riding.*

Felis Leo *Femina Schreb. Säugtb. III tab. 97 B fig. matris cum catulis Riding.*

Leon (*mas*) Leona (*femina*) *Hispanis.*

Leão, Leam (*mas*) Leóa (*femina*) *Lusitanis.*

Lione, Leone (*mas*) Leona, Leonza, Lionessa (*femina*) *Italis.*

Lion (*mas*) Lionne (*femina*) *Gallis.*

Löwe (*mas*) Löwinn (*femina*) *Germanis.*

Leeuw *Belgis.*

Lion (*mas*) Lioness (*femina*) *Anglis.*

Leyon *Suecis.*

Левъ (Lew') (*mas*) Лвица (Lwitz) (*femina*) *Ruffis.*

Longitudo corporis 8 pedum et ultra, caudae 4 pedum. Caput magnum. Frons quadrata. Oculi ingentes. Nasus crassus. Labia pendula. Auriculae breues, rotundatae. Maris caput supra mentum, totum collum et humeri pilis longioribus hirsuta, caudaque floccosa: reliquum corpus pilis breuibus laeue. Pectus robustum; artus fortissimi. Color luteo-rufus, ventre albicante. Femina non iubata, paullo minor mare, mammis binis (quaternis *Buffon.*). Cor maximum.

Habitat

Habitat in Africa, rarior in calidioribus Asiae; Americae plane exul.

Segnis, esuriens praedatur equos et maiora quadrupeda, nec nisi famelicus hominem. Fugatur accensa flamma, non galli voce; canibus coercetur. Retro mingit et coit? (negat Buffonius.) Rugitus horrendus a tracheae annulis integris imbricatis. Dormit in aprico. Esurit tertio die. *Taxax*. Incessus sublentus, haud currit sed salit. Anima foetida, urina foetidissima. Generosum, gratum, vehementer mansuescere veteres habent. Iratus iubam erigit. Olfactu debiliore pollet. Caro editur in Barbaria, sapore vitulinae, ingrato tamen.

Offa durissima absque medulla, scintillantia cum chalybe veteribus falso.

Tigris. 2. F. cauda elongata, corpore maculis omnibus virgatis.

Tigris *Plin. hist. nat. VIII c. 4 (c. 5 Hard.) c. 17, 18 (c. 23 - 25 Hard.)*.

Tyris *Oppian. cyneg. III, 98, 340.*

Tigris *Gesn. quadrup. p. 1060 cum fig. mediocri.*

Tigris *Schwenckf. theriotr. p. 130.*

Tygres *Purch. Pilgr. II p. 1001.*

Tygris *Aldrov. digit. p. 101.*

Tigris secundum nonnullos *Aldrov. digit. p. 103 fig. pessima.*

Tigris *Gesneri Aldrov. digit. p. 104 fig. Gesneri.*

Tigris *Ionst. quadrup. p. 120.*

Tigris *Tigerthier Ionst. quadrup. tab. 53 fig. mala.*

Tigris *Gesneri Ionst. quadrup. tab. 54 fig. Gesneri.*

Tygre *Boullaye voy. p. 246.*

Tigris *Bont. Ind. or. p. 52 fig. p. 53 mediocr.*

Tygerthier *Neub. Gesandtsch. p. 372 fig. p. 373 mediocr.*

Tigerthier *Gesn. Thierb. p. 340 cum fig. mediocr.*

Tygris *Charlet. exerc. p. 14.*

Tygris *Rai. syn. quadrup. p. 165.*

Tygris maculis oblongis *Linn. syst. nat. 2 p. 43.*

Felis cauda elongata, maculis virgatis *Linn. syst. nat.*

6 p. 4 n. 2.

Tygris asiatica *Klein. quadrup. p. 80.*

Felis cauda elongata, maculis virgatis. The Felis,

with an elongated tail, and virgated spots; the

Tyger *Hill anim. p. 543 tab. 26 fig. mala.*

Le Tigre: Felis (Tygris) flava, maculis longis nigris

variegata *Briff. regn. an. p. 268 n. 6.*

Felis cauda elongata, maculis virgatis *Kram. Austr.*

p. 311.

Der Ceilonische Tiger *Hall. vierf. p. 530.*

Felis (Tygris) cauda elongata, corpore maculis omni-

bus virgatis *Linn. syst. nat. 10, I p. 41 n. 2.*

Tigre *Dictionn. anim. IV p. 335.*

Tyger: Kat met een zeer lange Staart, hebbende

Vlacken op 't Lyf, die altemaal gestreept zyn

Houtt. nat. hist. II p. 108.

Le Tigre *Buff. hist. nat. IX p. 129 tab. 9.*

Tigre *Bom. dictionn. IV p. 337.*

Felis (Tygris) cauda elongata, corpore maculis omni-

bus virgatis *Linn. syst. nat. 12, I p. 61 n. 2.*

The Tiger *Penn. syn. quadr. p. 167 n. 121.*

Tigre *Aless. quadrup. I tab. 9 fig. Buff.*

Der Tieger *Müll. Naturf. I p. 235 tab. 30 fig. 4.*

Tiger *S. G. Gmelin Reis. III p. 485.*

Felis Tygris *Schreb. Säugth. III tab. 98 fig. le Basii.*

Tigre *Hispanis.*

Tigre *Lusitanis.*

Tigre (mas) Tigra (femina) *Italica.*

Tigre (mas) Tigresse (femina) *Gallis.*

Tieger, Tieggerthier *Germanica.*

Tyger *Belgic.*

Tiger, Tyger *Anglic.*

Tiger *Succis.*

Шигрб (Tigr) *Ruffis.*

Paleng *Persis.*

Radja outang *Iauancusibus.*

Magnitudo Leonis, interdumque maior. Artus fortissimi. Corpus caputque laeue, ex flauo fuscum, maculis virgatis nigris a dorso versus ventrem et circum femora. Cauda corpore tertia parte brevior nigro annulata.

Habitat in Asia, non in Africa. Animal tremendae velocitatis dum salit, ceteroquin tardigradum, homini pessimum, timidum tamen. Mas occidit proprios filios. Vifus qui occidit Leonem. Saltu ex insidiis praedam adoritur. Parit vere 3-4. Numquam mansuescit.

Pardus. 3. F. cauda subelongata, corpore fusco maculis annularibus nigris centro notatis.

Παρδαλις *Arist. hist. anim. II c. 7 n. 29. c. 8 n. 41.*

Παρδαλις *Aelian. anim. IV c. 49. V c. 40, 34. VI c. 2.*

Παρδαλις μειζων *Oppian. cyneg. III, 63.*

Panthera seu Pardalis, Pardus, Leopardus *Gesn. quadrup. p. 935 cum fig. mala.*

Pardus, Panthera *Alpin. Aeg. I. p. 237 tab. 15 fig. 2 mediocr.*

Pardus *Aldrov. digit. p. 64.*

Pardalion Aristotelis *Aldrov. digit. p. 68 cum fig. mediocr.*

Pardus *Ionst. quadrup. p. 116.*

Pardus. Leopardus. Parderthier Leopard *Ionst. quadrup. tab. 53 fig. mediocr.*

Pardus Parderthier *Ionst. quadrup. tab. 53 fig. mediocr.*

Leopardi seu Pantherae *Bour. Ind. or. p. 55.*

Leopard oder Leppard *Gesn. Thierb. p. 253 cum*
fig. mala.

La Panthère *Perr. anim. III p. 16 tab. 3?*

Pardus *Charlet. exerc. p. 14.*

Pardalis cuius mās Pardus *Rai. syn. quadr. p. 166.*

Tyger-thiere *Kolbe Vorgeb. p. 171.*

Le Tigre *Des March. voy. I p. 182.*

The Panther *Shaw trav. p. 244.*

Tigris maculis orbiculatis *Linn. syst. nat. 2 p. 43.*

Tiger *Riding. jagdb. Tb. tab. 2?*

Felis cauda elongata, maculis superioribus orbicula-
 tis, inferioribus virgatis *Linn. syst. nat. 6 p. 4 n. 3.*

Pardus, Pardalion *Klein. quadrup. p. 78.*

Felis cauda elongata, maculis superioribus orbicula-
 tis, inferioribus virgatis. The long-tailed Fe-
 lis, with the upper spots round, and the lower
 virgated: the Leopard *Hill anim. p. 543.*

Le Leopard: Felis (Leopardus) ex albo flavicans,
 maculis nigris, in dorso orbiculatis, in ventre lon-
 gis, variegata *Briss. regn. an. p. 272 n. 12.*

Felis cauda elongata, maculis superioribus orbicula-
 tis, inferioribus virgatis *Kram. Austr. p. 311.*

Der Pärder *Hall. vierf. p. 528.*

Felis (Pardus) cauda elongata, corpore maculis su-
 perioribus orbiculatis; inferioribus virgatis *Linn.*
syst. nat. 10, I p. 41 n. 3.

Léopard *Dictionn. anim. II p. 611.*

Panthère *Dictionn. anim. III p. 322.*

Luipaard: Kat met een zeer lange Staart, de boven-
 ste Vlakken op 't Lyf rond; de ondersten lang-
 werpig *Houtt. nat. hist. II p. 117.*

La Panthere *Buff. hist. nat. IX p. 151 tab. II fig.*
mavis tab. 12 feminae.

Panthere *Bom. dictionn. III p. 351.*

Felis (Pardus) cauda elongata, corpore maculis supe-
 rioribus orbiculatis; inferioribus virgatis *Linn. syst.*
nat. 12, I p. 61 n. 3.

Leopard *Kuorr delic. II tab. K fig. 4.*

The Panther *Penn. syn. quadrup. p. 170 n. 122.*

Pantera *Maschio Aless. quadrup. I tab. 4 fig. Buff.*

Pantera *Femmina Aless. quadrup. I tab. 10 fig. Buff.*

Der Leopard *Müll. Naturf. I p. 237; tab. 30 fig. 5.*

Leopardus *Forsk. fn. orient. p. V.*

Felis *Panthera Schreb. Säugth. III tab. 99 fig. Buff.*

Pantera, Leopardal, Leopardo *Hispanis.*

Panthera, Leopardo *Lusitanis.*

Pantera, Leopardo *Italis.*

Panthère, Léopard *Gallis.*

Panther, Panthèrthier, Parder, Leopard *Germanis.*

Luipaard *Belgis.*

Panther, Leopard *Anglis.*

Panter *Succis.*

Leonapab (Leopard) *Ruffis.*

نمر (Nems) *Arabibus.*

Longitudo corporis fere 7 ped. caudae 3 ped. Auriculae breves acutae. Pili corporis breves, laeves, splendentes, fusci; latera et dorsum maculis nigris e minoribus quatuor vel quinque in annulum dispositis adspersa, centrīs nigris. Facies et crura maculis solitariis. Dorsum serie macularum oblongarum. Pectus album striis obscuris transversis. Venter albus maculis nigris, magnis, irregularibus. Cauda nigro maculata. Apex nasi fuscus. Artus fortes. Mammæ quatuor abdominales.

Habitat in omni Africa, huiusque fere, Tigris magnitudine et crudelitate. Ex insidiis tribus saltibus praedam rapit. Equo insilit supra humeros, se triplo maiorem aufert. Hominem non adoritur, nisi fame coactus; gustato autem humano sanguine non desistit. Dicunt vero eam capere primo aethio-

aethiopicum, tum europaeum, ultimo americanum.
Caro sapida. Haud mansuescit.

Pennantus Asiae et hunc tribuit atque Americae; americanum autem animal certe alius speciei videtur.

Panthera. 4. *F. cauda elongata*, corpore albido maculis irregularibus nigris.

Panthera *Plin. hist. nat. VIII c. 15* (c. 17 *Hard.*). c. 16 (c. 21 *Hard.*). e. 17 (c. 23 *Hard.*). X c. 63 (c. 83 *Hard.*). XI c. 40 (c. 95 *Hard.*). c. 49, 50 (c. 110, 111 *Hard.*).

Πορδαλις ολιγοτερεα *Oppian. cyneg. III, 95.*

Leopardus *Schwenckf. thes. p. 102.*

Der Leopard *Olear. Reis. p. 437?*

Das kleine Pantherthier. Ein Untz. Ein kleiner Löwopard. Ein Hunds- oder Wolfspard *Gesn. Thierb. p. 256 cum fig. mala.*

Duo foetus *Tigridis ceylonicae* *Seb. thes. I p. 52 tab. 32 fig. 7, 8?*

The Faadh *Shaw trav. p. 245.*

Das junge ceilanische Tiger das Männlein *Meyer Thiere III tab. 23.* Das Weiblein *tab. 24? figg. Sebae.*

Tiegerthiere *Müll. Samml. III p. 549?*

Pantherthiere *Müll. Samml. III p. 549?*

Tieger *Müll. Samml. III p. 608?*

Once *Dictionn. anim. III p. 277.*

L'Once *Buff. hist. nat. IX p. 151 tab. 13.*

Once *Bom. dictionn. III p. 351.*

Babr, Parder *Ryzschk. Orënb. I p. 225?*

The Once *Penn. syn. quadr. p. 175 n. 126.*

Panthera asiatica *Aless. quadrup. I tab. 13 fig. Buff.*

Felis Vncia *Schreb. Säugth. III tab. 100 fig. Buff.*

Der kleine Panther *Müll. Naturf. Suppl. p. 29.*

Баpб (Babr), Барб (Bars) *Ruffis?*

Kunik *Tungusis?*

Iölbars *Bucharice?*

أقذ (Faadh) *Arabibus.*

Longitudo corporis $3\frac{1}{2}$ pedum, caudae 3 ped. Caput crassum. Auriculae breues. Corpus magis elongatum, pedibus breuioribus. Color albido-cineus subflauicans. Caput maculis paruis rotundis nigris: post vtramque aurem macula maior. Collum supra maculis magnis solitariis. Dorsi latera maculis nigris approximatis in strias longitudinales; infra has maculae irregulares magnae. Crura maculis minoribus rarioribus. Cauda sat pilosa, maculis magnis nigris absque ordine notata.

Habitat in Africa boreali, Persia, Hyrcania et Sinenfi regno. Est ex mitioribus huius generis, vt et venatui inferuire queat cicurata.

Leopardus. 5. F. cauda mediocri, corpore fusco maculis subcoadunatis nigris.

Variae (*feminae*), Pardi (*mares*) *Plin. hist. nat. VIII*

c. 15, 16 (c. 17 *Hard.*). c. 17 (c. 23, 24 *Hard.*).

X c. 73 (c. 94 *Hard.*). XI c. 37 (c. 65 *Hard.*).

Vncia *Gesn. quadrup. p. 937.*

Quelly *Barbot Guin. p. 115.*

Leoparden oder Pantherthiere *Kolbe Vorgeb. p. 156.*

Le Leopard *Des March. voy. I p. 181.*

The lesser Panther *Shaw trav. p. 245?*

Le Léopard *Buff. hist. nat. IX p. 151 tab. 14.*

Leopard *Bom. dictionn. III p. 351.*

The Leopard *Penn. syn. quadr. p. 172 n. 123.*

Leopardo *Aless. quadrup. I tab. 15 fig. Buff.*

Felis Leopardus *Schreb. Säugth. III tab. 101 fig. Buff.*

Der guinesische Leopard *Müll. Naturf. Suppl. p. 29.*

Quelly *Guineensibus.*

Longitudo corporis 4 pedum, caudae $2\frac{1}{2}$ ped. Pili pallide fulvi, maculis dorfi laterumque parvis nigris in circulos dispositis maximeque approximatis. Facies et crura maculis simplicibus. Pectus et venter pilis longioribus albicantibus. Maculae in cauda magnae, oblongae.

Habitat in Guinea et propinquis terris Africae. Hominem atque bestias adoritur, nec mansuescit. Caro esculenta. Pellis pulchra. Huic hostis Pardus est.

iubata. 6. *F.* cauda mediocri, corpore fulvo maculis nigris, collo iubato.

Leopard *Boullaye voy.* p. 248 cum fig. mala.

Une certaine beste appellée Once *Tavern. voy.* I p.

Tyger-Welff *Kolbe Vorgeb.* p. 171 tab. 6 fig. 5.

Der Tiegerwolf *Hall. vierf.* p. 533.

Le Tigre Barbet, ou Tigre frisé: *Felis* (Tigris crispa) pilis crispis vestita, maculis nigris variegata *Briss.*

regn. an. p. 271 n. 10.

Loup-Tigre *Dictionn. anim.* II p. 709.

Loup-Tigre *Bom. dictionn.* II p. 725.

Le Guépard *Buff. hist. nat.* XIII p. 249, 254.

The hunting Leopard *Penn. syn. quadr.* p. 174 n. 125 tab. 18 fig. 1 propr.

Felis iubata *Scircb. Säugth.* III tab. 105 fig. propria.

Der Wolfstieger *Müll. Naturf. Suppl.* p. 30.

Magnitudo *Canis familiaris* graii maioris: longitudo corporis $3\frac{1}{2}$ ped. caudae 1 ped. 3 poll. Corpus elongatum. Caput paruum. Irides pallide aurantiae. Nasas apice niger. Linea fusca ab angulo oris ad angulum oculi. Auriculae breves, fuscae. Facies, mentum ac gula pallide flavo-fusca.

fulca. Facies leuiter maculata. Corpus pallide fuluum, maculis multis paruis nigris distinctis, nec in circulos dispositis. Venter et crura extus maculis maioribus. Collum iubatum, pilis longioribus. Venter albus pilis longioribus. Cauda e rubro fulca, supra maculis magnis nigris, pilis infra valde longis.

Habitat in India atque Africa. Manufecta venarum inferuit.

concolor. 7. F. cauda mediocri, corpore immaculato fuluo.

Puma seu Leo Americanus *Hernand. Mex. p. 518.*

Cuguacuarana *Marcgr. Brasil. p. 235.*

Cuguacuara *Pis. Ind. p. 103.*

Cuguacuarana Brasil. Tigre Lusitanis *Rai. syn. quadr. p. 169.*

The Panther *Lawson Carol. p. 117.*

The Panther *Carcsb. Carol. app. p. XXV.*

Le Carcajou ou Quincajou *Charlev. nouv. Fr. III p. 129?* videtur vtiq̄ue, quamuis nomen ad aliud animal pertineat.

Lions *Condarn. voy. p. 162.*

Lions bâtards *Ulloa voy. I p. 305.*

Tigris fuluus, Tigre rouge *Barr. Fr. équ. p. 166.*

Tigris Cuguacuarana *Marcgr. Klein. quadrup. p. 81.*

Le Tigre rouge: Felis (Tigris fulua) ex flauo rufescens, mento et infimo ventre albicantibus *Briss. regn. an. p. 272 n. 11.*

Der grosse Amerikanische Tiger *Hall. vierf. p. 533.*

Le Tigre *Du Pratz Louif. II p. 90.*

Puma *Dictionn. anim. III p. 612.*

Le Cougar *Buff. hist. nat. IX p. 216 tab. 19.*

Cougar *Bom. dictionn. I p. 700.*

The brown Tiger *Pepp. syn. quadr. p. 179 n. 129.*

Felis (concolor) cauda elongata, corpore immaculato fuluo *Linna. mant. II p. 522.*

Tigre

Tigre rossa *Aless. quadrup. I tab. 17 fig.* Buff.
 Felis concolor *Schreb. Säugth. III tab. 104 fig.* Buff.
 Die brasilianische Katze *Müll. Naturf. Suppl. p. 30.*
 Puma *Peruanis.*
 Leo americanus *vulgo.*

Longitudo corporis 5 ped. 3 poll. caudae 2 ped.
 8 poll. Caput parvum: Auriculae paullulum acuta.
 Oculi magni. Mentum album. Totum corpus pallide rufo-fuscum intermixtis pilis obscurioribus: pectus, venter et crurum interiora cinerea. Cauda obscure ferruginea apice nigro. Ungues albi: exteriore palmarum maiore. Corpus elongatum pedesque longi.

Habitat in continente Americae a Canada vsque in Brasiliam. Ferox et rapax, noui orbis Leo; hominem adeo fame coacta adoritur. Versus septentrionem paullo minor est, magisque metuit hominem. Ex arboribus insilit in praedam. Caro vitulinae sapore.

nigra. 8. F. cauda elongata, corpore nigro.

- discolor gm.* Iaguarete *Marcgr. Brasil. p. 235 cum fig.*
 Iaguareté *Pis. Ind. p. 103 cum fig. Marcgr.*
 Iaguarete Brasiliensis *Rai. syn. quadr. p. 169.*
 Once, espèce de Tigre *Des March. voy. III p. 285.*
 Tigris Iaguarete *Klein. quadrup. p. 81.*
 Le. Tigre noir: Felis (Tigris nigra) maculis nigris saturationibus variegata *Briff. regn. an. p. 271 n. 9.*
 Der größte Tiger mit schwarzen Flecken auf lichtgelbem Grunde *Hall. vierf. p. 531.*
 Iaguarete *Dictionn. anim. II p. 516.*
 The black Tigre *Pénn. syn. quadr. p. 180 n. 130*
tab. 18 fig. 2.
 Iaguareté *Brasiliensibus.*

Magni-

vidi in arce Londinensi (the Tower) d. 21 Febr.

Magnitudo vituli annui. Tota nigra, splendens, interdum maculis atris. Labium superius album. Labium inferius, gula, venter et crurum interiora albicantia siue pallidissime cinerea. Ungues albi. Auriculæ acutæ.

Habitat in Brasilia et Guiana. Crudelior atque ferocior præcedente, sed rarior.

Buffonius hanc ad F. Onçam refert: ego potius F. concoloris varietatem colore obscuriorem crederem.

Onça. 9. F. cauda subelongata, corpore fusco-lutescente ocellis nigris rotundato angulatis medio flavis.

Tlatlahqui ocelotl seu Tigris Mexicana *Hernand. Mex. p. 498 cum fig.*

Iaguara *Marcgr. Brasil. p. 235 cum fig.*

Iaguára *Pis. Ind. p. 103 cum fig. Marcgr.*

Tlatlahqui Ocelotl seu Tigris Mexicana. Ein Mexicanisch Tigerthier *Gesn. Thierb. p. 342.*

Le Tigre *Perr. anim. III p. 1 tab. 1 fig. bona.*

Tigre de la grande espèce, que les Portugais appellent Tigre Royal *Perr. anim. III p. 287.*

Pardus an Lynx Brasiliensis Iaguara dicta *Marcgr. Rai. syn. quadr. p. 168.*

Tigres de Cayenne *Des March. voy. III p. 283.*

Ianovare iuuenis americanus *Seb. tbes. II p. 50 tab. 49. fig. 4* videtur huius pullus.

The Tyger *Brick. North-Carol. p. 114? cum fig. mala.*

The Panther *Brick. North-Carol. p. 115 cum fig. mediocr.*

Le Tigre *Condam. voy. p. 161.*

Des Tigres *Ulloa voy. I p. 49, 87.*

Tigris Americana Iaguara Brasil. *Klein. quadrup.*
p. 80.

Tigris quam Lusitani Tigre Royal appellant *Klein.*
quadrup. p. 80.

Le Tigre royal: Felis (Tigris regia) in dorso fulva,
in lateribus subcinerea, in ventre alba, maculis
longis nigris variegata *Briss. regn. an. p. 269 n. 7.*

Le Tigre de l'Amerique: Felis (Tigris americana)
flavescens, maculis nigris orbiculatis, quibusdam
rosam referentibus, variegata *Briss. regn. an. p.*
270 n. 8.

Felis cauda elongata, maculis subrotundis fere aequa-
libus: the American Tiger *Brown. Jam. p. 485.*

Der Amerikanische Tiger *Hall. vierf. p. 531.*

Felis (Onca) cauda elongata, corpore flavescente
maculis nigris rotundato - angulatis medio flavis
Linn. syst. nat. 10, I p. 42 n. 4.

Iaguara *Dictionn. anim. II p. 516.*

Amerikaansche Tyger: Kat met een lange Staart,
het Lyf geelagtig, met zwarte Vlakken getekend,
die rond zyn doch hoekig, in 't midden geel
Houtt. nat. hist. II p. 121.

Le Iaguar *Buff. hist. nat. IX p. 201 tab. 18.*

Iaguar *Bon. dictionn. II p. 564.*

Felis (Onca) cauda mediocri, corpore flavescente
ocellis nigris rotundato - angulatis medio flavis
Linn. syst. nat. 12, I p. 61 n. 4.

The Tiger of Guiana *Bancr. Guian. p. 137.*

Tigris americana *Fermin Surin. II p. 84.*

The Brazilian Panther *Penn. syn. quadr. p. 176 n.*
127.

Der Panther *Müll. Naturf. I p. 238 tab. 30 fig. 6.*

Felis Onca *Schreb. Säugth. III tab. 102 fig. propria.*
Onça *Lusitanis.*

Magnitudo Lupi et maior, longitudine corporis ad
 $4\frac{1}{2}$ ped. caudae $2\frac{1}{2}$ ped. Corpus fusco - lutescens
maculis

maculis ocellaribus nigris saepe pupilla nigra vna alteraue instructis. Dorsum supra striis aliquot longis nigris. Femora et crura maculis coecis nigris. Abdomen album maculis atris, vt in pedibus, vbi minores. Cauda circiter longitudine corporis dimidii, supra profunde fusca maculis magnis irregularibus, subtus maculis minoribus.

Habitat in calidioribus Americae australis, saeuens in homines et animalia. Noctu clamat canis famelici instar. Timida, canibus fuganda, praecipue autem ignem horret.

Pardalis. 10. F. cauda elongata corpore fusco maculis ocellaribus elongatis.

Tlacozelotl. Tlalocelotl. Catus Pardus Mexicanus
Hernand. Mex. p. 512 cum fig.

Catus Pardus siue Catus Montanus Americanorum
Rai. syn. quadr. p. 169.

Le Chat Tigre *Dampier voy. III p. 306.*

The mountain-Cat *Brick. North-Carol. p. 116?*

Felis cauda elongata, maculis superioribus virgatis, inferioribus punctatis *Linn. syst. nat. 6 p. 4 n. 4.*

Pardus cauda breui *Klein. quadrup. p. 78.*

Felis cauda elongata maculis superioribus virgatis, inferioribus punctatis. The Felis, with an elongated tail, with the upper spots virgated, the lower punctated: the Cat-a-Mountain *Hill anim. p. 544 tab. 27.*

Le Chat-Pard: Felis (Catus-Pardus) rufa, in ventre ex albo flauicans, maculis nigris, in dorso longis, in ventre orbiculatis, variegata *Briss. regn. an. p. 273 n. 13.*

Felis (Pardalis) cauda elongata, corpore maculis superioribus virgatis; inferioribus orbiculatis *Linn. syst. nat. 10, I p. 42 n. 5.*

Kat-Pard: Kat met een lange Staart, de Vlakken
boven op 't Lyf gestreept, de onderste rondagtig
Houtt. nat. hist. II p. 124.

L'Ocelot *Buff. hist. nat. XIII p. 239.*

L'Ocelot Male *Buff. hist. nat. XIII tab. 35.*

L'Ocelot Femelle *Buff. hist. nat. XIII tab. 36.*

Ocelot *Bon. dictionn. III p. 229.*

Felis (Pardalis) cauda elongata, corpore maculis
superioribus virgatis; inferioribus orbiculatis *Lin.*
syn. nat. 12, I p. 62 n. 5.

The Lynx of Guiana *Bancr. Guian. p. 140.*

The Mexican Panther *Penn. syn. quadr. p. 177 n.
128.*

The Mountain Cat *Penn. syn. quadr. p. 185 n. 134.*

Ocelot Maschio e Femmina *Aless. quadrup. IV tab.
152 figg. Buff.*

Die wilde Katze *Müll. Naturf. I p. 239 tab. 30 fig. 7.*

Felis Pardalis *Schreb. Säugth. III tab. 103 fig. Buff.*

Longitudo corporis 4 pedum, caudae 2 ped. Auri-
culae breues, margine bifidae absque penicillis.
Mystacles quatuor ordinum: in singulo ordine fe-
tae 3 s. 5, albae, basi nigrae, longitudine capi-
tis. Color corporis ex rufo fuscus, lateribus ma-
gis albicantibus. Linea nigra per medium dorsum
a capite ad caudam excurrent. Alia linea nigra a nari-
bus ad angulos oculorum. Frons nigro maculata.
Latera corporis striis longitudinalibus nigris in me-
dio fuscis cum maculis nigris minoribus; aliae si-
miles a collo per humeros. Crura albicantia ma-
culis parvis siue punctis nigris. Cauda corpore di-
midio breuior, fusca, maculis nigris, basin versus
minoribus, maioribus versus apicem nigrum. Mas
coloribus pulchrior quam femina.

Habitat in Mexicano regno inque Brasilia, in monti-
bus. Vorax vicitat animalibus minoribus, quibus
ex

ex arboribus insidiatur. Hominem timet. Simias deludit somno ficto. Facile cicuratur atque admodum pinguescit.

tigrina. II. F. cauda elongata, corpore fuluo nigro striato maculatoque subtus albidō.

Tepe Maxtlaton *Fernand. anim. p. 9.*

Maraguao siue Maracaia *Marcgr. Brasil. p. 233.*

Felis siluestris americanus tigrinus *Seb. thes. I p. 47. tab. 30 fig. 2.*

Felis siluestris tigrinus ex Hispaniola Tepe Maxtlaton *Seb. thes. I p. 77 tab. 48 fig. 2.*

Die wilde amerikanische Tiegerkaz *Meyer Thiere III tab. 22 fig. Sebae.*

Felis fera tigrina Malakaya. Chat-tigre *Barr. Fr. équ. p. 153.*

Alius Tepe Maxtlaton dictus, tygrinus ex Hispaniola *Klein. quadrup. p. 75.*

Le Chat sauvage tigré: Felis (siluestris tigrina) ex griseo flauescens, maculis nigris variiegata *Briss. regn. an. p. 266 n. 3.*

Die Tigerkaze *Hall. vierf. p. 522.*

Die Amerikanische Kaze *Hall. vierf. p. 523.*

Le Pichou *Du Pratz Louis. II p. 92 (at hic maior est).*

Le Margay *Buff. hist. nat. XIII p. 248 tab. 37.*

The Tiger Cat of Guiana *Bancr. Guian. p. 139.*

Felis fera tigrina *Fermin Surin. II p. 85.*

The Cayenne-Cat *Penn. syn. quadr. p. 182 n. 132.*

Gatto tigrato americano *Aless. quadrup. I tab. 16 fig. Buff.*

Felis trigrina *Schreb. Säugth. III tab. 106 fig. Buff.*

Der Margay *Müll. Naturf. Suppl. p. 29.*

Malakaya *Guianensibus.*

Magnitudo Cati. Caput supra, collum, dorsum, latera, humeri ac femora fulua. Facies nigrodeorsum striata. Humeri et corpus striis maculisque

magnis oblongis nigris. Crura maculis minori-
bus. Pectus et crura intus albida nigro maculata.
Cauda elongata, nigro, fusco et griseo notata.

Habitat in America australi, non domanda. Vicinat
auiibus. Vox Cati.

Catus. 12. F. cauda elongata fusco annulata, corpore
fasciis nigricantibus; dorsalibus longitudi-
nalibus tribus; lateralibus spiralis.

ferus. α) *Ferus*, cum synonymis totius speciei.

Αιλουρος *Arist. hist. anim. V c. 2 n. 22. VI c. 35 n.*
422, 423.

Feles *Plin. hist. nat. X c. 73 (c. 94 Hard.). XI c.*
37 (c. 55 Hard.).

Αιλουρος *Aelian. anim. V c. 27.*

Catus filuestris *Gesn. quadrup. p. 353.*

Catus filuestris *Schwenckf. theriotr. p. 80.*

Felis *Aldrov. digit. p. 564.*

Felis filuestris *Aldrov. digit. p. 582 fig. p. 583 me-*
diocr.

Felis *Ionst. quadrup. p. 182.*

Felis filuestris. *Wilde Katz Ionst. quadrup. tab. 72*
fig. mediocr.

Catus syluestris ein *Baumreuter Gesn. Thierb. p. 246.*

Felis *Charlet. exerc. p. 20.*

Felis seu Catus filuestris *Wagn. Heluet. p. 175.*

Catus filuestris *Rzac. Polon. p. 217.*

Felis cauda elongata, auribus aequalibus *Linn. syst.*
nat. 2 p. 43.

Wilder Kuder *Riding. jagdb. Th. tab. 18.*

Felis cauda elongata, auribus aequalibus. *Linn. syst.*
nat. 6 p. 4 n. 6.

Catus filuestris, ferus vel feralis. *Klein. quadrup. p. 75.*

Felis cauda elongata, auribus aequalibus. The long-
tailed Felis, with even ears: the Cat Hill *anim.*
p. 545 tab. 27. fig. mala.

Le Chat sauvage: Felis (siluestris) pilis ex fusco, flavicante, et albido variegatis vestita, cauda annulis alternatim nigris et ex sordide albo flauicantibus cincta *Briss. regn. an. p. 265 n. 2.*

Felis cauda elongata, auribus aequalibus *Kram. Austr. p. 311.*

Le Chat *Buff. hist. nat. VI p. 1.*

Le Chat sauvage *Buff. hist. nat. VI tab. 1.*

Catus siluestris. Die wilde Katze *Hall. vierf. p. 521.*

Felis (Catus) cauda elongata, corpore fasciis nigricantibus; dorsalibus longitudinalibus tribus; lateralibus spiralibus *Linn. syst. nat. 10, I p. 42 n. 6.*

Wilde Katzen *Müll. Samml. III p. 608.*

Chat *Dictionn. anim. I p. 501.*

Kater: Kat met een lange Staart, hebbende zwart-agtige Banden over 't Lyf, drie in de langte op de Rüg en geflingerde streepen op de Zyden *Houtt. nat. hist. II p. 126.*

The wild Cat *Penn. brit. zool. p. 22.*

Katte *Pontopp. Dan. I p. 604.*

Chat *Bom. dictionn. I p. 503.*

Felis (Catus) cauda elongata fusco annulata, corpore fasciis nigricantibus; dorsalibus longitudinalibus tribus; lateralibus spiralibus *Linn. syst. nat. 12, I p. 62 n. 6.*

Wilde Katzen *Rytzschk. Orenb. I p. 232.*

Felis Catus *Forster: Philos. transact. LVII p. 342.*

The common Cat *Penn. syn. quadr. p. 183 n. 133.*

Gatto selvatico *Aless. quadrup. I tab. 34.*

Die Hauskatze *Müll. Naturf. I p. 240 tab. 31 fig. 5.*

Die Katze *Mart. Buff. vierf. II p. 206.*

Die wilde Katze *Mart. Buff. vierf. II p. 230 tab. 39 fig. 1.*

Felis Catus ferus *Schreb. Säugth. III tab. 107 A fig. propria.*

Felis (Catus) cauda elongata fusco annulata, corpore fasciis nigricantibus; dorsalibus longitudinalibus

bus tribus; lateralibus spiralibus Müll. *Dan. prodr.*
p. 2 n. 8.

Gato montès *Hispanis.*

Gatto selvatico *Italis.*

Chat sauvage *Gallis.*

Cath goed *Cambrensisibus.*

Wilde Katze *Germanis.*

Kot dziki, Zbik *Polonis.*

Степная кошка (Stepnaja koschka) *Ruffis.*

Manul *Bucharis et Calmyccis.*

domesticus. β) *Domesticus.*

Catus siue Felis *Gesn. quadrup. p. 344 fig. p. 345*
bona.

Catus domesticus *Schwenckf. zberiotr. p. 79.*

Felis Syriaca *Aldrov. digit. p. 566 fig. mediocr.*

Felis Syriaca altera *Aldrov. digit. p. 567 fig. mediocr.*

Felis Domestica. Zahme Katz *Ionst. quadrup. tab. 72*
fig. mediocr.

Felis vulgo Catus. Eine Katz *Gesn. Thierb. p. 239*
fig. p. 240 bona.

Felis *Sibb. Scot. an. p. 13.*

Felis domestica seu Catus *Rai. syn. quadr. p. 170.*

Felis domestica seu Catus *Sloan. Iam. II p. 329.*

Feles seu Cati domestici *Rzacx. Polon. p. 244.*

Felis cauda elongata; auribus aequalibus *Linn. fn.*
suec. I p. 2 n. 3.

Eine Katz *Meyer Thiere I tab. 15 fig. mediocr.*

Catus domesticus, Felis domestica *Klein. quadrup. p.*
75.

Le Chat domestique: Felis domestica *Briss. regu. an.*
p. 264 n. 1.

Felis cauda elongata, vnguibus retractilibus; auribus
aequalibus: the Cat *Brown. Iam. p. 485.*

Le Chat domestique *Buff. hist. nat. VI. tab. 2.*

Die Hauskaze *Hall. vierf. p. 519.*

Felis (Catus) cauda elongata, corpore fasciis nigricantibus: dorsalibus longitudinalibus tribus: lateralibus spiralibus *Linn. sp. succ. 2 p. 4 n. 9.*

The domestic Cat *Penn. brit. zool. p. 21.*

Gatto domestico *Aless. quadrup. I tab. 35.*

Die zahme Katze *Müll. Naturf. I tab. 31 fig. 6.*

Die Hauskatze *Mart. Buff. vierf. II p. 232.*

Die zahme Katze *Mart. Buff. vierf. II tab. 38.*

Felis Catus domesticus *Schreb. Säugth. III tab. 107 B fig. 1 propria.*

Gato *Hispanis.*

Gato (*mas*), Gata (*femina*) *Lusitanis.*

Gatto *Italis.*

Chat *Gallis.*

Gwreath (*mas*), Cath (*femina*) *Cambrensis.*

Kater (*mas*), Katze (*femina*) *Germanis.*

Kater (*mas*), Kat (*femina*) *Belgis.*

Cat *Anglis.*

Kat *Danis.*

Katta *Succis.*

Kot *Polonis.*

Komb (Kot) (*mas*) Комка (Koschka) (*femina*) *Ruffis.*

Matfeh, Kotschafch *Tataris.*

Prifs *Tscheremissis.*

Kotschak *Tschuwafchis.*

Kotschifch *Woziakis.*

Saka, Katka *Morduanis.*

Kan *Sirjänice.*

Angorensis. γ) *Angorensis: domesticus pilis longioribus argenteis sericeis, in collo longissimis.*

Le Chat d'Angora: Felis (Angorensis) pilis longissimis toto corpore vestita *Briff. regn. an. p. 266*

" 4

Le Chat d'Angora *Buff. hist. nar. VI tab. 5.*

The Angora Cat *Penn. syn. quadr. p. 184 n. 133 n.*

- Gatto d'Angora *Aless. quadrup. I tab. 37 fig.* Buff.
 Die Angorische Hauskatze *Mart. Buff. vierf. II p. 237 tab. 40 fig. 2.*
 Felis Catus angorensis *Schreb. Säugth. III tab. 107 B fig. 2* Buff.

Hispanicus. δ) *Hispanicus: nigro, albo aurantioque varius.*

- Le Chat d'Espagne *Buff. hist. nat. VI tab. 3.*
 The Tortoise shell Cat *Penn. syn. quadr. p. 184 n. 133 β.*

- Gatto di Spagna *Aless. quadrup. I tab. 36 fig.* Buff.
 Die spanische Hauskatze *Mart. Buff. vierf. II p. 234.*
 Die spanische Katze *Mart. Buff. vierf. II tab. 39 fig. 2.*

caeruleus. ε) *Caeruleus.*

- Le Chat des Chartreux *Buff. hist. nat. VI tab. 4.*
 The blue Cat *Penn. syn. quadr. p. 184 n. 133 γ.*
 Die Karthäuserkatze oder aschfarbige Hauskatze
Mart. Buff. vierf. II p. 236 tab. 40 fig. 1.

ortus forte ex:

Blaue Katzen *Kolbe Vorgeb. p. 153.*

Catus Ferus maior domestico. Pili longi molles ex flauo albi admixtò griseo, striis griseis deorsum vergentibus oriundisque e stria obscura longitudinali dorsali. Cauda nigro siue fusco et albo annulata, apice nigro. Crura postice nigra. Seniori cauda apice nodosa. Domesticus variat colore.

Habitat in Europae australis siluis; domesticus colitur et in borealibus.

Mores congenerum. Tranquilla ore molat, caudam erigit; excitata agilissima, scandit, irata fremit odore ambrosiaco; oculi noctu lucent. Pupilla interdiu

terdiu perpendiculari oblonga, noctu tereti ampliata; unguibus complicatis incedit; parce bibit; urina maris corrosiua; ructus foetidissimus; ster-
cus sepelit; clamando rixandoque misere amat; cum pullis repentibusque ludit; in praedam intenta caudam mouet; Murum Leo; pacata in comestantibus; pullos conuocat, carnes piscesque edit, calida, salsa vegetabiliaque respuit; os instante tempestate palmis lauat, in altum acta decidit in pedes, Pili electrici. Pulices non habet. Delectatur Maro, Nepetha, Valeriana. Coit primo vere, grauida 63 diebus parit 3-6 coecos per dies nouem.

Serval. 13. F. cauda subabbreviata, corpore supra fusco maculis nigris, orbitis ventreque albis.

Le Chat-pard *Perr. anim. I p. 108 tab. 13 fig. bona*

Der Katzenparder *Hall. vierf. p. 529.*

Chat-pard *Dictionn. anim. I p. 504.*

Chat-pard *Bom. dictionn. I p. 509.*

Serval *Bom. dictionn. IV. p. 219.*

Le Serval *Buff. hist. nat. XIII p. 233 tab. 34.*

Serval *Aless. quadrup. IV tab. 151 fig. Buff.*

Felis Serval *Schreb. Säugth. III tab. 108 fig. Buff.*

Der Serval *Müll. Naturf. Suppl. p. 30.*

Serval *Lusitanis in India.*

Maraputé *Malabarice.*

Maiores Cato, minor Vierra Zibetha. Corpus fulvum, ventre albo, maculis nigris, rotundis, minoribus. Orbitae albae.

Habitat in siluis montosis Indiae, in arboribus degens. vix descendens in terram, saliensque ex arbore in arborem. Ferum animal, non domandum.

Caracal. 14. *F. cauda subabbreviata, auriculis apice barbatis, corpore immaculato.*

Les Karacoulacs *Thevenot voy. II p. 114.*

Siyah-Ghufh *Charlet. exerc. p. 21 fig. p. 23.*

Siyah-Ghufh *Perfice dictum animal Rai. syn. quadr. p. 168.*

The Black-Ears, The Gat el Khallah, Siyah Gufh, or Karrah Ku-lak *Shaw trav. p. 247.*

Felis cauda elongata, auribus penicilliformibus Linn. syst. nat. 2 p. 43.

Felis cauda elongata, auribus penicilliformibus Linn. syst. nat. 6 p. 4 n. 5.

Lynx cauda vitulina Klein. quadrup. p. 77.

Felis cauda elongata, auribus penicilliformibus. The longtailed Felis, with penicilled ears Hill anim. p. 544.

Luchskaze mit gelben Haaren, ohne Flekken *Hall. vierf. p. 527.*

The Animal sent from the East Indies etc. *Parsons: Philos. transact. LI p. 648 cum fig.*

Le Caracal *Buff. hist. nat. IX p. 262 tab. 24.*

Caracal *Bom. dictionn. I p. 421.*

The Persian Lynx *Penn. syn. quadr. p. 189 n. 137 tab. 19 fig. 2.*

Caracal *Aless. quadrup. I tab. 5 fig. Buff.*

Felis Caracal Schreb. Säugth. III tab. 110 fig. propria.

Der Caracal *Müll. Naturf. Suppl. p. 30.*

Siyah-Ghufh *Persis.*

Caput paruum. Facies elongata magis quam in reliquis. Auriculæ longæ, ténues, nigræ, intus apiceque albæ, apice nigro barbatae. Nasus albus. Oculi parvi. Corpus supra pallide ex rufo fuscum. Cauda longitudine dimidii corporis obscurior; pectus et venter albicantia. Artus fortes longique.

Habitar

Th. Hyde commentarii in Ulegh Beighi tabulas tarum ferarum, Operum ex ed. Greg. Sharpe, Ox 1767. 4. vol. 1. p. 36. c. icone a G. Edwards delin

Habitat in Persia, India et Africa boreali. Venatui inferuit.

Lynx. 15. F. cauda abbreviata apice atra, auriculis apice barbatis, corpore maculato.

Λυγξ *Arist. hist. anim. II c. 7 n. 31. c. 9 n. 50.*

Chama quem Galli rufum vocabant *Plin. hist. nat. VIII c. 19 (c. 28 Hard.).*

Ceruarii lupi *Plin. hist. nat. VIII c. 22 (c. 34 Hard.).*

Lynx *Plin. hist. nat. XI c. 46 (c. 106 Hard.). XXVIII c. 8 (c. 32 Hard.).*

Λυγξ *Aelian. anim. XIV c. 6.*

Λυγξ *Oppian. cyneg. III, 84.*

Lupus ceruarius f. Lynx *Hernand. Mex. p. 526.*

Lupus ceruarius *Gesn. quadrup. p. 769 cum fig. mediocr.*

Lynx *Ol. Magn. Sept. p. 610.*

Lynx *Schwenckf. theriogr. p. 103.*

Pinaum Dalypus siue Ocotochtli *Nieremb. hist. nat. p. 153 cum fig. mediocr.*

Lynx *Aldrov. digit. p. 90.*

Lynx africana *Aldrov. digit. p. 92 fig. mediocris.*

Lynx *Ionst. quadrup. p. 118.*

Lynx. Luchs *Ionst. quadrup. tab. 54 fig. mala.*

Lynx. Luchs *Ionst. quadrup. tab. 71 figg. mediocres.*

Ein Luchs, Lutz oder Lux. Ein Thierwolff *Gesn. Thierb. p. 354 cum figg. malis.*

Le Loup - Cervier *Perr. anim. I p. 125 tab. 17 fig. bona.*

Lynx *Charlet. exerc. p. 14.*

Lynx, Lupus ceruarius *Wagn. Helvet. p. 178.*

Lynx, Latinis Lupus ceruarius *Rai. syn. quadr. p. 166.*

Luchse *Kolbe Vorgeb. p. 157; nisi forte sit F. Caracal.*

Wild Cat *Latson Carol. p. 118.*

Lynx *Rzac. Polon. p. 222 auct. p. 313.*

The wild Cat *Catesb. Carol. app. p. XXV.*

The wild-Cat *Brick. North-Carol. p. 117.*

Felis cauda truncata, colore rufescente maculato

Linn. syst. nat. 2 p. 43.

Luchs *Riding. jagdb. Th. tab. 10.*

The Loup Cervier or Lynx *Dobbs Hudf. p. 41.*

Felis cauda truncata; corpore rufescente maculato

Linn. fn. succ. 1 p. 2 n. 4.

Luchse *Linn. Westgorb. p. 222.*

Der Luchs *Meyer Thiere III tab. 31 fig. bona.*

Felis cauda truncata, corpore rufescente maculato

Linn. syst. nat. 6 p. 4 n. 7.

Lynx *Klein. quadrup. p. 77.*

Felis cauda truncata, corpore rufescente maculato.

The truncated-tailed Felis, with the body brown and spotted with black: the Lynx *Hill anim. p.*

544 tab. 27, fig. mediocr.

Le Loup-Cervier: *Felis (Lynx) auricularum apicibus*

pilis longissimis praeditis, cauda breui *Briff. regn.*

an. p. 275 n. 15.

Felis cauda truncata, corpore rufescente maculato

Kram. Austr. p. 311.

Der Luchs *Hall. vierf. p. 524.*

Felis (Lynx) cauda abbreviata apice atra, auriculis

apice barbatis *Linn. syst. nat. 10, 1 p. 43 n. 7.*

Luchse *Müll. Samml. III p. 548, 607.*

Loup Cervier *Dictionn. anim. II p. 709.*

Los: Kat met een zeer korte Staart, die aan 't end

zwart is, de Ooren aan de tippen met een bosje

Hair *Houtt. nat. hist. II p. 141.*

Felis (Lynx) cauda abbreviata apice atra, auriculis

apice barbatis *Linn. fn. succ. 2 p. 4 n. 10.*

Le Lynx ou Loup-Cervier *Buff. hist. nat. IX p. 231*

tab. 21.

Lynx ou Loup-Cervier *Bom. dictionn. II p. 733.*

Felis (Lynx) cauda abbreviata: apice atra, auricu-

lis apice barbatis *Linn. syst. nat. 12, 1 p. 62 n. 7.*

Der Luchs *Ryttschk. Orenb. I p. 237.*

The

The Lynx *Penn. syn. quadr. p. 186 n. 135.*

Lupo cerviere *Alessi. quadrup. I tab. 18 fig. Buff.*

Der Luchs *Müll. Naturf. I p. 241 tab. 30 fig. 3.*

Felis Lynx *Schreb. Säugth. III tab. 109 fig. Buff.*

Felis (Lynx) cauda abbreviata: apice atra, auriculis
apice barbatis *Müll. Dan. prodr. p. 2 n. 9.*

Lince, Lynce, Lobo cervical *Hispanis.*

Lince, Lobo cervical *Lusitanis.*

Lince, Lupo cervero, Lupo cerviere, Lupo Gatto
Italis.

Lynx, Loup - Cervier *Gallis.*

Luchs *Germanis.*

Los *Belgis.*

Lynx, Ounce *Anglis.*

Los, Grup *Noruegis.*

Warglo *Suecis.*

Albos *Lapponibus.*

Rys, Ostrowidz *Polonis.*

Рысь (Rys') *Ruffis.*

Nondo *Tungusis.*

Scheleuffin *Bucharice.*

Longitudo corporis 4 ped. 6 poll. caudae 6 poll.

Auriculae erectae, apice nigrae, pilis longioribus
nigris barbatae. Oculi pallide flavi, fulgentes.

Palpebra inferior albicans, ut et superior versus can-
thum maiorem. Macula linearis fusca pone ocu-
los. Pili infra mentum longiores. Corpus pilis

longis, mollibus, cinereis subrufis, maculis obscu-
rioribus, in nonnullis vix apparentibus. Venter
albus. Sutura velleris α) a latere reflexo auri-
culae ad humeros. β) a gula versus brachium et
cubitum ad latus anterius exteriusue. γ) ab ano
ad genu posticam. δ) duplicata a genu ad calca-
neum: pilis interiectis reflexis, rigidulis, breuiori-
bus. Verrucae seniferae supra oculos sex maiores
superiores; octo minores inferiores. Verrucae

porum quinque, quarum duae superiores aequales; tres vero inferiores remotiores: intermedia maiore. Verrucae ad calcanea palmarum quatuor inaequales. Cauda femoribus paullo brevior, apice atra. Pedes crassi fortesque, palmis plantisque amplissimis.

Varietas maior albicans, maculis nigris:

Felis cauda truncata, colore albo maculato *Linn. syst. nat. 2 p. 43.*

Felis cauda truncata; corpore albo maculato *Linn. fn. suec. 1 p. 2 n. 5.*

Felis cauda truncata, corpore albo maculato *Linn. syst. nat. 6 p. 4 n. 8.*

Lynx colore albo; maculis nigris cauda truncata *Klein. quadrup. p. 77.*

Felis cauda truncata, corpore albo, maculato. The short tailed, white Felis, with black spots: the white Ounce *Hill anim. p. 545.*

Le Chat-Cervier: Felis (Catus ceruarius) alba, maculis nigris variegata cauda breui *Briss. regn. an. p. 274 n. 14.*

Die Luchskatze mit schwarzen Flekken auf weissem Grunde *Hall. vierf. p. 527.*

Irbis *Müll. Samml. III p. 607.*

Felis cauda truncata, corpore albo maculato *Linn. fn. suec. 2 p. 5 n. 11.*

Katzlichs *Boruffis.*

Katlo *Saecis.*

Habitat in silvis densioribus terrarum borealium Europae, Asiae, Americae. Arbres inhabitat. Vicinitat Leporibus, Capris, Oribus, in quos se delicit ex arboribus eorumque iugulo adhaeret. Adspiciens canem globo perfoditur. Parit duo vel tres. Pelliis bona.

Haud differre videtur:

The Bay Lynx *Penn. syn. quadr. p. 188 n. 136 tab. 19 fig. 1.*

Magnitudo dupla Cati maioris. Auriculæ erectæ, acutæ, pilis longis, nigris barbatae. Irides flavae. Orbitæ albæ. Caput, dorsum, latera et crura extus splendentia fusca maculis obscurioribus. In facie lineæ nigrae ad nasum deorsum vergunt. Labium superius vtrinque seriebus tribus macularum parvarum nigrarum, quibus vibrissæ insident. Lineæ aliquot nigrae, curvatae, ab oculis versus collum excurrunt. Genæ, labia, corpus subtus et crura intus albæ. Crura antica intus supra lineis duabus nigris. Cauda brevis supra fasciis nigricantibus; in apice fascia atra, apex caudaque subtus albæ. Pili breviores ac laeviores quam in vulgari.

Habitat circa novum Eboracum.

Species obscuræ.

* The Cape Tiger *Penn. syn. quadr. p. 181 n. 131.*
Tygerbuschkatzen *Kolbe Vorgeb. p. 154?*

Longitudo fere trium pedum. Pili breves, splendentes, ferruginei. Facies lineis nigris deorsum versis. Dorsum ab occipite ad caudam usque striis oblongis nigris. Latera maculis parvis nigris numerosissimis. Venter albus. Cauda elongata fusca, nigro maculata.

Habitat in capite bonæ spei? Pellem descripsit Pennantus.

** A particular beautiful Kind of Cats *Kaempf. Lap.*
I p. 125.

The lesser Leopard *Penn. syn. quadr. p. 173 n. 124.*

Dimidio minor F: Leopardo, caudaque pro ratione corporis breuiore. Facies nigro maculata. Mentum album. Macula magna nigra ad vtrumque latus labii superioris. Pectus maculis paruis. Venter albus nigro maculatus. Corpus supra et lateribus pilis splendentibus flauis, maculis nigris in circulos dispositis vt in Leopardo, minoribus tamen quam in hoc. Cauda fastigiata, pilis breuibus.

Habitat in India orientali et Iaponia. Mitis, vt domestica adeo fit in Iaponia.

*** Rothe Katzen *Kolbe Vorgeb. p. 153:*

Stria pulchra splendide rubra lata in dorso a capite incipiens. Venter cinereus siue albicans.

45. C A N I S.

Dentes Primores Superiores VI: laterales longiores distantes: intermedii lobati.

Inferiores VI: laterales lobati.

Laniarii solitarii, incuruati.

Molares VI s. VII (pluresue quam in reliquis).

familiaris. I. C. cauda (sinistrorsum) recurvata.

Kuvov Arist. hist. anim. I c. 6 n. 41. II c. 5 n. 23. c. II n. 72, 73. III c. 7 n. 95. V c. 11 n. 125-127. c. 13 n. 138. VI c. 20 n. 264 - 291.

Canis Plin. hist. nat. VIII c. 40-42 (c. 61-63 Hard.). X c. 63 (c. 83 Hard.).

Kuvov Aelian. anim. III c. 2. IV c. 40. VI c. 53, 62. VIII c. 1, 2, 9. X c. 45.

Kuvov Oppian. cyneg. I, 367.

Canis Gesn. quadrup. p. 173 cum fig.

Canis Schwenckf. zheriotr. p. 73.

Canis Aldrov. digit. p. 482.

Canis Ionst. quadrup. p. 176.

Canis. Ein Hund Gesn. Tbierb. p. 211 cum figg.

Canis Charlet. exerc. p. 26.

Canis Sibb. Scot. an. p. 12.

Canis Rai. syn. quadr. p. 175.

Ganes Rzacz. Polon. p. 244.

Canis the Dog Sloane Iam. II p. 329.

Canis cauda recurva Linn. syst. nat. 2 p. 44.

L 1 2

Canis

GANIS genus vorax, morsu lacerans, arbores non scandit. Penis nodosus est. Facies longior ac Felis.

Canis cauda recurva *Linn. fn. succ. I p. 5 n. 12.*

Canis cauda (sinistrorsum) recurva *Linn. syst. nat. 6 p. 5 n. 1.*

Canes proprie dicti *Klein. quadrup. p. 68.*

Canis cauda recurva. The Canis, with the tail bent upwards: the Dog *Hill anim. p. 552.*

Canis familiaris *Linn. amoen. acad. IV p. 43 cum fig.*

Canis (domesticus) cauda sinistrorsum recurva *Linn. mus. Ad. Frid. I p. 6.*

Le Chien *Buff. hist. nat. V p. 185.*

Le Chien: Canis domesticus *Briff. regn. an. p. 235 n. 1.*

Canis cauda recurva *Kram. Austr. p. 312.*

Der Hund *Hall. vierf. p. 470.*

Canis (familiaris) cauda (sinistrorsum) recurvata *Linn. syst. nat. 10, I p. 38 n. 1.*

Chien *Dictionn. anim. I p. 603.*

Hond: Hond met de Staart (over de flinkerzyde) opgekruld *Houtt. nat. hist. II p. 35.*

Canis (familiaris) cauda sinistrorsum recurva *Linn. fn. succ. 2 p. 3 n. 5.*

Canis cauda sinistrorsum recurva *Gronov. zooph. I p. 8 n. 29.*

The Dog *Penn. brit. zool. p. 23.*

Hunde *Pontopp. Dan. I p. 603.*

Chien *Bon. dictionn. I p. 564.*

Canis (familiaris) cauda (sinistrorsum) recurvata *Linn. syst. nat. 12, I p. 56 n. 1.*

Canis familiaris *Forster: Philos. transact. LVII p. 341.*

The faithfull Dog *Penn. syn. quadr. p. 141 n. 110.*

Der Hund *Marr. Buff. vierf. II p. 88.*

Der gefellige Hund *Müll. Naturf. I p. 207 Suppl. p. 27.*

Der Hund *Stell. Kamtsch. p. 132.*

Canis Ferus *Forsk. fn. orient. p. III.*

Der Hund: *Canis familiaris Schreb. Säugth. III p. 318 n. 1 tab. 87 fig. Riding.*

Canis (familiaris) cauda recurvata Müll. Dan. prodr. p. 2 n. 4.

Perro *Hispanis.*

Cam *Lusitanis.*

Cane *Italis.*

Chien (*mas*), Chienne (*femina*) *Gallis.*

Ci (*mas*), Gast (*femina*) *Cambrensis.*

Hund (*mas*), Hündinn (*femina*) *Germanis.*

Hond *Belgis.*

Dog *Anglis.*

Hund, Rakke, Köter, Mynde *Danis.*

Lubba *Islandis.*

Hund *Suecis.*

Pfi *Pclouis.*

Песъ (*Pes*), Собака (*Sobaka*) (*mas*); Сука (*Suka*) (*femina*), Псыца (*Pfitza*) (*obsolete*); Шеня (*Sczenja*), Шенокъ (*Sczenok*) *catulus.*

Ит *Tataris.*

Pi *Tscheremissis.*

Iida *Tschuwafschis.*

Punù *Wotiakis.*

Pi'na *Morduanis.*

Pon *Permice et Sirjänice.*

Kof'ha, Suka *Guinoya*, Kof'ha *Kamtshadalis.*

Kelb. marre *Aegyptiis.*

Caput horizontale, ante oculos angustatum, pilis brevioribus tectum. Cranium elevatum, vertice carinato. Dentes primores superiores sex, recti, paralleli: lateralibus remotis. Primores inferiores sex, paralleli: exterioribus lobulo laterali instructis. Laniarii ubique solitarii, subulati, maiores: superiores vtrinque remoti; inferiores tantum postice remoti. Molares superiores sex vtrinque; inferiores septem, acuti, sublobati. Labium

superius obtusum, fornicatum, lateribus tegens inferius, antice lacuna longitudinaliter conniun-
te excauatum. Labium inferius margine laterali occultato; nudo, molli, obtuse denticulato instar cristae. Mystaces labii superioris ex vibrissis rigidiusculis, antrorsum flexis, quinque vel sex ordinum horizontalium, infidentibus papillis verrucosis: superiore ordine remotiore. Labium inferius antice plurimis papillis fetiferis adpersum. Nasus ultra labium prominens, obtusus, nudus, rugosus, humidiusculus. Narium foramina rotunda, extorsum recuruata sinu lunari. Oculorum iris grisea; pupilla nigra; membrana nictitans intra canthum oculi maiorem, brevis. Supercilia vix vlla, quamuis pili in palpebra superiore versus canthum minorem promineant. Auriculae pilosae, oblongo-ouatae, margine baseos superiore reflexo, margine postico versus basin duplicato: interiore bilobo. Verrucae faciei septem: α) vnica vtrinque supra canthum oculi maiorem. β) vnica vtrinque in medio vtriusque malae. γ) vnica vtrinque extra dentes molares. δ) vnica impar, sub gula. Lingua laeuis, obtusa, planiuscula, longitudinaliter canaliculata. Palatum transuersim profunda sulcatum. Collum teretiufculum, longitudine fere capitis. Truncus teretiufculus, versus abdomen postice attenuatum. Suturae velleris tredecim: α) collaris vnica vtrinque ab auricula, per latera colli, flexuosa descendit ad basin sterni et connectitur cum opposita, vbi vorticem non minus format, quam in medio itinere ad latus vtrinque colli. β) sternea vnica impar a basi sterni ad eiusdem apicem ducta, adnexa priori. γ) cubitalis vnica vtrinque a flexura cubiti ad palmam. δ) analis vnica ad anum breuis, transuersalis. ϵ) auricularis vnica cingit anteriora auris arcuata. ζ) abdominalis vnica ab umbilico latera abdominis vtrinque

que ambiens, ad inguina desinens. 4) lumbaris vnica ab ano ad poplites. 5) ocularis vnica brevissima ad canthum oculi minorem. Pedes antici digitis quinque, semipalmati, vestiti: digitis duobus intermediis aequalibus, longioribus; duobus lateralibus aequalibus brevioribus; pollice ad latus interius tarsi brevissimo. Calcaneus sub basi carpi; digiti forma, muticus, apice nudus. Pedes postici anticis simillimi, sed absque pollice (qui tamen haud raro adest). Ungues conuexi modice compressi, obtusi, in omnibus digitis fixi, quos vix retrahit, hinc obtusiores. Cauda cylindrica, pedum fere longitudine, sinistrorsum recurvata, pilis vestita, quam hilaris recurvat, timidus vero inter femora inflectit. Scrotum vestitum quoad partem. Praeputium prominulum, vestitum. Mammae in femina decem: sex abdominalibus, quatuor pectoralibus; in mare sex abdominales, pectorales nullae.

Habitat fere vbique cum Homine; facer olim Aegyptiis, hodie Iaponensibus, inter quos numerosissimus reperitur *Kaempf. Iapon. I p. 125*. Etiam spontaneus euasit passim ab homine derelictus: in Congo regno, Aethiopia inferiore, versus caput benae spei, pilo rufo, corpore gracili, gregarius; adoritur adeo Leones, Tigrides, Elephantes, quorum saepe praeda fit. Copiosissimus quoque in America australi, in caueis cuniculorum similibus pariens, raro latrans, vigil, auriculis erectis: horum caniculi hominem facile sequuntur.

Dilacerat editque carnes, cadauera, adeoque putrida, vegetabilia farinosa, rarius olera fructusque.

Digerit ossa. Vomitu a Tritico repente aut canino vel Daetyli glomerata purgatur. Cacat supra lapidem; albumi graecum septicum. Potat lambendo.

bendo. Mingit ad latus, cum hospite saepius centies. Odorat anum alterius. Odoratu excelsit naso humido. Latrat. Oblique currit. Incedit supra digitos. Facile natat. Vix sudat; calidus linguam exferit. Cubitum iturus circumit locum. Dormit auditu acutiore, licet saepius cum stertore. Somniat. Oscitat euigilans. Procis rixantibus crudelis. Menstruans catullit cum variis; mordet illa illos, non illi illam; cohaeret copula iunctus. Gravida 63 diebus, parit 4 ad 10 coecos, masculis patri similibus, femineis matri. Adolescit annuo tempore. Aetas 12-15 annorum. Fidissimus omnium: Hominibus cohabitatur; blanditur ad domini accessum; eius inflictum non fert. Prae-currit in itinere; in bivio respicit. Docilis: amissa inquit, vigilias noctu instituit; aduenas indicat, ad merces vigilat, Pecora ab agris arcet, Tarandos coercet, Boves Ovesque a Feris custodit, Leones detinet, Feras agit, Anatibus adstat, repit affiliens ad rete, occisa a venatore adportat e rapina desistens; veru trahit in Gallia, in Belgio currus leuiore, rhedam in Kamtschatka. Mendicat ad mensam; furatus timet cauda incurvata; invidus edit; inter suos dominus domi; mendicorum hostis; ignotos sine iniuria laeessit. Lambendo vulnera, podagram, carcinomata curat. Ululat mingitque ad musicam. Mordet proiectum lapidem. Instante tempestate foetet aegrotans; taenia laborat, rabiem disseminat, demum caecutit et se ipsum rodit; ab oleo empyreumatico aethereoue caudae instillato clamitat; saepe gonorrhoea infectus, a Mahometanis expellitur. Anatomicorum victima pro experimentis variis. Caro Africanis, Sinensibus incolisque insularum australium esculenta, olim Graecis ac Romanis.

Coire Canem cum Simia Blumenb. gen. bum. var.
p. 11.

Varietates plures, nonnullae maxime distinctae: num
verae species?

a) Canis *κύων* domesticus seu socius Rai. syn.
quadr. p. 177 n. 8.

Canis domesticus f. villaticus Linn. amoen. acad. IV
p. 46 n. 1.

Le Chien de Berger Buff. hist. nat. V p. 241 tab.
28.

Der Schäferhund Hall. vierf. p. 479.

Huishond Houtt. nat. hist. II p. 36.

Herdershond Houtt. nat. hist. II tab. 12.

Canis (familiaris domesticus) auriculis erectis,
cauda subtus lanata Linn. syst. nat. 12, I p.
57 n. a.

The Shepherd's Dog Penn. syn. quadr. p. 144
n. 1.

Cane da Pastori Aless. quadrup. II tab. 94.

Der Schäfer- oder Hirtenhund Mart. Buff. vierf.
II p. 164 tab. 23 fig. 1.

Haushund Müll. Naturf. I p. 207 n. a.

Der Schäferhund Schreb. Säugth. III p. 319 n. 1.

Can di pastori Italis.

Chien de Berger Gallis.

Haushund, Schäferhund Germanis.

Huishond, Herdershond Belgis.

Curre, House-Dog Anglis.

Hushund Suecis.

Magnitudo Vulpis. Auriculae erectae, breues.
Cauda subrecta, subtus longius pilosa. Variat
colore nigro, fusco, etc.

- e) Chien-Loup *Buff. hist. nat. V p. 242 tab. 29.*
 Der Wolfshund *Hall. vierf. p. 480.*
 The Pomerian Dog *Penn. syn. quadr. p. 144 n. Ia.*
 Can lupo *Aless. quadrup. II tab. 95.*
 Der Wolfshund *Mart. Buff. vierf. II p. 165 tab.*

24.

- Der Spiz *Schreb. Säugth. III p. 319 n. 2.*
 Chien-Loup *Gallis.*
 Spitz, Pommer *Germanis.*

Magnitudo Vulpis, minorue. Os subacutum. Pili longiores circa os et in capite. Artus mediae longitudinis. Cauda maxime recurvata. Vt plurimum albus.

- γ) Chien de Sibérie *Buff. hist. nat. V p. 242 tab. 30.*

- Der Siberische *Hall. vierf. p. 480.*
 Siberische Hond *Houtt. nat. hist. II tab. 12 fig. Buff.*
 The Siberian Dog *Penn. syn. quadr. p. 144 n. Iβ.*
 Cane di Siberia *Aless. quadrup. II tab. 96.*
 Der fiberische Hund *Mart. Buff. vierf. II p. 166 tab. 25 fig. 1.*

Der fiberische Hund *Schreb. Säugth. III p. 319 n. 3.*
Gett. Cook's voyage to the northern hemisphere vol. III. p. 203 ff tab. 70.
 Similis praecedenti. Auriculae erectae. Caput pilis longis vti totum corpus. Niger, albus, vel griseus.

- δ) Canis Getulus feu Islandicus, a Shock *Rai. syn. quadr. p. 177?*
 Chien d'Islande *Buff. hist. nat. V p. 242 tab. 31.*
 Der Lappländische Hund *Hall. vierf. p. 480?*
 Der Isländische Hund *Hall. vierf. p. 480.*
 Ysländische Hond *Houtt. nat. hist. II tab. 12 fig. Buff.*

Cane d'Islanda *Aless. quadrup. II tab. 97 fig.* Buff.
Der isländische Hund *Mart. Buff. vierf. II p. 167*
tab. 25 fig. 2.

Der isländische Hund *Schreb. Säugth. III p. 320*
n. 4.

Caput magnum, rotundatum, rostro tenui atque
acuto. Auriculæ erectæ, apicibus pendulis.
Cauda recurvata. Pedes mediæ longitudinis,
tenues. Pili longi, excepto rostro.

e) Canis sagax ad aquas *Alarov. digit. p. 556 fig.*
mala.

Canes Hunde *Ionst. quadrup. tab. 70 fig. inferior*
ad dextram bona.

Canis Aviaris aquaticus *Rai. syn. quadr. p. 177.*

Canis aquaticus *Linn. amoen. acad. IV p. 46 n. 5.*

Grand Barbet *Buff. hist. nat. V p. 246 tab. 37.*

Der Pudel *Hall. vierf. p. 485.*

Krullhond *Houtt. nat. hist. II p. 37 tab. 12 fig.*
Buff.

Canis (familiaris aquaticus) pilo crispo longo in-
ferior *Ouis Linn. syst. nat. 12, I p. 57 n. e.*

Waterdog *Penn. syn. quadr. p. 144. n. II d.*

Can barbone *Aless. quadrup. III tab. 101 fig.* Buff.

Der grosse Budel *Mart. Buff. vierf. II p. 174 tab.*

30 fig. 1.

Pudel *Müll. Naturf. I p. 208 n. e.*

Der Budel *Schreb. Säugth. III p. 320 n. 5.*

Perro de agua, Barbudillo *Hispanis.*

Barbone *Italus.*

Barbet *Gallis.*

Pudel, Budel *Germanis.*

Krullhond *Belgis.*

Water-Spaniel *Anglis.*

Dogg *Suecis.*

Caput rotundatum rostro breui et crasso. Auriculæ latae et pendulae. Corpus crassum. Pedes breues. Cauda fere recta, horizontalis. Pili totius animalis longi et crispi. Niger, griseus, fuscus, albus, etc.

5) Petit Barbet *Buff. hist. nat. V p. 250 tab. 38 fig. 2.*

Der kleine Pudel *Hall. vierf. p. 488.*

Der kleine Budel *Mart. Buff. vierf. II p. 183 tab. 31 fig. 2.*

Barbino *Aless. quadrup. IV tab. 167 fig. 2.*

Der Zwergbudel *Schreb. Säugth. III p. 321 n. 6.*

Similis praecedenti, at minor; rostro breuiore. Auricularum pili longissimi, penduli.

6) Canis Melitenis breuioribus pilis *Aldrov. digit. p. 541 fig. mediocr.*

Grédin *Buff. hist. nat. V p. 247 tab. 39 fig. 1.*

Le Pyrame *Buff. hist. nat. V tab. 39 fig. 2.*

Der englische Wachtelhund *Hall. vierf. p. 485.*

King Charles's dog *Penn. syn. quadr. p. 145 n. III a.*

Pyrame *Penn. syn. quadr. p. 145 n. III b.*

Canis d'Inghilterra *Aless. quadr. IV tab. 170.*

Der englische Wachtelhund *Mart. Buff. vierf. II p. 176 tab. 32 fig. 1.*

Der Pyrame *Mart. Buff. vierf. II p. 176 tab. 32 fig. 2.*

Der kurzhaarige Bologneser *Schreb. Säugth. III p. 321 n. 7.*

Grédin, E'pagneul d'Angleterre *Gallis.*

Caput paruum, rotundatum, rostro breui. Pili longi, praecipue pone auriculas, sub collo, pectore, ventre atque postice in pedibus anticis

et

et posticis. Cauda recurvata. Color niger, albus, variegatus. *Pyrame niger* maculas fulvas habet supra oculos.

- 4) *Canis Hispanicus* auribus demissis, pectore, ventre, pedibus albis maculis nigris distinctis, reliquo corpore nigro *Aldrov. digit. p. 561 fig. mediocris.*

Canis Hispanicus alter auribus demissis *Aldrov. digit. p. 562 fig. mediocr.*

Canis extrarius s. *Hispanicus* *Linn. amoen. acad. IV p. 47 n. 9.*

E'pagneul *Buff. hist. nat. V p. 246 tab. 38 fig. 1.*

Das Bologneserhündchen *Hall. vierf. p. 488 tab. 57.*

Spaansche Hond *Houtt. nat. hist. II p. 38.*

Spanjoler *Houtt. nat. hist. II tab. 12 fig. Buff.*

Canis (familiaris extrarius) auriculis longis lanatis pendulis *Linn. syst. nat. 12, I p. 57 n. x.*

Spagnoletto *Aless. quadrup. IV tab. 167. fig. 1.*

Der Spanische Wachtelhund *Mart. Buff. vierf. II p. 175 tab. 31 fig. 1.*

Der spanische Hund *Müll. Naturf. I p. 209 n. k.*

Der Bologneser Hund *Schreb. Säugth. III p. 322 n. 8.*

E'pagneul Gallis.

Pili longissimi, praecipue pone auriculas, sub collo, pectore, ventre atque pone in pedibus anticis atque posticis. Ut plurimum albus, interdum variegatus, saepe maculis nigris et fuscis ad auriculas. Auriculae longissimae, pendulae.

- 3) *Canis Melitensis* *Aldrov. digit. p. 542.*

Catulas Melitaeus *Rai. syn. quadr. p. 177 n. 9.*

Canis Melitaeus *Linn. amoen. acad. IV p. 46 n. 6.*

Bichon *Buff. hist. nat. V p. 251 tab. 40 fig. 1.*

Schoothondje *Houtt. nat. hist. II p. 37.*

Bologneesch Hondje *Houtt. nar. bist. tal.* 12 fig. Buff.

Canis (familiaris meliteus) magnitudine Sciuri
Linn. syst. nat. 12, I p. 57 n. 2.

Shock *Penn. syn. quadr.* p. 145 n. III 7.

Can Malthese *Aless. quadrup.* IV tab. 168 fig. 2.

Das Bologneser Hündchen *Mart. Buff. vierf.* II p. 184 tab. 33 fig. 1.

Bologneserhund *Müll. Naturf.* I p. 208 n. f.

Der angorische Hund *Schreb. Säugth.* III p. 322 n. 9.

Perrillo de falda *Hispanis.*

Cachorro *Lusitanis.*

Cagnuolo, Cagnolino *Italis.*

Bichon *Gallis.*

Lap-dog, Shock *Anglis.*

Knähund *Suecis.*

Omnium minimus. Caput rotundatum, rostro crasso. Oculi auriculaeque pilis longissimis occultati. Pili mollissimi, sericei longissimique, in toto corpore. Pedes breues. Malignus.

1) Chien-lion *Buff. bist. nar.* V p. 251 tab. 40 fig. 2.

Das Löwenhündchen *Hall. vierf.* p. 488.

Can Leone *Aless. quadrup.* IV tab. 168 fig. 1.

Das Löwenhündchen *Mart. Buff. vierf.* II p. 185 tab. 33 fig. 2.

Der Löwenhund *Schreb. Säugth.* III p. 322 n. 10.

Similis praecedenti, at pilis longissimis tantum in capite, pectore, pedibus apiceque caudae.

* Petit Danois *Buff. bist. nar.* V p. 247 tab. 41 fig. 1.

Der kleine Dänische Hund *Hall. vierf.* p. 486.

Basterd-Deentje *Houtt. nat. hist. II tab. 12 fig. Buff.*

Der kleine Dänische Hund *Marr. Buff. vierf. II p. 177 tab. 34 fig. 1.*

Der Harlekin *Schreb. Säugth. III p. 323 n. 11.*

Caput rotundatum magnum, vertice cleuato, rostro paruo, recto, acuto. Oculi magni. Auriculæ paruae, subpendulæ. Abdomen postice attenuatum. Crura gracilia. Color varius, sæpe albus maculis maioribus minoribusue.

λ) Roquet *Buff. hist. nat. V p. 253 tab. 41 fig. 2.*

Der Roquet *Hall. vierf. p. 489.*

Bastard-Pug *Penn. syn. quadr. p. 147 n. V γ.*

Der Roquet *Marr. Buff. vierf. II p. 188 tab. 34 fig. 2.*

Der Bastartmops *Schreb. Säugth. III p. 323 n. 12.*

Caput paruum, vertice eleuato, naso sublimo crasso. Oculi magni, prominentes. Auriculæ paruae, subpendulæ. Abdomen postice attenuatum. Crura longa, gracilia. Color variat: sæpe albus, maculatus aut immaculatus. Hybridus est ex antecedente et sequente.

ρ) Canis fricator *Linn. amoen. acad. IV p. 46 n. 7.*

Doguin *Buff. hist. nat. V p. 252 tab. 44.*

Der Mops *Hall. vierf. p. 488.*

Steendog *Houtt. nat. hist. II p. 38 tab. 12 fig. Buff.*

Canis (familiaris fricator) naso resimo, auribus pendulis, corpore quadrato *Linn. syst. nat. 12, I p. 57 n. γ.*

Pug-dog *Penn. syn. quadr. p. 147 n. V β.*

Cane musolo *Aless. quadrup. III tab. 103.*

Der Mops *Mart. Buff. vierf. II p. 186 tab. 36*
fig. 2.

Mops; Steindocke *Müll. Naturf. I p. 209 n. g.*

Der Mops *Schreb. Säugth. III p. 323 n. 13.*

Mopse, Doguin, Dogue de Bologne, Dogue d'Al-
 lemagne. *Gallis.*

Mops *Germanis.*

Pug-dog *Anglis.*

Mops *Suecis.*

Caput quadratum, naso breuissimo resimo. Labia
 breuia. Corpus torosum, breue. Auriculae
 pendulae. Pili breues, ut plurimum lutei, os
 nigrum. Mitis.

L'Artois *Buff. hist. nat. V p. 253.*

Der Achtziger oder der Rüsselsche Hund *Hall.*
vierf. p. 490.

Der Artoisische Hund *Mart. Buff. vierf. II p. 188.*

Hybridus ex hoc et praecedente.

Le Chien d'Alicante *Buff. hist. nat. V p. 254.*

Der Alikantische Hund *Hall. vierf. p. 490.*

Alikantische Hunde *Mart. Buff. vierf. II p. 189.*

Hybridus ex fricatore et extrario.

v) Canis Mastivus seu Molossus *Linn. amoen. acad.*
IV p. 46 n. 4.

Dogue *Buff. hist. nat. V p. 249 tab. 43.*

Der Bullenbeißer *Hall. vierf. p. 487.*

Wagthond *Houtt. nat. hist. II p. 37.*

Dog *Houtt. nat. hist. II tab. 12 fig. Buff.*

Canis (familiaris Molossus) magnitudine Lupi,
 labiis ad latera pendulis, corpore toroso *Linn.*
syst. nat. 12, I p. 57 n. 2.

Bull-

Bull-dog *Penn. syn. quadr. p. 147 n. V a.*

Der Bullenbeißer *Mart. Buff. vierf. II p. 180 tab.*

36 fig. 1.

Bullenbeißer, Wachthund *Müll. Naturf. I p. 208 n. d.*

Der Bullenbeißer *Schreb. Säugth. III p. 324 n. 14.*

Dogo, Perro grande *Hispanis.*

Dogue *Gallis.*

Bullenbeißer *Germanis.*

Wagthond *Belgis.*

Bull-dog *Anglis.*

Blodhund *Suecis.*

Собака Меделянская (Sobaka medeljanskaja)

Ruffis.

Similis fricatori, at maior. Labia pendula. Corpus torosum. Artus fortes. Color luteus saepe umbra nigra aut grisea. Auriculae extus atque os nigra. Cradelis atque ferox, saepe mordet antequam latret. Angliae propius, quamuis et ibi hodie rarior fit.

3) Canis bellicosus Anglicus *Aldrov. digir. p. 559 fig. mala.*

Mastius, nonnullis Martinus *Rai. syn. quadr. p. 176 n. I.*

Dogue de forte race *Buff. hist. nat. V p. 252 tab. 45.*

Die englische Dogge *Hall. vierf. p. 488 tab. 32.*

Mastiff *Penn. syn. quadr. p. 146 n. IV d.*

Cane d'armi *Aless. quadrup. III tab. 102.*

Die große Dogge *Mart. Buff. vierf. II p. 186 tab. 37.*

Die englische Dogge *Schreb. Säugth. III p. 324 n. 15.*

Can d'armi *Italis.*

Dogue de forte race *Gallis.*

Englische Dogge *Germanis.*

Mastiff *Anglis.*

Engelk Dogg *Suecis.*

Affinis antecedenti, at maior, omniumque maximus. Labia crassa, pendula. Caput magnum. Color varius.

o) Canis Sagax *Linn. amoen. acad. IV p. 46 n. 2.*

Iagdhund *Hall. vierf. p. 483.*

Iagthond *Houtt. nat. hist. II p. 36.*

Canis (familiaris sagax) auriculis pendulis, digito spurio ad tibias posticas *Linn. syst. nat. 12, I p. 57 n. β.*

Iagdhund *Müll. Naturf. I p. 207 n. b.*

Der Iagdhund *Schreb. Säugth. III p. 324 n. 16.*

Iagt-hund *Suecis.*

Caput magnum, occipite carinato, rostro elongato. Auriculae latae, longissimae, pendulae. Labia pendula. Corpus elongatum mediae crassitie. Artus fortes. Digitus spurius plantarum unguiculatus. Cinereus, niger, rufus, fuscus aut luteus. Latratus gravis ac profundus.

π) Canis venaticus sagax *Rai. syn. quadr. p. 177 n. 4.*

Chien courant *Buff. hist. nat. V p. 243 tab. 32.*

Chien courant metis *Buff. hist. nat. V tab. 36.*

Dryf-Brak *Houtt. nat. hist. II tab. 12 fig. Buff.*

Hound, or dog with long smooth and pendulous ears *Penn. syn. quadr. p. 144 n. II.*

Cane da Corfa *Aless. quadrup. II tab. 98.*

Der Iagdhund *Mart. Buff. vierf. II p. 168 tab. 26.*

Der Parforcehund *Schreb. Säugth. III p. 325 n.*

17.

Chien courant *Gallis.*

Hound

Hound (*maior*), Beagle (*minor*) *Anglis.*

Similis praecedenti, albicans.

q) *Canis Scoticus sagax Aldrov. digit. p. 553 fig. mediocr.*

Canis Scoticus furum deprehenfor Aldrov. digit. p. 554 fig. mediocr.

Sanguinarius seu furum deprehenfor Rai. syn. quadr. p. 177.

Spürhund Hall. vierf. p. 484?

Blood-hound Penn. syn. quadr. p. 144 n. II.

Der Schweißhund Schreb. Säugth. III p. 325 n. 18.

Blood-hound Anglis.

Собака вижлая (Sobaka wifhlaja) Ruffis.

r) *Der Leithund Schreb. Säugth. III p. 325 n. 19.*

τ) *Canis sagax ad coturnices capiendas pantherinus Aldrov. digit. p. 555 fig. mediocr.*

Canis auarius seu Hispanicus compestris Rai. syn. quadr. p. 177 n. 5.

Canis auicularius Linn. amoen. acad. IV p. 47 n. 10.

Braque Buff. hist. nat. V p. 245 tab. 33.

Le Braque de Bengale Buff. hist. nat. V p. 245 tab. 34.

Der Spanische Wachtelhund Hall. vierf. p. 485.

Der Bengalische Tigerhund Hall. vierf. p. 484.

Patryshond Houzt. nat. hist. II p. 38.

Brak Houzt. nat. hist. II tab. 12 fig. Buff.

Canis (familiaris auicularius) cauda truncata Linn. syst. nat. 12, I p. 57 n. 1.

Harrier Penn. syn. quadrup. p. 144 n. II a.

Dalmatian Hound Penn. syn. quadr. p. 144 n. II β.

Spaniel Penn. syn. quadr. p. 145 n. III.

Can bracco *Aless. quadrup. II tab. 99.*

Bracco di Bengala *Aless. quadrup. II tab. 100.*

Der Spürhund *Mart. Buff. vierf. II p. 171 tab. 27.*

Tiger- oder Bengal. Spürhund *Mart. Buff. vierf.*

II tab. 28.

Der Hühnerhund oder Wachtelhund *Müll. Na-*

turf. I p. 209 n. i.

Der Hühnerhund *Schreb. Säugth. III p. 326 n. 20.*

Podenco *Hispanis.*

Bracco *Italis.*

Braque, Chien couchant *Gallis.*

Hühnerhund *Germanis.*

Patryshond *Belgis.*

Irish pointer, Land-Spaniel, Harrier *Anglis.*

Rapphöns - hund, Fogel - hund *Suecis.*

Собака испанская (Sobaka ispanskaja) *Ruffis.*

Capite crassiore, rostro breuiore fortioreque; auriculis breuioribus angustioribusque; cauda breuiore, carnosiore, rectiore. Pili breues. Albicans maculis nigricantibus aut fuscis, sed et totus albus vel fuscus. Quem bengalensem dicit Buffonius, dalmaticum Pennantus, tigrinus colore est.

v) Der Wasserhund *Schreb. Säugth. III p. 326 n. 21.*

Similis praecedenti, at pilis longioribus, crispis.

φ) Grand Danois *Buff. hist. nat. V p. 240 tab. 26.*

Der große Dänische *Hall. vierf. p. 482.*

Danish Dog *Penn. syn. quadr. p. 146 n. IV γ.*

Can daneſe grande *Aless. quadrup. II tab. 92.*

Der große dänische Hund *Mart. Buff. vierf. II*

p. 161 tab. 22.

Der dänische Blendling *Schreb. Säugth. III p. 326*

n. 22.

Grand Danois, Danois de Carroffe *Gallis.*

Corpore graciliore, cruribus tenuioribus atque longioribus. Auriculæ breues, angustae, pendulae. Color ut plurimum luteus.

Le Chien de Calabre *Buff. bist. nat. V p. 254.*

Der Kalabrische Hund *Hall. vierf. p. 490.*

Kalabrische Hunde *Mart. Buff. vierf. II p. 192.*

Hybridus ex hoc atque extrario.

α) Der Curshund *Schreb. Säugth. III p. 327 n. 23.*

Caput elongatum fronte plana, rostro mediae crassitiei. Auriculæ parvae, subpendulae. Crura longa carnosa. Corpus longius graciliusque quam in praecedentibus. Pili colli, ventris caedaeque saepe reliquis longiores. Colore variat.

ψ) Canis Graius Hibernicus *Rai. syn. quadr. p. 176*

n. 3.

Der Irländische *Hall. vierf. p. 482.*

Irish Gre-hound *Penn. syn. quadr. p. 146 n. IV α.*

Das grosse irländische Windspiel *Schreb. Säugth.*

III p. 327 n. 24 tab. 80 fig. Riding.

Irish Greyhound *Anglis.*

Omnium fere maximus, in reliquis graio vulgari similis. Olim valde communis in Hibernia ad Lupi venationem, hodie rarus.

ω) Canis Leporarius alter ferruginei coloris, seu Tur-

cicus *Aldrov. digit. p. 550 fig. mediocr.*

Das türkische Windspiel *Schreb. Säugth. III p. 327*
n. 25.

Antecedenti similis, at pili subcrispi.

- 42) *Canis venaticus Aldrov. digit. p. 545 fig. mala.*
Canis venaticus Graius seu Graecus, nonnullis Sco-
ticus Rai. syn. quadr. p. 176 n. 2.
Canis Graius Linn. amoen. acad. IV p. 46 n. 3.
Levrier Buff. hist. nat. V p. 240 tab. 27.
Der Windhund Hall. vierf. p. 481 tab. 33.
Windhond Hoult. nat. hist. II p. 36 tab. 12 fig.
Buff.
Canis (familiaris graius) magnitudine Lupi, trunco
curvato, rostro attenuato Linn. syst. nat. 12, I
p. 57 n. 7.
Common Gre-hound Penn. syn. quadr. p. 146 n.
IV p.
Cane levriere Aless. quadrup. II tab. 93.
Der Windhund Mart. Buff. vierf. II p. 162.
Das Windspiel Mart. Buff. vierf. II tab. 23 fig. 2.
Windhund Müll. Naturf. I p. 207 n. c.
Der gemeine Windhund Schreb. Säugth. III p. 327
n. 26.
Lebrel, Galgo Hispanis.
Galgo Lusitanis.
Levriere Italis.
Levrier Gallis.
Windhund Germanis.
Windhond Belgis.
Greyhound, Grehound Anglis.
Winthund Suëcis.
Собака гончая (Sobaka gonczaja) Russis.

Caput paruum, elongatum, rostro attenuato, acu-
 minato. Labia brevia. Auriculae minutae,
 subpen-

subpendulae. Totum corpus tenue, abdomine maxime attenuato. Dorsum curvatum postice. Crura longa, tenuia. Cauda tenuis. Pili breues. Vt plurimum sublutens, interdum striis griseis aut nigricantibus. Cursu velocissimus omnium. Rarius latrat reliquis.

ββ) Canis Leporarius hirsutus albus *Aldrov. digit. p.*

549 *fig. mediocr.*

Oriental Gre-hound *Penn. syn. quadr. p. 146 n.*

IV p. 2.

Der zottige Windhund *Schreb. Säugth. III p. 328*

n. 27.

A praecedente differt pilis longioribus crispis.

γγ) Levron *Buff. hist. nat. V p. 241.*

Italian Gre-hound *Penn. syn. quadr. p. 146 n.*

IV p. 1.

Das kleine Windspiel *Schreb. Säugth. III p. 228*

n. 28.

Levron *Gallis.*

Windspiel *Germanis.*

Dimidio minor graio vulgari, cui in reliquis similis. Timidus.

δδ) Canis sine pilis *Aldrov. digit. p. 563 fig. mala.*

Canis aegyptius *Linn. amoen. acad. IV p. 47 n. 11.*

Chien-turc *Buff. hist. nat. V p. 248 tab. 42 fig. 1.*

Chien-turc metis *Buff. hist. nat. V tab. 42 fig. 2.*

Canis pilis carens, minor. The Indian Dog *Brown.*

Iam. p. 486.

Der Türkische Hund *Hall. vierf. p. 487.*

Turksche Hond *Houtt. nat. hist. II p. 39 tab.*

12 fig. Buff.

chien de habite & colore ethiopiens - pag. 56 67. 78

Canis (familiaris aegyptius) nudus absque pilis

Lin. syst. nat. 12, I p. 57 n. 2.

Naked Dog *Penn. syn. quadr. p. 147 n. V d.*

Can Turco *Aless. quadrup. IV tab. 169 fig. 1.*

Can Turco bastardo *Aless. quadrup. IV tab. 169 fig. 2.*

Der türkische Hund *Mart. Buff. vierf. II p. 178 tab. 35 fig. 1.*

Der türkische Blendling *Mart. Buff. vierf. II p. 179 tab. 35 fig. 2.*

Der türkische Hund *Müll. Naturf. I p. 210 n. 1.*

Der türkische nackte Hund *Schreb. Säugth. III p. 329 n. 29.*

Chien-turc *Gallis.*

Naken-Hund *Suecis.*

Conuenit cum praecedente abdomine attenuato cruribusque longioribus; differt capite crassiore, rostro breuiore. Pili in toto corpore nulli praeter vibrissas. Cutis nuda, cinerea, nigricans, aut coloris carnei. Ex Guinea oriundus.

es) Mâtin *Buff. hist. nat. V p. 239 tab. 25.*

Der Bauenhund *Hall. vierf. p. 481?*

Wagthond *Hourt. nat. hist. II tab. 12 fig. Buff.*

Mastino *Aless. quadrup. II tab. 91.*

Der Haus- oder Bauernhund *Mart. Buff. vierf. II p. 159 tab. 21.*

Der Mezgerhund *Schreb. Säugth. III p. 329 n. 30.*

Mastin *Hispanis.*

Rafeiro *Lusitanis.*

Can mastino *Italis.*

Mâtin *Gallis.*

Caput elongatum, tenue. Auriculae mediocres, subpendulae. Corpus tenue, postice angustatum.

rum. Crura longa, fortia. Cauda crassior,
fere recta, horizontalis. Pili laeves, ut plurimum
nigri, saepe fulvo maculati.

75) Der Saufinder *Schreb. Säugth. III p. 329 n. 31.*

Figura praecedentis, at pilis longioribus villosus,
ut plurimum niger.

22) Der Saurüden *Schreb. Säugth. III p. 330 n. 32.*

Caput magnum fronte plana. Rostrum crassum,
subacutum. Corpus postice attenuatum. Pedes
longi. Pilis longioribus villosus.

24) Vertagus *Rai. syn. quadr. p. 177.*

Canis Vertagus *Linn. amoen. acad. IV p. 47 n. 8.*
Basset à jambes torfes *Buff. hist. nat. V p. 245*
tab. 35 fig. 2.

Der Dachshund *Hall. vierf. p. 485.*

Dashond *Houtt. nat. hist. II p. 38 tab. 12 fig.*
Buff.

Canis (familiaris vertagus) pedibus curuatis, trun-
co longo saepius variegato *Linn. syst. nat. 12,*
I p. 57 n. 9.

Turnspit *Penn. syn. quadr. p. 145 n. II γ.*

Der krumbeinigte Dachshund *Mart. Buff. vierf.*
II p. 172 tab. 29 fig. 1.

Der Daclshund *Müll. Naturf. I p. 209 n. b tab.*
12 fig. Buffoniana repetita cum reliquis, ex
Houttuynii tabula,

Der Dachshund *Schreb. Säugth. III p. 330 n. 33.*

Perrillo, Raposero, Perro baxo *Hispanis.*

Basset *Gallis.*

Dachs, Tachs, Dachshund, Tächshund, Tächfel
Germanis.
 Dashond *Belgis.*
 Tumbler, Turnspit *Anglis.*
 Hånse *Suecis.*

Caput maius, fronte plana, rostro longo. Auriculæ latae, pendulae. Truncus maxime elongatus. Pedes breues, antici curuati. Pili laeves. Niger, maculis supra oculos, ore, pectore pedibusque infra fuluis, sed et varius reperitur. Alterum oculum altero maiorem habere dicitur *Rai.* In Sueciam introductus a Fridrico I rege.

99) Basset à jambes droites *Buff. hist. nat. V p. 245*
tab. 35 fig. 1.

Der Dachs mit geraden Beinen *Mart. Buff. vierf. II p. 172 tab. 29 fig. 2.*

Ab antecedente differt folis pedibus rectis.

11) Der zottige Dachshund *Schreb. Säugth. III p. 330*
n. 34.

Differt a praecedentibus pilis longioribus crispis.

Le Burgos *Buff. hist. nat. V p. 254.*

Der Hund von Burgos *Hall. vierf. p. 490.*

Hunde von Burgos *Mart. Buff. vierf. II p. 189.*

Hybridus ex vertago atque extrario.

Huc quoque referendus videtur:

Ytzcuinte Porzotli *Hernand. Mex. p. 466 cum fig.*

Secundus — quem Michuacanensem abora — vocare solent *Fernand. anim. p. 7.*

Ter-

Tertius nuncupatus Techichi *Fernand. anim. p. 7?*
 Ytzcuintepotzotli seu Canes gibbi *Fernand. anim. p.*
 10.

Ytzcumbepotzotli. Ein Indianischer Hund. *Canis*
Mexicana Gesn. Thierb. p. 225 fig. p. 226 Her-
nand.

Canis Mexicanus; monstroso corporis habitu Klein.
quadrup. p. 68.

Der Mexikanische Hund *Hall. vierf. p. 490.*

L'Alco *Buff. hist. nat. XV p. 151.*

Der Mexikanische Hund *Mart. Buff. vierf. II p. 190.*

Der Alko *Schreb. Säugth. III p. 342.*

Magnitudo *Canis familiaris minoris. Caput minutum.*
Rostrum caninum. Auriculae pendulae. Collum
breuissimum. Dorsum arcuatum siue gibbosum.
Cauda brevis, pendula. Venter crassus, mammis
sex. Pedes canini. Color capitis antici albus,
auriculis partim fulvis; dorsi fulvus, caudae albus.
Venter maculis nigris. Pedes albi.

Peruanis et Mexicanis *Canis familiaris* loco erat cum
 detegeretur nouus orbis, fidelis domino, moribus
Canis. Obscurum animal hodie.

Aliud obscurum:

Canis filuestris, americanus, cauda longissima Seb.
thes. I p. 47 tab. 30 fig. 1.

Der wilde amerikanische Hund *Meyer Thiere III*
tab. 21 fig. Sebae.

Canis Americanus filuestris, cauda longissima Klein.
quadrup. p. 69.

Der Amerikanische wilde Hund mit sehr langem
 Schwanze *Hall. vierf. p. 493.*

Der Amerikanische wilde Hund mit sehr langem
 Schwanze *Mart. Buff. vierf. II p. 193.*

Ex

with Barton on the different species & varieties of na-
 -american, or Indian dogs. in *Ep. Philadelphia medical*
official journal p. 11. vol. 1. p. 3 - 31.

Ex promontorio de Tiburon e regione insulae Martini-
ticae. In silvis degit, raptu vivens. Caput vul-
pinum. Auriculae arrectae, parvae. Oculi prae-
grandes. Vibrillae longiores. Rictus oris amplus.
Digni 5-5. Pellis dilute rufa, in capite, pedi-
bus atque cauda color dilutissimus.

Lupus. 2. C. cauda incurvata.

Αυνος Arist. hist. anim. V c. 2 n. 21. VI c. 35 n. 419-
421. VIII c. 9 n. 101.

Lupus Plin. hist. nat. VII c. 58 (c. 83 Hard.). X c.
63 (c. 83 Hard.). c. 73 (c. 93 Hard.). XI c. 37
(c. 55, 67 Hard.). c. 43 (c. 99 Hard.). c. 49
(c. 109 Hard.). c. 50 (c. 111 Hard.).

Αυνος Aelian. anim. III c. 6. IV c. 4, 15. V c. 19. VII
c. 20. X c. 26.

Αυνος Oppian. cyneg. III, 263.

Lupus Gesn. quadrup. p. 716 fig. p. 717.

Lupus Ol. Magn. Sept. p. 611.

Lupus Schwenckf. theriotr. p. 106.

Lupus Aldrov. digit. p. 144.

Lupus filuestris Aldrov. digit. p. 173 fig. mediocr.

Lupus Ionst. quadrup. p. 127.

Lupus. Wolff Ionst. quadrup. tab. 56 fig. mediocr.

Ein Wolff Gesn. Thierb. p. 348 cum fig. pessima.

Lupi Scheff. Lappon. p. 338.

Lupus vulgaris Charlet. exerc. p. 15.

Lupus Wagn. Heluet. p. 178.

Lupus Rai. syn. quadr. p. 173.

Lupus Reaüz. Polon. p. 219 auct. p. 312.

The Wolf Catesb. Carol. app. p. XXVI.

The Wolf Brick. North-Carol. p. 119.

Canis cauda recta corpore brevior Linn. Syst. nat. 2
p. 44.

Wolf Riding. jagdb. Th. tab. 8.

Canis cauda incurva Linn. fn. suec. I p. 5 n. 13.

Der Wolff Meyer Thiere I tab. 35 fig. bona.

Canis cauda incurua *Linn. syst. nat. 6 p. 5 n. 2.*

Lupus vulgaris *Klein. quadrup. p. 70.*

Canis cauda incurua. The Canis, with the tail bending inward: the Wolf *Hill anim. p. 552 tab. 27 fig. mala.*

Canis (Lupus) cauda incurua *Linn. mus. Ad. Frid. I p. 6.*

Le Loup: Canis (Lupus vulgaris) ex griseo flavescens *Briss. regn. an. p. 235 n. 2.*

Canis cauda incurua *Kram. Austr. p. 313.*

Der gemeine Wolf *Hall. vierf. p. 496.*

Canis (Lupus) cauda incuruata *Linn. syst. nat. 10, I p. 38 n. 2.*

Wölfe *Müll. Samml. III p. 546, 608.*

Le Loup *Buff. hist. nat. VII p. 39 tab. 1.*

Loup *Dictionn. anim. II p. 706.*

Wolf: Hond met een nederwards gekromde Staart *Houtt. nat. hist. II p. 69.*

Canis (Lupus) cauda incurua *Linn. fn. suec. 2 p. 3 n. 6.*

Ulve *Pontopp. Dan. I p. 607.*

Loup *Bom. dictionn. II p. 717.*

Canis (Lupus) cauda incuruata *Linn. syst. nat. 12, I p. 58 n. 2.*

Canis Lupus *Forster: Philos. transact. LVII p. 342.*

The Wolf *Penn. syn. quadr. p. 149 n. 111.*

Lupo *Aless. quadrup. II tab. 66 fig. Buff.*

Der Wolf *Müll. Naturf. Ip. 219 tab. 31 fig. I Suppl. p. 28.*

Kuorchu oder Wölfe *Stell. Kamtsch. p. 117.*

Lupus *Forsk. fn. orient. p. V.*

Der Wolf *Mart. Buff. vierf. IV p. 59 tab. 57.*

Der Wolf: Canis Lupus *Schreb. Säugth. III p. 346 n. 2 tab. 88 fig. propr. tab. 81 fig. capitis et dentium.*

Canis (Lupus) cauda incuruata *Müll. Dan. prodr. p. 2 n. 5.*

- Lobo *Hispanis*.
 Lobo *Lusitanis*.
 Lupo *Italici*.
 Loup (*mas*) Louve (*femina*) Louveteau (*caulus*)
Gallis.
 Wolf (*mas*) Wölfinn (*femina*) *Germanis*.
 Wolf *Belgici*.
 Wolf *Anglici*.
 Ulv *Danicis*.
 Graabeen, Varg *Noruegici*.
 Warg, Ulf, Gräben *Suecici*.
 Kumpi, Stolpe, Saibek, Gaine, Olgobutzh *Lappo-*
nibus.
 Wilk *Polonicis*.
 Волкъ (Wolk) (*mas*) Волчица (Wolczitza) (*femi-*
na) *Russici*.
 Eör *Bucharice*.
 Bojjaku *Tungusici*.
 Schonu *Burätici*.
 Blüre *Tatarici*.
 Pirä *Tscheremissici*.
 Kaskar *Tschurwaschici*.
 Kiön *Wotiakici*.
 Wjarges *Morduanici*.
 Kaiin *permice*.
 Köiin *sirjänice*.
 ديب (Dîb) *Arabibus*.

Maior Cane familiari maiore: longitudine corporis
 $3\frac{1}{2}$ ped. caudae fere $1\frac{1}{2}$ ped. Caput oblongum,
 crassum, rostro acuto. Dentes fortes. Auriculae
 erectae, acutae. Oculi oblique positi. Crura elonga-
 ta. Cauda longius pilosa, incurvata. Color ex
 griseo flavescentis, subvariegatus, interdum albus,
 rarius niger in borealibus.

Habitat in Europa, Asia, Africa, America in silais: non intra circulum arcticum. Rarior in Suecia sub initio huius seculi, hodie vulgaris. Deletus hodie in magna Britannia ab anno 800 inde. Americanus omnium minimus, timidissimus in Kamtschatka.

Cateruatim incedit quasi claudus, nocturnus. Pecora, Equos, Sues, Canes occidit; in silais suspiciosissimus vix audet; tractum faniculum metuit; portam non subit, sed sepimentam superflit; sonum tubae stentoreae non fert. Summa fame et frigore lassatus in propriam speciem et hominem saevit; gustata humana carne illam praefert; inediam diu tolerat; modo non desit aqua pro potu. Vnguibus retractis incedit. Collum facile flectit. Noctu ululat. Excellit olfactu atque auditu. Lichene vulpino occiditur. Odit maxime Canem familiarem. Coit Ianuario mense; grauida 10 hebdom. parit in nido ex muscis mollioribus parato, loco occulto, pullos 5-9 coecos. Adolefcit anno tertio. Aetas 15-20 annorum. Morsus perniciosus. Iunior mansuescit. Pediculos pulicesue non fert.

mexicanus.

3. C. cauda deflexa laeui, corpore cinereo fasciis fuscis maculisque fuluis variegato.

Xoloitzcuintli Lupus Mexicanus *Hernand. Mexic. p. 479 cum fig.*

Cuetlachtli, seu Lupus Indicus *Fernand. anim. p. 7.*

Lupus Indicus *Nicemb. hist. nat. p. 180.*

Ein Indianischer Wolff *Ges. Thierb. p. 353.*

Quanhpecotli f. Felis montana americana *Seb. thes. I p. 68 tab. 42 fig. 2.*

Le Loup du Mexique: Canis (Lupus mexicanus) cinereus, maculis fuluis variegatus taeniis subnigris a dorso ad latera deorsum hinc inde deductis *Briff. regn. an. p. 237 n. 4.*

Des

Der nackte amerikanische Hund *Hall. vierf. p. 491.*

Der Mexikanische Wolf *Hall. vierf. p. 500.*

Canis cinereus, maculis fulvis variegatus, taeniis subnigris, a dorso ad latera deorsum hinc inde ductis Gronov. zooph. I p. 8 n. 30.

Canis (mexicanus) cauda deflexa laevi, corpore cinereo fasciis, fasciis maculisque fulvis variegato

Linna. Syst. nat. I p. 60 n. 8.

Le Loup de Mexique *Buff. hist. nat. XV p. 149.*

The Mexican Wolf *Penn. Syn. quadr. p. 151* coniungit cum antecedente.

Der nackte amerikanische Hund *Mars. Buff. vierf.*

II p. 491.

Der mexikanische Fuchs *Müll. Naturf. I p. 228.*

Der Mexikanische Wolf *Schreb. Säugth. III p. 352 n. 3.*

Magnitudo Lupi. Caput magnum. Maxillae dentesque fortes. In labio superiore setae longae, retrorsum versae, aculeis mollioribus Hystricis similes, coloris grisei albique. Auricalae magnae, erectae, cinereae, interstitio fulvo-maculato. Caput cinereum, lineis transversis nigricantibus striatum. Collum crassum, cute laxiori cum stria longa fulva, aliaque in pectore. Corpus cinereum nigro maculatum. Latera nigro striata transversaliter. Venter cinereus. Cauda minus pilosa, longa, cinerea, medio fulva. Crura pedesque nigro cinereoque striata. Interdum albus est.

Habitat in calidioribus regni Mexicani. Mores Lupi, cuius varietas videtur Fernandésio, Buffonio atque Pennanto.

Lycaon. 4. *C. cauda recta, corpore toto nigro.*

Vulpeculae nigrae Scheff. Lapon. p. 340.

Schwarze

M A M M A L I A. Canis.

561

- Vulpes* 9-7
 Schwarze Füchse *Strahlenb. Af. p. 355*;
 Renards noirs *Charlev. nouv. Fr. III p. 133*.
 Der Scithische Wolf *Hall. vierf. p. 501*.
 Der schwarze Fuchs *Hall. vierf. p. 504*.
 Schwarze Füchse *Müll. Samml. III p. 535*.
 Le Loup noir *Buff. hist. nat. IX p. 362 tab. 41*.
 The black Fox *Penn. syn. quadr. p. 152 n. 112 γ*.
 Lupo nero *Aless. quadrup. I tab. 24 fig. Buff.*
 Schwarze Füchse *Stell. Kamtsch. p. 124*.
 Der schwarze Fuchs: *Canis Lycaon Schreb. Säugth.*
III p. 353 n. 4 tab. 89 fig. Buff.
 Der Steilohr *Müll. Naturf. suppl. p. 28*.
 Черно бурои (Czerno buroi) *Ruffis.*

Magnitudo media inter Lupum ac Vulpem. Similis quodammodo Lupo. Oculi oblique positi, at minores quam in Lupo magisque inuicem remoti. Auriculae remotiores magisque distantes. Dorsum sabiabaturn. Color totius niger, sed et variat colore subgriseo, nec non apicibus pilorum argenteis.

Habitat in frigidioribus Europae, Asiae et Americae. Astutissimus omnium. Pellis pretiosissima, americani vilior.

Vulpes. 5. C. cauda recta: apice albo.

- Αλωπηξ *Arist. hist. anim. I c. 6 n. 46. VI c. 34 n. 414*.
 Vulpes *Plin. hist. nat. VII c. 58 (c. 83 Hard.). VIII*
c. 28 (c. 42 Hard.). X c. 63 (c. 83 Hard.). XI
c. 49 (c. 109 Hard.). c. 50 (c. 111 Hard.). XXIII
c. 8 (c. 75 Hard.).

Αλωπηξ *Aelian. anim. IV c. 39. VI c. 24. XIII c. 11*.

Κερω *Oppian. cyneg. III, 449*.

Vulpes *Gesf. quadrup. p. 1081 cum fig. bona*.

Vulpes *Ol. Magn. Sept. p. 634*.

Vulpes *Schwenckf. thesiorr. p. 133*.

Vulpes Aldrov. digit. p. 195.

Vulpes Ionst. quadrup. p. 131.

Vulpes. Fuchs Ionst. quadrup. tab. 56 fig. bona.

Der Fuchs Gesn. Thierb. p. 121 cum fig. bona.

Vulpeculae Scheff. Lappon. p. 340.

Vulpes Charlet. exerc. p. 15.

Vulpes Wagn. Helvet. p. 187.

Vulpes Sibb. Scor. an p. 9.

Vulpes Rai. syn. quadr. p. 177.

Vulpes Rzacz. Polon. p. 231 auct. p. 324.

Canis cauda recta longitudine corporis Linn. syst. nat.

2 p. 44.

Fuchs Riding. jagdb. Tb. tab. 14.

Canis cauda erecta Linn. fn. suec. I p. 5 n. 14.

Der Fuchs Meyer Thiere I tab. 36.

Canis cauda recta extremitate alba Linn. syst. nat. 6

p. 5 n. 6.

Vulpes vulgaris Klein. quadrup. p. 71.

Canis cauda recta extremitate alba. The Canis, with

the tail straight and white at the tip: the Fox

Hill anim. p. 553.

Canis (Vulpes) cauda recta: extremitate alba Linn.

mus. Ad. Frid. I p. 6.

Le Renard: Canis (Vulpes vulgaris) fulvus, pilis

cinereis intermixtis Briss. regn. an. p. 239 n. 5.

Canis cauda erecta Kram. Austr. p. 313.

Vulpes Auctorum Hasselqu. Palaest. p. 271.

Der gemeine Fuchs; Birkenfuchse Hall. vierf. p. 501.

Canis (Vulpes) cauda recta: apice albo Linn. syst.

nat. 10, I p. 40 n. 4.

Füchse Müll. Samml. III p. 531, 608.

Le Renard Buff. hist. nat. VII p. 75 tab. 4.

Renard Dictionn. anim. III p. 676.

Vos: Hond met een regte Staart, die aan't end wit

is Houtr. nat. hist. II p. 85.

Canis (Vulpes) cauda erecta: apice albo Linn. fn.

suec. 2. p. 3 n. 7.

The Fox *Penn. brit. zool. p. 28.*

Reve *Pontopp. Dan. I p. 608.*

Renard ou Goupil *Bom. dictionn. III p. 735.*

Canis (Vulpes) cauda recta: apice albo *Linn. syst. nat. 12, I p. 59 n. 4.*

Canis Vulpes *Forster: Philos. transact. LXII p. 342.*

The Fox *Penn. syn. quadr. p. 152 n. 112.*

Volpe *Aless. quadrup. II tab. 67 fig. Buff.*

Der Fuchs *Müll. Naturf. I p. 224 tab. 31 fig. 2.*

Füchse *Szell. Kamtsch. p. 123.*

Canis Vulpes *Forsk. fn. orient. p. III.*

Der Birkfuchs: Canis Vulpes *Schreb. Säugth. III p. 354 n. 5 tab. 90 fig. propr.*

Der Fuchs *Mart. Buff. vierf. IV p. 97 tab. 58.*

Canis (Vulpes) cauda recta, apice albo *Müll. Dan. prodr. p. 2 n. 6.*

Zorro (*mas*) Zorra, Raposa (*femina*) *Hispanis.*

Rapoza *Lusitanis.*

Volpe *Italica.*

Renard *Gallis.*

Llwynog (*mas*) Llwynoges (*femina*) *Cambrensis.*

Fuchs, Birkfuchs *Germanis.*

Vos *Belgis.*

Fox *Anglis.*

Ræv, Eiter-Vnge *Danis.*

Räf *Suecis.*

Rupfok, Raude, Zhiaepok, Vielgok *Lapponibus.*

Lis, Liszka *Polonis.*

Лисъ (*Lis'*) (*mas*) Лисица (*Lisitza*) (*femina*) *Russis.*

Tülk *Bucharice.*

Schulak *Tungusis.*

Unagin *Buräzis.*

Tschafshea, Ahlinges *Kamtschadalis.*

ذئب (Taaleb) ذئبين (Dorén) *Aegyptiis.*

Tulki *Persis.*

Nari *Malabarice.*

Gjambâcaha *Grendice.*

Quassi *Guineensibus.*

Terrianiak *Groenlandis.*

Longitudo corporis paullatam supra 2 pedes. Caput latum, rostro acuto, fronte plana. Oculi oblique fissi, fusci, splendentes. Auriculæ acutæ, erectæ. Corpus large pilosum. Cauda crassa, recta, villosa. Color corporis fulvus, labiis, gula, striaque longitudinali pedum, caudæque apice albis, pedibus anticis auricularumque apicibus nigris. Pectus cum ventre cinereum. Raro totus albus.

Habitat in Europa, Asia boreali et australi, Africa. Antra fodit, animal astutissimum. Sævit noctu in Agnos, Anseres, Gallinas, Auiculas, non Accipitres foetidioresque. Superflua desodit. Edit quoque stercora animalium. Pinguescit vis, maximeque mel amat. Non rapit facile in prædio quod inhabitat. Apricatur in sole. Pruriens noctu clamitat mense Februario. Gravida 9 hebdom. parit 5-8 coecos, interdum etiam bis in anno. Adolefcit anno secundo. Aetas 13-14 annorum. Bombardas explosas odoremque pulveris pyrii fugit. Pellitur fumo. Frigore nasum cauda obuoluit. Ludit sæpe cum cauda. Urinam foetidissimam intra terræ caueam mittit terraque tegit. Foetet maxime infra caudam. Vox quasi latratus. Caro passim esculenta. Pellis bona. Haud bene mansuescit. Morsus malus, grauis, perniciosus.

Coire cum Cane familiari cl. *Blumenb. gen. hum. var. p. II* alique, sed hybridos ex Vulpe et Cane haud obtinuit perill. *Bullonius.*

Alopex.

- Alopex. 6. C. cauda recta: apice nigro.
 Vulpes villo denfiore et nigricante *Gefn. quadrup. p.*
1082.
 Canis cauda recta extremitate nigra *Linn. syst. nat. 6*
p. 5 n. 5.
 Canis cauda recta extremitate nigra. The Canis,
 with a straight tail black at the tip: the larger Fox
Hill anim. p. 554.
 Der gemeine Fuchs; Brandfuchse *Hall. vierf. p. 501.*
 Der Brandfuchs *Hall. vierf. p. 504.*
 Canis (Alopex) cauda recta: apice nigro *Linn. syst.*
nat. 10, I p. 40 n. 5.
 Renards charbonniers *Buff. hist. nat. VII p. 82.*
 Hond met een regte Staart, zwart aan't end *Houtt.*
nat. hist. II p. 92.
 Canis (Alopex) cauda recta: apice nigro *Linn. syst.*
nat. 12, I p. 59 n. 5.
 The Brant Fox *Penn. syn. quadr. p. 152 n. 112 d.*
 Der Feldfuchs *Müll. Naturf. I p. 226.*
 Der Brandfuchs: Canis Alopex *Schreb. Säugth. III*
p. 358 n. 6 tab. 91 fig. propria.
 Renard charbonnier in *Burgundia.*
 Köhler, Kohlbrenner, Brandfuchs *Germanis.*
 Brandräf *Suecis.*

Hic et sequentes 7, 8, 9, 10, 11 cum Vulpe in vnicam speciem a pluribus auctoribus contrahuntur.

Differt a Vulpe colore magis ex ferrugineo nigricante, cauda obscuriore: apice nigricante pilis paucioribus albis. Paulo minor Vulpe est.

Amat montosa, rariorque Vulpe est, cui moribus similis. Pellis minus bona.

Karagan. 7. *C. cauda recta*, corpore griseo.

Karagan (Schwarzohr) *Pallas Reis. I p. 199.*

Steppenfüchse (Karagan) *Pallas Reis. I p. 234.*

Der Karagan *Schreb. Säugth. III p. 359 n. 7.*

Colore griseo, lupino.

Habitat in desertis calmyccis et kirgificis. Animal
subobscurum.

Corfac. 8. *C. cauda recta fulva basi apiceque nigra.*

Canis (Corfac) cauda fulva basi apiceque nigra *Linn.*

syst. nat. 12, III p. 223.

Korlaki eine Art kleiner Füchse *Rytzschk. Orenb. I p.*

232.

The Corfac Fox *Penn. syn. quadr. p. 154 n. 112 s.*

Der Korlak: *Canis Corfac Schreb. Säugth. III p. 359*

n. 8 tab. 91 B fig. propria.

Der Wolfshund *Müll. Naturf. Suppl. p. 28.*

Каракаб (Korlak) *Ruffis.*

Korlak *Kirgisis.*

Corpus facie Vulpis, quo tamen minor: pilis molli-
bus, supra hieme griseis, aestate vero dilute ful-
vis; subtus albis. Cauda pilosa, longitudine cor-
poris, dorso concolor, nisi quod basis atque apex
nigricantes sint. Pedes dilute fulvi. Gula alba.
Auriculae breues, erectae, dorso concolores. Oculi
luteo-virides. Orbitae albicantes. Stria fusca
vtrinque ab oculis ad nares.

Habitat in campis magni deserti a Iatico fluuio ver-
sus Irtim, innumera copia. Saeuit in Aues. Ter-
ram excauat. Superflua defodit. Foetet, clami-
tat, latrat. Pellis Kirgisis monetae loco est.

cinereo-

- cinereo · 9. C. cauda recta corpore cinereo: collo late-
argente- ribus fuluo.
us. Der Grisfuchs: *Canis cinereo - argenteus Schreb.*
Säugeth. III p. 360 n. 9 tab. 92 fig. propria.
Der Silberhund *Müll. Naturf. Suppl. p. 29.*

Minor Vulpe. Vertex, collum et dorsum mixtum
ex griseo nigro alboque: pilis mollioribus albidis,
fortioribus nigro alboque annulatis. Auriculæ
extus ferrugineæ, apicibus nigricantibus. Ma-
cula fulva circa auriculas et in cõlli lateribus.
Gula, pectus, venterque alba. Pedes extus fulvi;
in anterioribus antice linea ex albo nigroque
mixta, infra latior. Pedes posteriores intus striâ
alba in nigricantem infra desinens postice. Cauda
fusca, sublutea.

*Habitat in America boreali. Forte idem cum se-
quente.*

- virginia- 10. C. cauda recta, corpore ex cinereo albi-
nus. cante.

The Fox of Carolina *Lawson Carol. p. 125.*

The Gray Fox *Catesb. Carol. II p. 78 tab. 78.*

The Fox *Brick. North-Carol. p. 124.*

Renards *Charlev. nouv. Fr. III p. 133?*

Vulpes cinereus Americanus *Klein. quadrup. p. 71.*

Le Renard gris: *Canis (Vulpes cinerea) ex cinereo
argenteus Briss. regn. an. p. 241 n. 7.*

Der Amerikanische Silberfuchs *Hall. vierf. p. 505.*

Renard *Du Pratz Louis. II p. 92.*

Die erste Art Füchse in Surinam, Quassi *Fermin
Surin. II p. 91?*

The grey Fox *Penn. syn. quadr. p. 157 n. 114.*

The silvery Fox *Penn. syn. quadr. p. 157 n. 115?*

Der virginische Fuchs: *Canis Virginianus Schreb. Säugth. III p. 361 n. 10 tab. 92 B fig. Catesb.*

Totus ex cinereo albicans, nisi quod paullulum rufescat circa aures. Rostrum acutum. Auriculae longae, erectae. Crura longiora.

Habitat in Carolina et reliquis calidioribus terris Americae borealis. Numquam fodit terram, sed degit in cauis arboribus. Olfactus debilis. Venatur aues. Facile mansuescit.

Lagopus. II. C. cauda recta, palmis plantisque pilosissimis.

Vulpes alba Aldrov. digit. p. 222 fig. mediocr.

Vulpes alba Ionst. quadrup. p. 133.

Vulpeculae cinereae Scheff. Lappon. p. 340.

Fuchs Mart. Spitzb. p. 72 tab. O. fig. b mala.

Les Renards Egede Groenl. p. 45.

Weisse Füchse Strahlenb. Af. p. 355.

Canis cauda recta unicolore Linn. syst. nat. 6 p. 5 n. 7.

Canis cauda recta unicolore. The Canis, with a straight tail all of one colour: the Siberian Fox Hill anim. p. 554 tab. 27 fig. mediocr.

Weisse und blaue Füchse I. G. Gmelin. Sibir. III p. 214.

Isatis I. G. Gmelin: Nou. comm. petrop. V. p. 358.

Le Renard blanc: Canis (Vulpes alba) hieme albus, aestate ex cinereo caerulefcens Briff. regn. an. p. 241 n. 8.

Der blaue Fuchs Hall. vierf. p. 504.

Der weisse Fuchs Hall. vierf. p. 504.

Canis (Lagopus) cauda recta: apice concolore Linn. syst. nat. 10, I p. 40 n. 6.

Steinfüchse *Müll. Samml. III p. 539.*

Hond met een rechte Staart; die aan 't end van de Zelfde kleur is *Houtt. nat. hist. II p. 93.*

Canis (Lagopus) cauda recta apice concolore *Linn. fn. suec. 2 p. 4 n. 8.*

L'Hatis *Buff. hist. nat. XIII p. 272.*

Ifatis *Bom. dictioun. II p. 608.*

Die Füchse *Cranz Groenl. p. 97.*

Canis (Lagopus) cauda recta: apice concolore *Linn. syst. nat. 12, I p. 59 n. 6.*

The arctic Fox *Penn. syn. quadr. p. 155 n. 113 tab. 17 fig. 1.*

Arctic Fox *Forster: Philos. transact. LXII p. 370.*

Der Hafenfuchs *Müll. Naturf. I p. 226.*

Pesci oder weisse Steinfüchse *Stell. Kamtsch p. 126.*

Der Steinfuchs: Canis Lagopus *Schreb. Säugth. III p. 362 n. 11 tab. 93 fig. Pennanti.*

Canis (Lagopus) cauda recta: apice concolore *Müll. Dan. prodr. p. 2 n. 7.*

Field-Rak, Mel-Rak *Noruegis.*

Fiäll-Racka *Succis. Bläräf (varietas caerulefcens).*

Nial *Lapponibus.*

Пеceгb (Pezetz) *Ruffis.*

Longitudo corporis 22 pollicum, caudae 11 - 12 $\frac{1}{2}$ poll. Figura canina potius, quam vulpina. Caput latum, rostro acuto breui. Auriculae fere rotundatae. Pedes breues, densissime pilosi vt in Lepore. Pollex palmarum distans a reliquis digitis. Corpus pilis vulpinis mollioribus, coloris plerumque candidi, interdum cinerei. Cutis denudata nigra ad nares et in maxilla inferiore. Cauda brevior ac in Vulpe, at pilosior. Folliculus putorius nullus ad anum, nec odor vulpinus, vel saltem debilis.

Habitat ad omne mare glaciæ frequentissimus, atque in America boreali; in nudis montibus, non in filuis. Degit in cuniculis, aut vnico pare cohabitante, aut tribus vel quatuor. Cuniculi multi-fores, aperturis octo ad decem. Cubile muscis mollioribus stratum. Edit Lemmôs, Mures, Anferes, etc. fame coactus baccas, testacea. Calidissimum animal, raro integrum annum in eodem loco degens. Latratus vulpinus, voce magis rauca ac Canis; interdum etiam eiulat. Prurit mense Martio, grauida per nouem hebdomades. Parit sub fine Maii 6, 7, 8 (an ad 25? sic I. G. Gmêlin). Hieme pilis longioribus donatur, qui defluunt mense Iunio. Catuli nigri sunt.

Pellis proba, imprimis caerulea, id est cinerea, eo semper magis aestimata, quô magis ad nigrum accedit color.

Vulpes crucigera; cruce nigra in dorso, linea transversali per humeros ducta:

Vulpes crucigera *Schwenckf. theriotr. p. 135.*

Vulpes crucigera *Aldrov. digit. p. 221 fig. mediocr.*

Vulpes crucigera *Iouft. quadrup. p. 133.*

Ein Kreutzfuchs *Gesn. Thierb. p. 126 cum fig. mediocri.*

Vuipæculæ cruce notatæ *Scheff. Lapon. p. 340.*

Vulpes super dorsum crucigeræ *Klein. quadrup. p. 71.*

Le Renard croisé: Canis (*Vulpes crucigera*) fuluus, cruce nigram in dorso gerens *Briss. regn. an. p. 241 n. 6.*

Der Kreutzfuchs *Hall. vierf. p. 504.*

Kreutzfuchse *Müll. Samml. III p. 534.*

The Cross Fox *Penn. syn. quadr. p. 152 n. 112 β.*

Korfsräf *Suecis.*

Крестовка. (Krestowka) *Ruffis.*

Kartal *Tungusis.*

Hanc non Lagopodis, sed Vulpis varietatem esse Pennantus asserit. Forte dantur crucigeræ in utraque specie.

aureus. 12. C. cauda recta, corpore pallide fuluo.

Θως *Arist. hist. anim. II. c. 19 n. 150. VI. c. 35 n.*

426-428. *IX. c. 70 n. 473-475.*

Thoes *Plin. hist. nat. VIII. c. 34 (c. 52 Hard.). X*

c. 74 (c. 95 Hard.).

Θως *Aelian. anim. I. c. 7.*

Λυκος ξυδος *Oppian. cyneg. III, 296.*

Λυκος χρυσος *Oppian. cyneg. III, 314.*

Thoes *Gesn. quadrup. p. 766.*

Asiaticum animal Adil nuncupatum *Bellon. obs. p.*

160.

Schakal eine Art Füchse *Olear. Reif. p. 413.*

Le Schekal *Boull. voy. p. 254.*

Lupus aureus *Charlet. exerc. p. 15.*

Lupus aureus *Rai. syn. quadr. p. 174.*

Iackal *Barbot Guin. p. 209.*

Sjakallen of wilde honden *Bruin Reiz. p. 321.*

Lupus aureus *Kaempf. amoen. exot. p. 413 fig. p. 407,*

n. 3 mala.

The Deeb or Iackall *Shaw trav. p. 247.*

Canis Lupus aureus dictus *Linn. syst. nat. 6 p. 5*

n. 3.

Lupus aureus *Klein. quadrup. p. 70.*

Canis rostro angustiore. The Canis, with a slender snout; the Iackall *Hill anim. p. 552 tab. 27*
fig. mediocr.

Le Loup doré; Canis (Lupus aureus) flavus *Briff.*

regn. an. p. 237 n. 3.

Iackalls

Iackalls, *Ruff. Aleppo* p. 60.

Canis Chical Turcarum *Hasselqu. Palaeft.* p. 271.

Der Zwerg- oder Goldwolf *Hall. vierf.* p. 500.

Canis (aureus) Lupus aureus dictus *Linn. syst. nat.*
10, I p. 40 n. 7.

Adil *Dictionn. anim.* I p. 52.

Iackals *Dictionn. anim.* II p. 514.

Loup doré *Dictionn. anim.* II p. 708.

Iakhals: Hond, de Gulden Wolf genaamd *Houtt.*
nat. hist. II p. 93.

The Iackals *Bell. trav.* I p. 53.

Adil *Bom. dictionn.* I p. 57.

Chacal *Bom. dictionn.* I p. 470.

Iackal *Bom. dictionn.* II p. 562.

Le Chacal *Buff. hist. nat.* XIII p. 255.

L'Adive *Buff. hist. nat.* XIII p. 255?

Canis (aureus) Lupus aureus dictus *Linn. syst. nat.*
12, I p. 57 n. 7.

The Iackal *Penn. syn. quadr.* p. 158 n. 116.

Der Goldwolf *Müll. Naturf.* I p. 227 tab. 30 fig. 1.

Der Schakal *S. G. Gmelin Reis.* III p. 80 tab. 13
fig. mala.

Der Schakall: Canis aureus *Schreb. Säugtb.* III p. 365
n. 12 tab. 94 fig. propr.

Squilachi *Graecis hodiernis*

Sjéchaal *Persis.*

Chical *Turcis.*

دیب (Deeb), چخال (Chathal) in *Barbaria.*

Kádtu - narâ *ramulice.*

Gôlâ *Indis.*

Figura fere Lupi, magnitudine inter Lupum ac Vulpem, pedibus tamen longioribus quam hic: longitudo corporis circiter 3 pedum. Caput supra saluum mixtis pilis longis griseis nigro annulatis. Labium superius ad utrumque latus album. Gula alba. Vibrillae oris, menti et oculorum quinque nigrae.

nigrae. Auriculae extus fulvae, intus albae. Collum et dorsum ex cinereo flauum, umbra pilorum longiorum apice nigrorum. Corpus subtus et pedes pallide fului, cruribus ac femoribus fuluis. Ungues nigri, pollicis altius posito incuruato. Cauda recta, paullo longior et villosior quam in Lupo, ex griseo flaua apice fuluescente pilis longioribus apice nigris, ut caudae ipse apex niger appareat. Pili rigidiores ac in Lupo, lanugine grisea. Dentibus primores intermedii quatuor obtrase truncati; extimi maiores: supra conici, infra rotundati. Laniarii superiores paullo maiores inferioribus. Molares utrinque sex, antico minimo, quarto supra et quinto infra maximo. Lingua ciliata. Femina minor mare. Mammae sex vel octo.

Habitat in Oriente, India orientali, Africa boreali. Die latet in montibus siluisque, noctu cateruatim ad 200 vrbes villasque ingreditur, furto deditus. Lente incedit capite dependente; at praeda aliqua detecta celerrime currit. Vix adultos inuadit, pueros trucidat. Edit animalia minora, aues, cibaria varia, corium, fructus, radices, cadauera e terra effodienda. Vno clamante clamant remoti alii, ululatu execrabili, quasi ciulatu latiatu intercepto. Coit canino more verno tempore. Parit quinque ad octo. Valde mansuescit. Moschum olet?

Latratu exagitare dicitur feras, hoc audientes reliqui in exercitum concurrunt, prosequuntur miserum ceruum, dum Leo Tigrisue ex insidiis fugientem prosternit praedamque vorat, circumfidente venatorum corona, usque dum Rex satiatus discesserit; nisi forte fabula sit. Inde Anglis *the Lion's provider*, Gallis *Le Pourvoyeur du Lion* dicitur.

Videtur

Videtur Simfonis Vulpecula, nec non veterum $\Theta\omega\varsigma$; hunc tamen amicissimum homini animal esse, eique adeo succurrere habent.

Canem familiarem ferum esse putat celeb. Pallas spicil. XI p. 3.

Mesomelas. 13. C. cauda recta, corpore ferrugineo fascia dorsali nigra.

Iackhals *Kolbe Vorgeb. p. 150.*

Le Chacal *Buff. hist. nat. XIII p. 268?*

Der capische Schakall: *Canis Mesomelas Schreb.*

Säugeth. III p. 370 n. 13 tab. 95 fig. propr.

Tenlie, Kēnlee *Hottentotis.*

Facies vulpina. Longitudo corporis $2\frac{3}{4}$ pedum, caudae pedis vnius. Caput ferrugineum admixto albo nigroque, postice nigricans. Vibrissae nigrae. Corpus supra ferrugineum. Fascia nigra dorsalis a nucha vsque ad caudam, albo undulata, in humeris latissima. Gula, collum subtus, pectus et venter albicant. Cauda supra ferruginea cum linea longitudinali nigra apicem non attingente; subtus nigra annulis aliquot pallidioribus.

Habitat vulgaris ad caput bonae spei.

Thous. 14. C. cauda deflexa laeui, corpore subgriseo subtus albo.

Canis ferus maior canerosus vulgo dictus. Koupara Barr. Fr. équ p. 149?

Canis (Thous) cauda deflexa laeui, corpore subgriseo subtus albo Linn. syst. nat. 12, I p. 60 n. 9.

Die (Füchse) von der zwoten Art Fermin Surin. II p. 92?

The Surinam Dog *Penn. syn. quadr. p. 160 n. 117.*

Der surinamische Fuchs *Müll. Naturf. I p. 228.*

Der surinamische Fuchs *Schreb. Säugth. III p. 371 n. 14.*

Corpus griseum, subtus totum album, magnitudine Cati maioris. Auriculæ concolores erectæ. Verruca supra oculos, in buccis, sub gula. Lingua lateribus ciliata. Pedes 5-4.

Habitat in Surinamo.

Hyaena. 15. C. cauda recta, pilis cervicis erectis, auriculis nudis, pedibus tetradactylis.

Ἰαυνα, Γλαυός Arist. hist. anim. VI c. 32 n. 401-406. VIII c. 9 n. 102.

Hyaena *Plin. hist. nat. VIII c. 30 (c. 44 Hard.) XI c. 37 (c. 55, 67 Hard.). XXVIII c. 8 (c. 27 Hard.).*

Ἰαυνα Aelian. anim. I c. 25. III c. 7. VI c. 14. VII c. 22.

Ἰαυνα Oppian. cynege. III, 263.

Hyaena *Gesn. quadrup. p. 624 fig. mala.*

Papio *Gesn. quadrup. p. 630 quem confundit cum Hyaena.*

Lupus marinus *Bellon. aquat. p. 33 fig. p. 34 mediocr.*

Animal necrophagum, siue iesef, seu hyaena *Nieremb. hist. nat. p. 181.*

Zilio Hyaena *Ionst. quadrup. tab. 56 fig. mala.*

Hyaena *Ionst. quadrup. tab. 56 fig. pessima.*

Lupus Marinus *Gesneri et Bellonii Ionst. quadrup. tab. 57 fig. Bellon.*

Hyaena *Ionst. quadrup. tab. 57 fig. mala.*

Der Vielfraß. Grabthier *Gesn. Thierb. p. 356 cum fig. mala.*

Der Indianische Vielfraß *Gesn. Thierb. p. 357.*

Lupus Marinus ein Meerwolf *Gesn. Thierb. p. 359*
cum fig. Bellonii.

Lupus Marinus *Charlet. exerc. p. 15?*

Dabuh Arabum, Africanis Sesele dicta *Charlet. exerc.*
p. 15.

Kaftaar i. e. Taxus porcinus, siue Hyena veterum
Kaempf. amoen. exot. p. 411 fig. p. 407 n. 4
 mala.

The Dubbah or Hyaena *Sbaew trav. p. 246.*

Indianischer Wolf *Riding. tabula peculiari, fig. bona.*

Canis pilis ceruicis erectis longioribus *Lin. syst. nat.*
6 p. 5 n. 4.

Canis pilis ceruicis erectis longioribus. The Canis,
 with the hairs of the neck long and erect: the
 Hyaena *Hill anim. p. 553.*

L'Hycne: Hyaena *Briff. regn. an. p. 233 n. 1* con-
 fundit cum Mustela Gulone.

Canis pilis ceruicis erectis longioribus *Kram. Austr.*
p. 373.

Hyaena *Ruff. Aleppo p. 59.*

Der Meerwolf *Hall. vierf. p. 500.*

Canis (Hyaena) cauda recta annulata, pilis cerui-
 cis erectis, auriculis nudis *Lin. syst. nat. 10, I*
p. 40 n. 3.

Hyene *Dictionn. anim. II p. 508.*

Hond met een regte gebandeerde Staart, de Hairen
 in de Neck overend staande, de Ooren kaal *Houtt.*
nat. hist. II p. 83.

L'Hyæne *Buff. hist. nat. IX p. 268 tab. 25.*

Hyene *Bom. dictionn. II p. 552.*

Canis (Hyaena) cauda recta annulata, pilis ceruicis
 erectis, auriculis nudis, palmis tetradactylis *Lin.*
syst. nat. 12, I p. 58 n. 3.

Die Hyaene *Berl. Samml. II p. 186 cum fig.*

The striped Hyaena *Penn. syn. quadr. p. 161 n. 118.*

Iena

Skiddebrand nov. act. Ups. vol. 1.

Jo Fr Miller fase. IV. tab. XIX fig. A.

Bruce T. V. tab. 26.

ménagerie du muséum national III.

Iena Aless. quadrup. I tab. 22 fig. Buff.

Die Hyaena Müll. Naturf. I p. 222 tab. 31 fig. 3.

Hyaena Forsk. fn. orient. p. III.

*Die Hyäne: Canis Hyaena Schreb. Säugth. III p. 371
n. 15 tab. 96 fig. le Bassi.*

Hyena Hispanis.

Hyena Lusitanis.

Iena Italis.

Hyene Gallis.

Hyäne Germanis.

Hyena Anglis.

ذئب (Dabbá) Aegyptiis.

Dubbah in Africa boreali.

Kastaar Persis.

Magnitudo Lupi: longitudine corporis 3 ped. et ultra; facies Apri. Collum crassum. Pili dorsi subspithamei, erecti albidii, apicibus nigris. Caput lupinum, crassum, rostro acuto, nigricans. Oculi rostro propinquiores, nigri. Auriculae erectae, longae, acutae, nudaе. Cauda longius pilosa, interdum annulis nigricantibus verticillata. Crura annulis nigris variegata. Pili corporis duriores, longi, albidii. Striae corporis fuscae et nigrae transversales, a dorso ad ventrem ductae. Pedes 4-4. Penis ossē nullo. Folliculus putorius supra anum. Mammae ventrales quatuor.

Habitat in Oriente, Persia, Africa boreali.

Excavat terram degitque in antris solitaria. Crudelis atque ferox, aspectu maligna, ipsi Leoni resistit. Diutius sine cibo vivit; in humana cadauera saevit, quae e tumulis effodit, coemeteriis infesta. Carne deficiente radices palmarumque ramos iuniores edit. Quidquid irritata oreprehendit, mor-

dica tenet nec viua dimittit pertinacissima. Haud mansuescit. Vox grauis rauca, quasi hominis vomiturientis. Veteribus sexum mutabat, ceruice rigida donata, humanam vocem imitabatur, fasciabat opiliones.

Arabes carnem ad vsus medicos adhibent.

Coniungendam forte genere Hyaenam cum Mele doctissimus Schreberus monet; Pennantus a Cano distinguit Hyaenae genus.

Crocuta. 16. C. cauda recta, corpore nigro maculato, pedibus tetradactylis.

Hyaena siue congener illi Crocuta *Ludolf. Aeth. L. Ic. 10 n. 50. Comment. p. 152.*

The Quumbengo *Barbot Guin. p. 486.*

Iachhals oder Boshond *Bossm. Guin. p. 291.*

Tigerwolf *Kolbe Vorgeb. p. 171 tab. 6 fig. 5?*

The spotted Hyaena *Penn. Syn. quadr. p. 162 n. 119 tab. 17 fig. 2.*

Spotted Hyaena *Schreb. Säugth. III p. 374.*

Zubbi Kabegia. v. Salt in Valentin's voyages &c vol. II. p. 498.

Caput magnum, planum. Vibrissae aliquot supra utrumque oculum, longioresque ad latera nasi. Auriculae breues, subacuminatae, extus nigrae, intus cinerae. Facies et caput supra nigra. Iuba breuis, nigra. Corpus pilis breuibus, mollibus; cum artibus rufo-fuscum maculis rotundis nigris. Crura postica striis transuersis nigris. Cauda brevis, nigra, villosa.

Habitat in Guinea, Aethiopia, ad caput bonae spei in terrae rupiumque caueis. Noctu praedatur oves, sepulchra adit voratque cadauera; ipsosque homines adoritur. Vox terribilis.

Animal

Animal paucis visum ex viuo exemplo descripsit
Pennantus, distinguendum ab antecedente.

46. P H O C A.

Dentes Primores Superiores VI paralleli: exte-
riores maiores.

Inferiores IV paralleli, distin-
cti, aequales, obtusiusculi.

Laniarii solitarii: superiores a primo-
ribus, inferiores a molaribus remo-
ti, primoribus longiores.

Molares V s. VI, tricuspидati.

Auriculae nullae (plurimis).

Corpus postice gracilescens.

Pedes pentadactyli: postici coaliti.

ursina. 1. P. capite auriculato.

Ursus marinus *Steller: Nou. comment. petrop. II p.*
331 tab. 15.

Der Seebär *Steller: Hamb. Mag. XI p. 264 cum fig.*
comm. petrop.

Der Seebär *Hall. vierf. p. 585.*

Phoca (ursina) capite auriculato *Linn. syst. nat. 10, 1*
p. 37 n. 1.

Seekatzen *Müll. Samml. III p. 249.*

Zee-Beer: Rob met Ooren aan den Kop *Houtt. nat.*
bist. II p. 3.

PHOCAE genus sub aqua natat, vix incedit ob pedes anticos re-
tractos, posticos unitos: vicitat piscibus; pingue. Aurium
foramina valuula triangulari claudenda sub aqua, nares contra-
hendae. Linguam binadam habet.

Ours marin *Bon. dictionn. III p. 318.*

Phoca (ursina) capite auriculato *Linn. syst. nat. 12, I p. 55 n. 1.*

The urfine Seal *Penn. syn. quadr. p. 344 n. 271.*

Der Seebär *Müll. Naturf. I p. 195.*

Der Seebär *Stell. Kamtsch. p. 97.*

Der Seebär: Phoca ursina *Schreb. Sängtb. III p. 289 n. 1 tab. 82 fig Stelleri.*

Морской котъ (Morskoi kot) *Ruffis. Выпорошки (Wiporotki) (ex utero exseciti embryones).*

Tarlatfhega *in sinu penschinico.*

Longitudo corporis nouem pedum. Caput ursinum, at crassius et rotundius. Labia tumida, intus rubra atque ferrata. Lingua longa, angusta, papillis acutis, bifida. Vibrissae albae, longae crassaeque. Nares lunatae. Apex nasi cute nigra, nuda, rugosa tectus. Oculi magni, prominentes: iride nigra, pupilla smaragdina, membrana carnosa tegendi. Auriculae paruae, acutae, extus pilosae, intus laeues, sub aqua occludendae. Collum crassum. Corpus postice gracilescens. Palmae digitis quinque magnitudine decrefcentibus: unguibus minutis, Plantae multo longiores: digitis quatuor prioribus aequalibus, quinto minore: unguibus tribus interioribus rotundatis, duobus externis minutis. Cauda breuissima. Cutis crassa, pilis densis. Mares nigri, apicibus pilorum griseis in senioribus; feminae cinereae. Mammae abdominales duae. Penis osse instructus.

Habitat in Kamtschatkae maritimis inter Asiam et Americam proximam, primario in insula Beringii. A Iunio ad Septembriam inhabitant insulas inter utrumque orbem, in quibus coeunt atque pariunt; mense Septembri emaciatae adeunt lito-

ra asiatica atque americana inter gradum latitudinis 50 et 56.

Impetuofissime natant. Mares polygami gregatim degunt cum 8-50 vxoribus, filiis, filiabus ad 120; coeunt vespera in litore resupinata femina. Vterum fert nouem menses. Parit Iunio mense vnicum, raro duo. Nascitur oculis apertis, omnibusque dentibus instructa exceptis laniariis. Vix metuunt hominem. Mordent proiectum lapidem maxime irascibiles. Senes elumbes quiescunt pingues semperque fere dormientes; proprium lapidem pro lecto habent, quem non deserunt. Bella instituunt propter vxores, lectum, acquum et iustum; succumbente vno accurrit alter opem laturus, mox alteri alius, ne duo contra vnum, vsque dum omnes praelio inuoluti. Vxores victi brabea sunt victoris. Mares prolem mire amant; crudeles in vxores timidas, nisi prolem defenderint strenue; hae vero obedientissimae; subiectissimaeque. Moesti lacrymas fundunt copiosissimas. Caro maris mala, haud esculenta, seminarum ac iuniorum sapida. Pellis adhibetur embryonum ex vtero exsectorum.

leonina. 2. P. capite antice cristato, corpore fusco.

Le Lion marin *Dampier voy. I p. 118.*

La Manate de Sainte Helene *Dampier voy. II p. 268.*

Sea-lyon *Anson voy. p. 122 cum figg. maris et feminae.*

Les Loups marins *Ullóa voy. II p. 24?*

Phoca maior, dentibus caninis tectis, palmis anterioribus digitatis, vngulatis, posterioribus latis bifidis *Parsons: Philos. transact. XLVII p. 121.*

Shelvoocke's voyage round the world (a. 1719) p. 262 ff.

Phoca (leonina) capite antice cristato *Linn. syst. nat.*

10, I p. 37 n. 2.

Lion marin *Dictioun. anim. II p. 691.*

Zee-Leeuw: Rob met een Kam van vooren aan den
Kop *Houtr. nat. hist. II p. 5.*

Le Lion marin *Buff. hist. nat. XIII p. 333, 351.*

Lion marin *Bom. dictioun. II p. 703.*

Phoca (leonina) capite antice cristato *Linn. syst. nat.*

12, I p. 55 n. 2.

Loups marinus *Pernetty voy. II p. 40 tab. 9 fig. 1.*

The leonine Seal *Penn. syn. quadr. p. 348 n. 272.*

Der Seelöwe *Müll. Naturf. I p. 197. -*

Der glatte Seelöwe: Phoca leonina *Schreb. Säugth.*

III p. 297 n. 2 tab. 83 A fig. Anson.

Longitudo corporis 15-20 pedum; at feminae mi-
niores. Naso cristato cute inflata retractili.

Corpus pilis breuibus pallide fuscis. Pedes ni-
gricantes.

Habitat ad polum antarcticum. A Iunii mensis fine
vsque ad Septembrim degit in insula Iuan Fer-
nandez, ubi in sicco parit atque sine cibo et motu
viuit. Natat gregatim. Pugnat pro feminis; ex-
cubias agit. Caro esculenta.

iubata. 3. P. capite subauriculato, collo (maris) iubato.

Leo marinus *Steller: Nou. comm. petrop. II p. 360.*

Der Seelöwe *Steller: Hamb. Mag. XI p. 451.*

Der Seelöwe *Häll. pierf. p. 593.*

Die Seelöwen *Müll. Samml. III p. 250.*

Les Lions-marins *Pernetty voy. II p. 47 tab. 10.*

Der Seelöwe *Stell. Kamtsch. p. 97.*

Der zottige Seelöwe: Phoca iubata *Schreb. Säugth.*

III p. 300 n. 3 tab. 83 B fig. Pernettii.

Phoca (leonina) capite antice cristato *Müll. Dan. prodr. p. VIII.*

Der Seelöwe: Phoca leonina *Müll. Naturf. Suppl. p. 25.*

Сивуча (Siwucza) *Ruffis.*

Blandruselr *Islandis.*

Neitferfoak. *Groenlandis.*

Longitudo corporis ad 25 pedes. Differt a Phoca leonina, a qua eam bene distinxit doctiss. Schreberus, pilis longis nuchae et colli in mare, in femina deficientibus. Caput maius ac in Phoca vrsina. Nasus magis prominens, firmus. Dentes fortiores ac in Phoca vrsina. Oculi magni, rubri in angulis, membrana nictitante instructi. Auriculæ breues, erectæ. Color totius animalis ruber vaccinus: seniores pallidiores sunt, iuniores obscuriores, feminae fere ochraceae, iuniores castaneae, nonnullae fere nigrae.

Habitat in borealibus maris pacifici, ad litora occidentalia Americae, orientalia Kamtschatkae, praecipueque in insulis propinquis. Reperitur quoque versus austrum. Edit Pisces, Phocas, Lutres, Aves aliaque animalia. Prolem minus curat. Pugnax. Polygamus, feminis tamen paucioribus quam vrsina, duabus, tribus, quatuor. Parit in sicco initio mensis Iulii unicum. Coit Augusto et Septembri, resupinata femina. Vox Bouis, iuniorum Ovis. Mares seniores graueolentes. Caro dulcis, bona, Kamtschadalis expetita.

vitulina. 4. P. capite laevi inauriculato, corpore fusco. Vitulus maris Oceani *Rondel. pisc. p. 458 cum fig. mala.*

Vitulus marinus *Ol. Magn. Sept. p. 701.*

- Phoca seu vitulus maris Oceani, Rondeletius *Gesn. aquat.* p. 829 fig. p. 830 Rondel. *aliaque mala.*
- Phoca seu Vitulus marinus *Aldrov. pisc.* p. 722 fig. p. 724 mediocr.
- Phoca seu Vitulus marinus *Ionst. pisc.* p. 221 tab. 44 figg. mediocres.
- Phoca *Mus. wormian.* p. 285.
- Le veau marin *Perr. anim.* I p. 187 tab. 27.
- Seehund den man auch Rubbe oder Sallhund nennet *Mart. Spitzb.* p. 75 tab. P fig. a mala.
- Phoca *Charlet. exerc. pisc.* p. 48.
- Phoca sine Vitulus Marinus *Sibb. Scot. an.* p. 10.
- Phoca seu Vitulus Marinus *Rai. syn. quadr.* p. 189.
- Phoca seu vitulus marinus *Rzac. Polon. auct.* p. 244.
- Chiens marins *Egede Groenl.* p. 62 cum fig. mediocr.
- Phoca dentibus caninis inclusis *Linn. syst. nat.* 2 p. 44.
- Le Loup Marin *Charlev. nouv. Fr.* III p. 143.
- Seehunde *Linn. Gotbland.* p. 270.
- Phoca dentibus caninis tectis *Linn. fn. succ.* I p. 4 n. 11.
- Seehunde *Linn. Westgoth.* p. 191.
- Der Seehund *Anderf. Island.* p. 260.
- Phoca dentibus caninis tectis *Linn. syst. nat.* 6 p. 6 n. 1.
- Phoca Oceanica *Steller: Nou. comment. petrop.* II p. 290.
- Phoca minor, dentibus caninis tectis, palmis anterioribus digitatis, vngulatis, posterioribus lais ordinariis, vngulis teretibus donatis: the common Seal *Parsons; Philos. transact.* XLVII p. 120 tab. 6.
- Phoca. Robbe *Klein. quadrup.* p. 93.
- Phoca dentibus caninis tectis. The Phoca, with the canine teeth covered: the Sea-calf *Hill anim.* p. 554 tab. 27 fig. mediocris.

Retzius Ajur - Riket tab. 1. fig. 2.

Phoca

- Phoca (communis) dentibus caninis tectis *Linn. mus. Ad. Frid. I p. 5.*
- Le Phocas ou veau marin: Phoca seu Vitulus marinus *Briff. regn. an. p. 230 n. 1.*
- Das Seekalb. Robbe *Hall. vierf. p. 579.*
- Das graue Seekalb, Skäl *Kneiff: Act. holmiens. 1757 p. 171.*
- Phoca (vitulina) dentibus lanariis tectis *Linn. syst. nat. 10, I p. 38 n. 4.*
- Seehunde *Müll. Samml. III p. 559.*
- Phocas *Dictionn. anim. III p. 416.*
- Veau marin *Dictionn. anim. IV p. 452.*
- Rob met de Hoektanden in den Bek beslooten: Rob of Zee-Hond *Houtt. nat. hist. II p. 14 tab. 11 fig. 6.*
- Phoca (vitulina) dentibus caninis tectis *Linn. fr. juec. 2 p. 2 n. 4.*
- Phoca pedibus anticis digitatis, vnguiculatis; posterioribus latis: vnguibus teretibus *Gronov. zooph. I p. 7 n. 28.*
- The Seal *Penn. brit. zool. p. 34.*
- Loup marin *Bon. dictionn. II p. 723.*
- Phocas *Bon. dictionn. III p. 442.*
- Le Phoque de nôtre ocean *Buff. hist. nat. XIII p. 333, 339.*
- Le Phoque *Buff. hist. nat. XIII p. 395 tab. 45.*
- Kassigiak *Cranz Groenl. I p. 163.*
- Phoca (vitulina) capite laevi inauriculato *Linn. syst. nat. 12, I p. 56 n. 3.*
- Seehund *Knorr. delic. II tab. Pl. 8.*
- Der Seehund *Fermin Surin. II p. 107.*
- The common Seal *Penn. syn. quadr. p. 339 n. 265.*
- Vitello marino grande *Aless. quadrup. IV tab. 171 fig. Buff.*
- Der Robbe oder Seehund *Müll. Naturf. I p. 198.*
- Eine andere Art eines Seehundes *Müll. Naturf. I p. 201 tab. 11 fig. 6 Houtt.*
- Die dritte Sorte *Stell. Kamtsch. p. 108.*

Der gemeine Seehund: *Phoca vitulina* Schreb. Säugth.

III p. 303 n. 4 tab. 84 fig. Buff.

Phoca (vitulina) capite laevi inauriculato Müll. Dan.

prodr. p. I n. 3.

Lobo marino *Hispanis.*

Vechio marino *Italica.*

Veau marin *Gallis.*

Möelrhon *Cambrensibus.*

Robbe, Seehund, Seekalb *Germanis.*

Rob, Zee-Hond *Belgis.*

Seal, Sea-calf *Anglis.*

Sælhund *Danis.*

Selr *Islandis.*

Skjal

Siäl, Wikare-Siäl *Succis.*

Alg (mas), Lagg (femina), Kut (pullus) *Ostrobotnien-sibus.*

Pies morski, Ciele morskie *Polonis.*

Шюленб (Tjulen) *Ruffis.*

Kupa *Tungusis.*

Няр *Burätis.*

Нерпа (Nerpa) *in Sibiria.*

Purfe, Kaffigiak *Groenlandis.*

Poezie is the Esquimaux word for Seal. (Cantwright & I.)

Longitudo corporis 5 - 6 pedum. Oculi magni, nigri, in frontè positi, membrana nititante instructi: humore crySTALLINO globoso. Vibriffae longae, undulatae. Labia tumida. Nares oblongae. Auriculae nullae. Caput grande. Lingua apice parum bifida. Collum crassum, breue. Corpus fere conicum, postice gracilescens, pilis breuibus densis, colore fusco, albido adsperso: dorso magis fusco, abdomine pallidiore. Seniores grisei raroque toti albi. Pedes supra et subtus pilosi. Ungues acuti. Cauda breuissima, planiuscula, obrufa. Mammæ duae abdominales, retractiles. Foramen ouale apertum.

Habitat

Habitat versus litora in mari, praecipue boreali, circa Spitzbergiam, Groenlandiam, Americam borealem, Russiam, Noruegiam, inque omni mari balthico; in litoribus Belgii, Angliae, Galliae. Forte eadem species est circa nouam Seelandiam.

Aestate in siccis degit, hieme saepius in mari; intrat quoque fluuios. Vicinat piscibus, imprimis Clupea Harengo, fucis. A Laris prouocata exspuit pisces. Dormit in lapide ex aqua eminente. Coit Aprili mense. Parit hieme (Februario mense) atque primo vere unicum pullum vel duo in arena, lapide, glacie, quem lactat per dies quatuordecim. Pulli colore albo aut flauicante hebdomade quarta mutando. Pugnant inter se propter vxores, lapides, glaciem. Vox quasi latratus raucus, iunioribus fere Cati. Moeſta lacrymas fundit. Caro Groenlandis, Americanis, Kamtschadalis esculenta, iuniorum sapida. Ictu supra nasum facillime occiditur.

Varietares huius forte sunt, nisi species distinctae:

a) Der graue Seehund *Schreb. Säugth. III p. 309.*
Gräßlial Suecis.

Longitudo pedum sex, et maior. Nasus latior. Ungues longiores. Corpus obscure griseum; interdum flauescens.

Habitat gregaria in mari balthico, sed non cum vitulina. Parit Ianuario mense in glacie pullum unicum album, qui colorem mutat die octauo, primum in capite atque palmis.

β) Seals

e) Seals *Bell trav. I p. 261.*

Die vierte Sorte Seehunde *Stell. Kamtsch. p. 108.*

Der sibirische Seehund *Schreb. Säugth. III p. 310.*

Magnitudo Phocae vitulinae, corpore toto argenteo.

Habitat in Lacu Baikal et Orok.

γ) Der Seehund *S. G. Gmelin Reif. III p. 246.*

Der caspische Seehund *Schreb. Säugth. III p. 310.*

Magnitudo Ph. vitulinae, at pinguior. Color niger, albicans, ex flavo albicans, cinereus, murinus vel tigrinus.

Habitat in mari Caspio. Caro comeditur.

groenlandica. 5. P. capite laevi inauriculato, corpore griseo lateribus luna nigra.

Syartfiide *Egede Groenl. fig. p. 62.*

Seehund mit einer schwarzen Seite *Ellis Hudf. tab. 7*

Attarfoak *Cranz Groenl. p. 163.*

The harp Seal *Penn. syn. quadr. p. 342 n. 269.*

Die andere Sorte *Stell. Kamtsch. p. 107.*

Der schwarzseitige Seehund *Schreb. Säugth. III p. 310*

n. 5:

Phoca groenlandica *Müll. Dan. prodr. p. VIII.*

Harp-Seal, Heart-Seal *Anglis.*

Vadefelur, Vadefelr *Islandk.*

Attarfoak, Atak *Groenlandis.*

Corpus longitudine novem pedum. Caput acutius ac in Ph. vitulina. Corpus crassum, maxime pingue,

pingue, ex albicante griseum, lateribus luna nigra notatis, non ante annum quintum in conspectum veniente: cornubus sursum versis. Quouis anno in quintum vsque colorem mutat, nomenque apud Groenlandos. Foetus albus lanuginosus *Iblau* est, primo anno albicans *Attarak* dicitur; altero grisea *Atteikfiak*; tertio *Aglektok*, quarto *Milekrok*, quinto *Attarsoak*.

Habitat in Groenlandia et Newfoundland, nec non circa Kamtschatkam. Forte et in lacu Baikal. Vtilissima species pelle atque oleo copiosissimo optimoque.

Migrat bis quotannis; primum Martio mense boream versus per fretum Davis, Maio redit ad Islandiam, Iuniique initio in Groenlandiam, macra. Tum deserit Groenlandiam Iulio reditque Septembri, inque Islandiam fine Decembris maxime pinguis, vnica agmen ducente, quam vocant *Robbenkönig*.

hispida. 6. P. capite laeui inauriculato, corpore pallide fusco pilis surrectis hispido.

Phoca minor, dentibus caninis testis, ceruice longiore, capite lutrae caput referente, palmis anterioribus latis non digitatis, posterioribus latis ordinariis: the long-neckd Seal *Parsons: Philos. transact. XLVII p. 120 tab. 6?*

Neitsek Cranz Groenl. p. 164.

The rough Seal *Penn. syn. quadr. p. 341 n. 267.*

Der rauhe Seehund: Phoca hispida *Schreb. Säugth.*

III p. 312 n. 6 tab. 86 fig. propr.

Der rauhe Seehund *Müll. Naturf. Supplem. p. 26.*

Phoca foetida *Müll. Dan. prodr. p. VIII.*

Utselr *Islandis.*

Neitsek Groenlandis.

Magnitudo praecedentis. Pili surrecti fere Porci setae. Color pallide fuscus, circa oculos nigricans.

Habitat in Groenlandia et Labrador.

eristata. 7. P. capite antice cristato, corpore griseo.

Le Klap-myssen. *Egede Groenl. p. 62.*

Klapmüts *Egede Groenl. fig. p. 62.*

Seehund mit einer Haube *Ellis Hudf. tab. 7.*

Neiterfoak *Cranz Groenl. p. 164.*

The hooded Seal *Penn. syn. quadr. p. 342 n. 268.*

Die Klpppmütze *Schreb. Säugth. III p. 312 n. 7.*

Neiterfoak *Groenlandis.*

Multo maior antecedentibus. Frons cute forti, plicata, retractili supra oculos et nares. Color pulchre griseus: pilis albis, lanugine densa nigra.

Habitat in Groenlandia australiori et Newfoundland.

Non occidenda, istu capitis, nisi detrahatur antea cutis frontis.

Num forte idem animal cum Phoca leonina?

barbata. 8. P. capite laevi inauriculato, corpore nigricante.

The Phoca: Vitulus marinus or Sea-Calf *Parsons:*

Philos. transact. n. 469 p. 383 tab. I fig. I.

Phoca maxima *Steller: Nou. comm. petrop. II p. 290.*

Phoca maior, dentibus caninis tectis, palmis anterioribus digitatis, unguulatis, posterioribus latis ordinariis, corpore longiore: the long-bodied Seal

Parsons: Philos. transact. XLVII p. 121.

Seehunde von der größten Art, die in Kamtschatka

Lachtak genannt werden Müll. Samml. III p. 250.

Le grand Phoque Buff. hist. nat. XIII p. 333, 343.

Ukfuk Cranz Groenl. p. 165.

The great Seal Penn. syn. quadr. p. 341 n. 266.

Der große Seehund Schreb. Säugth. III p. 313 n. 8.

Phoca barbata Müll. Dan. prodr. p. VIII.

Gransfelr Islandis.

Lachtak in Kamtschatka.

Ukfuk, Urkfuk Groenlandis.

Similis vitulinae, at longitudo corporis 12 pedum.

Cutis densa, pilis nigricantibus.

Habitat ad Scotiam atque Groenlandiam australiorem,
vulgaris circa Islandiam. Parit Nouembri atque
Decembri pullos albos.

An femina praecedentis?

pufilla.

9. P. capite lacui subauriculato, corpore fusco.

Φωκη Arist. hist. anim. I c. 2 n. 12 c. 23 n. 210. II

c. 4 n. 14, 19. c. 11 n. 68. c. 18 n. 130, 134.

c. 20 n. 158. III c. 16 n. 237. V c. 2 n. 25.

VI c. 11 n. 126-135.

Vitulus marinus Plin. hist. nat. VIII c. 31 (c. 49

Hard.). IX c. 12, 13 (c. 14, 15 Hard.). XI c. 37

(c. 50, 55, 75, 87 Hard.) c. 40 (c. 95 Hard.).

Phoca Plin. hist. nat. IX c. 7 (c. 6 Hard.). XI c. 37

(c. 72 Hard.).

Φωκη Aelian. anim. IX c. 9, 50.

Vitulus marinus Bellon. aquar. p. 19 fig. p. 21? mal.

Vitulus maris mediterranei Rondelet. pisc. p. 453 cum
fig. mala.

Phoca seu vitulus maris mediterranei Rondeletius Gesn.

aquar. p. 827 cum fig. Rondelet.

Les veaux marins *Dampier voy. I p. 116?*

Phoca minor, dentibus caninis testis, palmis anterioribus digitatis, unguulatis, posterioribus latis ordinariis, collo constricto, capite testudiniformi: the tortoise-headed Seal *Parsons: Philos. transact. XLVII p. 120 tab. 6?*

Loup marin *Vlloa voy. II p. 2? 26?*

Zee-Kalf in de Middellandsche Zee gevangen *Houtt. nat. hist. II p. 16 tab. 11 fig. 5.*

Le petit Phoque noir *Buff. hist. nat. XIII p. 333.*

Le petit Phoque *Buff. hist. nat. XIII tab. 53.*

Le Phoque de la Méditerranée et des mers du Midi *Buff. hist. nat. XIII p. 340.*

The little Seal *Penn. syn. quadr. p. 343 n. 270.*

Vitello marino picciolo *Aless. quadrup. IV tab. 171 fig. Buff.*

Müll. Naturf. I tab. 11 fig. 5 Houtt.

Der kleine geöhrte Seehund: Phoca pusilla *Schreb. Säugth. III p. 314 n. 9 tab. 85 fig. Buff.*

Der kleine Seehund *Müll. Naturf. Suppl. p. 26.*

Longitudo corporis 2-3 pedum. Dentes primores quatuor intermedii superiores bifurcati, inferiores duo intermedii leuiter trifurcati. Rudimentum auricularum. Pinnae inter digitos ultra hos atque ungues prominentes. Pili molles, longiores acin P. vitulina. Corpus fuscum, subtus pallidius.

Habitat in Oceano, mari mediterraneo, ad insulam Iuan Fernandez; non in India, vti Buffonio. Haec veterum Phoca videtur.

47. TRICHECHVS.

Dentes Primores nulli utrinque.

Laniarii superiores solitarii.

Molares ex osse rugoso utrinque; inferiorius duo (*utrinque quatuor secundum Pennantium*).

Labia geminata, filia.

Auriculae nullae.

Pedes digitati pentadactyli palmati: posteriores compedes coadunati in pinnam.

Rosmarus. 1. T. dentibus laniariis superioribus exsertis longioribus.

Rosmarus siue Morsus noruagicus *Ol. Magn. sept. p. 757 cum fig. mala.*

Rosmarus *Gesn. aquat. p. 249 cum fig. Ol. Magn. aliaque p. 250 paullo meliore.*

Animal quod nostrates Walrus, Angli a Russis mutato nomine Morsli vulgo nominant *Laet Amer. p. 38 cum fig. bona.*

Wallrus seu Mors *Ionst. pisc. p. 227.*

Rosmarus. Wallrofs *Ionst. pisc. tab. 44 fig. mala.*

Rosmarus Vetus. Ein Alt Meer Ros. Rosmarus Iuuenus. Ein Jung Meer Ros *Ionst. pisc. tab. 44 fig. Laet.*

Animal quod Anglis et Russis Walrus, aliis Mors, Danis et Islandis Rosmarus vocatur *Mus. Worm. p. 289 cum fig. Laet.*

Ruffor oder Rostinger *Gesn. Fischb. p. 127 cum fig. Ol. aliaque p. 128 meliori.*

Rosmarus, Wallrofs oder Seepferd *Olear. Gott. Kunstk. p. 354 tab. 23 fig. 3 Laet.*

Wallrofs *Mart. Spitzb. p. 78 tab. P fig. b; mala.*

Walrus *Charlet. exerc. pisc. p. 49.*

Er xl. Mammal.

Pp

Walrus

scriptis ac delineatio geographica selectionis facti ad occasum
 a terras americanas in Chinam ducturi p. amst. 1613. 4. cum
 de iniisa egegia, cuius imitamenta minus exquisita
 fuer. in Laeti, wormii aliorumq; tab. transierunt.

Walrus seu Mors *Sibb. Scot. an. p. 10.*

Equus marinus et Hippopotamus falso dictus Rai. syn. quadr. p. 191.

Le Wallrofs, ou Cheval marin *Egede Groenl. p. 61 cum fig. mala.*

Phoca dentibus caninis exsertis Linn. syst. nat. 2 p. 44.

Vache Marine *Charlev. nouv. Fr. III p. 147.*

Das Wallrofs *Anderf. Island. p. 258.*

Phoca dentibus caninis exsertis Linn. syst. nat. 6 p. 6 n. 2.

Ein Seepferd *Ellis Hudf. tab. 7 fig. mala.*

Rosmarus. Wallrofs *Klein. quadrup. p. 92.*

Morsch *I. G. Gmelin Sibir. III p. 165.*

Phoca dentibus caninis exsertis. The Phoca, with the canine teeth exerted: the Walrus Hill anim. p. 555.

La Vache marine: *Odobenus Briff. regn. an. p. 48 n. 1.*

Das Wallros *Hall. vierf. p. 583.*

Phoca (Rosmarus) dentibus laniariis superioribus exsertis Linn. syst. nat. 10, I p. 38 n. 3.

Wallrofs *Müll. Samml. III p. 563.*

Rosmare *Dictionn. anim. III p. 713.*

Vache marine *Dictionn. anim. IV p. 438.*

Walrus *Dictionn. anim. IV p. 570.*

Walrus: Rob met de bovenste Hoektanden buiten den Bek uitsEEKende *Houtt. nat. hist. II p. 7 tab. 11 fig. 1 cranii.*

Vache marine ou bête à la grande dent *Bon. dictionn. IV p. 497.*

Le Morfe ou la vache marine *Buff. hist. nat. XIII p. 358, 415 tab. 54 fig. animalis; tab. 55 fig. cranii.*

Das Wallrofs *Crauz Groenl. p. 165.*

Trichechus (Rosmarus) *dentibus laniariis superioribus exsertis Linn. syst. nat. 12, I p. 49 n. 1.*

The

- The arctic Walrus *Penn. syn. quadr. p. 335 n. 263.*
 Vacca marina *Aleff. quadrup. IV tab. 172 fig. Buff.*
 Wallrufs *Müll. Naturf. I p. 171 tab. 11 fig. 1 cranii;*
tab. 29 fig. 2 animalis mala.
 Wallrofs *Stell. Kamtsch. p. 106.*
 Das Wallrofs: *Trichecus Rosmarus Schreb. Säugth. II*
p. 262 n. 1 tab. 79 fig. Buff.
 Trichechus (Rosmarus) dentibus laniariis superio-
 ribus exsertis *Müll. Dan. prodr. p. 1 n. 1.*
 Vache marine *Gallis.*
 Hors-whal *Cambrensis.*
 Wallrofs *Germanis.*
 Wallrus *Belgis.*
 Sea-Cow, Walrus *Anglis.*
 Hav-Hest, Hval-Ros, Rosmar *Noruegis.*
 Wallrus *Suecis.*
 Morsk *Lapponibus.*
 Rost-Unger, Rostungr, Rossiner *Islandis.*
 Auek, Auak *Groenlandis.*
 Моржъ (Morsh) *Ruffis.*
 Tiute *ad ostium Ob fluuii.*

Longitudo corporis 18 pedum, peripheria vbi crassif-
 simum 10-12 ped. Caput subrotundum, obtu-
 sum, fere elephantinum absque proboscide. Na-
 sus minus eleuatus: naribus lunatis. Os paruum.
 Labia crassa, supra et infra fetis pellucidis crassitie
 straminis tecta. Laniarii superiores elongati, fere
 duorum pedum longitudine ex maxilla prominen-
 tes, deorsum curui, eburnei, sinister vt plurimum
 dextro breuior. Oculi parui, splendentes, retra-
 ctiles. Orificia duo parua auricularum loco, fere
 in nucha. Collum breue, crassum. Corpus me-
 dio crassum, postice gracilescens. Cutis crassa, ru-
 gosa, pilis breuibus, fuscis, rarioribus adpersa.
 Crura breuia. Pedes digitis 5-5 pinnatis, vn-
 guibus paruis. Pedes postici lati, retrorsum

spectantes. Cauda breuissima. Penis ingens offe-
sultus.

In sceleto cranii musei Erlangensis dentes primores
superiores duo.

Habitat ad Spitzbergam copiosus, ad Groenlandiam
rarius; circa nouam Zemblam, fretum Hudsonis,
inque oceano glaciali vsque ad promontorium
Tschuktchorum. Gregarius ad 100. Timidus
at ferox. Lenite incedit ope laniariorum. Dor-
mit in glaciei insulis. Vox fortis Bouis. Parit
unicam vel duo. Edit fucos, pisces, crustacea
dentibus lanariis effodienda. Excrementa quasi
equina.

Manatus, 2. T. dentibus lanariis inclusis.

Manati *Hernand. Mex.* p. 323 cum fig. mala.

Manatus *Rondel. pisc.* p. 490.

Manatus *Gesn. aquat.* p. 253.

Manati Phocae genus Clus. exot. p. 132 fig. p. 133
mediocris.

Manati *Laet Amer.* p. 6 cum fig. Clusii.

Manati Indorum *Aldrov. pisc.* p. 728 fig. p. 729
Clusii.

Manati Indorum *Ionst. pisc.* p. 223.

Manati *Charlet. exerc. pisc.* p. 49.

Manati seu Vacca marina *Rai. syn. quadr.* p. 193.

Manates ou vaches marines Dampier voy. I p. 46.

The Lamentyn female *Barbot Guin.* p. 562 tab. 7?
videtur potius Tr. Dugung.

Manati *Sloane lam.* II p. 329.

Trichechus *Art. gen.* p. 79. *synon.* p. 109.

Trichechus Manatus *Linn. syst. nat.* 2 p. 59.

Monatus *Klein. miss. pisc.* II p. 32.

Baca Marina *Gum. Orin.* I p. 319. *non II. p. 120*

Sily Saggio di Storia Americana. I. p. 82. tab. 1. Lamen-

- Lamentin ou Poiffon Boeuf *Condem. voy. p. 154.*
Trichecus Manatus *Linna. syst. nat. 6 p. 39 n. 1.*
Manati seu Vacca marina *Steller: Nou comm. petrop.
II p. 294.*
Manatus. See - Kuh. See - Ochs *Klein. quadrup. p. 94.*
Das Manati oder die fogenannte Seekuh *Steller:
Hamb. Mag XI p. 132.*
Le Lamantin: Manatus *Briff. regn. an. p. 49 n. 2.*
Thrichecus manimis pectoralibus binis: the Manatee
Brown. Jam. p. 459.
Lamantin *Adanf. Seneg. p. 143.*
Trichecus (Manatus) *Linna. syst. nat. 10, I p. 34 n. 1.*
Die Seekuh *Müll. Samml. III p. 251.*
Lamentin *Dictioun. anim. II p. 585.*
De Zee - Koe genaamd Manati of Lamentin *Houze.
nat. hist. I p. 462.*
Le Lamantin *De la Caille voy. p. 229.*
Lamentin *Bom. dictioun. II p. 635.*
Le Lamantin *Buff. hist. nat. XIII p. 377, 425 tab. 57.
fig. embryonis.*
Trichechus (Manatus) dentibus lanariis inclusis *Linna.
syst. nat. 12, I p. 49 n. 2.*
The Manati *Penn. syn. quadr. p. 352 n. 273.*
Seekuh *Müll. Naturf. I p. 176 tab. 29 fig. 3 Clusii.*
Die Seekuh *Stell. Kamtsch. p. 97.*
Der Manati: Trichecus Manatus *Schreb. Säugth. II p.
269 n. 3 tab. 80 fig. Buff.*
Trichechus (Manatus) dentibus lanariis inclusis *Müll.
Dan. prodr. p. 1 n. 2.*
Manati *Hispanis.*
Pezze Mouller, Pezze Muger *Lusitanis.*
Lamantin, Lamentin, Vache marine *Gallis.*
Seekuh *Germanis.*
Manati, Manatee *Anglis.*
Söe - Koe, Hav - Nödd *Danis.*
Корова морская (Korowa morskaja) *Ruffis.*
Капустник *Ruffis in Kamtscharka.*

Labat Afrique oc-
cidentale p. 187.

Lereou ad Senegal fluum.

Cojumero Guianensibus.

Pege buey ad fluum Amazonum.

Ypupiapa Brasiliensibus. Casp. Barboi res gestae in Brasilia p. 22

Longitudo Africani 8 pedum, Americani 17 pedum: Pennanto autem 28 pedes, Barbotio ad 20 pedes longus est; hic tamen T. Dugung descripsisse videtur, cum lanarios tribuat animali. Cetis maxime affinis. Pedes antici fere pinnae sunt, postici caudae horizontali similes, neque unquam terram ingreditur animal. Caput paruum, oblongum, fere quadratum. Nares fetis breuibz repletae. Rictus paruus. Labia duplicata, fetosa, quibus abscindit fucorum radices. In angulis oris setae albae, tubulosae, ne cibus effluat ex ore. Dentes nulli? praeter ossa solitaria vtrinque, rugosa, plana, alba, dentium loco. Lingua acuta, parua. Oculi minutissimi, iride nigra. Auriculae nullae; meatuum auditoriorum foramina minuta. Collum crassum, cum capite pendulo fere confluent. Palmae s. pinnae pectorales (absque unguibus Pennanto, unguibus quatuor Schrebero) subtus concavae fetis duris testae. Cauda crassa, horizontalis, fortis, subdiuisa margine. Cutis crassa, nigra siue cana, inaequalis, corticis quercus aemula, durissima, fetis rarissimis. Mammae duae pectorales.

Habitat ad litora in Mari americano, asiatico, ad ostia fluuiorum. Mitis; musica delectatur, forte veterum Delphinus. Vorat indefinenter fucos vluasque et vegetabilia reliqua. Dormit post prandium in dorso natans. Sociati Mas, femina, semiadultus, proles. Monogamus, verno tempore coit, praecipue diebus serenis versus vesperam: femina variis gyris primum fugiente, resupinata. Parit unicum pullum vel duo; grauidam vltra annum putat Stellerus. Dorsum inter pascendum ex aquis emi-

eminet, aubus animalis pediculos venantibus. Vox Bouis (Pennanto nulla). Male videt, bene audit. Caro alba, durior, bouilla, difficulter putrescens, iunioris sapore vitulinae.

Stellerianum animal differre, aliamque speciem esse cis, aliam transamericanam, doctiff. Schreberus.

Dugung. 3. T. dentibus laniariis superioribus exsertis breuioribus.

The Lamentyn female *Barbot Guin.* p. 562 tab. 7?

Le Dugon *Buff. hist. nat. XIII* p. 374 tab. 56 figg. cranii.

F. Leguat voyages T. 1. p. 93

The Indian Walrus *Penn. syn. quadr.* p. 338 n. 264

Der Dugung *Schreb. Sängzb. II* p. 267 n. 2.

Der Dugung: *Trichechus Dugon Müll. Naturf. Suppl.* p. 21.

Dugung, Ikan Dugung *Maleitis.*

Rosmaro affinis. Laniarii duo breuiiores approximati. Molares supra quatuor abs laniariis remoti, infra tres.

Habitat ad caput bonae spei et circa insulas philippinas. Dicitur vesci recentibus muscis in sicco. Species subobscura.

Species obscurae.

* The Beluga *Penn. syn. quadr.* p. 357.

Bieluga *Stell. Kamtsch.* p. 106.

Barclay & Mill in Mem. of the Werner Soc. T. 3. p. 271. t. 17

Distinguendum animal ab Acipensere eiusdem nominis. Longitudo 15-20 ped. crassities 3-4 pedum. Phocae simile pedibus atque cauda. Dentes Vaccae. In collo foramina duo proicienda aqua. Pili rariores in corpore, ut cutis alba transpareat vbique.

Habitat in mari Asiam ab America diuidente, inque oceano glaciali ad ostium Ienisei. Gregarium animal, piscibus victitans, pullos in dorso gerens. Raro circa litora conspicitur.

** The Sea Ape *Penn. syn. quadr. p. 356.*

Animal quinque pedes longum, a Stellero visum ad litora americana. Caput canis. Auriculae acutae, erectae. Oculi magni. Labium vtrumque barbatum. Corpus crassum, rotundatum, versus caput crassius, postice gracilescens. Cauda bifurcata, lobo superiore longiore. Corpus pilis densis, supra griseis, infra rubris tectum. Pedes nulli. Animal ludibundum.

* * *

Piscis anthropomorphos *Ionst. pisc. p. 209.*

Anthropomorphos *Ionst. pisc. tab. 40.*

The Meermaid *Barbot Guin. p. 516 tab. 30.*

Sirenes *Dictionn. anim. IV p. 213.*

Homme marin *Bom. dictionn. II p. 532.*

Haud iuuat afferre plura synonyma animalis fabulosi, forte ex vitiosa Manati figura ac descriptione efficti.

48. BALAENA.

Pedes nulli: anticorum loco pinnae pectorales; posteriorum loco pinna caudalis horizontalis absque unguibus.

Dentium loco in maxilla superiore laminae corneae.

Fistula respiratoria duplex supra caput.

Mysticetus. I. B. naribus flexuosis in medio capite, dorso impinni.

Φαλανα *Arist. hist. anim. I c. 5 n. 35? III c. 16. n. 237?*

Μυσικητος *Arist. hist. anim. III c. 10 n. 164?*

Balaena Plin. hist. nat IX c. 6, 7 (c. 5, 6 Hard.) c. 13 (c. 15 Hard.)?

Φαλανα *Aelian. anim. V c. 4?*

Balaena vulgo dicta siue Musculus Rondel. pisc. p. 475 cum fig. mala.

Balaena vulgo dicta siue Mysticetus Aristotelis, Musculus Plinii Gesn. aquar. p. 132 cum fig: Rondel.

Balaena Schonew. ichth. p. 24.

Balaena Aldrov. pisc. p. 675 figg. a pag. 677 ad 682 malae.

Balaena vulgi Aldrov. pisc. p. 688.

Balaena vulgi Ioust. pisc. p. 216.

Balena vulgi Mus. Worm. p. 281.

Wallfischli Mart. Spitzb. p. 98 tab. Q. fig. a, b.

Balaena vulgaris Charlet. exerc. pisc. p. 46.

Balaena, the Common Whale Sibb. Scot. an. p. 23.

CETORVM species pauciores recte cognitae: videtur horum historia denuo fere inchoanda.

- Balaena Rondeletii, Gesneri et aliorum. The Whale
Willughb. pisc. p. 35.
- Balaena vera Rondeletii *Willughb. pisc. p. 38.*
- Balaena vulgaris edentula, dorso non pinnato *Rai. syn. pisc. p. 6.*
- Balaena maior laminas corneas in superiore maxilla habens, fistula donata, bipinnis *Sibb. Rai. syn. pisc. p. 16.*
- Balaena maior laminas corneas in superiore maxilla habens, bipinnis, fistula carens *Sibb. Rai. syn. pisc. p. 16.* fictam putat *Artedi.*
- La seconde forte *Egede Groenl. p. 48.*
- Hvalfisk *Egede Groenl. fig. p. 48.*
- Balaena fistula in medio capite; dorso caudam versus acuminato *Art. gen. p. 76 n. 1. descr. p. 106. synon. p. 106 n. 1.*
- Balaena groenlandica *Linn. syst. nat. 2 p. 59.*
- Balaena vera *Zorgdrageri Klein. miss. pisc. II p. 11.*
- Balaena fistula in medio capite, dorso caudam versus acuminato *Linn. fu. succ. I p. 98 n. 264.*
- Der rechte Grönländische Wallfisch *Anderf. Island. p. 212.*
- Balaena fistula in medio capite dorso caudam versus acuminato *Linn. syst. nat. 6 p. 39 n. 1.*
- Balaena fistula in medio capite, dorso caudam versus acuminato. The Balaena, with the fistula in the middle of the head, and the back ridged toward the tail: the Whale *Hill anim. p. 312.*
- Balaena (groenlandica) fistula duplici in fronte, maxilla inferiore multo latiore *Linn. mus. Ad. Frid. I p. 51.*
- La Baleine ordinaire de Groenland: Balaena (vulgaris groenlandica) bipinnis, in dorso nigricans, in ventre alba, dorso laevi *Briff. regn. an. p. 347 n. 1.*
- Balaena (Mysticetus) naribus flexuosis in medio capite, dorso impinni *Linn. syst. nat. 10, I p. 75 n. 1.*

Baleine *Dictiomm. anim.* I p. 202 cum reliquis Cetis.
 Groenlandsche Walvisch: Walvisch met bogtige Blaas-
 gaten midden op den Kop, de Rug zonder Vin
Houtt. nat. hist. III p. 442.

Balaena (*Mysticetus*) naribus flexuosis in medio ca-
 pite, dorso impinni *Linn. fn. succ.* 2 p. 16 n. 49.

Balaena dorso impinni: fistula in medio capite: dor-
 so caudam versus carinato *Gronov. zooph.* I p. 29
 n. 139.

Balaena. Hval *Pentopp. Dan.* I p. 645.

Baleine *Bom. dictiomm.* I p. 224 cum reliquis Cetis.
 Der eigentliche sogenannte Grönländische Wallfisch
Crauz Groenl. p. 141.

Balaena (*Mysticetus*) naribus flexuosis in medio ca-
 pite, dorso impinni *Linn. syst. nat.* 12, I p. 105
 n. 1.

Der grönländische Wallfisch *Müll. Naturf.* I p. 481.

Balaena (*Mysticetus*) naribus flexuosis in medio capi-
 te; dorso impinni *Müll. Dan. prodr.* p. 6 n. 45.

Wallfisch, grönländischer Wallfisch *Germanis.*

Groenlandsche Walvisch *Belgis.*

Whale, Greenlands Whale *Anglis.*

Hvalfisk, Sletback, Grönlandsk Hval *Noruegis.*

Grönlands Hvalfisk *Suecis.*

Vatushalr *Islandis.*

Arbek, Arbavirkfoak *Groenlandis.*

Omnium animalium maximum, ut plurimum 50-60
 pedes longum, neque longius Martensio, aliis
 70-80; Linneo saepe 100 ped. Caput pars ter-
 tia corporis est. Os longum, forma literae S cur-
 vatum, vsque ad oculos protensum. Dentium lo-
 co laminae corneae circiter 700, apice margine-
 que fissae in fetas: media longissima ad 18-20
 pedes longa. Lingua mollis, alba, lateribus ni-
 gro maculatis, maxillae inferiori adhaerens. Ma-
 xilla inferior latissima, imprimis medio. Oculi
 magni.

magnitudine bubulorum, laterales, remotissimi, cum aliquot pilis. Caput supra planiusculum, testiforme cum tuberculo, et in hoc spiracula flexuosa. Aures infra oculos. Dorsum impinne. Angulus subacutus a media cauda secundum dorsum medium extensus, brevis. Cauda parum bifida. Totam nitida nigra, ventre albo; raro tota nigra, vel nigro flauoque varia, vel alba. Cutis crassitie pollicis, epidermis calami scriptorii. Penis 6-8 pedes longus, vaginatus. Mammæ duæ, abdominales ante vuluam, paruae. Lardum inter cutem ac carnem copiosissimum.

Habitat versus polum arcticum, praecipue circa Groenlandiam atque Spitzbergam. Velocissima timidaque. Victitat vermiculis marinis ingens bellua. Parit unicum, raro duo, ad pedes decem longum, post graviditatem nouem vel decem mensium. Prolem mire amat mater. Capitur ob lardum ex unica Balaena ad 70-90 dolia obtinendum, ex quo postea excoquant oleum; nec non ob laminas oris corneas. Caro sicca, in cauda succulentior, molliorque, edulis, sapore tamen non valde grato.

Eiusdem speciei forte est, saltem affinis, necrite determinata:

Une autre espece qu'on appelle Nord-kapper *Egede Groenl. p. 53.*

Balaena glacialis *Klein. miss. pisc. II p. 12.*

Der Nordcaper *Andersf. Isl. p. 219.*

La Baleine d'Islande: Balaena (islandica) bipinnis, ex nigro candicans; dorso laevi *Briff. regn. an. p. 350 n. 2.*

Noord-Kaaper *Houtt. nat. hist. III p. 489.*

Der Nord-Caper *Crauz Groenl. p. 145.*

Der Nordkaper *Müll. Naturf. I p. 494.*

Balaena. (glacialis) *Müll. Dan. prodr. p. 7 n. 49.*
 Nordkaper *Germanis.*
 Sild-Qual, Lille-Hval, Nordkaper *Noruegis.*

Paullo gracilior minorque Mysticeto, capite laminis-
 que corneis minoribus. Ex nigro candicans.

Habitat in borealibus. Visitat Medasis et Clupeis.

Phyfalus. 2. B. fistula duplici in medio capite, dorso extre-
 mo pinna adiposa.

Physeter *Plin. hist. nat. IX c. 4 (c. 3 Hard.). XXXII*
c. 11 (c. 53 Hard.).

Physeter *Rondel. pisc. p. 485 cum fig. mala.*

Phyfalus bellua seu Physeter *Gesn. aquar. p. 851 cum*
fig. Rondel.

Physeter *Aldrov. pisc. p. 689 cum fig. Rondel.*

Physeter qui et Phyfalus *Ionst. pisc. p. 217.*

Finnisch *Mart. Spitzb. p. 125 tab. Q. fig. c bona.*

Physeter et Phyfalus *Charl. exerc. pisc. p. 47.*

Physeter, the Spouting-Whale *Sibb. Scot. an. p. 23.*

Physeter *Rondel. Willughb. pisc. p. 47.*

Balaena edentula corpore strictiore, dorso pinnato
Rai. syn. pisc. p. 9.

Finne-Filke *Egede Groenl. p. 48 cum fig.*

Balaena fistula in medio capite, tubere pinniformi
 in extremo dorso *Art. gen. p. 77 n. 2 synonym. p.*
107 n. 2.

Balaena edentula, corpore strictiore, dorso pinnato
Klein. miss. pisc. II p. 13.

Balaena fistula in medio capite, tubero pinniformi in
 extremo dorso *Linn. fn. suec. I p. 99 n. 265.*

Der Finnisch *Anderf. Isl. p. 219.*

Balaena fistula in medio capite, tubero pinniformi in
 extremo dorso *Linn. syst. nat. 6 p. 39 n. 2.*

- Balaena fistula in medio capite, tubero pinniformi in extremo dorso. The Balaena, with the fistula in the middle of the head, and a pinniform tuberosity on the back: the Physeter *Hill anim. p. 313.*
 I.e. Gibbar: Balaena tripinnis, ventre laevi *Briff. regn. an. p. 352 n. 5.*
- Balaena (Physalus) naribus in medio capite, dorso extremo pinna adiposa *Linn. syst. nat. 10, I p. 75 n. 2.*
- Vinvisch: Walvisch met Blaasgaaten midden op den Kop, aan 't end van de Rug een Vetvin *Hourt. nat. hist. III p. 477.*
- Balaena (Physalus) naribus in medio capite, dorso extremo pinna adiposa *Linn. fn. succ. 2 p. 17 n. 50.*
- Der Finnfisch *Cranz. Groenl. p. 145.*
- Balaena (Physalus) fistula duplici in medio capite, dorso extremo pinna adiposa *Linn. syst. nat. 12, I p. 106 n. 2.*
- Finnfisch *Müll. Naturf. I p. 491.*
- Balaena (Physalus) fistula duplici in medio capite; dorso extremo pinna adiposa *Müll. Dan. prodr. p. 7 n. 46.*
- Finnfisch *Germanis.*
- Vinvisch *Belgis.*
- Fin-fish *Anglis.*
- Rör-Hval, Finne-Fisk, Tue-Qual, Stor-Hval *Norvegis*
- Finn-fisk *Suecis.*
- Reider *Lapponibus.*
- Hunfubakr *Islandis.*
- Tunnulik, Kepokak, Kepokarsoak *Groenlandis.*
- Longitudo Myfficeti, at corpore triplo quadruplous graciliore. Oris rictus amplior. Dorsum pinna recta acuta, tres aut quatuor pedes longa, prope caudam. Laminae corneae breuiores-ac in Myfficeto,

ceto, colore caeruleo. Corpus nitidum fuscum, subrus albumi.

Habitat in Oceano europaeo, americano. Vescitur Clupeis, Scombris. Aquam maiori vi eicit exspiraculis ac Mysticetus. Minus pinguis hoc est. Caro esculenta, sapore fere Sturionis.

Dentes acutos huic tribuit Rondeletius, ideoque ex Delphini genere esse putat Brissonius, vocatque distincto a Physalo nomine:

Le Souffleur: Delphinus (Physeter) pinna in dorso nulla *Briss. regn. an. p. 374 n. 5.*

Souffleur *Dictionn. anim. IV p. 224.*

De Blaazer *Houtt. nat. hist. III p. 552.*

Der Blaser. Souffleur *Müll. Naturf. I p. 508.*

Huc quoque forsitan pertinet:

Balaena gibbo unico prope caudam *Klein. miss. pisc. II p. 12.*

Der Plockfisch *Anderf. Isl. p. 224.*

La Baleine de la nouvelle Angleterre: Balaena (nouae Angliae) bipinnis, unico in dorso gibbo *Briss. regn. an. p. 351 n. 3.*

Nieuw Engelandfche Penvisch *Houtt. nat. hist. III p. 488.*

Der Plockfisch *Cranz Groenl. p. 146.*

Der Plockfisch *Müll. Naturf. I p. 493.*

Plockfisch *Germanis.*

Penvisch *Belgis.*

Bunch, Humberk - Whale *Anglis.*

Dorsum caudam versus gibbere capite humano maiore.

Habitat circa nouam Angliam.

Boops. 3. B. fistula duplici in rostro, dorso extremo protuberantia cornea.

Balaena tripinnis, nares habens, cum rostro acuto et plicis in ventre *Sibb. Rai. syn. pisc. p. 16.*

Balaena fistula duplici in rostro, protuberantia corniformi in extremo dorso *Art. gen. p. 77 n. 3. synon. p. 107 n. 3.*

Iubartes *Klein. miss. pisc. II p. 13.*

Balaena, Tigridis instar, variegata *Klein. miss. pisc. II p. 16?*

Der Iupiterfisch *Anderf. Isl. p. 220.*

Balaena fistula duplici in rostro, protuberantia corniformi in extremo dorso. The Balaena, with a double fistule in the rostrum, and a corniform protuberance on the back *Hill anim. p. 313.*

La Baleine à museau pointu: Balaena tripinnis, ventre rugoso, rostro acuto *Briss. regn. an. p. 355 n. 7.*

Balaena (Boops) fistula duplici in rostro, dorso extremo protuberantia cornea *Linn. syst. nat. 10, I p. 76 n. 3.*

Ossen-Oog: Walvisch met eenu dubbele Buis in de Snoet, een Hoornagtige uitpuling op het uiterste van de Rug *Houtr. nat. hist. III p. 485.*

Der Iupiter-Fisch, besser Gubartas oder Gibbar *Cranz Groenl. p. 146.*

Balaena (Boops) fistula duplici in rostro, dorso extremo protuberantia cornea *Linn. syst. nat. 12, I p. 106 n. 3.*

Schnabelfisch *Müll. Naturf. I p. 492.*

Balaena (Boops) fistula duplici in rostro, dorso extremo protuberantia cornea *Müll. Dan. prodr. p. VIII.*

Hrafu-Reyðus *Islandis.*

Keporkak *Groenlandis.*

Longitudo corporis 46 pedum, ambitus circa pinnas pectorales, vbi crassissimum, 20 ped. Caput oblon-

oblongum, rostro subacuto. Lingua quinque pedes longa, figura bouillae. Oculi bouillorum magnitudine, prope angulos oris fiti. Cutis laevissima, nigra, in ventre alba. Dorsum postice protuberantia cornea. Abdomen rugis longitudinalibus.

Habitat in Oceano septentrionali.

Musculus.

4. B. fistula duplici in fronte, maxilla inferiore multo latiore.

Balaena Bellon. *aquat.* p. 4.

Φαλινα, Balena, Baleine, Italis Capidolio Bellon. *aquat.* p. 6 fig. mediocr.

Balena Bellonii Aldrov. *pisc.* p. 676 fig. Bellon.

Balaena tripinnis, maxillam inferiorem rotundam et superiore multo latiore habens Sibb. *Rai. syn. pisc.* p. 17.

Balaena fistula duplici in fronte maxilla inferiore multo latiore *Arr. gen.* p. 78 n. 4 *Synon.* p. 107 n. 4.

Balaena fistula duplici in fronte, maxilla inferiore multo latiore *Linn. syst. nat.* 6 p. 39 n. 3.

Balaena fistula duplici in fronte, maxilla inferiore multo latiore. The Balaena, with a double fistule in the forehead, and with the lower jaw broadest *Hill anim.* p. 314.

La Baleine à museau rond: Balaena tripinnis, ventre rugoso, rostro rotundo *Briff. regn. an.* p. 353 n. 6.

Balaena (Musculus) fistula duplici in fronte, maxilla inferiore multo latiore *Linn. syst. nat.* 10, I p. 76 n. 4.

Breedsmoel: Walvisch met een dubbele Buis in 't Voorhoofd, de Onderkaak veel breeder *Houtt. nat. hist.* III p. 487.

Balaena (Musculus) fistula duplici in fronte, maxilla inferiore multo latiore *Linn. syst. nat. 12, I p. 106 n. 4.*

Breitmaul *Müll. Naturf. I p. 492.*

Balaena (Musculus) fistula duplici in fronte; maxilla inferiore multo latiore *Müll. Dan. prodr. p. 7 n. 47.*

Der Knotenfisch *Müll. Naturf. Suppl. p. 60.*

Longitudo corporis 78 pedum, ambitus ultra 35 ped. Maxilla inferior amplior et figurae semicircularis; superior angustior, apice acuto. Rictus ingens. Laminae corneae, nigrae, breues, longissimae trium pedum. Fistula figurae pyramidalis et septem diuisa, iuersus frontem. Abdomen rugis plurimis. Dorsum pinna adiposa. Corpus supra nigrum, ventre albo.

Habitat in mari scotico. Vescitur Clupeis.

gibbosa. 5. B. gibbis dorsalibus sex.

Balaena Gibbis vel Nodis sex. Balaena macra. *Klein. miss. pisc. II. p. 13.*

Der Knotenfisch oder Knobbelfisch *Anderf. Isl. p. 225.*

La Baleine à six bosses: Balaena bipinnis, sex in dorso gibbis *Briss. regn. an. p. 351 n. 4.*

Knobel-Visch *Houss. nat. hist. III p. 488.*

Der Knotenfisch *Crauz Groenl. p. 146.*

Der Knotenfisch *Müll. Naturf. I p. 493.*

Knotenfisch *Germanis.*

Knobelvisch, Knabbelvisch *Belgis.*

Scrag-Whale *Anglis.*

Figura Mysticeti, at gibbi in dorso sex, laminaeque corneae albae. Species subobscura.

Species obscura.

- * Balaena ore rostrato. Balaena tripinnis, edentula, minor, rostro paruo *Klein. miss. pisc. II p. 13.*
 Balaena (rostrata) minima rostro longissimo et acutissimo *Müll. Dan. prodr. p. 7. n. 48.*
 Nebbe - Hval, Butskopf *Noruegis.*
 Anderne - Fia, Fær - Dögling, Sandæta *Islandis.*

49. PHYSETER.

Pedes nulli: anticorum loco pinnæ pectorales; posticorum loco pinna caudalis horizontalis, absque unguibus.

Dentes in maxilla inferiore, non in superiore.

Fistula respiratoria in capite s. fronte.

Catodon. 1. P. dorso impinni, fistula in rostro.

Balaena minor, in inferiore maxilla tantum dentata, sine pinna aut spina in dorso *Sibb. Rai. syn. pisc. p. 15.*

Catodon fistula in rostro *Art. gen. p. 78 n. 1. synon. p. 108 n. 1.*

Catodon fistula in rostro *Linn. syst. nat. 6 p. 39 n. 1.*

Le petit Cachalot: Cetus (minor) bipinnis, fistula in rostro *Briss. regn. an. p. 361 n. 4.*

Physeter (Catodon) dorso impenni, fistula in rostro *Linn. syst. nat. 10, I p. 76 n. 1.*

Kazilot zonder Vin op de Rug, met een Buis in de Snoet *Hout. nat. hist. III p. 503.*

Physeter (Catodon) dorso impinni, fistula in rostro
Linn. syst. nat. 1^o, I p. 107 n. 1.

Der Weisfisch *Müll. Naturf. I p. 495.*

Physeter (Catodon) dorso impinni; fistula in rostro
Müll. Dan. prodr. p. 7 n. 51.

Svine-Hval, Kaskelot, Pöt-Fisk *Noruegjs.*

Kigutilik *Groenlandis.*

Longitudo circiter 24 pedum. Caput rotundum.
Rictus parvus. Fistula nasiformis in rostro.

Habitat in Oceano septentrionali.

Balaenam albicantem Kleinii, Weisfisch Martensii
et Zörgdrageri hanc censet O. Fabricius (*Müll.*
Dan. prodr. p. VIII). Istam tamen inter ednulas
ponit ipse Kleinus, vir doctissimus Ott. Frd.
Müller autem ad Balaenae genus refert eique est:

Balaena albicans *Müll. Dan. prodr. p. 7 n. 50.*

Hrafu-Reydur, Hrefna, Huitingar *Islandis.*

Killeluak *Groenlandis.*

vide species obscuras huius generis.

macroce- 2. P. dorso impinni, fistula in ceruice.

phalus. Aliud Cete admirabile *Clus. exor. p. 131 cum fig.*
mediocri.

Balaena *Ionst. pisc. p. 215 tab. 41 figg. duae superio-*
res et tab. 42 figurae bonae.

Cetus dentatus *Mus. Worm. p. 280.*

Cetus dentatus *Charlet. exerc. pisc. p. 47.*

Cetus dentatus *Clusii Sibb. Scor. an. p. 23.*

Cete Clusio — descriptum Pöt-Waldfisch Batanis ma-
ris accolis dictam *Willugbb. pisc. p. 41.*

Balaena *Wilingbb. piſc. tab. A I fig. 3* bona.

Cete Pot Walſiſh Batauis maris accolis diſtum *Rai. ſyn. piſc. p. 11.*

Balaena maior, in inferiore tantum maxilla dentata macrocephala, bipinnis *Sibb. Rai. ſyn. piſc. p. 15.*

Le Cachelotet, ou Pot-fiſke *Egede Groenl. p. 54.*

Catodon fiſtula in ceruice *Arr. gen. p. 79 n. 2 ſynon. p. 108 n. 2.*

Catodon Cete *Cluſ. Linn. ſyſt. nat. 2 p. 59.*

Cete Cluſii *Klein. miſſ. piſc. II p. 14.*

Cachelot ſ. Potfiſh Zоргdrageri *Klein. miſſ. piſc. II p. 14.*

Catodon fiſtula in ceruice *Linn. fn. ſuec. I p. 98 n. 262.*

Die Cachelotte *Anderſ. Isl. p. 232.*

Catodon fiſtula in ceruice *Linn. ſyſt. nat. 6 p. 39 n. 2.*

Le Cachalot: Cetus (. . .) bipinnis, ſupra niger, infra albicans, fiſtula in ceruice *Briff. regn. an. p. 357 n. 1.*

Catodon fiſtula in nucha, dorſo topho inſtructo: the Sperma-ceti Whale *Brown. Jam. p. 459.*

Phyſeter (macrocephalus) dorſo impenni, fiſtula in ceruice *Linn. ſyſt. nat. 10, I p. 76 n. 2.*

Potfiſch: Kazilot zonder Vin op de Rug, met een Buis in de Nek *Houtt. nat. hiſt. III, p. 505.*

Catodon (macrocephalus) dorſo impenni, fiſtula in ceruice *Linn. fn. ſuec. 2 p. 18 n. 53.*

Der Cachelot oder Pottfiſch *Cranz Groenl. p. 148.*

Phyſeter (macrocephalus) dorſo impinni, fiſtula in ceruice *Linn. ſyſt. nat. 12, I p. 107 n. 2.*

Der Pottfiſch *Müll. Naturf. I p. 498.*

Phyſeter (macrocephalus) dorſo impinni; fiſtula in ceruice *Müll. Dan. prodr. p. 7 n. 52.*

Trold-Hval, Huus-Hval, Sue-Hval, Buur-Hval, Bardhuali *Noruegis.*

Corpus ad 60 pedes longum et ultra, ambitu 36 ped.
 Caput crassissimum, maxilla inferiore minore cum
 dentibus 46 ad duo vel tres pollices exsertis ex
 gingiua duplici ordine; superior maxilla totidem
 alveolos habet pro excipiendis dentibus maxillae
 inferioris. Fistula in ceruice. Dorsum nigrum
 absque pinna. Venter albus.

Habitat in Oceano europaeo.

Sperma ceti ex huius ventriculis cerebri.

microps. 3. P. dorso pinna longa, maxilla superiore lon-
 giore.

Balaena maior, in inferiore tantum maxilla dentata,
 dentibus arcuatis falciformibus, pinnam seu spi-
 nam in dorso habens *Sibb. Rai. syn. pisc. p. 15.*

Physeter maxilla superiore longiore, pinna longa
 in dorso *Art. gen. p. 74 n. 1. Synon. p. 104
 n. 1.*

Balaena maior, in inferiore tantum mandibula den-
 tata, dentibus arcuatis falciformibus, pinnam seu
 spinam in dorso habens *Klein. miss. pisc. II p. 15.*

Dritte Species der Cachelotte *Andersf. Isl. p. 248
 cum fig.*

Physeter maxilla superiore longiore, spina longa in
 dorso *Linn. syst. nat. 6 p. 39 n. 1.*

Physeter maxilla superiore longiore, spina longa in
 dorso: The Physeter, with the upper jaw longest,
 and with a long spine on the back: the crooked-
 toothed Whale *Hill anim. p. 310.*

Le Cachalot à dents en faucilles: Cetus tripinnis,
 dentibus acutis, arcuatis, falciformibus *Briss. regn.
 an. p. 363 n. 6.*

Physeter (microps) dorso spina longa, maxilla su-
 periore longiore *Linn. syst. nat. 10, 1 p. 76 n. 3.*

Klein-

Klein - Oog: Kazilot met een lange Graat op de Rug, de Bovenkaak langer *Houtt. nat. bist. III p. 530.*

Physeter (microps) dorso pinna longa, maxilla superiore longiore *Linn. syst. nat. 12, I p. 107. n. 3.*

Kleinauge *Müll. Naturf. I p. 501.*

Physeter (microps) dorso pinna longa, maxilla superiore longiore *Müll. Dan. prodr. p. 7 n. 53.*

Staur - Hyning, Kobbe - Herre *Noruegis.*

Tikagulik *Groenlandis.*

Longitudo corporis ad 70 pedes. Caput maximum. Maxilla inferior paullo breuior superiore dentibus 42 rotundis, parumper compressis, arcuatis, falciformibus, medio crassioribus. In maxilla superiore totidem alueoli pro recipiendis istis dentibus. Oculi perexigui. Fistula parum sub rostri medio. Pinna dorsalis sat longa acuminata s. spina pinnae loco. Cutis laeuissima ex fusco nigricans.

Habitat in Oceano septentrionali. Exagitat saepe Phocaenas vsque in ipsam terram.

Tursio. 4 P. dorfi pinna altissima, apice dentium plano. Balaena macrocephala tripinnis. Quae in mandibula inferiore dentes habet minus inflexos et in planum desinentes *Sibb Rai. syn. pisc. p. 16.*

Physeter pinna dorfi altissima, apice dentium plano *Art. gen. p. 74 n. 2. synon. p. 104 n. 2.*

Mular Nierembergii *Klein. miss. pisc. II p. 15.*

Physeter pinna dorfi altissima, apice dentium plano *Linn. syst. nat. 6 p. 39 n. 2.*

Physeter pinna dorfi altissima, apice dentium plano. The Physeter, with the back fin very tall, and the summit of the teeth plane: the plane-toothed Whale *Hill anim. p. 310.*

Le Cachalot à dents plattes: *Cetus tripinnis*, dentibus in planum desinentibus *Briff. regn. an. p. 364 n. 7.*

Physeter pinna dorsi altissima, apice dentium plano: the Grampus *Brown. Jam. p. 459.*

Physeter (Turpio) dorsi pinna altissima, apice dentium plano *Linn. syst. nat. 10, I p. 77 n. 4.*

Mastvisch: Kazilot met een zeer hoog uitstekende Vin op de Rug, de Tanden van boven plat *Houtt. nat. hist. III p. 536.*

Physeter (Turpio) dorsi pinna altissima, apice dentium plano *Linn. syst. nat. 12, I p. 107 n. 4.*

Der Mastfisch *Müll. Naturf. I p. 503.*

Physeter (Turpio) dorsi pinna altissima, apice dentium plano *Müll. Dan. prodr. p. VIII.*

Mastvisch *Belgis.*

Pernak *Groenlandis.*

Ad centum pedes longum dicunt, et ultra. Praecedenti similis, at dentes minus inflexi, apiceque plani. Fistula in fronte. Pinna dorsi longissima, erecta, acuta, quasi naus malus.

Habitat in Oceano septentrionali.

Species obscurae.

* Weisfische *Mart. Spitzb. p. 94.*

Albus piscis cetaceus *Rai. syn. pisc. p. 11.*

Le Poisson blanc, Hviid-fiske *Egede Groenl. p. 55 cum fig.*

Balaena albicans; Weisfih Martensii et Zorgdr. *Klein. miss. pisc. II p. 12. (Edentulam dicit.)*

Der Wittfisch oder Weisfisch *Anderf. Isl. p. 251.*

Le Cachalot blanc: *Cetus (albicans) bipinnis*, ex albo flavescens, fistula in ceruice, dorso leui *Briff. p. 359 n. 2.*

Wit-

Wirfisch *Hoult. nat. hist. III p. 503.*

Der Weisfisch *Cranz Groenl. p. 150.* (Supra et infra dentatum dicit.)

Longitudo corporis 15-16 pedum. Figura Mysticeti, nisi quod caput acutius sit. Dentes parumper incurui, compressi, apice rotundati (alii vera Balaena est). Eminentia et fistula in ceruice. Pinna dorsalis nulla. Cutis ex albo flavescit.

Habitat in freto Davis.

** Dudleji Balaena *Klein. miss. pisc. II p. 15.*

Le Cachalot de la nouvelle Angleterre: Cetus (nouae Angliae) bipinnis, fistula in ceruice, dorso gibboso *Briss. regn. an. p. 360 n. 3.*

Nieuw Engelsche Kasilot *Hoult. nat. hist. III p. 526.*

Longitudo corporis 60-70 ped. crassities 30-40 pedum. Caput praegrande. Maxilla inferior multo angustior superiore, dentibus plurimis; superior totidem alveolis. Oculi exigui. Fistula in ceruice. Pinnae dorsalis loco gibbus pedem crassam. Cutis mollissima ex cinereo nigricans.

Habitat circa nouam Angliam.

** Zweyte Species der Cachelotte *Anderf. Isl. p. 246.*

Le Cachalot à dents pointuës: Cetus tripinnis, dentibus acutis rectis *Briss. regn. an. p. 362 n. 5.*

Longitudo 80-100 pedum. Caput maximum, mediam fere corporis longitudinem attingens. Maxilla inferior superiore multo minor, dentibus crassis, rectis, apicè acutis, quasi ferrae. Superior totidem alveolos habet. Oculi exigui, splendentes, flavicantes. Lingua parva, acuta. Gibbus altissimus in parte superiore dorsi, et pinna dorsalis versus caudam. Cutis laeuissima, in dorso nigricans, in ventre albicans.

Habitat

50. DELPHINVS.

Pedes nulli: anticorum loco pinnae pectorales; posticorum loco pinna caudalis horizontalis, absque unguibus.

Dentes in maxilla utraque.

Fistula respiratoria in capite.

Phocae- i. D. corpore subconiformi, dorso lato, rostro
na. subobtusum.

Tursio *Plin. hist. nat. IX c. 9 (c. II Hard.)*.

Tursio *Bellon. aquat. p. 15.*

Φοκίαινα, Tursio, Marfouin *Bellon. aquat. p. 16 fig. mediocris.*

Phocaena *Rondel. pisc. p. 473.*

Tursio *Rondel. pisc. p. 474 cum fig.*

Phocaena seu Tursio *Gesn. aquat. p. 837 cum fig.*

Tursio seu Phocaena *Schonev. ichth. p. 77.*

Phocaena siue Tursio *Aldrov. pisc. p. 719 fig. p. 720.*

Phocaena *Ionst. pisc. p. 221.*

Phocae-

Phocaena Meer Schwein. Braunfisch *Ionst. pisc. tab. 41.*

Meerschwein oder Tunin *Mart. Spitzb. p. 92.*

Phocaena *Charlet. exerc. pisc. p. 48.*

Phocaena, the Porpus or Porpoise *Sibb. Scot. an. p. 23.*

Phocaena Rondeletii *Willughb. pisc. p. 31 tab. A 1 fig. 2.*

Phocaena Rondeletii *Rai. syn. pisc. p. 13.*

Phocaena Rondeletii et Gesneri *Rzac. Polon. auct. p. 245.*

Le Niser ou le Marsouin *Egede Groenl. p. 60.*

Delphinus corpore fere coniformi, dorso lato, rostro subacuto *Art. gen. p. 75 n. 1. synon. p. 104 n. 1.*

Delphinus Phocaena *Linn. syst. nat. 2 p. 59.*

Anatome Phocaenae *De la Motte: Klein. miss. pisc. I p. 24.*

Tursio siue Phocaena *Klein. miss. pisc. II p. 26 tab. 3 fig. B bona; tab. 2 fig. A, B foetus.*

Marsouin *Charlev. nouv. Fr. III p. 147.*

Meerschweine *Linn. Gorbl. p. 198.*

Delphinus corpore subconiformi, dorso lato, rostro subacuto *Linn. fn. succ. 1 p. 99 n. 266.*

Das Meerschwein oder Tunin *Anderf. Isl. p. 253.*

Delphinus corpore subconiformi, dorso lato, rostro subacuto *Linn. syst. nat. 6 p. 39 n. 1.*

Delphine *Linn. Schon. p. 147.*

Delphinus corpore fere coniformi, dorso lato, rostro subacuto. The Delphinus, with a coniform body, a broad back, and a subacute rostrum: the Porpess *Hill anim. p. 311.*

Le Marsouin: Delphinus (Phocaena) pinna in dorso una, dentibus acutis, rostro breui, obtuso *Briff. regn. an. p. 371 n. 2.*

Delphinus (Phocaena) corpore subconiformi, dorso lato, rostro subobtusum *Linn. syst. nat. 10, I p. 77 n. 1.*

Marfouin *Dictionn. anim.* III p. 33.

Braunfifch: Dolphyn met het Lyf omtrent Kegelvormig, een breede Rug, de Snoet eenigermaate ftomp *Houzz. nat. hift.* III p. 540.

Delphinus (Phocaena) corpore fubconiformi, dorfo lato, roftro fubobtufo *Linn. fn. fucc.* 2 p. 17 n. 51.

Delphin oder Nifen *Gunnerus: Act. nidrof.* II p. 237 tab. 4.

Delphincs Phocaena. Tumleren *Pontopp. Dan.* I p. 646.

Das Meerfchwein *Cranz Groenl.* p. 151.

Delphinus (Phocaena) corpore fubconiformi, dorfo lato, roftro fubobtufo *Linn. fyst. nat.* 12, I p. 108 n. 1.

Der Braunfifch *Müll. Naturf.* I p. 504.

Delphinus (Phocaena) corpore fubconiformi, dorfo lato, roftro fubobtufo *Müll. Dan. prodr.* p. 7 n. 54.

Marfopa *Hispanis.*

Marfouin *Gallis.*

Meerfchwein, Braunfifch *Germanis.*

Braunfifch *Belgis.*

Porpus, Porpes, Porpette, Porpoiffe *Anglis.*

Marfwin, Tumler *Danis.*

Nife *Noruegis.*

Marfwin, Tumblare *Suecis.*

Swinia morska *Polonis.*

Морская свинья (Morfkaja Swin'ja) *Ruffis.*

Nifa *Groenlandis.*

Longitudo corporis 5 ad 8 ped. Corpus fupra nigro-caerulefcens, fubtus album. Caput obtufiusculum. Oculi perexigui. Foraminulum auditorium pone oculos. Spiraculum lunatum, finu antrorfum verfo, inter oculos. Dentes utrinque 46 parui, acuti.

acuti. Foramen penis lineare pone umbilicum, siue sub pinna dorsali. Foramen ani medio loco inter penem et caudam pinnatam, parum bifurcam.

Habitat in Oceano europaeo et mari balthico.

Delphis. 2. D. corpore oblongo subtereti, rostro attenuato acuto.

Δελφίς *Arist. hist. anim. I c. 5 n. 35. II c. 9 n. 44. III c. 1 n. 7. c. 7 n. 103. c. 16 n. 237. IV c. 9 n. 271. c. 10. n. 308, 309. IX c. 74 n. 498-503.*

Delphinus *Plin. hist. nat. IX c. 7, 8 (c. 6-10 Hard.). XI c. 37 (c. 50 Hard.).*

Δελφιν *Aelian. anim. I c. 13. II c. 6. V c. 6. VIII c. 3. X c. 8. XI c. 12, 22. XII c. 6, 45.*

Delphinus *Bellon. aquar. p. 7 figg. p. 9, 10.*

Delphinus *Rondel. pisc. p. 459 cum fig.*

Delphinus *Gesn. aquat. p. 380 fig. p. 331 Rondel.*

Delphinus *Aldrov. pisc. p. 701.*

Delphinus prior *Aldrov. pisc. p. 703 fig.*

Delphinus alter *Aldrov. pisc. p. 704 fig.*

Delphinus *Ionst. pisc. p. 218.*

Delphinus prior. Delphin *Ionst. pisc. tab. 34 fig. Aldrov.*

Delphinus alter. Delphin *Ionst. pisc. tab. 43 fig. Aldrov.*

Delphinus faemina. Delphin Weiblein *Ionst. pisc. tab. 43 fig. Rondel.*

Delphinus alius. Ein ander art Delphin *Ionst. pisc. tab. 43 fig. mala.*

Delphinus *Mus. Worm. p. 288.*

Delphinus *Charlet. exerc. pisc. p. 47.*

Porcus Marinus *Sibb. Scot. an. p. 23.*

Delphinus *Willughb. pisc. p. 28 tab. A I fig. 1.*

Delphinus Antiquorum Rai. *syn. pisc.* p. 12.

Delphinus Rzacz. *Polon. auct.* p. 238.

Delphinus corpore oblongo subtereti, rostro longo acuto *Art. gen.* p. 76 n. 2. *synon.* p. 105 n. 2.

Delphinus Linn. *syst. nat.* 2 p. 59.

Delphinus Klein. *miss. pisc.* II p. 24 tab. 3 fig. A.

Der Delphin *Andersf. Isl.* p. 254.

Delphinus corpore oblongo subtereti, rostro longo acuto *Linn. syst. nat.* 6 p. 39 n. 2.

Delphinus corpore oblongo subtereti, rostro longo acuto. The Delphinus, with an oblong, subcylindric body, and a long, acute rostrum: the Dolphin *Hill anim.* p. 311.

Le Dauphin: Delphinus (. . .) pinna in dorso una, dentibus acutis, rostro longo, acuto *Brissf. regn. an.* p. 369 n. 1.

Delphinus corpore subtereti oblongo, rostro producto acuto: the Porpoise *Brotten. Linn.* p. 459.

Delphinus (Delphis) corpore oblongo subtereti, rostro attenuato acuto *Linn. syst. nat.* 10, I p. 77 n. 2.

Dolphyn: Dolphyn met het Lighaam langwerpig omtrent rond, den Snoet dun en scherp *Houtr. nat. hist.* III p. 543.

Delphinus Delphis. Marfvin *Pontopp. Dan.* I p. 646.

Der Delphin *Granz Groenl.* p. 152.

Delphinus (Delphis) corpore oblongo subtereti, rostro attenuato acuto *Linn. syst. nat.* 12, I p. 108 n. 2.

Der Tummler *Müll. Naturf.* I p. 505.

Delphinus (Delphis) corpore oblongo subtereti; rostro attenuato acuto *Müll. Dan. prodr.* p. 7 n. 55.

Delfino *Italis.*

Dauphin *Gallis.*

Delphin, Meerfchwein, Tummeler *Germanis.*

Dolphyn *Belgis.*
 Dolphin, Grampus, Porpesse *Anglis.*
 Marfvn *Danis.*
 Springer *Noruegis.*
 Huyfen, Höfrung, Leipter *Islandis.*
 Delfin *Polonis.*

Maior praecedente, minor sequente: longitudo corporis 9-10 pedum, crassitiei diameter 2 ped. Corpus minus crassum quam in Phocaena. Rostrum longius et acutius, supra cinctum fascia lata transversa. Dentes subulati. Oris scissura magna ad thoracem vsque. Cutis supra nigra, subtus alba. Genitalia medio inter umbilicum et anum. Renes conglomerati.

Habitat in Oceano europaeo, adhaerens saepius Balaenis vt exsiliant.

- Orca. 3. D. rostro sursum repando, dentibus latis serratis.
- Orca *Plin. hist. nat. IX c. 6 (c. 5 Hard.). XXXII c. 11 (c. 53 Hard.).*
- Orca *Bellon. aquat. p. 16 fig. p. 18.*
- Orca *Rondel. pisc. p. 483 cum fig.*
- Orca *Gesn. aquat. p. 748 cum fig. Rondel.*
- Orca *Schonev. ichth. p. 53.*
- Orca *Aldrov. pisc. p. 697 fig. p. 698.*
- Orca *Ionst. pisc. p. 217.*
- Wagnhyalur vel Hualhund *Mus. Worm. p. 279.*
- Butskopf *Mart. Spitzb. p. 93.*
- Orca *Charlet. exerc. pisc. p. 47.*
- Orca *Rondeletii et Bellonii Willughb. pisc. p. 40.*
- Orca *Rondel. et Bellon. Rai. syn. pisc. p. 10.*

Balaena minor utraque maxilla dentata *Sibb. Rai. syn. pisc. p. 15.*

Le Bats - Kopper *Egede Groenl. p. 56.*

Delphinus rostro sursum repando, dentibus latis serratis *Art. gen. p. 76 n. 3. synon. p. 106 n. 3.*

Orca *Linn. syst. nat. 2 p. 59.*

Orca *Klein. miss. pisc. II p. 22 tab. I fig. I cranii.*

Delphinus rostro sursum repando, dentibus latis serratis *Linn. fn. suec. I p. 100 n. 267.*

Der Butzkopf *Anderf. Isl. p. 252.*

Delphinus rostro sursum repando, dentibus latis serratis *Linn. syst. nat. 6 p. 39 n. 3.*

Delphinus rostro sursum repando, dentibus latis serratis. The Delphinus, with the rostrum repandous upwards, and with serrated teeth, the *Grampus Hill anim. p. 512.*

L'Épaulard: Delphinus (Orca) pinna in dorso una, dentibus obtusis *Briff. regn. an. p. 373 n. 4.*

Balaena fistula in medio vertice, rostro obtusiori sursum repando: the Bottle - nose *Brown. Jam. p. 459?*

Delphinus (Orca) rostro sursum repando, dentibus latis serratis *Linn. syst. nat. 10, I p. 77 n. 3.*

Orca *Dictionn. anim. III p. 279.*

Botzkop: Dolphyn met een opgewipten Snoet, de Tanden breed en Zaagswyze *Houtt. nat. hist. III p. 547.*

Delphinus (Orca) rostro sursum repando, dentibus latis serratis *Linn. fn. suec. 2 p. 17 n. 52.*

Delphinus Orca *Pontopp. Dan. I p. 646.*

Der Butzkopf *Crantz Groenl. p. 151.*

Delphinus (Orca) rostro sursum repando, dentibus latis serratis *Linn. syst. nat. 12, I p. 108 n. 3.*

Der Butzkopf *Müll. Naturf. I p. 506.*

Orca auf russisch Kosatiky genannt *Stell. Kamtsch. p.*

Delphinus (Orca) rostro sursum repando; dentibus
 latis serratis Müll. *Dan. prodr. p. 8 n. 56.*
 Botskop *Belgis.*
 Grampus *Anglis.*
 North-Caper *Scotis.*
 Öre-Svin, Tandthöye *Danis.*
 Spek-Hugger, Hval-Hund, Springer *Noruegis.*
 Tandtheye, Springer *Hilgelandis.*
 Huyding *Islandis.*
 Löpare *Suecis.*
 Kofatky *Ruffis.*

Neque differre videtur:

Noch ein ander Art große Fische *Mart. Spitzb. p. 94.*

Der Schwerdtfisch *Anderf. Isl. p. 255.*

L'Epée de mer: Delphinus pinna in dorso vna gladii recurui aemula, dentibus acatis, rostro quasi truncato *Briff. regn. an. p. 372 n. 3.*

Zabel-Vifch *Houtt. nat. hist. III p. 550.*

De Walvifch dooder *Houtt. nat. hist. III p. 551.*

Der Schwerdtfisch *Crauz Groenl. p. 152.*

Delphinus Orca *Linn. mant. II p. 523.*

Der Säbelfifch *Müll. Naturf. I p. 507.*

Der Mörder. Killer *Müll. Naturf. I p. 507.*

Delphinus (Orca) dorsi pinna altissima; dentibus subconicis, parum incuruis Müll. *Dan. prodr. p. 8 n. 57.*

Der Buttkopf *Müll. Naturf. Suppl. p. 61.*

Stör-Vangen, Vand-Hünd, Staal-Fönning, Wagn-Hualur *Noruegis.*

Fakan *Laponibus.*

Haa-Hyrningar *Islandis.*

Arlo, Arlorfoit, Tikagulik *Groenlandis.*

Maximus huius generis: longitudine corporis 24-25 pedum, latitudine dimidia. Maxilla inferior multo maior superiore. Rostrum simum, sursum repandum. Dentes obtusi 40: Oculi parvi. Spiraculum planum, biloculare. Pinna dorsalis est spina ensiformis, saepe sexpedalis, cute vestita, basi latior. Corpus nigrum, ventre albo.

Habitat in Oceano norwegico, Freto Davis. Occidit et vorat Balaenas et Pleuronectes maximas. Bellum gerit cum Phocis, quas ope gladii dorsalis e lapidibus detrudit; Balaenarum Phocarumque tyrannus, quas turmatim adgreditur.

51. MONODON.

Pedes nulli: anticorum loco *pinnae pectorales*; posticorum loco *pinna caudalis* horizontalis, absque unguibus.

Dentes duo in maxilla superiore exserti, prae-longi, recti, spirales.

Fistula respiratoria in vertice.

Monoce- I. MONODON.

ros. Decimum sextum (genus) — — Nahwal *Schoenw. Ichth. p. 28.*

Unicornu marinum *Mus. Worm. p. 282 cum fig. animalis mala; p. 283 fig. cranii.*

Einhorn *Mart. Spitzb. p. 94.*

Monoceros, Unicornu Marinum *Charlet. exerc. pisc. p. 47.*

Monoceros piscis, qui de genere Cetaceo esse fertur
Willugbb. pisc. p. 42 append. p. 12.

Piscis Monoceros *Willugbb. pisc. tab. A fig. 2 mala ani-*
malis, bonæ cranii ac dentis.

Monoceros piscis e genere Cetaceo *Rai. syn. pisc.*
p. 11.

Eenhörning ou le Narhval, Licorne *Egede Groenl.*
p. 56 cum fig. mediocri.

Monodon *Art. gen. p. 78 n. 1. synon. p. 108 n. 1.*

Monodon Monoceros. Vnicornu *Linn. syst. nat. 2.*
p. 59.

Narwhal *Klein. miss. pisc. II p. 18 tab. 2 fig. C*
bona.

Monodon *Linn. fn. succ. 1 p. 98 n. 263.*

Der Narhwal oder das Einhorn *Anderf. Isl. p. 225*
cum fig. mediocri.

Monodon Monoceros *Linn. syst. nat. 6 p. 39 n. 1.*

Monodon. The Unicorn-fish, or Nar-Wal *Hill.*
anim. p. 313 tab. 16 fig. mala.

Monodon (Vnicornu) *Linn. mus. Ad. Frid. I p. 22.*

Le Narhval: Ceratodon *Briss. regn. an. p. 366*
n. 1.

Monodon (Monoceros) *Linn. syst. nat. 10 p. 107*
n. 1.

Narhwal *Dictionn. anim. III p. 217.*

Eenhörn-Visch *Houtr. nar. hist. III p. 423.*

Monodon (Monoceros) *Linn. fn. succ. 2 p. 16*
48.

Der Einhorn-Fisch oder Narhval *Crauz Groenl.*
I 46.

Monodona (Monoceros) *Linn. syst. nat. 12, Ip. 105*
n. 1.

Der Narwal *Müll. Naturf. I p. 477.*

Monodon (Monoceros) *Müll. Dan. prodr. p. 6 n.*
44.

Narhval, Lighval *Noruegis.*

Naahval *Islandis*.

Tauvar, Killelluak kernektok, tugalik *Groenlandis*.

Aglankook *Eskimosis* (ex-relat. m. J. Her-
hut. m. septa)

Longitudo corporis 20-22 pedum, latitudo 12 cir-
citer: secundum alios 40-60 pedes longus est

Caput exiguum. In maxilla superiore dentes duo
exserti, novem vel decem pedes longi, recti, spi-
raliter torti, interdum lacues, labium superius
perforantes, quorum saepissime alter deest. Oculi
perexigui. Pinna dorsalis nulla, pectorales exiguae
Caris alba, in dorso nigro maculata. Sub cute
copiosum lardum habet.

Habitat in Oceano septentrionali Europae atque
Americae. Velocissime natat, ut, quamvis sae-
pius appareat, raro tamen capiatur.

- A D D I T A M E N T A.

pag. 14 sub fine adde:

Simia plâtypygos Schreb. Säugth. I p. 74 tab. 5 B.

Species huius generis noua, a celeb. Schrebero recenter descripta, olimque sub nomine Inui depicta, quam habuit a doctiss. Hermanno, prof. Argentor. Forte autem Papius est, aut Cercopithecus. Facies coloris carnei. Irides fuscae. Frons nigra prominens. Caput et dorsum pallide fusca subflauicantia. Collum pilis longioribus. Venter pectusque albicantia. Ungues pollicum plani, reliquorum digitorum angustiores. Nates late denudatae, coloris carnei. Cauda nuda, breuis, carnei coloris.

Habitat Submitis.

pag. 23 lin. 26.

Cebum lugubrem ex accuratiore examine cum Capucina contrahendum hodie credo.

pag. 73 post lin. 26 adde:

Maritacaca aliis Biaratacaca Pif. Ind. p. 324 cum fig.

pag. 76 post lin. 16 adde:

Maritacaca Bom. dictionn. III p. 32.

et post liy. 31:

Didelphys Marsupialis Schreb. Säugth. III tab. 144 fig. Sebae.

pag. 84 post lin. 30 adde:

Haut, beste qui vit de vent *Thevet cosmogr. II*

941 cum fig. mala.

pag. 156 post lin. 27 adde:

Vrsus Ol. Magn. sept. p. 621.

pag. 157 post lin. 1 adde:

Vrsus Scheff. Lappon. p. 336.

et post lin. 31:

Bären Müll. Samml. III p. 550.

pag. 158 post lin. 16 adde:

Vrsus Arctos fuscus Schreb. Säugth. III tab. 139 fig

Riding.

Vrsus Arctos niger Schreb. Säugth. III tab. 140 fig

Riding.

pag. 161 post lin. 1 adde:

Vrsus maritimus Schreb. Säugth. III tab. 141 fig

propria.

et post lin. 23:

Taxus Ol. Magn. sept. p. 619.

pag. 163 post lin. 18 adde:

Vrsus Meles Schreb. Säugth. III tab. 142 fig. pro-

pria.

pag. 166 post lin. 32 adde:

Vrsus Lotor Schreb. Säugth. III tab. 143 fig. Buff.

pag. 172 post lin. 26 adde:

Erinaceus auritus S. G. Gmelin: *Nou. comment. petrop.*

XIV p. 519 tab. 16.

Erinaceus auritus Pallas: *Non. comment. perrop. XIV*

p. 573 tab. 21 fig. 4.

sub fine eiusdem paginae:

Erinaceus auritus Gmelini et Pallasii num diuersus?

Longitudo corporis 5-7 poll. caudae 5 lin. Aculei ut in europaeo, basi albi, medio obsolete nigri apice ex flauo albi, versus basin incrassati. Corpus subtus pilosum. Oculi minuti, palpebris fuscis, iride pallide caerulea, pupilla nigra. Tempora castanea. Rostrum ut in europaeo. Nares ois dentatis reuolutis. Auriculae insignes, triangulae, obtusae, longissimae, pollicis vnus cum quatuor lineis. Dentes primores vtrinque duo reliquis longiores, cuneati. Laniarii vtrinque supra quinque: primo minimo, quinto paruo; infra tres antrorsum decumbentes. Molares vtrinque quatuor: primo maximo, vltimo minimo. Digni 5-5. Unguiculi rubicundi. Cauda ex albo sordide flaua, apice nigro.

Frequentissimus in regione Astrachanensi, europaeo plane exule. Mores europaei. Edit adeo *Meloen vesicatoriam*.

pag. 196 post lin. 3 adde:

Hippopotamus Charlet. exerc. pisc. p. 50.

pag. 228 post lin. 19 adde:

Vrus Ol. Magn. sept. p. 632.

pag. 305 post lin. 32 adde:

Rangifer Ol. Magn. sept. p. 595.

NOMINA HUNGARICA

MAMMALIVM.

*Simia.*Majom (*preunz. Majom*).*Papio.*Pávian (*Paateiáan*), Kutya majom (*Kutja majom*).*Cercopithecus.*Matska - majom (*Matschka majom*).*Talpa europaea.*Vakondok (*Wakondok*).*Sorex Araneus.*Patkány (*Patkaanj*).*Vespertilia.*Szárnyos egér (*Sfaarnjosch - egér*), Denevér (*Denevér*).*Vrsus Arctos.*Medve (*Medwe*).*Vrsus Meles.*Börz (*Bors*).*Erinaceus europaeus.*Tövis Disznó (*Töwisch disznoo*).*Sus, Scrofa, Aper.*Vad - kan (*Wad - kan*) (mas); Vad - disznó (*Wad - disznoo*), Vad - eme (*Wad - eme*) (femina).

Sus Scrofa mansues.

Kán (Kan), Artány (Aartaanj) (mas); Éme (Eme),
Kotza (Kotza), Gönye (Gönje) (femina); Malatz
(Malatz) (pullus).

Elephas maximus.

Elefánt (Eléfaant).

Equus Caballus.

Mén-ló (Mén-loo), Tödör (Tschödör) (mas); Pa-
ripa (Paripa), Herélt-ló (Herélt-loo) (castratus);
Kantza (Kantza) (femina); Tsikó (Tschikoo),
Vembe (Wembe) (pullus).

Equus Asinus.

Szamar (Sfamaar) (mas); Számár-kantza (Sfa-
maar-kantza) (femina).

Mulus.

Öszvér (Öffwér).

Camelus bactrianus.

Tewe (Tewe).

Bos Taurus Vrus.

Belend (Belénd), Vad-Bika (Wad-bika).

Bos Taurus domesticus.

Bika (Bika) (mas); Tehén (Tebén) (vacca); Borjú
(Borju) (vitulus); Ökör (Ökör) (bos castratus).

Bos Bubalis.

Bivaly (Biwaj), Bial (Bial).

Ovis Aries.

Kos (Kosch) (mas); Örü (Örü), Berbéts (Berbétsch)
(véruex); Iuh (Iuh) (femina); Bárány (Baaraanj)
(agnus).

Ovis Strepeticros.

Magyar - juh (Madjar - jub).

Capra Hircus.

Ketske - Bak (Ketschke - Bak) (mas); Ketske (Ketschke) (femina); Gödölye (Gödölje), Alló (Alloo) (pullus).

Capra Ibes.

Vad - Kos (Wad - kosch).

Antilope Rupicapra.

Havasi - ketske (Hawaschi - ketschke).

Cervus Alces.

Iávor (Iaawor).

Cervus Elaphus.

Szarvas (Sfarwasch) (mas); Nöstény - Szarvas (Nöschbrénj - sfarwasch), Suta (Schuta) (femina); Szarvas - borjú (Sfarwasch - borju) (pullus).

Cervus Dama.

Dámvad - bak (Daamwad - bak) (mas); Suta - dámvad (Schuta - daamwad) (femina).

Cervus Capreolus.

Öz - bak (Öhsbak) (mas); Öz - nöstény (Öhs - nöschbrénj) (femina).

Lepus timidus.

Nyúl (Njubl).

Lepus Cuniculus.

Tengeri - nyúl (Tengeri - njubl).

Glis Marmora.

Havasi - hörtsök (Hawaschi - hörtschök).

- Glis Cricetus.*
 Hörsök (Hörschök).
- Mus Rattus.*
 Gözü (Göfü), Malom-egér (Malom-egér).
- Mus amphibius.*
 Gati-egér (Gaazi-egér).
- Mus silvaticus.*
 Erdei-egér (Erdei-egér), Mezei-egér (Mezei-egér).
- Mus Musculus.*
 Egér (Egér).
- Mus terrestris.*
 Üрге (Üрге).
- Sciurus vulgaris.*
 Mókus (Mookusch), Evet (Evet).
- Castor Fiber.*
 Hód (Hood).
- Lutra vulgaris.*
 Vidra (Widra).
- Mustela Martes.*
 Nyest (Njesch).
- Mustela Putorius.*
 Görény (Görénj).
- Mustela Zibellina.*
 Nyusz (Nyusz).
- Mustela vulgaris.*
 Menyét (Menjét).

Mustela Erminca.

Fegymet (*Pedjmet*).

Felis Leo.

Oroszlány (*Orofflaanj*).

Felis Tigris.

Tigris (*Tigrifcb*).

Felis Pardus.

Párdutz (*Pabrduetz*), Tarka Párdutz (*Tarka Pabrduetz*).

Felis Catus.

Bak - matska (*Bak - matscbka*) (*mas*); Matska (*Matscbka*) (*femina*).

Felis Lynx.

Hüüz (*Hius*).

Canis familiaris.

Eb (*Eb*), Kutya (*Kutja*) (*mas*); Nöstény - kutya (*Nöfchrénj kutja*) (*femina*); Komondor (*Komondor*) (*domesticus*); Püni (*Puni*) (*Spitz german.*); Verzere (*Wrezere*) (*fricator*); Szeléndek (*Szelendek*) (*Moloffus*); Kopó (*Kopoo*) (*lagax*); Vizsla (*Wifchla*) (*auicularius*); Agár (*Agabr*) (*grains*); Sinkuráta kutya (*Schinkurata kutja*) (*vertagus*).

Canis Lupus.

Farkas (*Farkascb*).

Canis Vulpes.

Róka (*Rooka*).



INDEX GENERVM.

	A.		Hydrochaerus	191
Antilope		268	Hystrix	340
	B.		I.	
Balaena		601	Iaculus	404
Bos		228	L.	
Bradypus		84	Lemur	63
	C.		Lepus	325
Callithrix		55	Lutra	445
Camelus		218	M.	
Canis		531	Mantis	98
Capra		256	Nonodon	626
Castor		440	Moschus	319
Cavia		348	Mus	381
Cebus		44	Mustela	452
Cercopithecus		22	Myrmecophaga	90
Cervus		294	O.	
	D.		Ovis	242
Dasytus		102	P.	
Delphinus		618	Papio	15
Didelphis		73	Phoca	579
	E.		Physter	611
Elephas		203	Pteropus	130
Equus		207	R.	
Erinaceus		169	Rhinoceros	198
	F.		S.	
Felis		500	Sciurus	411
	G.		Simia	6
Glis		358	Sorex	121
	H.		Spalax	377
Hippopotamus		195	Sus	176
Homo		1		

INDEX

T.

Talpa	114	Vespertilio	141
Trichechus	593	Vierra	480
		Vrius	156

INDEX SYNONYMORVM.

A.

Aap 7. 12. 13. 16. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 37. 38. 40. 47. 48. 50. 52. 54. 57. 59. 62.	Aftenbakke 145.
Abada 198. 200. 200.	Agar 636.
Abadas 198.	Agilis 84.
Abu mner 197.	Aglektok 589.
Acanthion 170. 172. 174. 346.	Agna 244.
Achlis 298.	Agneau 243. 244.
Achtziger 544.	Agnello 244.
Ackermans 398.	Agnetz 245.
Acouchy 354.	Agno 244.
Acuti 353. 354.	Agnus 242. 404.
Addax 283.	Agouchy 354.
Adelhiot 303. 303.	Agouti 353.
Adil 571. 572.	Agouty 353. 354.
Adim-maya 253.	Aguti 353. 354.
Adive 572.	Aguti 353.
Aeffinn 12.	Ahinges 563.
Aegagrus 260. 261. 274.	Ahu 283. 288.
Ælg 300.	Ai 85. 87.
Aenak 158.	Aiatochtli 107.
Aeneas 83.	Aiger 210.
Aeste 158.	Aigrette 40.
Aethiops 38. 103. 103. 103.	Aijir 76.
Affe 10. 12. 27. 29. 31. 33. 38. 47. 52. 55. 64. 65. 83. 83.	Aju 158. 159.
	Akarina 58.
	Akkiik 289.
	Akoim 289.
	Akcuchi 354.
	Akouchy 354.
	Alagtaga 405.
	Alatchah 210.

Alawata

SYNONYMORVM

Alawata 46.	Ant-eater 91. 94-96.
Albos 527.	Antelope 271-277. 279-
Alce 298-300.	281. 283-288. 290 293.
Alces 298-300.	Antes 191.
Alco 555.	Antilepe 268. 271. 273-293.
Alg 586.	319. 323.
Algazel 274. 285.	Antropomorphos 600.
Alko 555.	Aouaré 75.
Alló 634.	Apar 103. 104.
Alopex 565.	Aparathier 104.
Alouate 46.	Aparea 348. 349.
Alpaque 226.	Ape 8. 10. 12-14. 19. 47.
Altwater 24.	Apedia 20. 21.
Alungu 100.	Apella 50.
Amboinefer 79.	Aper 176. 177. 179. 181.
Ameisenbär 91. 93. 94. 96.	185-189.
113.	Aperca 348.
Ameisenfresser 90-92. 94-97.	Aperea 348. 349.
490.	Aperea 348.
Ammon 250. 251.	Aquiqui 44. 45.
Anderne - Fia 611.	Arabata 46.
Andira 134.	Araneus 125. 126.
Ane 212-214. 217. 218.	Arbavirkfoak 603.
Anei 205.	Arbek 603.
Aneffe 214.	Arctopithecus 85.
Angan 454.	Arctos 156-158. 630.
Angel-Muus 126.	Arda 413.
Angora - Cat 521.	Ardilla 413.
Animal 63. 85. 191. 524.	Argali 251. 252.
caadimanum 82.	Arganáz 430.
moschiferum 319.	Aries 224. 242-244. 248.
Zibethi 494.	249. 253-255.
Animalculum 57. 64.	Ariete 244.
Anta 191. 192.	Arlo 625.
Antathier 192.	Arlorfoit 625.
Antauarres 67.	Armadio 111. 112.
Ant-bear 92. 96.	

I N D E X

- Armadil 103 - 106. 108.
 110-114.
 Armadillo 103.
 Armadilla 103. 110. 111.
 Armadille 103. 105. 106.
 108. 110. 112. 113.
 Armadillo 102 - 109. 111-
 113.
 Armadillas 98. 99. 109.
 Armelini 474.
 Armellina 474.
 Armellino 475.
 Armenta 235.
 Arminho 475.
 Armilho 475.
 Armodillo 103. 109. 111.
 Armodillas 99.
 Arnäh 327.
 Arrány 633.
 Artois 544.
 As i-schüfchì 384.
 Afen 214.
 Asiniferus 212.
 Asino 214.
 Asinus 212. 213. 215.
 Asina 214.
 Alne 212. 213. 216.
 Asno 214.
 Aspalax 120.
 Aff 212-214. 217.
 Affapanick 435. 437.
 Affes 213.
 Afyn 214.
 Atak 588.
 Attarrak 589.
 Attarfoak 588. 589.
 Attelk 589.
- Attigbro 166.
 Auak 595.
 Auek 595.
 Auerochs 229. 236.
 Avrafelika 367.
 Aurochs 229.
 Awari 76.
 Awerochs 228. 235.
 Axis 312. 313.
 Aychhorn 411. 425.
 Aygula 39. 40.
 Ayotochtli 107.
 Azemila 215.
- B.
- Babak 360.
 Babbuino 16.
 Babian 16.
 Babio 15.
 Babi-roefa 189.
 Babi-roefa 189.
 Babirouffa 189.
 Babi-rufa 190.
 Babon 16.
 Baboon 15. 17. 20. 21. 45.
 Babouin 16. 24.
 Babr 508.
 Babuin 15.
 Babuino 16.
 Babuk 405.
 Baby-rouffa 189.
 Babyrouffa 189.
 Babyrufa 189.
 Babyrouffa 189. 190.
 Baca 596.
 Bache 178.
 Bacorinho 180.

- Bacoro 180.
 Bada 202.
 Badger 162-164. 485.
 Baedd 180.
 Baeden 263.
 Bäfwer 442.
 Bär 156-158. 160. 166. 630.
 Bärän 245.
 Bärinn 158.
 Bärtmännerchen 25.
 Eäwer 442.
 Baiou 317.
 Baitäl 210.
 Bak-matska 636.
 Bakeleys 231.
 Bakſcha 413.
 Bala 245.
 Balaena 601-617. 624.
 Baläpi 245.
 Baleine 602-604. 607-610.
 Balena 601. 609.
 Baljåpi 245.
 Ballottula 473.
 Baran 245. 252.
 Barän 245.
 Barani 251.
 Baranni 251.
 Eárány 633.
 Barbareſque 425.
 Barbaſtelle 148.
 Barbaſtellus 148.
 Barbet 510. 539. 540.
 Barbino 540.
 Barbi-Ronfa 190.
 Barbone 539.
 Barbudillo 539.
 Bardhualir 613.
Exxl. Mammal.
- Barg 180.
 Baris 6. 7.
 Barraco 180.
 Barris 7.
 Bars 508.
 Barſuk 163.
 Bartaffe 24. 25.
 Bartſedermäus 149.
 Bartkragen 67.
 Baſſet 553. 554.
 Baſtard-Pug 543.
 Baſtarimops 543.
 Baſterd-Deentje 543.
 Bat 131. 133. 134. 136. 138.
 140. 142. 144-152. 155.
 Bauerhund 552.
 Bauernhund 552.
 Baviaan 16.
 Bavian 15.
 Baumarder 456. 457.
 Baumreuter 548.
 Beagle 547.
 Beanmouſe 390.
 Bear 157. 158. 160.
 Beard-man 31.
 Beaver 129. 441. 442. 444.
 Becco 258. 260. 266. 267.
 Beef 236.
 Beer 157. 158. 160. 162.
 166. 168. 180.
 Behemoth 195. 197.
 Bekker el Waſh 241. 292.
 Belagoed 457.
 Belagraig 459.
 Belénd 633.
 Belette 472. 473. 452.
 Belier 243. 244. 247. 254.
Ss Beluga

- Beluga 599.
 Belzebul 44-46.
 Belzebut 46. 47.
 Benula 473.
 Beori 191. 192.
 Berbe 498.
 Berbéts 633.
 Berghafe 329. 332.
 Berghirsch 304.
 Bergmaus 372.
 Bergratte 404. 405.
 Berraco 180.
 Betscher, 222.
 Besoarbock 284. 288.
 Bestes 175.
 Bestia 191.
 Bestiola 371.
 Bête 489.
 puante 491. 492.
 Beyer 128. 442.
 Beveren 441.
 Bevero 442.
 Bevers 441.
 Beutelfledermaus 153.
 Beutelratte 75.
 Beutelratze 74-76.
 Beuteltrager 153.
 Bezoarantilope 273.
 Bezoarbock 273. 274. 284.
 Bezoar-goat 272.
 Bezoar-Hert 317.
 Bezoarziege 273.
 Biä 210.
 Bial 633.
 Biaratacáca 629.
 Bíbaro 442.
 Biber 441. 442.
 Biberaffe 66.
 Biberratze 129.
 Biche 303. 310. 313. 316
 317. 324.
 Biches 278.
 Bichon 541. 542.
 Bieher 441. 442. 446.
 Bjelka 413.
 Bieluga 599.
 Biesamratte 128.
 Biesamratze 444.
 Bièvre 441. 442.
 Big 180.
 Biggel 279.
 Biggetje 350. 351.
 Bilát 197.
 Bika 633.
 Bilehmaulz 366.
 Biörn 158.
 Birkfuchs 562. 563.
 Bisamasse 58.
 Bisamkatze 498.
 Bisamratte 129.
 Bisamschwein 187.
 Bisamthier 321.
 Bisemratze 128.
 Bisemthier 320.
 Bisemthierlein 320.
 Bisón 228. 229. 235-237.
 Bivaly 633.
 Bivaro 163. 442.
 Bíaro 442.
 Búr 442.
 Elaazer 607.
 Black-ears 524.
 Elaircau 162-164 490.
 491. 493.

SYNONYMORVM.

- Blanc-nez 36.
 Blandruselr 583.
 Bläräf 569.
 Blasengazelle 292.
 Blaser 607.
 Blaumaul 37.
 Blendling 549. 552.
 Bléreau 493.
 Blodhund 545.
 Blood-hound 547.
 Blutfauger 132.
 Boaid 465.
 Boar 179. 180.
 Bobak 359. 361.
 Bobaque 359.
 Bobr 443.
 Bobr' 443. 447.
 Bócht 223.
 Bock 257. 259. 260. 271.
 274. 291.
 Bór 558.
 Bórcheln 180.
 Boëtfoi 308.
 Boeuf 231. 234. 236. 241.
 275.
 Bogía 12.
 Bogío 12.
 Bogu 300.
 Bojúku 558.
 Boitta 465.
 Bok 258. 259. 272. 291.
 Bokhirsch 279.
 Bokje 259.
 Bologneser 540. 541.
 Bologneserhündchen 541.
 Bologneserhand 542.
 Bonafus 233. 234.
 Bonnet-chinois 41.
 Bontsem 489. 464.
 Boops 608.
 Boot 53.
 Borju 633.
 Bork 180. 250.
 Born-doeskie 426.
 Borov 179. 180.
 Borrica 214.
 Borrico 214.
 Borsluk 163.
 Borz 632.
 Bus 228. 231. 234. 236.
 241. 282.
 Luca 203.
 Boschmensch 7.
 Boschmuis 389. 390.
 Boschratte 73. 78. 348.
 Boshond 578.
 Bos-rot 83.
 Botskop 624. 625.
 Bottle-nose 624.
 Boubach 359.
 Boubak 359.
 Bouc 257. 260. 262. 263.
 266. 267.
 Bouc-Estain 262. 263.
 Bouquetin 263.
 Bey 231.
 Braeco 548.
 Bradypus 85. 89.
 Brak 547.
 Brandfuchs 565.
 Brandhirsch 304.
 Brandräf 565.
 Brant-Fox 565.
 Braque 547. 548.

INDEX

- Braunfisch 619. 620.
 Braunfrett 491.
 Brebis 243. 244. 247-249.
 254.
 Breedsmeel 609.
 Breitmaul 610.
 Brillhase 138.
 Brock 163.
 Brök 163.
 Bronwen 473.
 Bruchhase 330.
 Brüllaffe 45. 46.
 Braunfisch 620.
 Brammoche 238.
 Bubale 292.
 Bubalis 238. 239. 291. 292.
 Bubalus 238. 239. 241. 291.
 Bubul 237.
 Buchmarder 459.
 Buck 306. 311. 312.
 Buekelochse 237.
 Budel 539. 540.
 Budek 321.
 Budschim-schir 384.
 Bue 231. 240.
 Buey 321.
 Büffel 238. 239. 241.
 Büffelochs 238-240.
 Büre 558.
 Buffalo 239.
 Buffalo 236. 238-240.
 Buffalus 239.
 Büffel 239.
 Buffelo 235. 236.
 Buffelus 238. 239.
 Buffle 239. 241.
 Busse 239.
- Bugée 67. 70.
 Bugía 12.
 Bugío 12. 16.
 Buidel-Rot 76.
 Buil' 230.
 Buiwol 230.
 Buk 259.
 Búka 232.
 Bala 469.
 Bulàn 300. 308.
 Bulgan 469.
 Bull 229. 232. 237. 238.
 240. 241.
 Bull dog 545.
 Bullenbeißer 544. 545.
 Bunch 607.
 Buntflügel 150.
 Buntfing 464.
 Burdüsche 384.
 Burgos 554.
 Burra 214.
 Burro 214. 218.
 Burunduk 427.
 Busan 232.
 Buschgott 14.
 Buschmensch 8.
 Buschratte 348. 349.
 Buschratze 81.
 Buschschwanzaffe 50.
 Buselaphus 292.
 Busvil 171.
 Butzkopf 624. 625.
 Butzkopf 611. 623.
 Buts-kopper 624.
 Butzkopf 624.
 Buur-Hval 613.
 Buweh 231.

SYNONYMORVM.

- Bweh 259.
 Byk 232.
 C.
 Caa 48.
 Caaigoara 185.
 Caballo 209.
 Caballus 207. 209.
 Cabardyn 320.
 Cabiái 193. 194.
 Cabionara 193. 194.
 Cabra 258. 270.
 Cabra montès 315.
 Cabram 258.
 Cabrito 258.
 Cabron 258.
 Cabronzillo 315.
 Cachalot 611. 613. 614. 616.
 617.
 Cachelot 613.
 Cachelotet 613.
 Cachelotte 613. 614. 617.
 Cachicame 110.
 Cachicâmos 103.
 Cachorro 73. 542.
 Cagnuolino 542.
 Cagnuolo 542.
 Cagua-cuapara 317.
 Cagua-cuete 317.
 Cagui 55. 58.
 Cajopolín 83.
 Caitaia 56. 57.
 Calf 232.
 Callithrix 56.
 Callitrichè 33.
 Callitrichus 34.
 Callitrice 33.
 Gam 533.
 Camehle 219.
 Camel 219. 220. 222. 223.
 225. 227. 295.
 Camelopard 296.
 Camello 223.
 Camello-Pardo 296.
 Camells 219.
 Camelo-congener 226.
 Camelopard 296.
 Camelopardalis 294-296.
 Camelo-Pardalis 295.
 Camelopardalus 295.
 Camelo-Pardalus 295.
 Camelo-Pardus 295.
 Camelas 218-227. 295.
 Camorcia 270.
 Campagnol 396. 397.
 volant 149.
 Campagnolo 396. 397.
 Canuza 270.
 Can 537-539. 542. 545.
 548. 552.
 Can-can 495.
 Câne 533. 537-539. 543.
 545. 546. 550.
 Canes 532. 539.
 Canguru 459.
 Cani 540.
 Canicatis 370.
 Caninchen 333.
 Caniner 332.
 Caninichen 331.
 Canis 531. 532. 537-547.
 550-553. 555-557-559-
 563-565-572-574-576-
 578.
 volans 131. 134.
 Ss 3
 Caper

INDEX

- Caper 253. 257. 264.
 Capibara 194.
 Capidolio 609.
 Capivar 193.
 Capivard 193.
 Capiverd 193. 194.
 Capra 251. 255. 258. 260.
 262. 267. 269. 270. 272.
 274. 276. 278. 282. 284.
 286. 288. 290. 319. 320.
 Caprea 269. 288. 306. 313.
 314.
 Capreolus 313. 316. 319.
 320. 323.
 Capretto 258.
 Capricorn 264.
 Capricorne 264.
 Capricornus 261. 262. 264.
 Capriuola 315.
 Capriuolo 315.
 Capucina 48. 49.
 Capucinus 48.
 Caput mortuum 53.
 Capuziner 49.
 Capybara 193.
 Capybara 193.
 Capy-Bara 193.
 Caracal 524.
 Carc 200.
 Carcadden 200.
 Carcajon 167.
 Carcajou 168. 511.
 Carcand 266.
 Cariacou 317.
 Cariacu 317.
 Caribou 306. 307.
 Cariboux 306.
 Caribu 308.
 Carigue 73.
 Carigueja 74.
 Carigueibeiu 445. 447.
 Carigueya 73. 74. 76.
 Carigueyá 76.
 Carigurbeju 446.
 Carlwm 475.
 Carneiro 244.
 Carnero 225. 244.
 Carw 303.
 Carygueia 73.
 Carygueibeju 445.
 Caygueya 76.
 Caschelot 613.
 Casleg 210.
 Castor 128. 386. 440. 442.
 444.
 Castôr 442.
 Castore 442.
 Castrone 244.
 Cat 439. 515. 516. 518.
 519. 521. 522. 525. 530.
 Cataphraetus 103. 105. 106.
 108. 110. 112. 113.
 Cath 520. 521.
 Catodon 611. 613.
 Cato-Simjus 71.
 Catta 68. 69.
 Catulus 541.
 Catus 515. 518. 519. 521.
 522. 528.
 Pardus 515.
 Cavale 210.
 Cavalla 209.
 Cavallo 209.
 Cave-Bat 134.
 Cavia

SYNONYMORVM.

- Cavia 336. 345. 348-350.
 352-356. 361.
 Cavy 349. 351. 352.
 354-357.
 Cay 48.
 Cayenne - Cat 517.
 Cayopollin 83.
 Cebaius 467.
 Cebus 15. 24. 26. 28-31.
 37. 41. 44. 53. 57. 59. 68.
 629.
 Cefyl 210.
 Ceinach 327.
 Cephalotes 152.
 Cephus 37. 38.
 Ceratodon 627.
 Cercopithecus 11. 14. 17. 18.
 21. 22. 24-34. 37. 42.
 44. 46. 48. 51. 53. 55. 57.
 59-62. 64. 67. 70.
 Cerdo 180.
 Cerf 283. 302-305. 307.
 Cerva 301-303. 322.
 Cervarii 525.
 Cervia 303.
 Cerviatto 302.
 Cervicapra 283. 284.
 Cervio 303.
 Cervo 302. 303. 305.
 Cervocamelus 224.
 Ceruula 322. 324.
 Ceruus 278. 282. 294-296.
 298-319. 322. 323.
 Cete 612. 613.
 Cetus 611-614. 616. 617.
 Chacal 572. 574.
 Chagni 179.
 Chaleu 450.
 Chaly 443.
 Chama 525.
 Chameau 219. 222. 223.
 225.
 Chamois 267-270.
 Chamoise 269.
 Chartis 200.
 Chat 515. 517. 519. 522.
 Cervier 528.
 civette 495.
 epineux 343.
 musqué 493.
 Pard 515. 523.
 tigre 517.
 Chathal 572.
 Chauvefouris 131. 132. 134.
 136. 139. 141. 145. 149.
 152. 154.
 Cheropotamus 195.
 Cheval 208-210. 594.
 marin 195. 196.
 Chevre 255. 257-260. 265.
 267. 282.
 Chevreau 259.
 Chevrette 314. 315.
 Chevreuil 312. 314. 316.
 320.
 Chevrotain 277. 279. 322.
 124.
 Chevrotin 323.
 Chical 572.
 Chien 532. 533. 537. 538.
 542. 544. 546. 548. 549.
 551. 552.
 Chien d'eau 193.
 Chien volant 131. 133.
 Ss 4
 Chienne

INDEX

- Chiennes 533.
 Chillehueque 225.
 Chilob 437.
 Chimpanzee 7.
 Chinche 491. 492.
 Chinchi 491.
 Chinco 491.
 Chiritolo 413.
 Chirquinham 106.
 Chitote 66.
 Choakrama 16.
 Chomak 364.
 Chomik 364.
 Choras 18. 19.
 Chorok 470.
 Chors 159.
 Chunk 492.
 Chwiltlen 126.
 Chymchymka 469.
 Ci 533.
 Ciele 586.
 Cierva 303.
 Ciervo 303.
 Cignale 178.
 Cinghiale 178.
 Cingiale 186.
 Cirquincon 113. 114.
 Citellus 366. 367.
 Citille 366.
 Citillus 366. 367.
 Citli 336.
 Citrellus 366.
 Civet 495 - 496.
 Civet-cat 494.
 Civet-kat 494.
 Civetta 493 - 495.
 Civette 494 - 496.
 Ciuro 413.
 Coaita 47.
 Coase 491.
 Coaso 491.
 Coati 90. 162. 165 - 167.
 485-487. 490. 494. 497.
 Coati-monde 485.
 Coati-Mondi 485. 486.
 Coaty 90. 165.
 Cobaya 349. 350.
 Cobaya 349.
 Cochina 178. 180.
 Cochinitillo 180.
 Cochino 178. 351.
 Cochon 177-181. 184-186.
 193. 350. 351.
 Coelho 333.
 Coendou 344.
 Coescoes 79.
 Coja Merl 185.
 Cojumero 598.
 Colos 289.
 Colt 210.
 Comadreia 473.
 Condoma 183.
 Coneja 333.
 Conejillo 333.
 Conejito 333.
 Conejo 333.
 Conejuelo 333.
 Conepate 489.
 Conepatl 488.
 Conepato 489.
 Coney 345. 349. 353.
 Coniglio 332-334.
 Cony 333.
 Copy-Bara 193.

Coqual-

SYNONYMORVM.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| Coquallin 421. | Cassu 79. |
| Cordeiro 244. | Cassu-Aru 76. 100 |
| Cordero 244. | Catu 283. |
| Corina 291. | Cwningen 333. |
| Corine 291. | Cynamolgos 29. 30 |
| Corinna 287. 291. | Cynocephalus 13. 14. 22. |
| Coriac 566. | 24. 30. |
| Corza 311. | Cynomolpus 28. |
| Cotia 354. | Czerno büroi 561 |
| Coudous 275. | |
| Couguar 511. | D. |
| Cow 232. | Daa-Dyr 312. |
| Coyamel 185. | Dabba 577. |
| Coyopollin 82. | Dabi 273. |
| Coziocotequallin 421. | Dabul 576. |
| Creature 189. | Dachkutsch 252. |
| Creutzbock 276. | Dachs 161-163. 352. 554. |
| Criceto 364. | Dachshund 553. 554. |
| Cricetus 363. 364. | Däsman 129. |
| Crocota 578. | Dafad 244. |
| Croque-neix 433. 434. | Dagnet 303. |
| Cross-Fox 570. | Daim 310. 311. |
| Cuanda 343. 344. | Dain 310. 311. |
| Cuati 165. | Daine 310. 311. |
| Cuchora 193. | Daino 311. |
| Cudu 275. | Dama 280. 285. 309-312. |
| Cuetlachtili 559. | Dama-Cercus 310. |
| Cugnaeu-apara 316. | Daman 404. |
| Cugnaeu-ete 316. | Damantilope 281. |
| Cugnaenara 511. | Damhert 311. 312. |
| Cugüacuarana 511. | Damhiort 312. |
| Cuilatopolli 349. | Damhirsch 310. 311. |
| Cuniculus 331. 336. 339. | Damhirschantilope 281. |
| 348. 351. 353. 356. 366. | Damma 311. |
| 372. 404. 405. | Dammhirsch 311. |
| Curre 537. | Damvad-bak 634. |
| Curshund 549. | Dandulana 420. |

INDEX

- Daniel 312.
 Dannhirsch 310.
 Danöis 542-548. 549.
 Danta 191.
 Dantas 191.
 Dante 191. 241.
 Das 162. 163.
 Dashond 553. 554.
 Dafypus 102-108. 110-113.
 331. 525.
 Dauphin 622.
 Deeb 571. 572.
 Deer 289. 305. 306. 310.
 312. 317. 318.
 Deer-Kind 301.
 Dein 311. 312.
 Delfin 623.
 Delfino 622.
 Delphin 619. 622.
 Delphinus 598. 607. 618.
 625.
 Delphis 621. 622.
 Dendl 311.
 Denevér 632.
 Desman 128. 129.
 Diable 99.
 Diabolus 98. 99.
 Djämmel 220.
 Diana 30. 31. 32.
 Djarbua 405.
 Dîb 558.
 Didelphe 76.
 Didelphis 76. 78. 79. 81-84.
 Didelphys 629.
 Dikaja Koza 317.
 Dikobraz 342.
 Dispaiddsarch 210.
 Doc 312.
 Dol 312.
 Doffhiort 312.
 Dog 531-533. 538. 540.
 544. 546. 548. 551. 552.
 575.
 Dogg 539. 546.
 Dogge 545. 546.
 Dogo 545.
 Dogue 544. 545.
 Doguin 543. 544.
 Dolphin 623.
 Dolphyn 620. 622-624.
 Dóngus-bállas 180.
 Doninha 473.
 Donnola 466. 473.
 Dorcas 269. 285-287. 291.
 313. 314.
 Dorcos 268.
 Dorên 563.
 Dormouse 429. 430. 433.
 434.
 Dorrschwein 340. 343.
 Dorrakon 163.
 Douc 42.
 Draen 171.
 Draenog 171.
 Drill 7.
 Dromadaire 220.
 Dromas 219.
 Dromedaire 220.
 Dromedal 220.
 Dromedar 220. 223.
 Dromedario 220.
 Dromedarius 218-220. 222.
 Dromedary 219. 220.
 Dryf-Brak 546.

Dschála

SYNONYMORVM.

Dschála 245.
 Dsheren 288.
 Dshicketaci 211.
 Dsholadshán 252.
 Dubb 159.
 Dubbah 576. 577.
 Duí 223.
 Dúá 223.
 Dugon 599.
 Dugung 599.
 Duk 43.
 Dyfrgi 450.
 Dyrkolle 303.
 Dzik 179.
 Eagle-Bar 131.
 Eb 636.
 Eber 178-180.
 Eberhirsch 190.
 Echinus 104. 107. 169-172.
 173.
 Ecureuil 412. 413. 415-418.
 421-428. 436. 438.
 Edmarder 457.
 Eekhoorn 413.
 Eenhörning 627.
 Eenhoorn-Visch 627.
 Eezel 214.
 Egel 170-173.
 Egér 635.
 Egern 413.
 Egerne 412.
 Egin 220.
 Egoa 209.
 Egret 40.
 Eichelmaus 432.

Eichhörnchen 412. 413. 415-
 418. 420-423. 426. 427.
 429.
 Eichhörnlein
 Eichhorn 412. 413. 415-419.
 422. 423. 425. 427. 435-
 438.
 Eichhornaffe 52. 69.
 Eichkatzl 413.
 Eidion 231.
 Eikhoorn 413.
 Einhorn 626. 627.
 Einhornfisch 627.
 Eiter-Vnge 563.
 Elain 303. 311.
 Elan 191. 298-300.
 Eland 299. 300.
 Elant 298.
 Elaphus 302. 303.
 Elaurandus 34.
 Elawandum 24.
 Eldi 210.
 Elefant 205. 633.
 Elefante 205.
 Elend 298. 300.
 Elendgeschlecht 298.
 Elendkuh 299.
 Elendsthier 299.
 Elendthier 272. 299. 300.
 Elephant 203-205. 207.
 Elephante 205.
 Elephantus 203. 204.
 Elephas 199. 203-205.
 Elg 300.
 Elk 298. 300.
 Ellend 299.
 Ellgur 300.
 Elsdjur

INDEX

- Elsdjur 300.
 Elsdyr 300.
 Eme 633.
 Emgalo 187.
 Empakasse 275.
 Empalagna 275.
 Encoubert 106.
 Encubertado 107.
 Encuberto 107.
 Enfant du Diable 491.
 Engalla 187.
 Engeco 6.
 Engulo 187.
 Enkubert 106.
 Enydris 448.
 Epagneul 540. 541.
 Epaulard 624.
 Epée 625.
 Equa 207.
 Equiferus 208.
 Equus 207 - 209. 211. 213.
 216 - 218. 594.
 Erdei-eger 635.
 Erdeichhörnchen 427.
 Erdeichhorn 426.
 Erdhaase 405.
 Erdmensch 8.
 Erdschwein 98.
 Erdzeisl 397.
 Erinaceus 103. 107. 110.
 112. 169. 174. 630. 631.
 Erizo 171.
 Ermellino 475.
 Ermin 474.
 Ermine 475.
 Erminea 472-474.
 Ermineum 474.
 Ermineus 474. 477.
 Esel 212-214. 217. 218.
 Eselinn 214.
 Eselpferd 218.
 Espan 166.
 Espin 341.
 Esquilo 413.
 Evet 635.
 Eulassie 40.
 Ewig 303.
 Exquima 31. 32.
 Ezel 213. 214.

F.

- Faadh 508. 509.
 Faar 244.
 Faca 209.
 Far-Dögling 611.
 Fakan 625.
 Falanger 79.
 Falanouc 494 495.
 Fallow-deer 310-312.
 Faon 302. 303.
 Faquinha 209.
 Far 393.
 Fär 244.
 Fara 74.
 Farkas 636.
 Fatagino 101.
 Fatuellus 51.
 Faule 64. 85. 88.
 Faulthier 86. 87. 89.
 Faulthieraffe 88.
 Faunus 26. 27.
 Fefe 7.
 Feldfachs 565.
 Feldgott 51.
 Feldhase

Feldhase

SYNONYMORVM.

Feldhase 326.	Fiskatte 489.
Feldmarder 456. 457.	Fitchet 464. 473.
Feldmaus 366. 389. 390. 396. 397. 404.	Fizzler - Weefel 493.
Feldratte 348.	Flädermus 145.
Felis 72. 165. 493. 496. 499. 524. 526. 528. 559.	Flagermaus 144.
Felis Zibethi 494.	Flaggermaus 145.
Felsengeis 270.	Flatterer 134.
Fer - à cheval 154.	Fledermaus 134. 137. 139. 141. 144. 145. 147. 148. 150. 152. 155.
Ferkel 150.	Fliegenfänger 45.
Ferkelkaninchen 353. 354. 361.	Flieger 438.
Ferken 180.	Flirus 262.
Ferret 466. 467.	Flittermoufe 145.
Ferro da Cavallo 154.	Flußflötter 449.
Fert el Heile 473.	Flatter - moufe 141.
Feuille 138.	Flyve - Ekorn 437.
Ffwlbard 464.	Foetta 464.
Fiällmus 373.	Fogelhund 548.
Fiällracka 569.	Foina 458. 459.
Fiber 440. 442.	Fonkes 58.
Fieldmoufe 389. 390. 396. 397.	Foram 466.
Field-Rak 569.	Forão 466. 468.
Fieldrat 390.	Foras P'bar 197.
Filander 74.	Foffa 498.
Filfrals 478.	Foffana 498.
Finfifch 605.	Foffane 498.
Finfifh 606.	Fouina 459.
Finne - Fiske 605. 606.	Fouine 459. 491.
Finnfifch 605. 606.	Foumart 473.
Finn - fifk 606.	Fourmiller 90. 92. 94. 96.
Fifch 625.	Fourmillier 91.
Fifchotter 448. 450.	Fox 66. 492. 561. 563. 565. 567. 569.
Fifcher - Weefel 470.	Fox - Squirrel 418.
Fifhräll 251.	Foyna 459.

INDEX

Fret 466. 467. 482. 489.
 491. 495. 497.
 Frett 465. 467. 498.
 Frettbär 487.
 Frettel 465. 467.
 Fricator 1543.
 Frischling 178.
 Fritt 467.
 Fritter 466.
 Fuchs 481. 490. 574. 560-
 563. 565. 568. 569. 571.
 575.
 Fuchsalz 74.
 Fuchsaße 68.
 Füchfel, Mannchen 68.
 Fülchigen 482.
 Füllen 210.
 Fuina 459. 497.
 Fummer 464.
 Furet 454. 466. 467. 481.
 482.
 Furettel 465.
 Furetto 466.
 Furo 454. 465. 466.
 Furunculus 427.

G.

Gaas 159.
 Gabelhirsch 303.
 Gadse 465.
 Gafr 259.
 Gaine 558.
 Galeopithecus 357.
 Galgo 550.
 Galera 453.
 Galero 430.
 Gamo 31.

Gansud 171.
 Garañon 215.
 Gasa 159.
 Gafelle 273.
 Gast 533.
 Gat 524.
 Gata 521.
 Gati-egér 635.
 Gato 520. 521.
 Gatto 517. 519-522.
 Gazella 272-274. 284-286.
 316.
 Gazelle 272-274. 277. 284.
 286. 316.
 Gebirghirsch 304.
 Gedder 258.
 Geiß 257. 259.
 Geit 251. 258-260. 262.
 265-267. 269. 273. 277.
 278. 284. 286. 288.
 Geitje 278.
 Gelding 210.
 Gemars 233.
 Gembse 269.
 Gems 267-271.
 Gemse 267. 269-270. 281.
 Genet 497.
 Genet-Kat 497.
 Geneth 496.
 Geneth-Katz 496.
 Genetha 496.
 Genetta 396-498.
 Genette 496. 497.
 Genetkatze 497.
 Gerbo 405.
 Gerboise 405.
 Gerbua 405.

SYNONYMORVM.

Get 259.
 Geyfs 255. 257. 264.
 Ghazell 273.
 Ghiro 430. 432.
 Giacco 58.
 Gjambûcaha 564.
 Gibbar 606. 608.
 Gibbon 9. 10.
 Gied 459.
 Gieddk 478.
 Gimmer-Lam 244.
 Gin-hiung 157.
 Ginetta 496. 497.
 Ginnus 216.
 Girafra 295.
 Giraffa 295. 296.
 Giraffe 294. 295.
 Girchi 427.
 Giftshan 315.
 Glama 224. 225.
 Gliero 430.
 Glis 83. 128. 135. 358. 359.
 361. 363. 364. 366. 370.
 371. 373. 376. 381. 382.
 429. 430. 432. 433.
 Glouton 478.
 Glutton 478.
 Goa - aige 465.
 Goâdinachtsch 252.
 Goadinadatsch 252.
 Goat 224. 251. 257. 260.
 263. 267.
 Godde 308.
 Godde Sapan 373.
 Gödölye 634.
 Gönye 633.
 Göreny 635.

Gözü 635.
 Gohu 303.
 Gôlä 572.
 Goldwolf 572.
 Golucks 10.
 Gomari 197.
 Gondir 158.
 Gornostai 475.
 Gonandu 343.
 Gonlu 478.
 Goupil 563.
 Graabeen 558.
 Graadyr 308.
 Grabthier 575.
 Gräffvin 163.
 Gräsdyr 158.
 Gräyling 163.
 Graffa 295.
 Grampus 616. 623. 625.
 Gramselt 591.
 Gräben 558.
 Gräffäl 587.
 Gräffkir 413.
 Grattthier 271.
 Grauwerk 415. 419.
 Grauwerkskönige 437.
 Gray 163.
 Gredin 540.
 Grehound 549. 551.
 Greifs 46.
 Greul 429.
 Greyhound 549. 550.
 Griehun 315.
 Griis 180.
 Grimme 277.
 Grimmia 276.
 Grisfuchs 567.

Gronostay

INDEX

- Gronostay 475.
 Großkopf 152.
 Ground-rat 395.
 Ground-Squirrel 426:427.
 Grundhase 330.
 Grup 527.
 Guanaco 224.225.
 Guanacos 224.
 Guanicoe 225.
 Guariba 44.45.
 Gubarras 608.
 Guenon 12.
 Guépard 570.
 Guereba 45.
 Guereza 58.
 Gürtelthier 104-106. 108.
 III. 112, 114.
 Guevei 279.
 Guianacoe 225.
 Guianicoe 225.
 Guib 276.
 Guinea-Deer 278.
 Guinea-Pig 350.
 Guiny-Pig 351.
 Guldfah 252.
 Gulo 477.478.
 Guouzha 158.
 Gurg 200.
 Gurt-Ketsch 259.
 Gwadd 116.
 Gwiwair 413.
 Gwrcath 521.
 Gyrassa 294.
 H.
 Haa-Hyrningur 625.
 Haarnase 121.
 Haas 326. 327. 332. 335.
 336.
 Haase 326. 329.
 Hadjin 220.
 Häermlein 471.
 Häp 586.
 Haerbe 171.
 Häfinn 327.
 Häst 210.
 Haifer 232.
 Halbfuchs 168.
 Halbhase 355.
 Halsbuk 308.
 Hamadryas 22.23.
 Hamster 363. 364.
 Hammel 243. 244.
 Hamster 363. 364. 367.
 Hamstermäus 376.
 Hanse 554.
 Harda 413.
 Hardilla 413.
 Hardlooper 188.
 Hare 326. 327. 329. 330.
 335. 337. 355.
 Harer 326.
 Harlekin 543.
 Harp-Seal 588.
 Harpyja 133.
 Harrier 547. 548.
 Hart 303.
 Has 325. 326.
 Hase 325-327. 329. 330.
 335. 404.
 Haselmaus 432-434.
 Hasenfuss 569.
 Hasenmaus 355.
 Hasenscharte 140.
 Har-Heft

SYNONYMORVM.

- Hav - Hest 593.
 Hav - Nödd 597.
 Havasi - hörtfök 634.
 Havasi - ketske 634.
 Hauer 178.
 Hausbock 258.
 Haushund 537. 552.
 Hauskatze 519. 522.
 Hausmarder 457. 459.
 Hausmaus 383. 392. 393.
 Hausratze 384.
 Hauschwein 180.
 Haut 85. 630.
 Hay 85.
 Hazelmuis 433. 434.
 Heart - Seal 588.
 Hedghog 103.
 Hedgehog 103. 170. 171.
 173. 175.
 Helfant 204.
 Hemionus 211.
 Hengst 209. 210.
 Herdershund 537.
 Herelt - lo 633.
 Herinaceus 169.
 Heriffon 169. 174.
 Hermela 474.
 Hermelein 471.
 Hermelin 472. 473. 475. 476.
 Hermelinus 474.
 Hermellanus 474.
 Hermine 472. 475.
 Hermyn 475.
 Hermyn - Wezel 472.
 Hert 299. 302. 305. 307.
 311. 314. 317. 318.
 Herznase 136.
 Er xl. Mammal.
- Hest 209. 210.
 Hiang - tchang - tse 320. 321.
 Hind 303.
 Hinde 301. 303.
 Hindinn 303.
 Hingst 210.
 Hinnulus 216. 322.
 Hinnus 216.
 Hint 303.
 Hiort 303.
 Hipopotamus 193.
 Hippelaphe 304.
 Hippobus 233.
 Hippopotame 196. 197.
 Hippopotamo 195.
 Hippopotamus 191. 192. 195.
 197. 594. 631.
 Hippotaurus 233.
 Hircus 251. 255. 258. 260.
 262. 265. 267. 269.
 272. 274. 282. 284. 286.
 316.
 Hirsch 282. 288. 301. 306.
 308. 316. 317. 324.
 Hirsche ihre Könige 278.
 Hirschbock 284. 288.
 Hirscheber 190.
 Hirschgen 278. 282. 323.
 324.
 Hirschkalb 302. 303.
 Hirschkameel 224.
 Hirschkuh 302.
 Hirschziege 274.
 Hirtenhund 537.
 Hüz 636.
 Hód 635.
 Hoedus 257.
 Tt Höfrung

Höfrung 623.
 Hörfök 635.
 Hog 177. 178. 180. 181.
 184-186: 188-190.
 Hog-Deer 318.
 Hoitzlaquatzin 342.
 Hoitzlaquatzin 342.
 Hölzhafse 330.
 Homme 600.
 Homme des bois 7.
 Homme-ours 157.
 Homme-fauvage 7. 8.
 Homo 1. 6. 10.
 Hond 532. 533. 538. 541.
 551. 557. 562. 565. 569.
 571. 572. 576.
 Hond, vliegende 131. 134.
 Honde 321.
 Hondje 542.
 Hoorn-Varken 189.
 Hoppe 210.
 Horda 233.
 Hornnase 198.
 Hors-whal 595.
 Horfe 208-210.
 Hound 546. 547.
 Houfe-dog 537.
 Houfe-moufe 391.
 Hrafu-Reyður 608. 612.
 Hrefna 612.
 Hrein-Dyr 308.
 Hval 603.
 Hvalfisk 602. 603.
 Hvalhund 623. 625.
 Hvalros 595.
 Huanaco 224.
 Huanacu 224.

Hühnerhund 548.
 Hündchen 542.
 Hündinn 533.
 fliegende 134.
 Hünerhund 548.
 Hufeisennase 154.
 Hviid-fiske 616.
 Huishond 537.
 Huis-Muis 392. 393.
 Huis-Rot 383.
 Huitingar 612.
 Humberk-whale 607.
 Hund 531-533. 538. 539.
 541. 544. 548. 549. 551.
 552. 555. 560.
 Hund, fliegender 131. 132.
 134.
 Hundsbeißler 29.
 Hundsköpff 13.
 Hundskopf 14. 22. 30.
 Hundsmaul 152.
 Hundspard 508.
 Hunfubakr 606.
 Huron 466.
 Hushund 537.
 Hutaffe 41.
 Huus-hval 613.
 Huus-muus 393.
 Huyding 625.
 Huyfen 623.
 Hyaena 15. 477. 493. 494.
 575-578.
 Hyäne 577.
 Hydd 311.
 Hyddes 311.
 Hydrochaeris 194.
 Hydrochaerus 191. 193.
 Hyeni

SYNONYMORVM.

- Hyena 494. 576. 577.
 Hyene 477. 576. 577.
 Hystrix 173. 174. 340. 347.
- L.
- Labali 178.
 Labalina 178.
 Iacchus 56. 58.
 Iackal 571.
 Iackall 571.
 Iackalls 572.
 Iackals 574. 578.
 Iackafh 452.
 Iaculus 404. 405. 409.
 Iärf 478.
 Iärv 478.
 Iagdhund 546.
 Iagthond 546.
 Iagt-hund 546.
 Iaguar 514.
 Iaguara 513. 514.
 Iaguarete 512.
 Iakhals 572.
 Ianovare 513.
 Iarka 245.
 Iartzy 443.
 Iafe 327.
 Iavali 178.
 Iaval'es 186.
 Iavaris 185. 186.
 Iävor 634.
 Iazwetz 163.
 Iazwiec 163.
 Ibex 261. 263. 267. 289.
 Iblau 589.
 Ichneumon 480. 482. 490.
 Ictis 465.
- Iebrafchken 337.
 Ielek 475.
 Ielen 303.
 Iemuranka 367.
 Iena 577.
 Ierboa 71. 404. 405. 410.
 Ierboah 408.
 Ierbuab 404.
 Ierf 478.
 Iesh' 171.
 Iesef 575.
 Ievrafchka 366. 367.
 Iez 171.
 Igel 107. 169. 174.
 Igelkott' 171.
 Ignauus 84. 86. 88.
 Iida 533.
 Tirataka ein 296.
 Liya 445.
 Ikal 232.
 Ikan 599.
 Ikorn 413.
 Ilder 464.
 Ilgiersdyr 158.
 Iller 465.
 Iltis 463. 464.
 Iltnis 463.
 Imel 219.
 Imnä 210.
 Impanguezze 275.
 Imral 367.
 Inè 232.
 Inkhoorn 412. 413. 417.
 419. 423. 425. 427. 436.
 Innus 233. 276.
 Inuus 13. 14. 629.
 Iocko 8.

INDEX

- Iölbars 509.
 Iöra 300.
 Ippopotamo 197.
 Irabübo 193.
 Irbis 528.
 Irgendir 450.
 Irjä 210.
 Irmisch 145.
 Iron Pig 342.
 Isatis 568. 569.
 Isch 245.
 Ischaki 214.
 Ischim 223.
 Ischpi 245.
 Iskäl 232.
 Ist 533.
 Istrice 170. 341.
 Ifubr 303.
 Iubartes 608.
 Iuh 633.
 Iumar 233.
 Iumarra 233.
 Iumars 233.
 Iumarus 233.
 Iument 210.
 Iunetz 232.
 Iungfernböck 277.
 Iunitza 232.
 Iupatiima 73. 77.
 Iupiterfisch 608.
 Iuuenca 233. 241.
 Iuuenus 233.
 Iwrch 315.
 Iyrchell 315.
 Izquepolt 491.
 Izquiepatl 490.
 Izquiepotl 490.
- K.
- Kaas 244.
 Kaban 180.
 Kabarga 320. 321.
 Kabassion 112.
 Kabasslou 112.
 Kabassu 112.
 Kaberda 320.
 Kachikame 111.
 Kad'ga-m'rügam 200.
 Kädtu-nari 572.
 Känguruh 409.
 Käuler 178.
 Kaftaar 577.
 Kager Angan 454.
 Kahlbart 50.
 Kahlohr 173.
 Kaiin 558.
 Kaiko 447.
 Kalan 447.
 Kalb 230. 232.
 Kalf 232.
 Kaltan 469.
 Kamczatskoi bobr' 447.
 Kameel 220. 222. 223.
 Kameelböck 279.
 Kameelparder 296.
 Kameelsziege 225.
 Kamele 223.
 Kamelpard 295.
 Kamelthier 219. 222. 295.
 Kampagnol 397.
 Kan 521. 633.
 Kanatle-Tskan 145.
 Kand'â-mürrugam 200.
 Kanin 333.

Izard 270.

Kanin-

SYNONYMORVM.

- Kaninchen 332. 334. 337.
 349. 353.
 Kaninchenmaus 357.
 Kaninich 331.
 Kaninichen 332. 334. 335.
 Kaninichenjäger 466.
 Kaninichenwiesel 466.
 Kantza 633.
 Kapustnik 597.
 Karacoulac 524.
 Karagan 566.
 Kara - Gursu 158.
 Karbusch 365.
 Karibou 307.
 Karnickel 333.
 Karra Ku-lak 524.
 Karfak 566.
 Kartal 571.
 Karthäuserkatze 522.
 Kafah 259.
 Káfa 259.
 Kafkar 558.
 Kafkelot 612.
 Kaffigiak 585. 586.
 Kastaar 576.
 Kat 502. 504. 506. 514.
 516. 519. 521. 526.
 Kat-Pard 516.
 Kater 519. 521.
 Katka 521.
 Katta 521.
 Katte 519.
 Kattlo 528.
 Katz 496. 518. 520.
 Katze 72. 166. 512. 516.
 517. 519. 522. 530.
 fliegende 140.
 Katzenparder 523.
 Katzluchs 528.
 Kayopollin 82. 83.
 Kayopollino 83.
 Kazilot 611. 613. 615. 617.
 Kedi - Milau 145.
 Kelb maerre 533.
 Kemel 220. 223. 225. 227.
 Kemel - Pardel 296.
 Kempe 180.
 Kē nlee 574.
 Kepokak 606.
 Keporkak 608.
 Kepokarloak 606.
 Ker-Kamonou 196.
 Kerkedon 200.
 Kermang 413.
 Ketske 634.
 Ketske - Bak 634.
 Kevel 287.
 Kevella 287. 291.
 Khallah 524.
 Kigutilik 612.
 Kiid 259.
 Killeluak 612. 628.
 Killer 625.
 Kiön 558.
 Kir - sickan 338.
 Kiriwula 150.
 Kitzchen 259.
 Klapmüts 590.
 Klap - myffen 590.
 Klappmütze 590.
 Kleeblattnaße 137.
 Kleinauge 615.
 Klein - Oog 615.
 Knabbel - Vifch 610.

I N D E X

- Knähund 542.
- Knobbelfisch 610.
- Knobbel-Vifch 610.
- Knotenfish 610.
- Knur 179.
- Ko 232.
- Koati 166.
- Koatimondi 485.
- Kob 293.
- Koba 293.
- Kobbe-Herre 615.
- Kobüllà 210.
- Kobyła 210.
- Koe 229. 231. 232. 234.
236. 239. 240.
- Köhler 565.
- Köin 558.
- Koekeboe 453.
- Kör 308.
- Köter 533.
- Köfch 327.
- Koger 454.
- Koha 533.
- Kohlbrénner 565.
- Koiàn 327.
- Koljä 393.
- Komondor 636.
- Kon' 210.
- Kon 210.
- Koni 414.
- Konyn 332. 333. 355.
- Kopó 636.
- Kornfärklein 363.
- Korowa 232. 597.
- Korfak 566.
- Korfaki 566.
- Korfsräf 571.
- Kos 633.
- Kofatky 624. 625.
- Kofchka 520. 521.
- Kofchki 367.
- Kofchloki 443.
- Kofha 533.
- Kofzalka 432.
- Kot 520. 521.
- Kotfch-kohi 252.
- Kotfchak 521.
- Kotfchafch 521.
- Kotfchifch 521.
- Kotfchkui 252.
- Kotza 633.
- Koupara 574.
- Koutou 283.
- Koza 259. 270. 315.
- Kozel 259.
- Koziel 259.
- Kquoggelo 98.
- Krestowka 571.
- Kret 116.
- Kreutzfuchs 570.
- Kriersch 364.
- Kriffa 384.
- Krolík 333.
- Kronhiort 303.
- Krulhond 539.
- Krummhorn 281.
- Kryfa 384.
- Kfrjäh 210.
- Kubort 145.
- Kuder 518.
- Küniglein 331. 350. 353.
- Küniglhafe 333.
- Kür 308.
- Kütfch 327.

Kuh

SYNONYMORVM.

- Kuh 230-232. 293.
 Kuhantilope 292.
 Kuifch 469.
 Kukan 232.
 Kulany 213.
 Kulehm 252.
 Kulem 252.
 Kulon 470.
 Kulonnok 470.
 Kuma 586.
 Kumpi 558.
 Kumrah 233.
 Kuna 458.
 Kunaka 303.
 Kunjan 232.
 Kunigle 333.
 Kuniglein 331.
 Kunik 508.
 Kunitza 458.
 Kunlein 333.
 Kuorchu 557.
 Kurzmaul 148.
 Kurzschwanz 21.
 Kufchbort 145.
 Kut 586.
 Kutgun 376.
 Kutuguna 376.
 Kututhier 283.
 Kutya 632. 636.
 Kymich Chym 469.
 Kyr-taka 252.
 Kyfch 469.
 Kytyp 252.
- L.
- Lacerta 98. 101.
 Lacertus 98. 101.
 Lachtak 591.
 Läderlapp 145.
 Lakat 472. 473.
 Lagg 586.
 Lagopos 569.
 Lagopus 568. 569.
 Lagurus 375.
 Lam 244.
 Lama 225.
 Lamantin 597.
 Lamb 243. 244.
 Lamentin 597.
 Lamentyn 596. 599.
 Lamm 244.
 Lampreelen 333.
 Lan' 303.
 Landhippopotamus 192.
 Land-Spaniel 548.
 Lánduga 200.
 Langarm 10.
 Langfufs 410.
 Langohr 63. 142.
 Langschleicher 65.
 Langschwanz 347.
 Lap-dog 542.
 Lapin 332-334. 336. 348.
 350. 353-355. 361. 366.
 367. 372.
 Lapine 333.
 Lapreau 333.
 Lar 10.
 Laſica 467.
 Laſiczka 473.
 Laſitza 465.
 Laſka 476.
 Laſka 467. 473.
 Laſmitzki 473.

INDEX

- Lafoczka 465.
 Latax 448. 451.
 Laubba 194.
 Lavellan 472.
 Laye 178.
 Leæna 500. 501.
 Leam 502.
 Leão 502.
 Lebracho 327.
 Lebre 327.
 Lebrecilla 327.
 Lebrél 550.
 Lebrinho 327.
 Lechon 178. 180.
 Lechoncillo 180.
 Lechoncito 180.
 Leem 371.
 Leeuw 502.
 Leipter 623.
 Leitão 178. 180.
 Leithund 547.
 Lekatt 475.
 Lemán 372.
 Lemend 371.
 Leming 371. 372.
 Lemingus 372.
 Lemmar 371. 372.
 Lemmier 371.
 Lemming 371. 372.
 Lemmus 371. 372.
 Lemur 64. 70. 72.
 Leo 500. 502. 511. 512.
 582.
 Leba 502.
 Leofante 205.
 Leon 502.
 Leona 502.
 Leone 502.
 Leoniceps 59.
 Leonza 502.
 Leopard 505. 510. 530.
 Leopardal 507.
 Leopardo 507. 509.
 Leopardus 505. 509.
 Leppard 506.
 Lepre 326. 327.
 Lepturus 153.
 Lepus 325. 338. 348. 350.
 404.
 Lepusculus 332.
 Lereou 598.
 Lérot 432.
 Lerwee 251.
 Lěsnyi byk 230.
 Leveret 327.
 Levraut 327.
 Levrier 550.
 Levriere 550.
 Levron 551.
 Leuy aert 87.
 Lew' 502.
 Leyon 502.
 Leytão 180.
 Lezard 98. 99. 101.
 Licorne 627.
 Lidmee 285.
 Liebre 327.
 Ljetag' 437.
 Ljetag 437.
 Ljetaga 437.
 Lievereieichhörnchen 425.
 428.
 Lievereyeichhörnchen 429.
 Lievora 327.

SYNONYMORVM.

- Lièvre 326. 327. 329. 330.
 336.
 Lighval 627.
 Lille-hval 605.
 Lille-muus 392. 393.
 Lince 527.
 Liocephalus 59.
 Lion 501. 502. 511. 581.
 582.
 Lion's provider 573.
 Lion-Monkey 59. 61.
 Lione 502.
 Lioness 502.
 Lionessa 502.
 Lionne 501. 502.
 Liron 430.
 Lis 563.
 Lis' 563.
 Lifitza 563.
 Lifzka 563.
 Livreiltis 489.
 Lizard 101.
 Llama 224. 225.
 Llo 231.
 Llwynog 563.
 Llwynoges 563.
 Llyg 126.
 Llygoden 126. 384. 387.
 390. 393. 397.
 Lobo 527. 558. 586.
 Locobardus 235.
 Lodra 450.
 Lodria 451.
 Löpare 625.
 Löfl 300.
 Löw 501.
 Löwe 501. 502.

- Löwenaffe 59. 60.
 Löwenhündchen 542.
 Löwenhund 542.
 Löwenmeerkatze 59.
 Löwenschwanz 27.
 Lowinn 501. 502.
 Löwpard 508.
 Loir 429. 430. 432.
 Lontra 449. 450.
 Lori 65.
 Loris 65.
 Los 300. 526. 527.
 Los' 300.
 Loschad' 197. 210.
 Loschak 216.
 Lotor 165. 166. 630.
 Loup 557. 561. 571. 581.
 582. 584. 585. 592.
 Loup-Cervier 525. 527.
 Loup-Tigre 510.
 Loutre 446. 448. 450.
 Louve 558.
 Louveteau 558.
 Lowando 24.
 Lubba 533.
 Luca Bos 203.
 Luchs 525. 527.
 Luchskatze 524. 528.
 Lucifer 6.
 Lüd ketsch 327.
 Lui 458.
 Luijaard 86. 88.
 Luipaard 506. 507.
 Lummick 373.
 Lumusch 469.
 Lupo 557. 558. 561.
 Lupo cervero 527.

INDEX

- Lupo cerviere 527.
- Lupo gatto 527.
- Lupus 525. 556. 557. 559.
571. 572. 575. 576.
- Lutra 445. 446. 448. 449.
451. 480.
- Lutreola 451.
- Lutris 446. 447.
- Lutz 525.
- Lwitza 502.
- Lycaon 560. 561.
- Lynce 527.
- Lynx 513. 516. 524 - 529.
- Lyon 501.

- Maar 457.
- Macacco 29.
- Macaco 67.
- Macaq 48.
- Nacaque 29.
- Macaquo 28. 29.
- Macatlechihiltic 316.
- Macatlechihiltis 316.
- Macho 215.
- Mänestier 234.
- Maenk 451.
- Mäufegattung 403.
- Mafutiliqui 492.
- Magot 14. 17.
- Magu 53. 54.
- Magyar-Iuh 634.
- Maharen 244.
- Maihary 219.
- Majeg 442.
- Maimon 17.
- Majom 632.

- Maipuri 192.
- Makaque 29.
- Maki 66-68. 70. 72.
- Makis 64.
- Malakaya 517.
- Malatz 633.
- Malbrouck 27. 41. 42.
- Malom-éger 635.
- Mammone 20.
- Mamonet 16. 18.
- Man 25.
- Man of the wood 7.
- Man-Tiger 18.
- Manate 581.
- Manatee 597.
- Manates 596.
- Manati 596. 597.
- Manatus 596. 597.
- Mandrill 17.
- Mangabey 38.
- Mange-fourmis 94.
- Mangeur de fourmis 90. 94.
96.
- Mangia formiche 91.
- Mangouste 481. 482.
- Mangusta 482.
- Manicou 74. 81.
- Manipouris 191. 192.
- Manipuri 192.
- Manipuris 192.
- Manis 98 - 101.
- Manitou 73.
- Manul 520.
- Manzao 205.
- Manzo 205.
- Märd 457.
- Mapach 165.

- Mapurit

SYNONYMORVM.

- Mapurit 492.
 Mapurita 492.
 Mapurito 492.
 Maracaia 517.
 Maraguao 517.
 Maral' 303.
 Maraputé 523.
 Marcassin 177. 178.
 March 210.
 Marder 456. 457. 459.
 Mardures 456.
 Mare 210.
 Margacz' 290.
 Margay 517.
 Marikina 60. 61.
 Maritacaca 74. 629.
 Mark-Muns 396. 397.
 Marmeldier 359. 360.
 Marmontana 360.
 Marmosa 81. 88.
 Marinose 81.
 Marmot 359. 360. 362. 364.
 366. 367. 370. 372.
 Marmota 358. 361. 364.
 Marmote 361.
 Marmotta 360.
 Marmotte 358. 362. 364.
 Marmotte-volante 151.
 Marrã'o 180.
 Marsopa 620.
 Marsouin 618. 620.
 Marsvin 622. 623.
 Marsupiale 74.
 Marsupialis 629.
 Marswin 620.
 Mart 457.
 Marta 457. 468.
 Marte 456. 457. 468.
 Marter 456. 457. 459.
 Martes 455. 459. 468.
 Martin 457. 459.
 Martlet 457.
 Martora 457.
 Martorello 457.
 Martres 456.
 Martura 457.
 Maruwki 427.
 Maskjä 158.
 Mastfisch 616.
 Mastiff 545.
 Mastiffe 546.
 Mastin 552.
 Mastino 552.
 Mastinus 545.
 Mastius 544. 545.
 Mastochse 231.
 Mastschwein 180.
 Mastvisch 618.
 Mataga 387.
 Matin 552.
 Matsch 521.
 Matska 636.
 Matska-majom 632.
 Maucauco 65. 70. 72.
 Maulesel 215. 216.
 Maulochsen 233.
 Maulthier 215. 217.
 Maulwurf 115. 120. 123.
 Maura 41.
 Maus 83. 194. 349. 356.
 360. 367. 371. 372. 391.
 393. 398. 400. 482.
 Mausart 377.
 Mausart 396.

Mause-

- Maufeeichhörnchen 430.
 Maufekopf 125.
 Maufohr 145.
 Maushund 480.
 Maufz 480.
 Maxtlaton 517.
 Maypoury 191.
 Mazame 276. 282.
 Mazames 317.
 Medve 632.
 Medwēd' 158.
 Medwēditza 158.
 Medwjed 116.
 Meerkatz 44.
 Meerkatze 29. 31. 53. 57.
 61. 62.
 Meermaid 600.
 Meerotter 446.
 Meerros 593.
 Meerfchwein 619. 620. 622.
 Meerfchweinchen 350. 351.
 Meerfchweinlein 350.
 Meerwolf 576.
 Mel-Rak 569.
 Meles 161. 164. 481. 482.
 490. 494. 630.
 Melis 161. 162.
 Memerian bacala 254.
 Meminna 322.
 Memphitis 490.
 Mén-lo 633.
 Menyét 635.
 Mephitis 491. 492.
 Meràn 327.
 Mere 210.
 Meren 210.
 Mefch 245.
 Mefk 216.
 Mefomelas 574.
 Meufe 391.
 Mezei-egér 635.
 Mezgerhund 552.
 Miccia 214.
 Miccio 214.
 Mice 399.
 Mico 61.
 Micos 61.
 Microps 614. 615.
 Midas 62. 63.
 Mier-Haagdis 99.
 Mieren-eeter 91. 93. 96.
 Miko 61.
 Milektök 589.
 Minx 451.
 Mistbellerle 358.
 Mochyn 180.
 Mock 179.
 Mococo 68.
 Moccock 68.
 Mococo 69.
 Moelrhon 586.
 Mönch 53.
 Mörder 625.
 Möfs 232.
 Mohr 33.
 Mohraffe 41.
 Mokoko 69.
 Mókus 635.
 Mol 115. 116. 120.
 Mole 115. 121. 123.
 Molgátfeh 327.
 Moldwarp 116.
 Molle 397.
 Moloffus 151. 152. 544.

SYNONYMORVM.

Mommenet 13.	Morf koi kot 580.
Mona 12. 32. 33.	Morfus 593.
Monax 361. 362.	Morta 53.
Monaza 16.	Moruéco 244.
Monazo 16.	Mofcardino 433. 434.
Mencus 481.	Mofchelaphus 305.
Monie 32. 33.	Mofchus 277. 319. 324.
Mongkos 481.	Mofe 299.
Mongooz 66.	Mofe-deer 298.
Mongous 66.	Moff 232.
Mongoz 66.	Moffe 298.
Mongus 66.	Moufflon 251.
Monichus 32.	Mouffe 135. 392. 393. 396.
Monkey 10. 20. 23. 26. 29.	Mouftac 37.
31. 38. 40. 47. 49. 52.	Mouftache 37.
54. 55. 57. 62.	Moutain - cat 5150
Monkje 53.	Mouton 243. 244. 248. 249.
Monkos 67.	253. 254.
Monna 33.	Mu 215.
Mono 12. 46.	Müne 333.
Monoceros 626. 627.	Müll 232.
Montone 244. 247. 249. 254.	Mützer 125.
Moos 299.	Mufione 251. 252.
Moofe 298. 305.	Mufolo 543.
Moofe-deer 300.	Muilezel 215.
Mops 543. 544.	Muis 350. 355. 359. 362.
Mopfe 544.	364. 372. 383. 387. 389.
Morcego 145.	392. 393. 396. 400. 405.
Morcielago 145.	410. 433. 438.
Mormon 18. 19.	Mul 215.
Moromorus 224.	Mul' 216.
Mors 593. 594.	Mula 215. 216.
Morfch 594.	Mulafna 216.
Morfe 594.	Mular 615.
Morf h 593. 595.	Muldrarp 116.
Morf k 595.	Muldrarpe 115.
Morfkaja lofchad' 197.	Mule 215.

Mules

- Mules** 215.
Mulet 215. 216.
Mullvad 116.
Mulo 215.
Mulot 389. 390.
 volant 152.
Mulus 215. 233.
Mungo 481.
Munister 234.
Munistier 234.
Murceguillo 145.
Murciegalo 145.
Murcielago 134. 145.
Mures 391.
Murganho 126.
Murgano 126.
Murmecophaga 93.
Murmeltier 337. 352. 358.
 362.
Murmentle 358.
Mus 75. 78. 80. 82. 83. 125.
 127. 128. 130. 345. 349.
 351. 353. 356. 358. 364.
 366. 367. 371. 377. 379.
 381. 398. 400. 405. 408.
 410. 414. 415. 424. 425.
 429. 431. 435. 438. 444.
 467. 474. 480. 481.
Mufaraigne 124. 127.
Mufaraneus 125. 127.
Musaranho 126.
Musaraña 126.
Musc 320. 494.
Muscardin 433. 434.
 volant 150.
Muscardino 434.
Musculus 391. 393. 601. 609.
 610.
- Muscusfchwein** 187.
Musfkiter 126.
Musimon 250. 251.
Musimons 251.
Musk 321. 324.
Musk animal 320.
Musk Deer 320.
Musk-hog 186.
Musk-rat 128. 444.
Muskeljaat dier 320.
Muskusaffe 481.
Muskusbok 320.
Muskusdier 320.
Muskus-Rot 128.
Muskuschwein 186.
Muskus Zwyn 186.
Musmon 250.
Mustacchio 37.
Mustela 423. 424. 446. 447.
 449. 451. 457. 459. 460.
 463. 469. 470. 478. 481.
 488. 489. 493. 497.
- Muyl** 215.
Muylezel 215.
Mydasaffe 62.
Mynde 533.
Mynn 259.
Myre-Biörn 158.
Myreneter 94.
Myrmecophaga 90. 98.
Myrmecophagus 93.
Mysch 145. 393. 397.
Myscz 452.
Mysticetus 601. 603. 605.
Mysz 364.
Myszzy 390.

SYNONYMORVM.

N.

- Naahval 628.
 Nabba 200.
 Näbbmus 126.
 Naeghe 205.
 Nætte 457.
 Nagor 281.
 Nahwal 626.
 Naken - Hund 552.
 Nanguer 281.
 Nanguer 281.
 Nanny - goat 258.
 Nar - Wal 627.
 Narhval 627.
 Narhwal 627.
 Nari 564.
 Narica 486. 487.
 Narwhal 627.
 Nasenfrett 485.
 Nasenhorn 199. 200. 202.
 Nashorn 199. 200.
 Nasua 485.
 Nattblacka 145.
 Nebbe - hval 611.
 Nebbe - Muus 126.
 Nedofobol 469.
 Neiterfoak 590.
 Neitsek 589.
 Neiterfoak 583.
 Nemestrina 20.
 Nems 482. 507.
 Nennock 161.
 Nerpa 586.
 Nertz 451.
 Netopyr 145.
 Neujorker 155.
 Niaamel 327.

- Nial 569.
 Nieteris 141.
 Niedzwiedz 158.
 Nietopersz 145.
 Nilgauz 275.
 Nilpferd 196. 197.
 Nimfe 467.
 Niri katschan 398.
 Nisa 620.
 Nisch 469.
 Nisen 620.
 Niser 619.
 Noctilio 140.
 Noctala 146.
 Noctule 146.
 Nöd 232.
 Noertz 451.
 Nörtz 451.
 Nörtz-wiefelein 451.
 Noerza 451.
 Nöstény - kutya 636.
 Nöstény - Szarvas 634.
 Nöt 232.
 Nondo 527.
 Nonno 471.
 Noord-kaaper 604.
 Nordcaper 604.
 Nordkaper 604. 605.
 Nord - kapper 604.
 Norka 451. 452.
 North - Caper 625.
 Nosorog 200.
 Nottola 145.
 Nottolo 145.
 Nozorozec 200.
 Nülmaus 395.
 Numba 200.

Numela

INDEX

- Numola 327.
 Nurek 451. 452.
 Nurtz 451.
 Nutria 450.
 Nyest 635.
 Nyl - ghau 280.
 Nyúl 634.
 Nyufzt 635.
 O.
 Obàh 158.
 Obes'jana 13.
 Ohymaus 374.
 Ocelot 516.
 Ochodona 337.
 Ochs 228. 230. 231. 234.
 236.
 Ochse 231. 232.
 Ochfenescl 233.
 Ochsenpferd 233.
 Ocotochli 525.
 Odder 449. 450.
 Odobenus 594.
 Oedipus 59. 60.
 Ökör 633.
 Oen 244.
 Öre - Svin 625.
 Örü 633.
 Ösch 232.
 Öszvér 633.
 Öz - bak 634.
 Öz - nöltény 634.
 Ohihoin 427.
 Olen' 303. 308.
 Olèn 308.
 Olenitza 308.
 Olgobutzh 558.
 Olufia 158.
 Olyfant 205.
 Olyphant 204. 205.
 Omokolotfeh 145.
 Ona 288.
 Onager 212.
 Onagr 213.
 Onagrus 212.
 Onca 514.
 Onça 513. 514.
 Once 508. 510. 512.
 Ondatra 444.
 Onotauri 233.
 Oouatirioiaou 90.
 Opaffum 73. 74.
 Ophion 250.
 Opossum 74. 76. 79. 81. 83.
 84.
 Orakelmaus 394.
 Orang outang 6-8.
 Orca 623. 625.
 Orecchione 142.
 Oreillar 142.
 Orignal 298. 299. 300.
 Orne 180.
 Oroszlány 636.
 Orre 413.
 Orso 158.
 Oryx 274. 275.
 Os 232.
 Ofch 159. 232.
 Ôfcha 210.
 Ofel 214.
 Oslitza 214.
 Oflia 158.
 Oflen - oog 608.

Ofla

SYNONYMORVM.

Oslo 158.
 Oslo hormiguero 94.
 Osion 205.
 Ostrowidz 527.
 Otter 446. 448. 451.
 Ouaikare 85. 87.
 Oualofes 276.
 Ouanderons 25.
 Ouanderou 25.
 Ouarine 45.
 Ouariri 94.
 Oveja 244.
 Ovelha 244.
 Ovi + Camelus 226.
 Ouis 224. 226. 242-244.
 246-251. 253-256. 294.
 Ouistiti 58.
 Ounce 527. 528.
 Ourana 357.
 Ourico 343.
 Ourizo 171.
 Ours 94. 157. 158. 160.
 168. 580.
 Owatiriway 91.
 Owca 245.
 Owen 245.
 Owieczka 245.
 Owza 245.
 Oxy 231. 232. 235-237.

P.

Paard 209. 210. 213. 217.
 Pac 356.
 Paca 356.
 Pacae 356.

Erxl, Mammal.

Paco 226. 227.
 Pacos 226. 227.
 Paerdt 210.
 Pag 356.
 Pague 356.
 Pak 356. 357.
 Paka 356. 357.
 Pakiri 357.
 Palatinasse 42.
 Palatine 42.
 Paleng 505.
 Palmeichhornchen 424.
 Pammenratze 424.
 Palmist 424.
 Palmitte 424.
 Palm Squirrel 424.
 Pan 14. 47.
 Panggoeling 98.
 Pangolin 99.
 Pangolino 99.
 Pangulling 100.
 Paniscus 46. 47.
 Panter 507.
 Pantera 507. 508.
 Panterthier 508.
 Panther 506. 507. 509. 511.
 513. 514. 516.
 Panthera 505. 507. 508.
 Panthere 508.
 Pantherthier 507. 509.
 Panzerthier 106.
 Papiid 15. 16. 85. 575.
 Papion 16. 23.
 Paquiras 186. 187.
 Paquires 186.
 Pardalion 505. 506.

V v

Parda-

INDEX

- Pardalis 505. 506. 515. 516.
 Parder 506-508.
 Parderthier 505.
 Pardi 509.
 Pardus 505. 506. 513. 515.
 Párdutz 636.
 Parefleux 85. 86. 88.
 Parforcehund 546.
 Paripa 633.
 Parna 210.
 Párspi 180.
 Parfs 180.
 Páfan 273.
 Páfen 261.
 Patas 34.
 Pate 103.
 Pathew 434.
 Patkány 632.
 Patryshond 547. 548.
 Pavian 16. 23.
 Pávián 632.
 Peafants 34.
 Pecari 186.
 Peccary 186.
 Pecora 244. 247. 254.
 Pécus 242.
 Pege buey 598.
 Pegymet 636.
 Pekan 455. 489.
 Pekano 455.
 Pekans 455.
 Pelandoc-Aru 76.
 Pélon Ichiatl Oquitli 224.
 Penvifch 607.
 Peregufna 460.
 Pereguzná 460.
 Perewialka 460.
 Pericos ligeros 85.
 Perillo 542. 553.
 Pernak 616.
 Perrico ligero 87.
 Perrillo ligero 87.
 Perro 533. 539. 545. 553.
 Pertrand 22.
 Perú 232.
 Peruicheatl 224.
 Pes 533.
 Pesci 569.
 Pefetz 569.
 Petaurista 35. 438.
 Petit-gris 419.
 Pezze Mouller 597.
 Pezze Muger 597.
 Pfeilmaus 408.
 Pfeilfchwanz 439.
 Pferd 208-210. 216.
 Pferdhirfch 304.
 Pflockfifch 607.
 Phalanger 79.
 Pharaonsmaus 482.
 Pharaoratze 482.
 Phatagen 101.
 Phatagin 101.
 Philander 74-76. 78-84.
 Philandre 75. 78-81. 83-84
 Phoca 579. 586. 588-592
 594-596.
 Phocaena 618-620.
 Phocas 585.
 Pholidote 99. 101.
 Pholidotus 99. 101.
 Phoque 585. 591. 592.

SYNONYMORVM.

- Phyfalus 605 - 607.
 Phyfeter 605-607. 611-616.
 Pi 533.
 Pica 356.
 Picary 186.
 Pichou 517.
 Pies 586.
 Piefek ziemny 370.
 Pig 180.
 Pigmy 12.
 Pigritia 85.
 Pika 337.
 Piloni 357.
 Pina 533.
 Pinche 59 - 61.
 Pinco 59.
 Pindsvin 170. 171.
 Pingo 186.
 Pinuum 525.
 Pipistrella 148.
 Pipistrelli 132.
 Pipistrello 137. 145. 148.
 Pipistrellus 148.
 Pirä 558.
 Piscis 600. 616. 627.
 Pisczucha 337.
 Pismire-eater 93.
 Piteco 12.
 Pithecia 55. 56.
 Pitheque 12.
 Pitoi 455.
 Plathorn 287.
 Platogni 310.
 Platyceros 309.
 Podenco 548.
 Poiffon 616.
 Poiffon boeuf 597.
 Polatouche 436.
 Polatucha 436.
 Polatuche 436.
 Polcat 488. 489.
 Polecat 463. 464.
 Polledro 209.
 Pommer 538.
 Pon 533.
 Pongo 6. 8.
 Pongos 7. 8.
 Popielica 415.
 Popieliza 415.
 Porc 178. 184. 187. 194.
 Porc-epic 340 - 343. 345.
 347.
 Porc-epys 340.
 Porca 178. 180.
 Porcellino 351.
 Porcellio 104.
 Porcellus 349-351. 363.
 Porco 178. 180. 181.
 Porco barrão 180.
 Porco-espinho 342.
 Porco spinoso 341.
 Porcupine 340 - 342. 344.
 347.
 Porcus 161. 173. 174. 176.
 177. 179. 184. 186. 189.
 346. 621.
 Porcus flumiaticus 193. 194.
 Porofenok 180.
 Porofia 179.
 Porpess 619. 620. 622. 623.
 Porpoife 619. 620.
 Porpus 619. 620.

INDEX

Porquinho 180.
 Porte-corne 200.
 Possenreißer 55.
 Possum 74.
 Postkameel 220.
 Potfish 613.
 Potfisk 612.
 Potfiske 613.
 Potjak 245.
 Potranca 209.
 Potro 209.
 pottfisch 613.
 Potto 88. 89.
 Potvish 613.
 Potwalfish 612. 613.
 pouc 381.
 Pouch 381.
 Poulain 210.
 Pourvoyeur du Lion 573.
 Pricket 303.
 Prjese 232.
 Priguiza 87.
 Prill 521.
 Profinia 66-68.
 Pryf 163.
 Przewialka 460.
 Pſchi 308.
 Pſi 533.
 Pſitza 533.
 Pteropus 130. 131. 134.
 Puant 75.
 Puccarara 349.
 Pudel 539. 540.
 Puerca 178. 180.
 Puerco 178.
 Puerco-espino 341.

Pütſche 308.
 Pug-dog 543. 544.
 Puma 511. 512.
 Pümp 636.
 Punù 533.
 Purke 180.
 Purpurmaulwurf 119.
 Purſe 586.
 Pürſos 180.
 Puſchè 300. 308.
 Putois 463. 464. 489.
 Putorius 463. 464. 488. 489.
 491.
 Putoro 464.
 Puzolo 464.
 Puzzolente 464.
 Pygargus 287. 288. 317.
 Pygmaeus 8.
 Pyrame 540.

Q.

Qott el barr 495.
 Quata 46.
 Quachy 485.
 Quadruped 279. 330.
 Quadrupes 435.
 Quanhpecotli 165. 559.
 Quapizotl 185.
 Quassi 564. 567.
 Quata 47.
 Quato 47.
 Quauhcoyametl 185.
 Quauhcallotlquapacntli 421.
 Quauhtechallotl 417.
 Quauhtechallotl thilitic 417.
 Quauhtla 185.

Queen.

SYNONYMORVM.

Queen-ja 340. 342.	Rapoza 77. 563.
Queequehatch 167.	Rapphöns-hund 548.
Quelly 509.	Rat 74. 76. 801. 83. 128.
Quickhatch 167.	357. 381. 383. 387. 389.
Quich-hatch 168.	390. 395. 401. 404. 424.
Quil 480.	432. 434. 444. 487. 482.
Quimichpatlan 435.	Ratdort 434.
Quineajou 511.	Rata 384. 393.
Quirpele 480.	Ratelmaus 488.
Quogelo 98.	Ratinho 393.
Quoggelo 99. 100.	Rato 384. 387.
Quojas Morrou 7.	Raton 126. 166. 384. 387.
Quojaurau 8.	393.
Quumbengo 578.	Ratte 136. 381. 384. 396.
	397.
R.	Ratto 384.
Raa 315.	Rattus 382. 386.
Raa-buk 315.	Ratz 135. 430.
Raa-dyr 315.	Ratze 81. 136. 383. 384.
Rabbet 332. 335. 337.	401.
Rabbit 332. 335.	Ravale 74.
Raccoon 165. 166.	Raude 563.
Radja 505.	Rauhschwanz 375.
Räf 563.	Rearmouse 145.
Ræv 563.	Red Deer 302. 303.
Rafeiro 552.	Reh 315. 319. 322.
Rakke 533.	Rehbock 314. 315.
Rakkoon 166.	Rehe 306. 314. 317.
Ram 244.	Rehebock 314.
Ramfier 308.	Rehgeifs 315.
Rammler 327.	Rehziege 315.
Rangifer 305. 307. 631.	Reider 606.
Ranglier 308.	Rein 308.
Rädjur 315.	Reindeer 307.
Rapofa 563.	Reinthier 306.
Rapofero 553.	Reinthiersgeschlecht 306.

INDEX

- Reitmaus 380.
 Rell 429-430.
 Rellmaufs 429.
 Rellmoufe 430.
 Rellmufs 430.
 Ren 308.
 Renard 561-563. 565. 567.
 568. 570.
 Rendier 307.
 Rendieren 306.
 Rénes 306.
 Renne 306-308.
 Rennthier 306-308.
 Renfchieron 306.
 Rensdyr 308.
 Reremoufe 145.
 Reve 563.
 Réwä 245.
 Rewelaux 245.
 Rex simiorum 46.
 Rhantier 308.
 Rhee 314. 315.
 Rheetje 318.
 Rhen 308.
 Rhenne 307. 308.
 Rhinocer 198. 199.
 Rhinoceronte 200.
 Rhinoceros 198-200. 202.
 Riccio 171.
 Riche 334.
 Ricke 315.
 Rillow 41.
 Rind 232.
 Rindvieh 292.
 Ringauge 66.
 Rinoceronte 200.
 River-horse 196.
 Rivierpaard 192. 196.
 Rob 579. 582. 585. 586.
 594.
 Robbe 584-586.
 Robbenkönig 589.
 Roe 315.
 Roe-deer 314.
 Roebuck 315.
 Röd-Dyr 303.
 Rör-Hval 606.
 Rös-kat 473.
 Rößelwiff'lar 427.
 Róka 636.
 Røloway 42.
 Rone 180.
 Roquet 543.
 Rosalia 60. 61.
 Roselet 475.
 Rosenaffe 60.
 Rosmar 595.
 Rosmare 594.
 Rosmarus 593-595.
 Rosomach 478.
 Rosomack 479.
 Rosomaken 478.
 Rofs 208. 210.
 Rosfamaka 479.
 Rosfhirsch 304.
 Rosfiner 595.
 Rosfomack 478.
 Rosfomaka 477.
 Rostinger 593.
 Rost-Unger 595.
 Rostungr 595.
 Rot 128. 136. 384.

Rotta

- Rotta 384.
 Rotte 384.
 Rotter 384.
 Rougette 132. 133.
 Rouffette 131. 134.
 Rubbe 584.
 Rufius 525.
 Rukkaia 420.
 Rüpicapra 251. 268. 270.
 284.
 Rüpicaprea 268.
 Rupsok 563.
 Rufak 327.
 Ruffor 593.
 Rys 527.
 Rys' 527.
- S.
- Sabaea 33.
 Sabbel 469.
 Sabeldier 468. 469.
 Sabelmus 373.
 Sable 468. 469.
 Säbelfisch 625.
 Sælhund 586.
 Sagau 308.
 Sagif 450.
 Sagitta 408. 439.
 Sagoin 57. 58.
 Sagouin 51. 56. 57. 61.
 Sagovin 56.
 Saguin 55. 62.
 Sahouesquanta 437.
 Sai 49.
 Saj 49.
- Saibek 558.
 Saiga 289. 290. 317. 321.
 Saigaki 290.
 Saigi 289.
 Saïmiri 52.
 Sajmiri 52.
 Sajou 48.
 Saiu 49.
 Saju 50.
 Saka 521.
 Sake-winkee 55.
 Saki 55. 56.
 Sallhund 584.
 Sandata 611.
 Sandmaus 375.
 Sanglier 177. 178. 185.
 189.
 Sanglin 57. 58.
 Sangouinchen 57. 59.
 Sanguinariu 547.
 Sanguinen 57.
 Sapajou 44. 48. 49. 51. 52.
 55.
 Sarak 245.
 Saricovieme 445.
 Saricovienne 446.
 Sarigue 76.
 Sarluk 238.
 Sarmatier 460.
 Sarn 315.
 Sarna 315.
 Sarris 270.
 Sater 7.
 Satherius 467.
 Satyr 7. 8.
 Satyre 7.

INDEX

- Satyrus 6. 7.
 Sau 178. 180.
 Saufinder 553.
 Savia 352.
 Saugel 171.
 Saerüden 555.
 Sayga 289.
 Scalopes 80. 81.
 Scaly - Lizard 80.
 Schaaf 242 - 244. 246 - 251.
 254. 256. 289.
 Schaafbock 244. 247.
 Schaafkameel 225. 227.
 Schaap 227. 244. 254. 255.
 Schaeferhund 537.
 Schaep 244.
 Schär 115.
 Schämams 115.
 Schaf 243. 250. 254. 255.
 265.
 Schaf dromedar 225.
 Schakal 571. 572.
 Schakall 572. 574.
 Schandalgan 327.
 Schank 450.
 Scharmaus 396.
 Schaufelnase 138.
 Scheer 116.
 Scheinmaus 116.
 Schekel 571.
 Schelenffün 527.
 Scherebetz 210.
 Schiarro 413.
 Schield - hogs 105.
 Schildferkel 108.
 Schildferkelchen 110.
 Schildkrötenigel 105.
 Schildkrötenfchwein 105.
 Schildverken 107.
 Schir 393.
 Schiratolo 413.
 Schiratto 413.
 Schiriuolo 413.
 Schlafmaus 402.
 Schlafratte 430.
 Schleaderaffe 10.
 Schmalthier 303.
 Schnabelfisch 608.
 Schneewiesel 476.
 Schöps 244.
 Scholongo 471.
 Schönkfscha 384.
 Schonu 558.
 Schoorhondje 541.
 Schórda 300.
 Schórok 245.
 Schrotmaus 429.
 Schubdier 101.
 Schubhaagdis 99.
 Schür 393.
 Schüschi 393.
 Schulak 563.
 Schuppenthier 100. 101.
 Schupphier 100. 101.
 Schwanzratze 84.
 Schwarzohr 566.
 Schwein 177 - 179. 181. 184.
 185. 188.
 Schweinigel 170. 171.
 Schweinschwanzaffe 20.
 Schweifshund 547.
 Schweitzer 427.

Schwerdt-

S Y N O N Y M O R V M

X * D N I

- | | |
|---|---|
| <p>Schwerdtfisch 625.</p> <p>Scimie 34.</p> <p>Sciurus 411-433. 435-439.</p> <p>Scoiattolo 413. 419. 424.</p> <p style="padding-left: 20px;">426. 427.</p> <p>Scrag-whale 610.</p> <p>Scrofa 176-180.</p> <p>Scyurus 425.</p> <p>Sczenja 533.</p> <p>Sczeniuk 370.</p> <p>Sczenok 533.</p> <p>Sea-ape 600.</p> <p>Sea-calf 584. 586. 590.</p> <p>Sea-cow 595.</p> <p>Sea-horse 196.</p> <p>Sea-lyon 581.</p> <p>Sea-otter 446.</p> <p>Seal 580. 582. 584-586.</p> <p style="padding-left: 20px;">588-592.</p> <p>Sebeilinae 467.</p> <p>Seebär 579. 580.</p> <p>Seebiber 446.</p> <p>Seehund 584-592.</p> <p>Seekalb 585. 586.</p> <p>Seekatze 579.</p> <p>Seekuh 196. 597.</p> <p>Seelöwe 582. 583.</p> <p>Seeochs 597.</p> <p>Seeotter 446.</p> <p>Seepferd 197. 593. 594.</p> <p>Seibbfh 476.</p> <p>Selr 586.</p> <p>Semiulpa 73.</p> <p>Semlanaja Bjelka 436.</p> <p>Semljaroika 379.</p> <p>Seniculus 46.</p> | <p>Serna 312.</p> <p>Serotina 147.</p> <p>Sérotine 147.</p> <p>Serpenticida 481.</p> <p>Serval 523.</p> <p>Sesef 576.</p> <p>Setzhale 327.</p> <p>Sewigel 169.</p> <p>Sheep 224. 243. 244. 246.</p> <p style="padding-left: 20px;">250. 253-256.</p> <p>Shepherd's-dog 537.</p> <p>Sherebenok 210.</p> <p>Shibeardou 497.</p> <p>Shock 538. 542.</p> <p>Shrew 119. 122. 124. 127.</p> <p style="padding-left: 20px;">130.</p> <p>Shrew-mouse 125. 126.</p> <p>Sial 586.</p> <p>Sjarda 300.</p> <p>Sjakallen 571.</p> <p>Sic-cuse-fue 475.</p> <p>Siebenschläfer 430.</p> <p>Sjechaal 572.</p> <p>Sjenostawetz 337.</p> <p>Sifac 42.</p> <p>Sifach 43.</p> <p>Silberbär 159.</p> <p>Silberfuchs 567.</p> <p>Silberhund 567.</p> <p>Sild-Qual 605.</p> <p>Silenus 25. 26. 88.</p> <p>Siluanus 11. 12.</p> <p>Simia 7. 8. 10. 64. 88.</p> <p style="padding-left: 20px;">629.</p> <p>Simia-Sciurus 66.</p> <p>Simio 12.</p> <p style="text-align: center;">V v 5</p> |
|---|---|

- Simiolus 41.
 Simiötto 80.
 Simius 13. 34. 66. 71.
 Simiulpa 73. 74.
 Sinral 367.
 Singe 12. 13. 24. 28. 30-34.
 37. 42. 44. 46. 48. 52.
 53. 57. 59-61. 64. 66.
 Singe-Lion 59. 60.
 Sinkuráta kutya 636.
 Sinfín 7. 8.
 Sir 232.
 Sirenes 600.
 Sifel 367.
 Sisnàh 180.
 Sisnà-íga 180.
 Sivet-kar 495.
 Sjupp 166.
 Sivucza 583.
 Siyah-ghufh 524.
 Skäl 585.
 Skind-Vinge 145.
 Skogsmus 434.
 Skov-muus 389. 390.
 Skrzéczek 364.
 Skunk 488. 489. 491.
 Sleeper 432. 434.
 Slenter 450.
 Slepetz 377.
 Slepufchtschonka 379.
 Slepyschok 377.
 Sletback 603.
 Slinger-aap 26.
 Sloath 85. 86.
 Slon 205.
 Sloth 85-89.
 Sluggard 85. 88.
 Smale 244.
 Smitten 18. 19.
 Snee-muus 476.
 Snömus 476.
 Sobaka 533. 545. 547. 548.
 550.
 Sobella 467. 468.
 Sobeln 468.
 Söbol 469.
 Sobol' 469.
 Sochat 300.
 Soe 180.
 Soë-koe 597.
 Sogferken 180.
 Sogschwein 180.
 Sonatli schüfchi 145.
 Sora 171.
 Sorcio 384. 387.
 Sorex 79. 83. 121-129. 382.
 386. 388. 392. 394. 432.
 Sorice 393.
 Sôroch 245.
 Sofjedka 116.
 Soud 244.
 Souffleur 607.
 Sourichauue 141.
 Souris 390. 392-394.
 Souslik 367.
 Sow 180.
 Spagnoletto 541.
 Spalax 377. 379.
 Spanferkel 180.
 Spaniel 547.
 Spanjolet 541.
 Spafma 135. 136.
 Speck-

SYNONYMORVM.

- Speckmaus 145 - 147.
 Speäre 134.
 Spectrum 133 - 135.
 Speenvarken 180.
 Speicherwiesel 472.
 Spek - Hugger 625.
 Sperma - ceti Whale 613.
 Sperrnase 138.
 Sperrnase 138.
 Sphingion 15.
 Sphinx 15. 16.
 Spider - Monkey 47.
 Spiffier 303.
 Spinoso 341.
 Spitsmuis 121. 123. 126.
 Spitz. 538.
 Spitzmaus 125 - 127. 130.
 Spitzohr 151.
 Spiz 538.
 Spookdier 64. 68. 72.
 Sportiglione 145.
 Spouting - whale 605.
 Springer 405. 623. 625.
 Spürhund 547. 548.
 Squilachi 572.
 Squirrel 412. 413. 416 - 423.
 425 - 427. 429. 430. 432.
 435. 436. 438. 439.
 Sfää 259.
 Staal - Fönning 625.
 Stachelrücken 345.
 Stachelschwein 174. 340 -
 342. 344. 345. 347.
 Stag 302. 303. 305. 307.
 325.
 Staur - Hyning 615.
 Steenbok 262.
 Steendog 543.
 Steer 232.
 Steilohr 561.
 Steinbock 262. 263. 287.
 Steindocke 541.
 Steinfachs 569.
 Steinhaafe 337.
 Steinhund 451.
 Steinmarder 459.
 Steinmarter 459.
 Stekelvarken 174. 341 - 343.
 345. 347.
 Steppenfuchs 566.
 Steppenziege 290.
 Stier 229. 230. 232.
 Stinckbincksem. 493.
 Stinkdier 491.
 Stinkthier 464. 489. 490.
 Stoa 475.
 Stör 469.
 Stolpe 558.
 Stor - Hval 606.
 Stour - Vangen 625.
 Straubengeyz 255.
 Straubschaaf 289.
 Strepliceros 282.
 Strepliceros 255. 256. 282.
 283.
 Strepliceros 255.
 Strepticeros 282.
 Stuggard 88.
 Stute 210.
 Stutte 210.
 Svartside 588.
 Sucotario 207.

Suco.

- Sucotyro 207.
 Sue-Hval 613.
 Sürmülot 382.
 Suhak 289.
 Sviin 179. 180.
 Sviin-Sax 163.
 Svine-Hval 612.
 Suifle 427.
 Suka 533.
 Suka Guinoxa 533.
 Sukotyro 207.
 Sulgan 338.
 Sumpfhaafe 330.
 Sumpfmaus 394.
 Sumpfotter 451.
 Sumpffchwein 194.
 Sumura 367.
 Sungorus 376.
 Surek 116.
 Suricatta 488.
 Surikate 488.
 Surmülot 381.
 Surok 360.
 Sus 176-179. 181. 184-186.
 188-194.
 Sufar 458.
 Sufel 367.
 Sufjedka 116.
 Suslica 367.
 Suslik 367.
 Suta-dámvad 634.
 Suwfar 458.
 Swin 179. 180.
 Swinia 620.
 Swin'ja 179. 180. 620.
 Swinka 351.
 Swifcz 360.
 Syluanus 12.
 Syrichta 54.
 Szamár 633.
 Szárnyos egér 632.
 Szarvas 634.
 Szarvas-borjú 634.
 Szeléndek 636.
 Szymron 367.
 T.
 Taaleb 563.
 Tachs 162. 163. 554.
 Tachshund 554.
 Tackah 245.
 Tächfel 554.
 Tagah 245.
 Tagfchläfer 430.
 Tai 210.
 Tai-ibi 73. 74. 78.
 Tajacu 185. 186.
 Tajacu 185.
 Tajassoub 185.
 Tajassu 185.
 Taibi 73.
 Taiffion 162. 163.
 Takah 245.
 Takja 263.
 Talai 335.
 Talapoin 36.
 Talapoino 36.
 Talpa 114. 120. 123. 379.
 Tamandua 90-96. 490.
 Tamandua guacu 92-94.
 Tamandua-i 95.
 Tamandua Miri 95.

SYNONYMORVM.

Tamanduai 93.
 Tamanduai guacu 95.
 Tamanoir 91. 94.
 Tamari 63.
 Tamarin 61. 62.
 Tamarind 59.
 Tamarino 62.
 Tamariskenmaus 431.
 Tamendou 93.
 Tandtheye 625.
 Tandthöye 625.
 Tannbock 311.
 Tanngeis 311.
 Tannhirsch 310. 311.
 Tannwildpret, 311.
 Tanrec 175.
 Tapeti 336 337.
 Tapihires 191.
 Tapiirete 191.
 Tapiira 192.
 Tapiirete 191. 192.
 Tapir 191. 192. 194.
 Tapirus 191.
 Tapiti 336.
 Tarando 308.
 Tarandthier 306.
 Tarandus 305-308.
 Tarbaganezik 408.
 Tardigradus 85. 86. 88.
 Tarka Párdutz 636.
 Tarlatfchega 580.
 Tarpany 209.
 Tarsier 71.
 Tarsiere 708. 760 - 100.
 Tartar 190.
 Tartarin 17.

Tartarino 14.
 Taruga 224.
 Tarw 231.
 Tasso 163.
 Tatou 102. 103. 105-110.
 112. 113.
 Tattu 111.
 Tatu 99. 102. 103. 105.
 106. 109-113. 350.
 Tatu Apará 103.
 Tatu Apará 102. 103.
 Tatu-ete 109.
 Tatu-Kabassou 110.
 Tatu-peba 106.
 Taru-wiesel 111.
 Tatuete 107. 109.
 Tatuete 108.
 Tatus 106. 109. 107. 110.
 Tau-Tökké 263.
 Taupe 115-120. 123.
 Taura 233.
 Tauréar 231.
 Tauréléphantés 238.
 Taurus 228-231. 233-235.
 238.
 Tauvar 628.
 Taxus 161. 162. 176. 485.
 576. 630.
 Tayanán 99.
 Tayra 452. 453.
 Tchin Chian Kiapp 100.
 Tchorz 465.
 Techallorl 426.
 Techichi 555.
 Tehén 633.
 Teixugo 163.
 Teletz

INDEX

- Teletz 232.
 Telja 232.
 Telitza 232.
 Teluschka 232.
 Temacama 316.
 Temamacama 316.
 Temamaçame 316.
 Temamaçane 293.
 Tendrac 175.
 Tengeri-nyúl 634.
 Tenlie 574.
 Tepe 517.
 Ternera 231.
 Terrianiak 564.
 Têre de mort 53.
 Teve 633.
 Teufel 17. 100.
 Teufelchen 99.
 Teufelskind 463.
 Teuhtlamaçame 316.
 Texon 163.
 Texugo 163.
 Tezer-dea 482.
 Thier 301. 303. 310. 488.
 Thierlein 371. 493.
 Thierwolff 525.
 Thoes 571.
 Thous 574.
 Thrichechus 596. 597.
 Tjäcko 40.
 Ticháh 210.
 Tichari 452.
 Tieger 504. 508.
 Tiegerkatze 517.
 Tiegerthier 504. 508.
 Tiegerwolf 510.
 Tien 413.
 Tiger 504. 506. 508. 511.
 512. 514. 529.
 Tigercat 517.
 Tigerhund 547. 548.
 Tigeriltis 460.
 Tigerthier 503. 504. 513.
 Tigerwolf 578.
 Tigr 505.
 Tigra 504.
 Tigre 504. 505. 510. 514.
 Tigresse 504.
 Tigris 503. 504. 506. 511-
 514. 636.
 Tikagulik 615. 625.
 Timuch 478.
 Tittee 51.
 Tjulen 586.
 Tiür 232.
 Tiute 595.
 Tlacocelotl 515.
 Tlacoczelotl 515.
 Tlacuatzin 342.
 Tlamototli 428.
 Tlaquatzin 73. 78.
 Tlatlahqui 513.
 Todtenköpfchen 52.
 Todtenköpflein 52.
 Todtenkopf 53.
 Tövis-Difznó 632.
 Tolai 335.
 Took 300.
 Toparagno 124.
 Topo 116. 390. 393.
 Toporagno 126.
 Toro 231.

SYNONYMORVM.

- Tortoise shell cat 522.
 Toupeira 116.
 Touro 231.
 Toufchak 327.
 Tovus 450.
 Tragelaphe 304.
 Tragelaphus 250. 251. 279.
 304.
 Tragocamelus 279.
 Tragolo 323.
 Tragulus 277. 278. 282. 316.
 320. 322-324.
 Tragus 257. 269. 274. 277.
 283. 295. 320.
 Trais 262.
 Trampelthier 223.
 Tratratratra 7.
 Tretretretre 7.
 Trichechus 593. 594. 596.
 597. 599.
 Trichecus 595. 597.
 Troid-Hval 613.
 Truye 180.
 Tschâma 210.
 Tschan 210.
 Tschar 393.
 Tschaschea 563.
 Tschatak 479.
 Tschigitai 212.
 Tschinâma 458.
 Tschongifchische - kolja 145.
 Tschûbhuku 252.
 Tschûni 210.
 Tshkó 633.
 Tshkan 393.
 Tshödör 633.
 Túa 180.
 Tuabba 200.
 Tucan 119.
 Tüä 223.
 Tüè 223.
 Tue-Qual 606.
 Tülk 563.
 Tugalik 628.
 Tukalanda 179.
 Tukto 308.
 Tuläux 180.
 Tulân 458.
 Tulki 563.
 Tumblare 620.
 Tumbler 553.
 Tumler 622.
 Tumleren 620.
 Tunin 619.
 Tunnulik 606.
 Tur 230.
 Turnspit 553. 554.
 Turfio 615. 616. 618. 619.
 Twrch daear 116.
 Tyger 504. 513. 514.
 Tygerbuschkarze 529.
 Tygerpferd 218.
 Tygerthier 503. 506.
 Tygerwolf 510.
 Tygre 503.
 Tygris 503. 504.
 Tyr 232.
 Tzeiran 288.
 Tzur-ban 342.

I N D E X

M

V. 116
 Vaca 231. 231. 231. 231.
 Vacca 230. 231. 233. 235.
 237. 595. 597.
 Vache 191. 231. 238. 292.
 293. 594. 597.
 Vad-Bika 803.
 Vad-difznó 632.
 Vad-cme 632.
 Vad-kan 632.
 Vad-kos 634.
 Vadefehr 588.
 Vadefelur 588.
 Væfel 472. 473.
 Uagra 192.
 Vakondok 632.
 Vampire 134.
 Vampyr 134. 138.
 Vampyrus 130. 132.
 Vand-Hind 625.
 Vand-Roth 387.
 Vandfkioer 387.
 Vanfire 453.
 Vanfiro 453.
 Vary 558.
 Vari 67.
 Variae 509.
 Varius 41.
 Varken 178. 184.
 Varoza 360.
 Varus 415.
 Vary 66. 68.
 Vasmus 387.
 Vatushalr 603.
 Ucumari 159.
 Veado 311.

Veau 231. 584. 586. 592.
 Vechio 586.
 Veeh 415. 435.
 Veelvraat 478.
 Veeivraaten 477.
 Veldmuis 396. 397.
 Veldratte 348.
 Venhe 633.
 Venadito 311.
 Verdadeiro 111.
 Üрге 635.
 Verken 343.
 Verraco 180.
 Verrat 179. 180.
 Verres 177. 179.
 Verro 180.
 Vertagus 553.
 Veruex 226. 242.
 Ürwal 210.
 Üfch 245.
 Ufchkål 232.
 Üfchküfch 232.
 Vespertilio 710. 1390. 132.
 134. 155.
 Veter 24.
 Vetzere 636.
 Uggus 232.
 Uhrox 229.
 Vicogne 226. 227.
 Vicuna 226.
 Vicuñas 226.
 Vicunna 226.
 Vicunmas 226.
 Vidra 635.

Viell

SYNONYMORVM.

- Vielfraes 477.
 Vielfras 478.
 Vielfras 15. 477. 478.
 Vielfrafz 477. 575. 576.
 Vielgok 563.
 Vigogne 227.
 Ujing 475.
 Vild-Sviin 178. 179.
 Vilpestrello 145.
 Vinvifch 606.
 Viscacha 339.
 Viscachos 339.
 Vifela 471.
 Vifon 455.
 Vifone 455.
 Vifpiftrello 145.
 Vitela 231.
 Vitello 231. 585. 592.
 Vitala 233.
 Vitulus 230. 233. 583-585.
 590. 591.
 Viuerra 449. 451. 454. 465.
 466. 480. 482. 485-499.
 Vizcacha 339.
 Vizchaca 339.
 Vizsla 636.
 Ukalek 329.
 Ukschuk 158.
 Uksuk 591.
 Vledermuis 131. 134. 136.
 138. 140. 142. 144.
 Vledermuys 145.
 Ulf 558.
 Ulk 464.
 Ulofehò 210.
 Ulv 557. 558.
Excl. Mammal.
- Vlu Tiskan 384.
 Uluk 413.
 Umbulu 95.
 Umuk 437.
 Unagin 476. 563.
 Unau 85. 86. 88. 89.
 Vncia 508. 509.
 Vnicornfilh 627.
 Vnicornu 626. 627.
 Untz 508.
 Voang-Shira 453.
 Voifieu 432.
 Volpe 166. 563.
 Vond 116.
 Vond-fira 453.
 Vondfira 453.
 Vonfieu 432.
 Vormela 363.
 Vos 562. 563.
 Ur 413. 414.
 Urchin 170. 171.
 Urco 225.
 Urika 360.
 Uriftier 228.
 Urksuk 591.
 Urochs 229.
 Vifa 157. 158.
 Vifa formicaria 92.
 Urfo 158.
 Urfon 345.
 Urfone 345.
 Vrfulo affinis 167.
 Vrfus 156-158. 160-163.
 165. 166. 168. 478.
 485. 486. 579. 630.
- X x Uru

INDEX

- Uru 414.
 Vrus 228. 229. 235. 631.
 Ufeh 210.
 Ufehkan 327.
 Ufehmah 210.
 Ufehnap' 327.
 Usquiepatli 491.
 Ufia 158.
 Uffo 158.
 Ut 210.
 Uti 404.
 Utehr 589.
 Utter 450.
 Vulpecula 481. 488. 490.
 491. 560. 562. 568. 570.
 574.
 Vulpes 75. 165. 485. 490.
 561-563. 565. 567. 568.
 570.
 Vulpi affinis 165.
 Vulpisimia 73.

 W.
 Wachtelhund 540. 541. 547.
 548.
 Wachthund 545.
 Wadjanoi Krot 387.
 Wadur 244.
 Wagn-Hualur 625.
 Wagnhyalur 623.
 Waghthond 544. 545. 552.
 Wal 210.
 Waldefel 212.
 Waldgeist 27.
 Waldgott 20. 47.
 Waldhindinn 317.
 Waldmaus 79-81. 84. 390.
 Waldmensch 7.
 Waldnympe 23.
 Waldratte 382.
 Waldratze 76.
 Waldteufel 12.
 Waldthier 271.
 Wallach 210.
 Wallfisch 601. 603.
 Wallros 594.
 Wallrofs 593-595.
 Wallrus 593-595. 599.
 Wallrufs 595.
 Walvisch 603. 606. 608.
 609.
 Walvischdooder 625.
 Wanderow 24.
 Wanduru 26.
 Want 116.
 Wâranam 205.
 Warg 558.
 Warglo 527.
 Wariri 95.
 Warree hog 181.
 Wâs 232.
 Wâschina-210.
 Wasserhund 548.
 Wassermâus 123. 387.
 Wasserochs 195. 197.
 Wasserratte 128. 386. 387.
 Wasserratze 129. 387.
 Wasserfchwein 192. 193.
 Wasserpitzmaus 124.

Waterdog

SYNONYMORVM.

- Waterdog 539.
 Water-elephants 196.
 Waterhorfe 192.
 Water-Rat 386. 387.
 Water-Shrew 124.
 Water-Spaniel 539.
 Water-Spitsmuis 123.
 Water-Zwyn 193.
 Wattn-Rotta 387.
 Weasel 472. 473. 493.
 Weefel 453. 470. 472. 473.
 485. 486. 488. 489.
 491.
 Weezel 457. 466. 478.
 Weifsars 251.
 Weifsarsch 287.
 Weifsbart 25.
 Weifsifch 612. 616. 617.
 Weifsnafe 36.
 Wepr' 179.
 Werblūd 220. 223.
 Wefla 473.
 Wezel 446. 449. 453. 454.
 464. 468. 472. 473.
 Whale 601. 603. 613. 615.
 Whita nofes 35.
 Whitred 473.
 Wjarges 558.
 Wickelfchwanz 70.
 Widder 243. 244.
 Wjekſcha 413.
 Wieprz 179. 180.
 Wiefel 453. 454. 466. 470.
 473.
 Wiefelart 470.
 Wiefelein 471.
 Wiefeleicchörnchen 424.
 Wiewiorka 413. 437.
 Wikare-Sial 586.
 Wild 301. 303.
 Wild-Cat 526.
 Wildmarder 457.
 Wildſchwein 176. 177.
 Wilk 558.
 Will-Swin 179.
 Windhond 550.
 Windhund 550. 551.
 Windſpiel 549. 551.
 Winſelaffe 49.
 Wiporotki 580.
 Wirös 245.
 Wirrebocena 324.
 Wiſent 235. 237.
 Wittfiſch 616.
 Wittviſch 617.
 Wölfinn 558.
 Wöll 210.
 Woll 230. 232.
 Wolozitza 558.
 Wolf 559. 561. 572. 576.
 Wolfbeer 168.
 Wolfbard 508.
 Wolfsbär 168.
 Wolfshand 538. 566.
 Wolfſtieger 510.
 Wolk 558.
 Woloch' 210.
 Wolyerene 167. 168.
 Worrou 7.
 Wühlmaus 395.
 Wüll 210.

INDEX

Wüllä 210.

Wukor 232.

Wurdis 384.

Wychochol 129.

Wybuchol' 129.

Wydra 450.

Wyfent 235.

X.

Xavalí 178.

Xavalina 178.

Xe 320. 321.

Xé 320. 321.

Ximia 12.

Ximio 12.

Xoloitzcuintli 559.

Y.

Ybfch - Geyfs 262.

Ybfchen 262.

Ych 231.

Yegua 209.

Yerboa 404.

Yfard 270.

Yfgyfarnog 327.

Yftlum 145.

Ytzumbepotzotli 554.

Yzard 269.

Yzcuinte Porzotli 554.

Yzervarken 171.

Yzquiepatl 490.

Z.

Zabel - Vifch 627.

Zackl 256.

Zärtling 402.

Zaetz' 327. 405.

Zaiac 327.

Zajatz 327. 338.

Zainus 185.

Zalofes 276.

Zambus 66.

Zaunigel 171.

Zbik 520.

Zebra 216 - 218.

Zebre 217. 218.

Zebu 240.

Zecora 217.

Zee - Beer 579.

Zee - Hond 585. 586.

Zee - Kalf 592.

Zee - Koe 597.

Zee - Leeuw 582.

Zemni 370.

Zeug 180.

Zeura 217.

Zhiaepok 563.

Zhievres 450.

Zibak 126.

Zibeline 468.

Zibellina 467. 468.

Zibellino 468.

Zibet 495. 496.

Zibet Katz 494.

Zibetha 493 - 495.

Zibeth

SYNONYMORVM.

- Zibethicum animal 493.
 Zibethkarze 494.
 Zibethratze 444.
 Zibeththier 495.
 Zibetto 495.
 Ziebet 498.
 Ziege 251. 257-260. 265.
 286. 289. 290.
 Ziegenantilope 275.
 Ziegenbock 257-259.
 Ziegeneinhorn 289.
 Zieselmaufs 367.
 Zieselrate 367.
 Zieselratze 367.
 Zilio 575.
 Zifel 367.
 Zits-jam 405.
 Zits-jan 370.
 Zitteraffe 50.
 Zobel 467-469.
 Zobela 467.
 Zobeln 468.
 Zobelthier 469.
 Zobelwieselein 467.
 Zorilla 492.
 Zorille 492.
 Zorlito 315.
 Zorra 563.
 Zorro 563.
 Zubr 237.
 Zugmaus 373.
 Zuraphate 296.
 Zurnap 295.
 Zurnapa 294.
 Zurrma 367.
 Zwerg 54.
 Zwergbock 266.
 Zwergbudel 540.
 Zwergbüffel 240.
 Zwerggeichhörnchen 424.
 Zwegfledermaus 148.
 Zwerghaafe 338.
 Zwergmaus 122. 401.
 Zwergochs 241.
 Zwergwolf 572.
 Zwergziege 323.
 Zwyn 177. 178. 184. 186.
 189.

I N D E X
SYNONYMORVM GRAECORVM.

A.

Αιλουρος 518.
Αιξ 256. 259. 261. 268.
Αλωπηξ 561.
Αρκτος 156.
Ασπλαξ 114.

B.

Βιτάνες 235.
Βονασσος 233.
Βουβαλος 291.
Βους 228.

Γ.

Γαλη 423. 471.
Γιννος 216.
Γιλανος 216.

Δ.

Δασυπους 331.
Δελφιν 621.
Δελφισ 621.
Δορκος 285.

E.

Ελαφοκαμηλος 224.
Ελαφος 301.
Ελαφος ευρυκερως 309.
Ελειος 429.
Ελεφας 203.
Ευυδρις 448.
Εχινος 169.

Θ.

Θως 571.

I.

Ικτις 463. 465.
Ιορκος 310.
Ιππελαφος 354.
Ιππος 207. 208.
Ιππος ποταμιος 195.
Ιχνευμων 480.

K.

Καμηλοπορδαλις 294.
Καμηλος 221. 222.
Καπρος 176.

SYNONYMORVM GRAECORVM.

Καψωρ 440.
 Κερδω 561.
 Κηπος 34.
 Κυνοκεφαλός 22.
 Κυων 531.

Οναγρος 216.
 Ονος 213.
 Ορεως 215.

Π.

Λ.

Λαγως 325.
 Λαταξ 448.
 Λεζινα 500.
 Λεων 500.
 Λυγξ 525.
 Λυκος 556. 571.

Παρδαλις 505.
 Πιθηκος 11. 24. 25.
 Πορδαλις 505. 508.
 Ποταμιος ἵππος 195.
 Προβατον 242.
 Πτωξ 325.

Ρ.

Μ.

Μονωψ 233.
 Μυγαλη 125.
 Μυξος 429.
 Μυς 391.
 Μυσικτητος 601.

Ῥινοκερως 198.

Σ.

Ν.

Νυκτερις 143.

Σχυροι 6.
 Σκιουρος 411.
 Συς 176.

Τ.

Ο.

Οικουρος 537.
 Οις 248.
 Οις ξανθοι 255.

Ταξανδος 305.
 Ταυρος 228.
 Τιγρις 503.
 Τραγελαφος 304.
 Τραγοι 256.

Xx 4

Τ.

INDEX

τ.	Φοκαίνα 618.
Ἰαίνα 575.	Φωκίη 591.
Ἰε 170. 188.	
Ἰερίξ 340.	

x.

φ.	Χελονισκος 104.
Φαλίνα 601.	Χελωνεχίνος 104.
Φαλένα 609.	

INDEX

SYNONYMORVM RVSSICORVM.

A.	Бурундукъ 427.
Агнецъ 245.	Быкъ 232.
	Бѣлка 413. 430.

B.

B.

бабакъ 360.	Вепрь 179.
бабръ 508.	Верблюдъ 220. 223.
бабукъ 405.	Еодяной крошъ 387.
баранъ 245. 252.	Волкъ 558.
барсв 508.	Волохъ 210.
барсукъ 163.	Волчица 558.
бобръ 443. 447.	Выдра 450.
болъ 232.	Выпорошки 580.
боровъ 179. 180.	Выхохоль 129.
буйволъ 230.	Выхухоль 129.
буйль 230.	Вѣкша 413.

Г.

SYNONYMORVM RVSSICORVM.

Г.

Горностаѣ 475.

Д.

Джеренѣ 288.

Дикая коза 315. 317.

Дикобразѣ 342.

Е.

Ежѣ 171.

Ж.

Жеребенокѣ 210.

Жеребецѣ 210.

З.

Заецѣ 327. 405.

Заяцѣ 327. 338.

Земляная сосѣдка 116.

И.

Исубрѣ 303.

К.

Кабанѣ 180.

Кабарга 321.

Каланѣ 447.

Каменная сосѣдка 116.

Каменный медвѣдь 116.

Камчатской бобрѣ 447.

Карсакѣ 566.

Кнурѣ 179.

Кобыла 210.

Коза 259. 270. 315.

Козелѣ 259.

Конь 210.

Корова 232.

Корова морская 597.

Копѣ 521.

Кошка 520. 521.

Кошки 367.

Кошлоки 443.

Кресповка 571.

Кроликѣ 333.

Кропѣ 116.

Крыса 384.

Кулоннокѣ 470.

Куница 458.

Л.

Лань 303.

Ласица 465.

Ласка 476.

Ласмицки 473.

Ласочка 465.

Лвица 502.

Левь 502.

Леопардѣ 507.

Лисица 563.

Хъ 5

Лисѣ

I N D E X

Лисъ 563.
 Лось 300.
 Лошадь 210.
 Лошакъ 216.
 Лѣснѣй быкъ 230.
 Лѣшага 437.
 Лѣшагъ 437.
 Лѣшягъ 437.

М.

Мараль 303.
 Маргачъ 290.
 Медвѣдица 158.
 Медвѣдь 116. 158.
 Меренъ 210.
 Мескъ 216.
 Моржъ 595.
 Морская лошадь 197.
 Морскон котъ 580.
 Муль 216.
 Мышь 145. 393. 397.

Н.

Недособоль 469.
 Нерпа 586.
 Нешопыръ 145.
 Норка 452.
 Носорогъ 200.

О.

Обезьяна 13.
 Овенъ 245.

Овца 245.
 Оленица 308.
 Олень 303. 308.
 Она 288.
 Онагръ 213.
 Осель 214.
 Ослица 214.

П.

Перегузня 460.
 Песецъ 569.
 Песъ 533.
 Пищуха 337.
 Поросянокъ 180.
 Порося 179.
 Псица 533.

Р.

Росамака 479.
 Русакъ 327.
 Рысь 527.

С.

Саига 290. 321.
 Свинья 179. 180. 620.
 Семланая бѣлка 430.
 Серна 312.
 Сивуча 583.
 Слепецъ 377.
 Слепышокъ 377.

Слонъ

SYNONYMORVM RVSSICORVM.

Слонъ 205.		У.
Собака 533. 545. 547.	Ушканъ 327.	
548. 550.	Ушнапъ 327.	
Соболь 469.		
Сосѣдка 116.	Х.	
Соханъ 300.	Хомякъ 364.	
Сука 533.	Хорокъ 470.	
Сурокъ 360.		Ч.
Сусликъ 367.	Черно бурои 561.	
Сусѣдка 116.		
Сѣноставецъ 337.		
		Ш.
Т.	Шенокъ 533.	
	Шеня 533.	
Талаи 335.		Ю.
Тарбаганчикъ 408.		
Телецъ 232.	Юнецъ 232.	
Телца 232.	Юница 232.	
Телушка 232.		Я.
Теля 232.	Язвецъ 163.	
Тигръ 505.	Ярка 245.	
Толаи 335.	Ярцы 443.	
Тюленъ 586.		

ERRATA.

pag. 11	lin. 9	Altitudo	pag. 235	lin. 6	Biswaga
16	4	vnguibus.	266	24	Africa
26	26	Cercopithecus	269	14	Chamoise
27	23	desinens	289	4	Baikal
39	4	siue	296	29	rigi-
57	13	<i>Parsons</i>	303	2	Elaphus
62	14	labio	304	28	Cerf
	17	bovenlip	311	vl.	Dendl
63	3	Edw.	317	21	vere
73	14	nimis	319	5	Iugulum
84	20	infiliunt	321	2	moschiferus
90	18	Oouatirjoſaou,	322	1	orificiisque
94	1	Tamandua	323	34	femina
96	7	Tamandua-I		vl.	Hallenji
	8	Myrmecophaga	324	22	Bancroftio
99	7	tab. 6.	325	2	without
100	2	Naturf.	328	21	Delectatur
	17	rotundatae.	346	25	Hystrix
102	8	Cauda	355	16	Konyn
105	17	Schild.	368	24	refectae
112	33	zwölf	379	2	doctiff.
117	28	gefleckte	388	12	boreali
123	20	dan t	397	12	Erdzeisl
126	28	Murgaña	405	8	I. G.
134	26	tregrerswyze	441	14	Sarrasin
136	9	van	444	vl.	fiffis
	30	Vespertilio	445	13	hiemem
170	32	Erinaceus.	465	2	Gad-fe
181	24	domesticis	470	11	Fifher
183	7	instructa		27	sibirica
	23	ad regionem	475	34	Горностаѣ
197	17	lofchad'	480	29	et
198	5	terri-	570	25	Vulpeculae
	7	infulis	596	32	Manatus
214	21	Caput	608	22	een
219	21	Camelus		33	Reydur

<i>Didelphis Manisculis</i>	73
<i>Dasypus</i>	135
<i>Salp. longicauda</i>	110
<i>Salp. ?</i>	119
<i>amataca</i>	123
<i>Aspidosaurus</i>	151
<i>monobonanus</i>	155
<i>Urocyon</i>	151
<i>Canis</i>	162
<i>" lucius</i>	167
<i>Canis latrans</i>	175
<i>Urocyon</i>	234
<i>Canis</i>	305
<i>Canis</i>	330
<i>Canis</i>	362
<i>Canis</i>	363
<i>Canis</i>	410
<i>" Niger</i>	417
<i>" cinereus</i>	418
<i>Canis</i>	421
<i>Canis</i>	422
<i>Canis</i>	423
<i>Canis</i>	470
<i>Canis</i>	471
<i>Canis</i>	455
<i>Canis</i>	472
<i>Canis</i>	511
<i>Canis</i>	513
<i>Canis</i>	514
<i>Canis</i>	560
<i>Canis</i>	561



Patlány Sorex ein
Spitzmaus, Mützer.
Urge. Cuniculus Furgulus
Cureulis ein Korn-
wurm.
Gözü. Furgulus ein
Aufwöhre



